

olic

DATE DUE

~~AUG 8 1966 J R~~

~~INTERLIBRARY LOAN~~

AUG 17 1963

MAY 9 2006

PRINTED IN U.S.A.

Fh.

DOUBLE

DIAGNOSES

PLANTARUM ORIENTALIU NOVARUM.


DIAGNOSES

PLANTARUM ORIENTALIU NOVARUM.

AUCTORE

E. BOISSIER,

SOC. PHYS. GENEV. SODALI.



Volumen secundum.

Sisteus fasciculos 8-13.

LIPSIAE.

APUD B. HERRMANN.

1842-1854.

257004B

311

DIAGNOSES

PLANTARUM ORIENTALIVM NOVARVM.



RANUNCULACEÆ.

ANEMONE STELLATA L. var. *Heldreichii* Boiss. — Minor. Involucrum triphyllum foliolis abbreviatis oblongis obtusiusculis. Flores pallidissime roseo-grisei parvi diametro 9-14 lineas lati. Petala elliptica obtusa.

Hab. in dumosis montis *Akrotiri* et faucibus montis *Malaxa* propè *Cydoniam* Cretæ. Heldreich Marte 1846.

Varietas elegans distinctaque sed a specie nullo modo separanda.

ADONIS PALÆSTINA Boiss.

A. annua, calyce glabro demum reflexo, caule elato sulcato divaricatum ramosissimo, petalis magnis obovato-cuneatis miniatis, spicâ carpellorum cylindricâ elongatâ, carpellis axi horizontaliter impositis basi incrassatis tuberculato-rugosis medium versùs margine angulato-dentato circulari instructis supernè læviusculis striatis in rostrum uncinato-subrecurvum attenuatis.

Hab. ad basin montium Judææ inter *Ramlah* et *Hierosolimam*, in vallibus prov. Samariæ propè *Sanour* in agris et pinguibus gregarie crescens. Legi Apr. et Maio.

Planta sæpè 4-2 pedalis, flos diametro 45-48 lin. sæpè latus, carpella magis lata quàm longa usquè ad medium incrassata ibique in marginem seu discum dentatum abeuntia supernè in rostrum subrecurvum co-

nico-attenuata. Indole fructûs appropinquanda *A. dentata* Del. quæ quoque carpellis circulariter marginatis gaudet sed dimidiò minoribus et in quibus præterea margo multò profundius dentatus est et rostrum brevissimum ascendens apice suo extremitati margini superioris contiguum.

RANUNCULUS ORIENTALIS L. var. *heterophylla* Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. — Pumilus, foliis aliis trisectis segmentis crenatis dentatis vel etiam profundè partitis, aliis multifidis.

Hab. sectus vias et in littore maris propè *Adaliam* Pamphyliæ mixtus cum formâ genuinâ in Deless. Ic. select. I tab. 33 exhibitâ in quâ folia omnia decomposito-multifida sunt (Heldreich).

RANUNCULUS TRIGONOCARPUS Boiss. (Sect. *Ranunculastrum*.)

R. totus adpressè albo-villosus, radice..., foliis multifido-decompositis laciniis angustè linearibus elongatis apice rotundato-callosis caulinis sessilibus, caule supernè dichotomè et divaricatim ramoso, floribus... sepalis deflexis longè hispidis, pedunculis fructiferis elongatis apice subincrassatis, spicâ fructiferâ capitatâ oligocarpâ, axi villosâ, carpellis præter pilos secus marginem exteriorèm sparsos glabris brevibus triangularibus margine superiori brevi recto in rostrum horizontale apice subrecurvum carpello æquilongum rectilineè abeunti margine exteriori rectiusculo subconvexo.

Hab. verosimiliter in *Anatoliâ*, habeo specimen fructif. incompletum in coll. Aucherianâ sub N° 37 cum *R. Orientali* mixtum.

Spica fructifera vix pisi magnitudinis, carpella sensu verticali (longiori) lineam $1\frac{1}{4}$ lata, rostrum lineam longum. *A. R. Orientali*, *Isthmico* et affinibus eximè distinctus carpellis facie non tuberculatis, latere exteriori rectiusculis vel subconvexis nec profundè bilobis.

RANUNCULUS CUNEATUS Boiss. (Sect. *Ranunculastrum*.)

R. totus ad petiolos patentius ad caules ramos et folia adpressè villosus, foliis radicalibus ad $\frac{2}{3}$ vel $\frac{3}{4}$ tripartitis basi cuneatis partitionibus basi subangustatis apice obtusissimè 2-3 lobis, caule mediocri erecto semel rarius bis dichotomo cum flore longius pedunculato in dichotomiâ, foliis caulinis binis oppositis sessilibus 2-3 sectis laciniis linearibus elongatis obtusis, sepalis deflexis patulè et longè hispi-

dis, petalis creberrimè venulosis, spicâ fructiferâ ovato-rotundâ, axi glabrâ, carpellis (junioribus) triangulari-ovatis lævibus sparsim et marginem versùs albo-pilosis in rostrum rectum carpello æquilongum abeuntibus.

Hab. in *Tauro Cilicio* Kotschy pl. exs. N° 9 sub *R. oxypermo* MB.

R. oxypermus a nostrâ specie longè differt fibris radicalibus ovato-rotundis, foliis majoribus magis divisis basi truncatis vel subcordatis, floribus dimidiò minoribus, carpellis glabris etc. Nostra species est quasi intermedia inter *R. Sprunerianum* et *R. argyreum* quorum prior indumento patentiori, foliis inferioribus 5 lobis basi cordatis, caule ramosiori, carpelli tuberculati rostro recurvo discedit et posterior habet folia cuneata equidem sed multò magis lobata, fibras radicales valdè elongatas, indumentum totius plantæ valdè patulum, carpella tuberculata etc.

RANUNCULUS CUPREUS Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1846. (Sect. *Ranunculastrum*.)

R. radice albo-hispidulâ tuberculos grumosos ovatos acutos fibrasque tenues elongatas intermixtas edenti, caulibus folia parùm superantibus simplicibus biflorisve petiolisque pilis adpressiusculis hirsutis, foliis radicalibus pilis albis sparsis obsitis ambitu ovatis bipinnatisectis 4 sæpius 2jugis laciniis parvis obovatis indivisis vel 2-3 partitis obtusis, foliis caulinis minimis pinnatisectis laciniis linearibus abbreviatis, sepalis adpressis viridi-rubellis latè albo-marginatis glabriusculis, petalis obovatis subretusis intùs citrinis extùs rubello-cupreis, carpellis junioribus in rostrum rectum apice circinnatum abeuntibus.

Hab. in saxosis montis *Tavoutsi* Eparchiæ *Sitia* Cretæ alt. 5000'. Heldreich Aprili 1846.

Caules 3-4 pollicares, flores magnitudinis *R. philonotidis*. Valdè affinis foliorum formâ *R. leptaleo* DC. Deless. Ic. Select. tab. 33 qui differt tuberculis radicalibus ipsis in fibras elongatas attenuatis, indumento caulis patulo, foliis deniquè glabris, carpelli rostro a basi valdè incurvo.

RANUNCULUS BULLIFERUS Boiss. et Hohen. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Ranunculastrum*.)

R. glaberrimus, radice fasciculato-grumosa fibris oblongis vel cylin-

dricis constanti, foliis radicalibus paucis trisectis segmentis petiolulatis vel sessilibus oblongo-ellipticis obtusis integerrimis, caulibus humilibus basi tantum foliosis compressis flexuosis simplicibus vel parce ramosis, foliis caulinis petiolo basi dilatato suffultis trisectis segmentis saepius petiolulatis indivisis vel profundè 2-3 fidis lobis, oblongis obtusis, foliis supremis secus pedunculos oblongis sessilibus indivisis, axillis omnium bulbillos nigricantes petioli basi vaginatos edentibus, pedunculis longiusculis, sepalis glaberrimis luteis corollae flavae adpressis, petiolis ellipticis, carpellis...

Hab. ad nives deliquescentes montis *Totschal* propè *Teheran* Persiae borealis Kotschy N° 499.

Planta tripollicaris foliorum naturà et habitu *R. polyrhizum* qui ob radicis formam in alià sectione militat quodammodò referens, propè *R. Cadmeum* collocandus.

RANUNCULUS EDULIS Boiss. et Hohen. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Ficaria* vel *Thora*.)

R. glaberrimus, radice fibris longis cylindricis infernè clavato-incrasatis fibrillis tenuibus intermixtis constanti, foliis petiolo plano eis subtriplo longiori infernè membranaceo-dilatato suffultis ovato-triangularibus basi subcordatis circumcirea rotundato-crenatis carnosulis, caule brevissimo vaginis foliorum radicalium tecto apice fasciculum foliorum pedunculosque 4-3 foliis breviores unifloros post anthesin circinnato-recurvos edenti, sepalis basi subsaccatis flavidis oblongo-lanceolatis, petalis lanceolatis obtusiusculis basi attenuatis pallide flavis parallele multinerviis, spicà carpellorum minutà breviter ovatà, carpellis glabris oblongo-clavatis apice rotundatis.

Hab. in parte occidentali montis *Elbrus* in alpe *Hasartschal* alt. 7000' (Kotschy). Persicè *Serdi Muschak* et *Barf Elim* dictus; folia et caules cum oryzà coeti comeduntur.

Valdè affinis modo crescendi et characteribus *R. fscarioidi* Bory et Chaubard qui a nostrà specie differt foliis paulò majoribus basi valdè cordatis profundè et acutiusculè lobatis, petalis ellipticis. Forsàn *Ficaria ranunculoides* C. Koch. in Linnæa 15 p. 243 ad nostram speciem spectat.

RANUNCULUS PALÆSTINUS Boiss. (Sect. *Hecatonia*, DC.)

R. radice fibris fasciculatis cylindricis elongatis constanti, caule

elato striato sulcato infernè folioso supernè ramoso-paniculato petiolisque pilis albis deflexis hispidis, foliis longè petiolatis utrinquè adpressè hirsutis ambitu subrotundis basi cordatis ferè ad basin usquè tripartitis partitionibus lateralibus bifidis intermediâ basi cuneatâ trifidâ segmentis grossè et obtusissimè lobato-dentatis, foliis superioribus breviter petiolatis, summis ad pedunculorum basin ad laciniam linearilanceolatam reductis, pedunculis non sulcatis, sepalis sericeo-hirsutis demùm patenti-reflexis, spicâ fructiferâ globosâ parcè carpellatâ, axi glabrâ, carpellis magnis planis glabris facie sub lente punctulatis angustissimè marginatis rostro brevissimo uncinato-circinnato terminatis.

Hab. in pratis paludosis ad margines lacûs *Bahr el Houleh* in Galilæâ, in Antilibano inter *Hasbeya* et *Rascheya*.

Habitu, foliis crassis affinis *R. palustri* qui differt carpellis minoribus margine subtricarinatis in rostrum evidentius rectum abeuntibus. *R. lanuginosus* longius differt foliis acutè dentatis, rostro dimidium carpellum æquanti etc. Carpellum in nostrâ specie 2 lin. diametro latum, rostrum vix lineæ tertiam partem longum.

RANUNCULUS AMBLYOLOBUS Boiss. et Hohen. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Hecatonia*.)

R. radice tenuiter cylindrico-fibrosâ, caulibus elatis teneris striatis simplicibus 2-3 florisve petiolisque breviter et patulè hirtulis, foliis radicalibus longè petiolatis ambitu rotundis profundè cordatis sinu subclauso ad medium vel profundius tripartitis partitionibus in lobos magnos ovato-triangulares acutiusculos fissis glabriusculis margine ciliatulis, caulinis sessilibus ad basin usquè in 2-3 lacinias lanceolato-lineares acutas partitis, pedunculis substriatis adpressè hirsutis, sepalis hirsutis dorso rufescentibus margine flavidis, spicâ carpellorum ovatâ, axi hirsutâ, carpellis glabris lævibus subtriangularibus basi angustatis apice latioribus subinflatibus margine superiori carinato in rostrum breve horizontale circinnato-recurvum abeunti.

Hab. in hortis humidis umbrosis propè *Derwend* in parte inferiori montis *Elbrus*. Kotschy N° 117. 141.

Caules sesquipedales, folia diametro 2-2½ pollicaria. Flores illis *R. acris* ferè majores; huic speciei quoad habitum et characteres magis affinis sed eximiè distinctus lobis foliorum non acutis, spicâ fructiferâ

ovatâ nec globosâ, axi hirsutâ nec glabrâ, carpellis parte superiori subinflatis nec compressis, rostro evidenter circinnato.

RANUNCULUS BRACHYLOBUS Boiss. et Hohen. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Hecatonia*.)

R. radice obliquè descendenti fibras cylindricas verticales edenti extremitate truncatâ, foliis omnibus radicalibus glaberrimis petiolo patulo suffultis parvis ambitu rotundis trisectis segmentis cuneatis abbreviatissimis lobatis lobis ovatis acutiusculis apice sæpius callosis, pedunculis radicalibus unifloris nudis folia paulò superantibus hirtis, sepalis parcè hirsutis flavidis patentibus, petalis obovatis flavis, carpellis (junioribus) glabris rostro recto apice subincurvo sphacelato terminatis.

Hab. in humidis montis *Totschal* propè *Teheran* alt. 6000' Kotschy N° 468.

Plantula 2-3 pollicaris uniflora, folia diametro 6-8 lin. lata, flores magnitudinis *R. demissi* et *dissecti* affinibus et qui a nostrâ plantâ foliis in lacinias oblongas vel lineares multipartitis aliisque differunt notis.

RANUNCULUS CRYMOPHILUS Boiss. et Hohen. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Hecatonia*.)

R. glaberrimus, radice præmorsâ fibras radicales cylindricas edenti, collo densè fibroso, foliis omnibus radicalibus humi expansis breviter petiolatis ambitu oblongis pinnatisectis, segmentis minimis abbreviatis subsessilibus in lacinulas minutas oblongas acutas multipartitis, pedunculis tenuibus flexuosis 4 vel 2 floris folia duplò superantibus nudis ad dichotomiam vel ad medium foliolo lineari-lanceolato obsitis, flôribus parvis, sepalis dorso parcè hirsutis demùm deflexis, petalis obovatis flavis, spicâ carpellorum rotundâ, axi glabrâ, carpellis junioribus glabris in rostrum longiusculum apice circinnato-recurvum abeuntibus.

Hab. propè moles glaciales in alpihus *Hasartschal* in parte occidentali montis *Elbrus* alt. 10000'. Kotschy N° 496.

Folia cum petiolo sesquipollicaria semipollicem vix lata lobulis ferè 2 lin. longis lineam latis, scapi 2-3 pollicares. Species ambitu angusto foliorum notabilis propè *R. procumbentem* collocanda qui lacinis folio-

rum longè majoribus, indumento caulis adpresso, carpellis hirsutis etc. differt.

ISOPYRUM CÆSPITOSUM Boiss. et Hohen. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846.

I. perenne glaucescens cæspitosum, caudicibus reliquis petiolorum vetustorum densè squamosis imbricato-columnaribus apice folia scaposque edentibus, foliis petiolo tenuissimo basi dilatato angustèque membranaceo-auriculato suffultis biternatis, divisionibus primariis longiusculè petiolulatis segmentis subsessilibus rotundis in lobos 2-3 parvos breves ovatos obtusos ad medium vel ad basin usquè fissis sub lente puberulis, scapis unifloris folia paulò superantibus sub flore bracteis binis lanceolatis basi dilatato-auriculatis obsitis, sepalis lilacinis ovatis segmenta foliorum magnitudine suà multò superantibus, petalis obovatis apice emarginatis, stylis subcircinnato-recurvis ovariisque papillosis.

Hab. in excelsis alpis *Hasartschal* in parte occidentali montis *Elbrus* alt. 11000'. Kotschy N° 504.

Affine characteribus et florum magnitudine *I. grandiflora* a quo differt caudicibus densius squamosis cæspitosisque, foliorum segmentis in lobos breviores minoresque dissectis, stylis uncinatis papillosis nec rectis glabris.

NIGELLA BICOLOR. Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Nigellaria*.)

N. glabra viridis, caulibus erectis a basi dichotomis ramisque strictis foliosis, foliis pinnatisectis laciniis linearibus elongatis acutis, floribus parvis basi nudis, sepalis cæruleis patulo-deflexis obovatis obtusis basi attenuatis, petalis minutis stipitatis cuneatis bilobis lobis triangularibus parcè pilosis in laciniam linearem apice obtusam callosam attenuatis, nectario ad basin exteriorem limbi petalini inflato ovato, lacinia accessoriâ basi triangulari apice attenuatâ lineari e basi interiori limbi ortâ, antheris muticis stigmatibusque rubro-brunneis, stylis in flore patentibus recurvis, pedicello fructifero anguloso incrassato, carpellis erectis obsolete tuberculatis dorso carinatis in fructum obconicum pentagonum ad $\frac{2}{3}$ longitudinis concretis, stylis erecto-patulis fructu

triplo brevioribus, seminibus eximiè triquetris lævibus nitidis punctulatis.

Hab. in campis propè *Karkin* ad orientem urbis *Koniah* in Lycœniâ ubi legit Junio cl. Heldreich, eis *Tauriâ* undè misit cl. Turczaninow sub nomine *N. fœniculaceæ*.

Semipedalis vel paulò major. Flores eis *N. arvensis* dimidiò minores, fructus cum stylis 8-10 lin. longus. Affinis *N. fœniculaceæ* DC. quæ differt floribus duplò majoribus, sepalis cordatis, antheris aristatis, rostro carpellorum multò longiori. Planta ab. amiciss. Hohenacker e *Kachetiâ* sub *N. fœniculaceâ* distributa a plantâ Candolleana valdè diversa est et a nostrâ specie foliorum laciniis tenuioribus tantùm differre videtur.

NIGELLA STELLARIS Boiss. (Sect. *Nigellaria*.)

N. pumila pallidè virens, caule tenui simplici vel divaricatim ramoso ramis horizontalibus, foliis abbreviatis multifidis laciniis tenuiter linearibus acutis parcè papilloso-asperis, floribus involucro folioso multifido eos subæquanti suffultis, sepalis cæruleis patulo-deflexis oblongis attenuato-stipitatis, petalis hirtulis longè stipitatis basi extûs nectario gibbiformi intûs laciniâ triangulari-lineari auctis apice bilobis lobis ovatis in laciniam apice truncato-clavatam papillosam abeuntibus, antheris flavis muticis, carpellis tuberculato-asperis in fructum pentagonum brevissimè obconicum centro hiantem coalitis cornubus 5 basi tuberculosi apice lævibus a latere compressis horizontalibus a fructu augulo recto divergentibus eoque 4-5 plò longioribus, seminibus quadrangulis punctato-tuberculosi.

Hab. in cultis montis *Cassii* in regione inferiori inter *Cassab* et *Suadieh*. Legi Jun. 1846.

Planta 3-4 pollicaris sæpè ramosa, rami horizontaliter elongati semipedales, flores magnit. eorum *N. arvensis*, fructus 3-4 lineas longus cornubus stellatim patentibus subtûs carinatis 12-15 lin. longis coronatus. Species distinctissima.

DELPHINIUM SCLEROCLADUM Boiss. (Sect. *Consolida*.)

D. annuum pilis brevibus adpressis canescens, caulibus pluribus a basi crebrè et pyramidatim ramosis ramis brevibus paululis rigidissimis bifidis, foliis ad omnes dichotomias carnosulis sessilibus ambitu

orbiculatis omnibus multifidis laciniis abbreviatis linearibus, pedunculis rigidis bracteolis 2-3 minimis linearibus obsitis, calycis calcarē pubescenti horizontali apice incurvo supernè clauso, corollæ parte anticâ abbreviatâ emarginatâ lobo superiori obtusiori majori, lobis posticis roseis magnis a corollæ parte anticâ sinu angustissimo sejunctis, capsulâ glaberrimâ oblongo-linearî reticulato-venosâ apice rotundatâ stylo recto rostratâ.

Hab. in montibus demissioribus Syriæ borealis inter *Latakiah* et *Aleppum*. Legi. flor. Julio ineunte.

Planta pedalis vel sesquipedalis dumum rigidissimum pyramidatum formans, rami floriferi horizontales duri 4-2 pollicem longi biflori, capsula 5-6 lin. longa stylo 2 lineas longo terminata, flores formæ et magnitudinis eorum *D. anthoroides* quod e Syriâ quoque oriundum differt caule ramosissimo quidem sed dichotomo nec pyramidato, ramis elongatis divaricatis multò tenuioribus, petali parte anticâ valdè exsertâ æqualiter vel subæqualiter bifidâ a parte posticâ sinu lato sejunctâ, capsulâ breviori oblongo-subrhomboideâ, laciniis foliorum paucioribus longioribus, foliis summis simplicibus.

DELPHINIUM ITHABURENSE Boiss. (Sect. *Delphinastrum*.)

D. radice tuberosâ fibris cylindricis abbreviatis fasciculatis constanti, caule elato subangulato-striato simplici patentim hirsuto, foliis longè petiolatis patulè hirtulis ambitu rotundis palmatim 5-7 partitis segmentis basi cuneatis in lobos oblongo-lineares obtusos apice calloso-mucronatos fissis, racemo elongato densiusculo simplici, pedicello calcare dimidiò breviori basi tribracteato bracteis lanceolato-linearibus membranaceis barbatis basilari majori pedicellum æquantî vel superanti, floribus griseis vel griseo-rubellis, sepalis barbatis ellipticis petala æquantibus, calcare flore sublongiori cylindrico recto patulè hispido, petalis superioribus glabris obliquè truncatis inferioribus paulò longioribus hirtulis in stipitem longum attenuatis profundè bilobis lobis oblongis longè barbatis.

Hab. in sylvaticis montis *Thabor* Galilææ, legi florif. Maio.

Planta tripedalis, foliorum lacinia illis *D. hybridi* latiores, flores eis hujus paulò breviores, calcar 5-6 lin. longum. Affine. *D. hybrido* ab eo distinguitur indumento patulè hispido, foliorum formâ, florum colore, pedicellis medium versùs non bibracteatis, petalis longè et densè barbatis etc.

DELPHINIUM LANIGERUM Boiss. et Hohen. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Delphinastrum*.)

D. glaberrimum, radice subbulboso-incrassatâ, caule elato tereti lævi supernè parcè paniculato-ramoso, foliis amplis longè petiolatis ferè ad basin usquè palmatipartitis, partitionibus in lobos latè lineares acutos elongatos fissis, racemis abbreviatis laxiusculis, pedunculo calcare paulò breviorè basi bracteâ subbreuiori suprà medium bracteis binis lineari-setaceis glabris suffulto, floribus intensè cæreuleis, sepalis ellipticis glabris apice ciliatis petala æquantibus, calcare flore longiori glabro recto ad apicem usquè sensim attenuato, petalis superioribus coriaceis obliquè truncatis præter apicem sparsissimè ciliatulum glabris inferioribus basi longè stipitatis ad tertiam partem usquè bilobis densè et longè barbato-lanatis.

Hab. ad latera meridiem spectantia faucis *Dudera* montis *Elbrus* Kotschy N° 430.

Planta 6–8 pedalis, folia inferiora magnitudine et formâ ea *Aconiti lycoctoni* referentia, calcar 7–9 lin. longum. Ex affinitate *D. penicillati* et *saniculæfolii* ab eis et aliis speciebus Orientalibus a me descriptis differt staturâ elatâ, glabritie, foliis amplis diametro sæpè semipedalibus, etc.

PAPAVERACEÆ.

PAPAVER TENUIFOLIUM Boiss. et Hohen. in Kotschy pl. Pers bor. 1846. (Sect. *Rhæades*.)

P. annuum totum infernè setis basi in papillas dilatatis longis albis crispis patulis obsitum, caulibus e collo pluribus tenuibus crassis præter basin foliiferam scapiformibus unifloris, foliis ad collum et secùs basin caullium congestis cæspitosis brevissimè petiolatis brevibus ambitu lanceolatis bipinnatisectis lobis minimis tenuibus oblongis mucronatis, pedunculis folio triplò longioribus parcè hirsutis vel glabris, sepalis longè et parcè setosis, petalis parvis carneis basi carmineo-maculatis, filamentis nigris setaceis, capsulâ parvâ breviter obovatâ glabrâ, disco stigmatifero plano rotundato sexlobo.

Hab. in schistosis faucis *Schir Dere* montis *Elbrus* propè *Derbend* Kotschy N° 247.

Caules cum pedunculis tripollicares, folia pollicem longa, flores eis *P. dubii* minores diametro circ. 9 lin. lati, capsula 3-4 lin. longa, Planta foliis tenuiter dissectis aliisque notis distinctissima.

PAPAVER UMBONATUM Boiss. (Sect. *Pyramidostigma*.)

P. annuum vel bienne adpressè pilosum a basi ramosum caulibus subdiffusis flexuosis abbreviatis ramosis intricatis cæspitosis, foliis parvis in petiolum brevem attenuatis oblongo-lanceolatis sinuato-pinnatis lobis paucis rotundatis obtusis, pedunculis flexuosis cæspite 2-3 plò longioribus, floribus puniceis parvis, sepalis parè setosis, capsulâ angustè lineari-oblongâ basi attenuatâ substipitatâ glabrâ, disco stigmatigero plano quinquelobo ad centrum in umbonem conicum producto lobis rotundatis vix disjunctis.

Hab. in jugo Libani *Gebel Baruck* dicto inter *Deir el Kamar* et *Rascheya* copiosum. Fl. Jun. Julio.

Planta 4-5 pollicaris, caules procumbentes divaricatim ramosi brevissimi intricati subcæspitosi, flores eis *P. dubii* paulò minores, capsula 6 lin. circ. longa sesquilineam diametro lata. Formâ disci inter *Rhæades* et *Pyramidostigma* media ab eis disco non exactè pyramidato sed plano, a prioribus umbone centrali conico-elongato discedens.

FUMARIACEÆ.

CORYDALIS RUPESTRIS Kotschy var. *bracteata* Boiss. et Hohen. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846. — Major, folia cum petiolo scapique 8-10 pollices sæpè longa, bracteæ membranaceæ virentes oblongo-lanceolatæ acuminatæ pedunculos superantes, cætera speciei.

Hab. in præruptis ad cataractas *Ser Abi Schirr* montis *Elbrus* alt. 5000'. Kotschy.

CORYDALIS RUTÆFOLIA Sibth. var. *subuniflora* Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1847. — Caulis gracilis humilis apice duo folia opposita ternata vel biternata ferens, segmenta petiolulata ovata vel oblonga obtusa, pedunculus axillaris foliis brevior 1 rarius 2 florus medium

versus bractea ovato-rotunda basi amplexicauli lacinulaeque setacea bractea opposita stipatus, capsula subglobosa.

Fumaria uniflora Sieb. Reis. in Creta II p. 320 Icon.

Hab. in lapidosis excelsis montium *Lassiti* Cretae. Sieber! Heldreich!

A. *Cor. rutæfolia* specificè non differt. — *C. Erdelii* Zuccar. in Munch. Acad. III. tab. 9 fig. 2. est *C. rutæfolia* ipsa.

CERATOCAPNOS PALÆSTINA Boiss.

C. glaberrima viridis, caulibus teneris ramosis scandentibus, foliis brevissimè petiolatis biternatis 6-9 phyllis divisionibus longè petiolulatis triphyllis foliolis petiolulatis teneris integerrimis ovatis obtusis mucronulatis omnibus vel tantum unico divisionis intermediæ foliorum superiorum in cirrhum capillaceum ramosissimum mutatis, racemis oppositifoliis breviter pedunculatis floriferis densis tandem elongatis, pedicellis brevissimis patulis bractea linearis eis sublongiori suffultis, sepalis nullis, corollam minutam supernè sursum subrecurvam roseam ad apicem petalorum interiorum purpureo-violaceam, petalo superiori aliis paululum longiori basi in calcar ovatum obtusum pedicello æquilongum producto, fructibus biformibus, pluribus (in spica inferioribus) ovato-subquadratis compressis apice truncatis ibique operculo conico-umbonato brevissimo demum secedenti clausis longitudinaliter parallelè et tenuiter sulcato-striatis demum secus sulcos fenestratis citò deciduis, fructibus superioribus racemi 1-2 persistentibus indehiscentibus quintuplò longioribus lineari-lanceolatis utrinquè attenuatis parte inferiori seminifera striatâ superiori inani rostriformi complanato-ensiformi rectâ, semine solitario nigro lævi nitidissimo subincurvo.

Hab. in rupestribus umbris totius regionis montanæ Palæstinæ, in viâ inter *Ramla* et *Jerusalem* ad rupes et muros, in monte *Garizim* suprâ *Naplouse*, in montibus *Carmel* et *Tabor*. Fl. Maio.

Planta tenerrima facie omnino *C. claviculata* ramis et caulibus valdè intricatis. Foliorum inferiorum segmenta 6-10 lin. longa lataque, superiorum sensim diminuta acutiora, racemis floriferis cum pedunculo 2-3 pollicares, flores amænè rosei magnit. eorum *Coryd. claviculata*. Fructus inferiores 2 lin. longi lineam latam operculo umbonato-mucronato 1½-4 lin. longo clausi, fructus superiores 6-7 lin. cum rostro longi, rostro parti seminiferæ æquilongo vel longiori. Pericarpium constans membranarum duabus alterâ exteriori duriori subcrustacea in

fructibus inferioribus tandem secus sulcos angustè fenestratà, alterà interiori liberà tenerrimà tenuissimà rufescenti semen includenti. *Cerat. umbrosa* Durieu ex Algerià oriunda, cujus iconem pulchram fructusque benevolentiae clar. auctoris debeo a meà specificè differt foliolis duplò vel triplò minoribus oblongis acutis, floribus dimidiò minoribus, fructibus inferioribus durioribus longiùs umbonatis fungosis transverse rugosis costis alternatim crassioribus, fructibus superioribus laevibus in rostrum uncinato-recurvum non compressum abeuntibus.

FUMARIA GUSSONII Boiss.

F. glaucescens, caule humili basi ramoso non scandenti, petiolis ecirrhoris, foliolis crassiusculis cuneiformibus abbreviatis planis in lobos angustos oblongo-lineares breves obtusos fissis, racemis demùm laxiusculis, sepalis ovatis circumcìrca denticulatis mucronatis corollae tubo aequilatis eaque 3-4 plò brevioribus, pedicellis fructiferis rectis bracteà, triplò fructuque duplò longioribus, fructu (mediocri) globoso-subcompresso obsolete carinato tuberculato apice rotundato bifoveolato.

F. Petteri Guss. Syn. non Rechb. Icon. nec Parlatores. *F. capreolata* var. γ . ex parte Parlatores Mon. Fumar.

Hab. in Sicilia Guss., agro Neapolitano (Guss. Heldr.) Algeria (Bovè coll. secunda N° 137), propè Asculum (Orsini).

Habitus et florum magnitudo *F. officinalis* quæ longè differt foliorum laciniis longioribus remotioribus, sepalis ovato-lanceolatis cuspidatis, fructu majori obcordato. *F. Petteri* Rechb. Icon. e Dalmatià differt petiolis subcirrhosis, foliis viridibus supràdecompositis, sepalis rhombeis utrinquè medium versus unidentatis, nuculis apiculatis. *F. muralis* sonder deniquè omnium nostræ magis affinis est planta laxa decumbens, laciniis foliorum oblongo-lanceolatis inter se remotis nec parvis confertis, petiolis subcirrhosis, fructu laevi; an tamen ulterioribus observationibus ambo plantæ in unam speciem non erunt coniungendæ? *F. capreolata* ab hisce omnibus longè differt pedicellis fructiferis recurvis, floribus maioribus, fructu majori apice subtruncato.

FUMARIA REUTERI Boiss.

F. caule recto non scandenti, petiolis ecirrhoris, foliorum laciniis

minutis angustè linearibus subcanaliculatis confertis, racemis laxiusculis, sepalis e basi latiori truncatà oblongis subintegrè acutis corollæ tubo æquilatis eaque plùs duplò brevioribus, floribus pallidè apice intensius violaceis, pedicellis fructiferis rectis bractea sesquilateralibus fructu ferè duplò longioribus, fructu (parvo) ovoideo lævi vix compresso apice bifoveolato acutiusculo.

Hab. in Castellà veteri propè *Miraflores* ad radices *Sierra di Guadarrama* (Reuter) in cultis montis *S. Nevada* propè *San Geronimo* (Boiss.).

Folia ferè *F. parvifloræ* vel *micranthæ*, flores *F. officinalis* sed sepala integra, ab omnibus mihi notis fructu minuto acutiusculo diversa. *F. Petteri* Rehb. pro quà amiciss. Parlatore hanc plantam habet ex icone et descriptione certissimè differt petiolis subcirrhosis, foliorum laciniiis multò majoribus lanceolatis flabellatis, sepalis ad medium utrinquè unidentatis basi attenuatis, nuculis globoso-compressis acutiusculis quidem sed brevioribus.

FUMARIA ANATOLICA Boiss. in Pinard pl. exs. 4842.

F. glauco-virens, caulibus decumbentibus, foliolis ecirrhosis, foliorum laciniiis planis angustè lineari-oblongis, racemis brevibus densiusculis, floribus abbreviatis basi pallidissimè apice intensè purpureis, sepalis ovato-oblongis acutiusculis circumcinctà denticulatis corollà dimidià longioribus ejusque tubo latioribus, pedicellis fructiferis valdè recurvis bractea fructuque sesquilateralibus, fructu minutè tuberculato sphaerico apice rotundato subcompresso obsoletissimè basi carinato

Hab. in *Carià* (Pinard), in cultis montis *Carmeli* (Boiss.); nuper propè Massiliam verosimiliter e seminibus ex Oriente casu advectis observata.

F. micrantha var. *pedunculis recurvis* Boiss. Diagn. 5. pag. 80.

Foliorum laciniae eis *F. micranthæ* sublatores nunquam canaliculatae, flores breviores, sepala proportionè corollæ longiora. Priùs eam pro *F. micranthæ* varietate habueram sed nuper in Palæstinà eam vivam observavi, e seminibus relatis colui et ab eà sepalorum proportionè, pedicellis constanter et eximè recurvis, seminibus paulò minoribus vix carinatis distinctissimam esse vidi.

FUMARIA OXYLOBA Boiss.

F. pallidè virens, caulibus ascendentibus intricatis, petiolis subcir-

rhosis, foliorum laciniis planis latiusculis flabellatis oblongis acutis mucronulatis, racemis pauci et confertifloris fructiferis etiam brevissimis, floribus mediocribus angustis albidis apice virentibus, sepalis minutissimis lentis ope tantum perspicuis corollâ multoties brevioribus angustioribusque lanceolatis basi integerrimis utrinque dentibus 4-2 sæpè evanidis instructis, pedicellis fructiferis rectis bracteam setaceam vix superantibus fructu paulò longioribus, fructu magno tuberculato-rugoso sphærico apice obtuso subretuso.

Hab. in umbrosis ad parietes septentrionales verticales humidam montis *Garizim* supra *Naplouse*, in monte *Carmelo*, legi Aprili 1846.

Habitus et folia formarum majorum *F. capreolata* sed lobi foliorum acuti! racemi 7-8 flori, corolla demum tres lineas longa angustissima, fructus illis *F. capreolata* majores. Affinis *F. macrocarpæ* Parlatores quæ differt petiolis ecirrhis, foliorum laciniis multò minoribus, sepalis ejusdem formæ sed duplò majoribus basi acutè dentatis, fructu majori crassius tuberculato fungoso.

FUMARIA JUDAICA Boiss.

F. viridis, caulibus subscandentibus intricatis, petiolis subcirrhosis, foliorum laciniis oblongis obtusis mucronulatis, racemis demum elongatis, corollâ mediocri albidâ apice purpurascenti, sepalis minutis corollâ multò brevioribus angustioribusque oblongo-lanceolatis acutis basi acutè denticulatis, pedicellis fructiferis rectis apice incrassatis bracteâ fructuque duplò longioribus, fructu minutè tuberculato globoso compresso acutiusculè carinato apice rotundato-subtruncato.

Hab. in *Palæstina* cum præcedenti iisdem locis.

Facies et folia *F. capreolata*, flores paulò minores, fructus ejusdem formæ sed paulò major et tenuiter tuberculatus. Ex caractere sepalorum minimorum cum solis *F. macrocarpæ* et *F. oxylobæ* confundi potest sed ab eis differt pedicello tenuiori bracteâ duplò longiori nec eam æquanti, fructu minori multò tenuius tuberculato distinctè compresso carinatoque.

CRUCIFERÆ.

MATTHIOLA SINUATA R. Br. var. *bracteata* Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1847. — Pedicelli ad basin vel medium versus folio florali

lineari obtuso integro florem sæpè superanti suffulti, omnia cæterum speciei.

Hab. in muris castelli *Suda* in *Cretâ*. Heldreich legit Marte florif.

MATTHIOLA DAMASCENA Boiss. (Sect. *Luparia*.)

M. perennis multicaulis collo suffrutescenti, tota indumento pannoso crasso denso albo ad folia juniora flavido obsita, caulibus simplicibus subangulosis paulò suprâ basin foliosam floriferis in racemum post anthesin elongatum abeuntibus, foliis ad collum et caulium partem infimam numerosis ovatis vel ovato-oblongis subintegris vel repandis vel utrinque grossè et irregulariter 2-3 dentato-lobatis, infimis obtusis in petiolum longiorem attenuatis superioribus acutis subsessilibus, floribus pedicello calyce triplò breviori suffultis, calyce cano basi obsolete saccato, petalis sordidè flavis limbo lanceolato-lineari calyci subæquilongo, siliquis rectis a rachide parùm divergentibus longissimis compressis linearibus crispulè et breviter griseo-tomentellis stigmatè eis angustiori subrotundo bilobo terminatis, valvis nervo medio tenui percursis.

Hab. in collibus aridissimis suprâ *Salekiah* propè *Damascum* ubi legi Maio 1846.

Caulis fructiferi cum racemo 9-12 pollicares, folia inferiora cum petiolo 2-2 1/2 pollices longa 9-10 lin. lata, siliquæ 4 pollicares ferè 2 lin. latæ. Pulchra species foliis et habitu affinis *M. ovalifolia* Boiss. quæ differt indumento multò tenuiori et adpressiori, petalorum limbo longiori, siliquis angustioribus stigmatè æquilato terminatis.

MATTHIOLA ASPERA Boiss. (Sect. *Pinaria*.)

M. annua viridis tota indumento pilis sparsis ramosis constanti asperula eglandulosa, caulibus pluribus teretibus simplicibus paulò suprâ basim foliosam in racemum post anthesin elongatum abeuntibus, foliis lineari-lanceolatis obtusiusculis integris vel obsolete repandis in petiolum brevem longè attenuatis, calyce sessili basi vix saccato, petalorum limbo rubello-livido spathulato calyci subæquilongo, siliquis sessilibus rectis patentibus tereti-subtorulosis pilis ramosis aliis albidis aliis flavidis longioribus asperis, stigmatè conico bidentato plùs minùs perspicuo terminatis cornutis cornubus conicis elongatis erectis vel patentibus.

Hab. in sterilissimis calidis Judææ inter *S. Saba* et *mare Mortuum*, legi Maio 1846.

Caules semipedales, folia inferiora bipollicaria 4-5 lin. lata, flores magnitudinis *M. oxyceratis*, siliquæ bipollicares cornubus 2 lineas longis terminatæ. *A. M. oxycerate* et *M. livida* DC. quæ probabiliter unius speciei formæ tantum sunt eximie differt indumento non stellato cano brevi velutino sed pilis sparsis basi simplicibus supernè ramosis asperis constanti glandulis nullis intermixtis, siliquis rigidioribus crassioribus nunquam contortis.

MORETTIA PHILÆANA DC. Delil. *Ægypt.* tab. 33 fig. 3. non Boiss. Ann. 1842. — *M. asperrima* Boiss. ann. 1842.

M. tota aculeolis stellatis obsita, caulibus crassis ascendentibus, foliis breviter petiolatis oblongis repando-dentatis, petalorum ungue sepalis asperrimis breviori, siliquis quadrangulis subincurvis stylo profundè bilobo terminatis.

Hab. in *Ægypto* (Delile, Husson!) regno *Mascatensi* Arabiæ (Aucher), prov. *Berber* Nubiæ (Kotschy N° 363!)

MORETTIA CANESCENS Boiss. — *M. Philæana* Boiss. ann. Sc. Nat. 1842 non DC.

M. tota indumento denso stellato tomentosa canescens, caulibus tenuibus prostratis, foliis ovatis oblongisve subintegris medio subplicatis, petalorum ungue subexserto, siliquis rectiusculis cylindricis strictis stigmatè sessili bilobo terminatis.

Hab. in desertis *Arabiæ Petreæ* (Schimper! Boiss!)

Hanc speciem erroneè pro *M. Philæana* in opere citato habueram et igitur diagnosem utriusque hic dare utile duxi.

NASTURTIIUM AUREUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.

N. perenne glabrum, radice subrepente fibrosâ, foliis petiolatis ambitu oblongis bipinnatisectis laciniis irregularibus lanceolato-linearibus obtusis sæpè dentatis, caulibus erectis parè ramosis, petalis intensè aureis calyce duplò longioribus, racemis fructiferis longis rectis, pedicellis horizontaliter patentibus fructu duplò longioribus, siliquis oblongis basi attenuato-stipitatis apicè quoque angustatis stylo eis triplò breviori terminatis.

Hab. in pratis ad orientem fluvii *Catarrhacti* non procul ab urbe *Adalia* Pamphyliæ. (Heldreich Aprili.)

Caules pedales bipedalesve, folia ea *N. sylvestris* referentia sed magis dissecta, flores eis hujus speciei paulò majores, pedicelli fructiferi 4 lineas longi, siliquæ cum stylo 2 1/2 lin. longæ. Inter species affines *N. anceps* differt foliis incisive vel lyratis, floribus pallidè luteis, *N. sylvestre* siliquis pedicello æquilongis, *N. Lippizense* foliis inferioribus ovatis vel auriculatis, racemo flexuoso, siliquis pedicello æquilongis etc.

NASTURTIIUM MACROCARPUM Boiss.

N. perenne glabrum, radice crassâ pluricipiti cæspitosâ, collo vestigiis foliorum vetustorum fibroso, caulibus erectis teretibus flexuosis foliosis parçè ramosis, foliis radicalibus longè petiolatis vel oblongis obtusis basi attenuatis vel basi auriculatis lyratisque vel pinnatifidis laciniis latiusculè oblongo-linearibus, foliis caulinis sessilibus pinnatifidis laciniis 3-7 setaceis elongatis, racemis paucifloris fructiferis subelongatis, petalis pallidè luteis calyce sesquilongioribus, pedicellis fructiferis erecto-patulis siliquâ longissimâ lineari angustâ compressâ apice in stylum longiusculum obtusum attenuatâ 4-5 plò brevioribus.

Hab. in ericetis siccis ad radices Antilibani inter *Hasbeya* et *Rascheya*, legi Maio 1846.

Caules pedales, folia dissectione suâ ea *N. Lippizensis* referentia sed radicalia majora, laciniæque caulinarum longiores et tenuiores, siliquæ 1 1/2-2 pollicares lineæ 2/3 latæ. Species proxima *N. Lippizensi* sed ab omnibus siliquâ longissimâ distincta.

NASTURTIIUM HISPANICUM Boiss. et Reut.

N. perenne, caule simplici erecto folioso supernè paniculato-ramoso basi puberulo cæterum glabro, foliis glabris radicalibus breviter petiolatis lyratis segmentis lateralibus utrinquè 5-6 minutis ovato-oblongis versùs basin sensim diminutis terminali ovato sinuato-repando 4-6 plò majori, foliis caulinis sessilibus pinnatifidis basi auriculatis laciniis linearibus integerrimis, petalis luteis calyce sesquilongioribus, racemo fructifero brevi, pedicellis patentibus siliquâ oblongo-cylindricâ stylo triplò breviori apiculatâ vix longioribus.

N. Pyrenaicum Reut. pl. Hisp. exs. et Boiss. Voy. bot. Hisp. non R. Br.

Hab. in Hispaniâ centrali ad *Soto de Migas* propè Matritum (Reuter), a *la Cartuja del Paular* in montibus Carpetanis (Pavon!); in regno *Granatensi*. (Boiss.)

Nasturtio Pyrenaico habitu et characteribus valdè affine sed differt notis sequentibus; folia inferiora brevius petiolata sunt segmentis lateralibus minoribus plurioribus, flores manifestè minores, siliquæ cylindricæ nec ut in *N. Pyrenaico* ovato-oblongæ turgidæ, 2-2 $1\frac{1}{4}$ lineas longæ stylo $1\frac{1}{2}$ lineam longo apiculatæ cum eo pedicellum subæquantes nec eo triplò breviores. — *N. Pyrenaicum* e Galliâ, Germaniâ et Italiâ, est certissimè species Linnæana ex iconibus Morisonij et Allionii citatis et ex verbis « *silicula ovalis*. »

NASTURTIIUM NILOTICUM Boiss.

N. annum glabrum, caulibus erectis vel decumbentibus parcè ramosis, foliis teneris intensè viridibus lyrato-pinnatifidis laciniis basi confluentibus ovato-oblongis grossè et in foliis superioribus acutè lobatis dentatisque, floribus minutis pallidè luteis, petalis calyce vix sesquiflorioribus, racemo fructifero elongato, siliquis linearibus vix compressis utrinquè breviter attenuatis stylo brevi apiculatis pedicello patulo earum latitudine paulò longiori suffultis.

Hab. in humo limoso ad margines præruptos Nili in Ægypto superiori (Boiss.!), in Nubiâ propè *Chartum* Kotschy pl. exs. N° 324 sub *N. palustri*.

Siliquæ 6-7 lineas longæ lineam latæ, folia inferiora sæpè 4-5 poll. longa laciniis pollicaribus. Species a. *N. palustri* quocum confusa fuit distinctissima pinnis foliorum paucioribus majoribus profundius dentatis, floribus paulò majoribus, siliquis triplò longioribus stylo longiori apiculatis apice attenuatis.

CARDAMINE OLYMPICA Boiss.

C. perennis glabra vel basi hirtula, caule erecto sulcato, foliis teneris pinnatisectis 4-5 jugis segmentis lateralibus ovatis subintegris versus basin decrescentibus inter se remotiusculis terminali triplò majori repando in foliis radicalibus subrotundo basi cordato in caulinis cuneato, petiolis exauriculatis, petalis albis calyce duplò longioribus

antheris luteis, siliquis erectis glabris pedunculum subaequantibus apice attenuatis stylo earum latitudine paulò breviori terminatis.

Hab. in pratis humidis regionis tertiae *Olympi Bithyni* ubi cl. Aucher eam floriferam ego autem fructiferam legimus.

C. tenera Boiss. pl. Auch. Ann. Sc. Nat. 1842 non Gmelin.

Pedalis vel sesquipedalis, foliorum radicalium segmentum superius diametro pollicare, flores magnit. *C. amaræ* vel *pratensis*, siliquæ 9-12 lin. longæ lineam latæ. *C. tenera* pro quâ eam habueram differt radice stoloniferâ siliquis dimidiò angustioribus floribusque majoribus. *C. acris* Grisebach differt segmentis foliorum contiguis, floribus violaceis, siliquis pedicello duplò longioribus.

PTERONEURUM GRÆCUM DC. var. *lasiocarpa* Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1846. — Valvulæ siliquarum papillis albis elongatis crispulis obsitæ, omnia cæterum speciei.

Hab. in lapidosis sylvaticis montium *Lassiti* in Cretâ suprâ *Males* alt. circ. 4000'.

ARABIS IONOCALYX Boiss. (Sect. *Alomatium*.)

A. biennis? tota pilis apice furcatis molliter hirsuta griseo-virens tenera, caulibus erectis ferè a basi paniculato-ramosis, foliis radicalibus rosulatis subpetiolatis oblongo-spathulatis dentato vel pinnatifido-lyratis laciniis lateralibus sæpè elongatis sinuato-lobatis obtusissimis terminali majori ovatâ repando-lobatâ basi confluenti, foliis caulinis sessilibus oblongis basi amplexicauli cordato-auriculatis acutè dentatis vel pinnatifidis, calyce saecato violaceo glabrò vel apice parcè hirsuto, petalis albis calyce duplò longioribus, siliquis (junioribus) linearibus gracillimis glabris erecto-patulis.

Hab. in *Carid* (Pinard), in pinetis montis *Solya* Lyciæ (Heldreich).

Planta 9-12 pollic., caulibus a basi ferè thyrsoidè-paniculatis, floribus magnitudinis eorum *A. albidæ* a quâ differt foliis profundè dentatis vel pinnatisectim et sæpè bipinnatisectim lyratis, caulibus non ascendentibus nec basi stoloniferis sed rectis thyrsoidèis, calyce violaceo indumentoque hirsuto nec brevi tomentello.

ARABIS CRETICA Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1847. (Sect. *Alomatium*.)

A. perennis viridis, caudicibus subrepentibus, pilis caulibus foliorum-

que caulinarum simplicibus, foliorum radicalium furcato-ramosis simplicibusque intermixtis omnibus brevibus, foliis radicalibus oblongo-spathulatis integris vel obsolete dentatis in petiolum attenuatis, caulinis oblongis vel oblongo-linearibus basi rotundatis, caule simplici paucifloro, sepalis violaceis glabris vel apice pilis paucissimis obsitis, petalis albis vel pallide roseis cuneatis calyce subtriplo longioribus, siliquis planis strictis longitudinaliter venulosis nervo validiusculo, apice breviter attenuatis stylo brevi terminatis, seminibus.....

Hab. in rupibus montium *Sphacioticorum* Cretæ propè *Askypheus* alt. 4000'. (Heldr.)

Caules vix semipedales, flores magnitudinis *A. muralis*, siliqua 18-22 lin. longa lineæ $3\frac{1}{4}$ lata. Affinis *A. murali* ab eà differt indumento multò minùs copioso, pilis partis superioris plantæ simplicibus, siliquis planioribus, stylo terminali paulò longiori. Semina juniora omninò aptera videntur.

ARABIS CADMEA Boiss. (Sect. *Alomatium*.)

A. annua pilis ramosis pubescens, caulibus crassiusculis basi foliosis thyrsoideo-paniculatis, foliis caulinis ovatis dentatis basi profundè cordato-sagittatè amplexicaulibus, racemi fructiferi rachide crassà vix flexuosà, siliquis rigidis erecto-patulis sub lente sæpiùs puberulis compressis pedicello brevissimo æquilatis stigmatè sessili terminatis obtusis, valvulis uninerviis obsolete venulosis, seminibus apteris.

Hab. in pinguibus arenosis *Cadmi* orientalis suprà *Colossam* in *Carià* alt. 5000'-6000'. Legi Junio 1842.

Affinis *A. auriculatæ* pro quâ eam diù habui sed caulis rigidior magis thyrsoideo-ramosus, rachis crassior vix flexuosa, flores albi paulò majores. Siliqua *A. auriculatæ* insuper est gracilior pedicelloque sublatis valvulis subtrinerviis.

ARABIS SINAICA Boiss. (Sect. *Alomatium*.)

A. annua pumila tenella tota pilis ramosis hirtula, caulè infernè folioso parcè ramoso paulò suprà basin florifero, racemis aphyllis, rachide tenui flexuosà, foliis obtusis breviter ovatis obtusè repandis basi sinu clauso cordato-auriculatis auriculis amplexicaulibus, floribus parvis, sepalis hirtulis, siliquis glabris vel stellato-puberulis pedicello

vix latioribus uninerviis margine subsinuosis stylo brevi eis angustiori apiculatis, seminibus apteris.

Hab. in rupestribus vallium jugi *Sinaitici*, legi Marte 1846.

Caulis tener 3-4 pollicaris, folia eis *A. auriculatae* breviora magis rotundata auriculis extremitate inter se contiguis, flores dimidiò minores, siliqua gracilior magis compressa 7-8 lin. longa. Valvulae 4 nec 3 nerviae margine subsinuosae. *A. Montbretiana* quoque affinis est planta multò major foliis caulinis regulariter et profundius dentatis, racemo fructifero recto laxissimo basi folioso, siliquis duplò longioribus.

HESPERIS RENIFOLIA Boiss. et Hohen. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Hesperidium*.)

H. perennis glaberrima glaucescens, radice crassa verticali, caulibus 1-2 elatis teretibus parcè foliosis simplicibus vel supernè parcè paniculato-ramosis, foliis radicalibus et caulino infimo breviter petiolatis orbiculari-cordatis obtusissimis integris vel obsoletissimè et rotundatim repando-lobatis, caulinis inferioribus sessilibus reniformi-cordatis superioribus multò minoribus oblongis acutis, racemo recto paucifloro, petalis cupreo-rubellis lineari-oblongis calyce glabro sesquilon-gioribus, siliquis pedicello crasso erecto-patulo eis dimidiò angustiori triplòque breviori suffultis longis apice attenuatis stigmatè punctiformi apiculatis, valvulis plano-convexis subenerviis, seminibus elongatis.

Hab. propè *Schah Neschim* in monte *Totschal* propè *Teheran* alt. 7-8000'. Kotschy N° 248.

Planta florifera pedalis tandem elongata, folia inferiora 2-3 poll. longa lataque firma glaucescentia, racemi solitarii vel pauci 5-7 flori, flores eis *H. tristis* minores et petala praesertim multò breviora, siliqua 3 1/2-4 1/2 poll. longa 1 1/4 lin. lata pedicello circ. 15 lin. longo suffulta. Species formà foliorum distinctissima propè *H. tristem* vel *H. quadrangulam* collocanda. Facies quoque *Moricandiae* sed semina oblongo-cylindrica eam notorrhizeam esse demonstrant.

PARLATORIA ROSTRATA Boiss. et Hohen. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846.

P. secus caules et petiolos parcè hirsuta cæterum glabra, radice cylindrica verticali pluricipiti, caulibus simplicibus basi foliosis in racemos post anthesin elongatos nudos abeuntibus, foliis parvis triangu-

lari-rotundatis obtusè et rotundatim repando-lobatis radicalibus et caulinis inferioribus basi truncato-cordatis longè petiolatis superioribus basi breviter cuneatis subsessilibus, petalis albis lineari-cuneatis calyce glabro duplò longioribus, pedunculis patentibus incrassatis, siliquis lineari-cylindricis curvatis inter semina oblonga strangulatis in rostrum longum tenue incurvum abeuntibus.

Hab. in valle *Vesbach* montis *Elbrus* propè *Derbend* Kotschy N° 236.

Caules antè anthesin semipedales dein pedales, folia diametro 6-9 pollicaria formà suà ea *P. clavata* referentia carnosula, siliquæ pedunculo 2 1/2 lin. longo suffultæ pollicares in rostrum recurvum tenuem ferè 4 lin. longum abeuntes. Ab omnibus speciebus generis rostro distincta, transitum inter *Parlatoriam* et *Alliariam* præbens.

ERYSIMUM NANUM Boiss. et Hohen. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Cuspidaria*.)

E. perenne cæspitosum totum pilis adpressis simplicibus (bipartitis) obsitum pallidè flavo-virens, caudicibus brevibus basi nudis, caulibus nanis basi densè foliosis in racemum brevem simplicem a cæspite breviter exsertum abeuntibus, foliis parvis utrinquè adpressè hirtis inferioribus oblongo-spathulatis obtusis integris vel utrinquè obsoletissimè 1-2 denticulatis basi longè attenuatis petiolatis, superioribus sessilibus oblongo-linearibus acutis, pedicellis calyce bisaccato plùs dimidiò brevioribus, glandulis placentariis trilobis, siliquis brevibus tetragono-compressis adpressè hirsutis stylo tenui earum latitudine longiori terminatis.

Hab. in cacuminibus alpium *Hasartschal* montis *Elbrus* alt. 1000'. Kotschy N° 487.

Habitu, foliorum magnitudine et formà affine *E. rupestri* DC. sed folia vix dentata magis attenuata, tota planta pilis simplicibus nec trifidis obsita. Affine quoque *E. Aucheri* quod foliis integerrimis angustè linearibus canescenti-griseis differt. Siliquæ in meo specimine tantum semipollicem longæ.

ERYSIMUM GONIOCAULON Boiss. in Pinard pl. exs. 1843. (Sect. *Cuspidaria*.)

Er. bienne, caule elato acutè angulato infernè recto simplici folioso supernè longè et strictè ramoso-paniculato pilis adpressis simplicibus

canescenti, foliis pilis minutissimis adpressis aliis trifidis aliis simplicibus obsitis radicalibus longè petiolatis oblongo-spathulatis dentatis pinnatifidis vel pinnatifido-lyratis segmentis inferioribus minutis remotis oblongis acutis terminali multoties majori obtuso, caulinis subsessilibus sessilibusque acutè denticulatis, summis linearibus minutè denticulatis vel integris, floribus mediocribus, petalis pallidè flavis calyce breviter saccato duplò longioribus, glandulis placentariis obsolete trilobis, siliquis axi strictissimis pilis minutissimis trifidis adpressè et densè canescentibus asperis quadrangulis brevibus rectis vel contortis et tunc obscurius angulatis stylo latitudini suæ æquilongò vel longiori terminatis.

Syrenia goniocaula Boiss. et Heldr. pl. exs.

Hab. in *Cariâ* (Pinard), in rupestribus propè *Tcheltickchi* Pisidiæ (Heldreich), Antilibano propè *Zebdani* et monte *Cassio*. (Boiss.)

Caulis 1-2 pedalis, habitus et flores *Er. cuspidati*, siliquæ 7-9 lin. longæ vel rectæ strictæ exactè et acutiusculè quadrangulæ vel contortæ obsoleteque angulatæ. Propter siliquas a latere non compressas et semina uniserialia *Erysimo* nec *Syreniæ* adnumerandum. — Siliquæ valdè variabiles hujus speciei me docuerunt genus *Strophades* a me in ann. Sc. Nat. 1842 e speciminibus nimis incompletis propositum delendum esse et ejus species modo sequenti ad *Erysimum* reducendas.

Strophades lanceolata Boiss. loc. cit. — **ERYSIMUM STROPHADES** Boiss.

Strophades linearis Boiss. loc. cit. — **ERYSIMUM LINEARE** Boiss.

ERYSIMUM MUTABILE Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1846. (Sect. *Cuspidaria*.)

E. perenne nanum totum virens pilis simplicibus paucisque trifidis adpressissimè obsitum, radice simplici verticali, collo multicipiti vestigiis foliorum cauliumque vetustorum incrassato, caulibus pluribus filiformibus procumbentibus rubellis totâ longitudine foliosis simplicissimis apice 2-5 flores confertos ferentibus, foliis minutis radicalibus oblongo-spathulatis in petiolum attenuatis integris vel obtusè sublyratodentatis, caulinis minoribus subsessilibus oblongo-linearibus integerimis, petalis calyce subsaccato plùs duplò longioribus primùm flavis dein rubris, siliquâ juniore brevi adpressè hirsutâ stylo longo tenui terminatâ.

Hab. in saxosis montium *Lassiti* Cretæ alt. circ. 5000' et rarissimè in monte *Idà* (Heldreich.) Floret Maio.

Caules 2-3 pollicares, folia minima, flores magnitudinis eorum *E. stricti*. Species caulibus filiformibus petalisque versicoloribus distinctissima pulchella ex formâ siliquæ junioris *E. rupestri* ut videtur affinis.

CONRINGIA GRANDIFLORA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.

C. glabra glauco-virens, foliis inferioribus ovato-vel oblongo-spathulatis in petiolum brevem attenuatis, caulinis cordatis amplexicaulibus obtusis auriculis rotundatis, racemo terminali paucifloro fructifero elongato, floribus amplis, petalis flavis calyce albido subduplò longioribus exsertis, siliquis longis rectis erecto-patulis in rostrum longum compressum lineare eis augustius attenuatis, valvulis convexis dorso trinerviis.

Hab. in *Lyciâ* cl. Pestalozza, in montibus *Climax* et *Solyma* Lyciæ in regione inferiori (Heldreich), in monte *Ghibelleis* Pamphyliae suprâ *Alaya* (Heldreich).

Flores eos *Brassicæ napi* æquantes, illis *C. Orientalis* duplò, *C. Austriacæ* triplò majores, siliqua 3-3 1/2 pollicaris rostro 4-5 lin. longo terminata.

MORICANDIA DUMOSA Boiss.

M. glaberrima glauco-virens basi suffruticosa ramosissima dumosa ramis foliosis hornotinis tortuosis lignosis cortice albidâ vestitis an-
notinis virgatis flexuosis, foliis parvis oblongis carnosulis inferioribus et ramorum steriliis integris vel obtusè dentatis basi cuneato-atenuatis subpetiolatis, caulinis integris cordato-amplexicaulibus obtusis vel acutiusculis, racemis terminalibus fructiferis subflexuosis, pedicellis brevissimis, petalis roseis calyce bisaccato dimidiò longioribus, siliquis erecto-patulis angustè linearibus stylo brevi conico obtuso terminatis, valvulis carinato-uninerviis, seminibus subuniseriatis.

Hab. in omni Arabiâ petreâ septentrionali copiosè a jugo *Tih* ad limites Palæstinæ. Legi Aprili 1846.

Frutex 1-2 pedalis ramosissimus intricato-dumosus, folia 6-9 lin. longa 4-6 lata ramorum juniorum aliquandò majora, flores illis *M. arvensis* ferè dimidiò minores, petalorum unguis inclusi. Siliqua 1 1/2-2

et sæpè 2 1/2 pollicaris lineam unam lata vel angustior. Species a *M. arvensi* egregiè distincta caule fruticoso dumoso, foliis parvis eis ramorum steriliùm dentatis, siliquis longioribus angustioribus. — Hùc probabiliter referenda *Hesperis nitens* Vivian. fl. Libyc. tab. V fig. 3. Nam quamvis in icone folia basi rotundata exhibeantur in descriptione superiora amplexicaulia esse dicuntur.

Pro *Brassicà Sinaicà* Boiss. Ann. Sc. Nat. 1842. pone *Moricandia Sinaica* Boiss. quam in vallibus *Wadi Useit* et *Wadi Feiram* jugi Sinaïtici legi — *Mor. hesperidiflora* DC. — *M. crassifolia* Gay — *Hesperis acris* Forsk. abundè quoque crescit in arenosis jugi *Tih* Arabiæ petreæ.

BRASSICA PERSICA Boiss. et Hohen. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Micropodium*.)

B. glaberrima pallidè virens, foliis omnibus oblongis vel oblongo-lanceolatis basi in petiolum longè angustatis obtusis obsoletè repandocrenatis supremis lineari-lanceolatis integris, caule sulcato a basi paniculato-ramoso, floribus pallidissimè luteis, siliquis suprà torum stipitatis lineari-tetragonis a dorso compressis valdè torulosis stigmatè sessili apiculatis, valvulis carinato-uninerviis.

Br. elongata Boiss. Ann. Sc. Nat. 1842 non Ehrh.

Hab. in *Mesopotamià* Aucher l. cit.! Persià Aucher loc. cit.! inter segetes ad *Teheran* Kotschy N° 32.

Affinis *B. elongatæ* cui e speciminibus incompletis adjunxeram et quæ differt foliis sinuato-pinnatifidis siliquisque stylo longiusculo apiculatis.

KONIGA ARABICA Boiss.

K. annua, pilis simplicibus adpressis canescens, caulibus diffusis, foliis oblongo-spathulatis obtusis in petiolum longiusculum attenuatis, racemis terminalibus basi foliosis, floribus albis minimis, siliquis pedicello erecto-patulo eis vix longiori suffultis ovato-orbiculatis stylo eis quintuplò breviori apiculatis, valvulis pilis sparsis adpressis obsitis, loculis 4-2 spermis, seminibus planis angustè marginatis.

K. Libyca Boiss. Ann. 1842 non R. Br.

Hab. in desertis *Ægypti* (Aucher), Arabiæ petreæ ad meridiem urbis *Gaza* in arenosis (Boiss.).

Caules procumbentes vix semipedales, siliculæ diametro vix 1 1/4 lin. latæ. Radix annua et valvulæ hirtæ *K. Lybice* Viv. Lyb. tab. 16 fig. 4 quæ differt siliculis duplò majoribus, loculis 5-6 spermis.

PETROCALLIS? FENESTRATA Boiss. et Hohen. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846.

P. glaberrima basi fruticulosa glauco-virens ramis brevibus erectis foliosis racemos post anthesin abbreviatos simplices edentibus, foliis minimis cuneatis basi in petiolum linearem attenuatis trifidis laciniis linearibus acutis, floribus..... pedicellis fructiferis erecto-patulis siliculâ 3-4 plò longioribus, siliculâ minimâ ovato-globosâ glabrâ stylo ejus latitudine breviori superatâ, valvis convexissimis, septo ovato apice sæpius fenestrato, funiculis brevissimis ad apicem loculi sitis liberis.

Hab. in saxosis *Meidan Abdallah* in valle *Loura* montis *Elbrus* Kotschy No 493 et 795.

Plantula 2-3 pollicaris, caules suffruticosi ramosi, folia 3-4 lin. longa laciniis lineæ 3/4 latis, silicula lineam aut paulò ampliùs longa. E. specimine fructifero septis persistentibus tantùm donato descripta et ideò quoad genus subdubia, habitus et folia omninò *Petrocallidis* sed funiculi dissepimento non adnati. Eam priùs pro *Didymophysæ* specie habueram sed in hoc genere septum lineare angustissimum est et fructus non tantùm inflatus sed a latere compressus. Forsan genus proprium.

DRABA CRETICA Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1847. (Sect. *Aizopsis*.)

Dr. cæspitosa nana, foliis ad apicem caudicorum rosulatis ovatis oblongisve nitidulis setis rigidis pectinato-ciliatis, scapis pilis ramosis tomentellis floriferis e cæspite vix exsertis fructiferis elongatis, floribus parvis, petalis pallidè luteis calyce vix duplò longioribus, s taminibus corollæ æquilongis, racemo fructifero contracto subumbellato, pedicellis siliculæ subæquilongis brevioribusve, siliculis pilis stellatis tomentellis exactè ellipticis stylo brevissimo apiculatis.

Hab. in cacumine *Lazzaro* montium *Lassiti* alt. 6000'. (Heldreich.)

Florus eis *Dr. Zahlbruckneri* ferè minores, scapi fructiferi cum racemo 1-1 1/2 pollicares, silicula ferè 3 lin. longa sesquilineam lata. Af-

finis *Dr. hispanicæ* et *asperæ* Bertol, a quibus facile distinguitur indumento brevi siliculæ quæ apice non acuta nec basi attenuata est, stylo brevissimo.

DRABA OXYCARPA Boiss. (Sect. *Aizopsis*.)

Dr. cæspitosa nana, foliis rosulatis linearibus sulcatis setis rigidis densè pectinato-ciliatis, scapis pilis ramosis hirsutis brevibus, floribus parvis, petalis pallidè flavis calyce vix duplò longioribus, filamentis sepala paulò superantibus, racemo fructifero contracto, pedicellis siliculâ subbrevioribus, siliculis pube brevi ramosâ hirtellis oblongis basi latioribus inflatis vix compressis apice acutissimis in stylum longiusculum abeuntibus.

Hab. in cacuminibus *Hermonis* suprâ *Rascheya* in *Antilibano*. (Boiss.)

Dr. vesicariâ quæ in eisdem montibus crescit multò rarior. Valdè affinis *Dr. Hispanicæ* et *Dr. asperæ* quæ siliquam apice quoque attenuatam habent sed non adeò acutam et potius stylo terminatam quàm ut in nostrâ specie in stylum abeuntem. In eis speciebus quoque silicula infernè a dorso compressa est nec turgida, foliaque eis meâ plantâ latiora.

DRABA MACROCARPA Boiss. et Heldr. (Sect. *Erophila*.)

Dr. annua, foliis rosulatis oblongis in petiolum attenuatis utrinquè 4-3 dentatis pilis ramosis parcè obsitis, scapis post anthesin laxis elongatis, petalis lineari-cuneatis calyce plùs duplò longioribus ad medium usquè bifidis, pedicellis siliculâ paulò longioribus, siliculis glabris linearibus stigmate sessili apiculatis latitudine 6-7 plò longioribus.

Hab. in collibus maritimis propè *Smyrnam* in consortio *Dr. vernæ* Febr. et Mart. (Heldr.)

Erophila siliquosa Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 4846.

Flores illis *E. vernæ* majores, petala inprimis longiora, siliculæ 5-6 lin. longæ vix lineam latæ. Non confundenda est cum *Dr. lineari* Boiss. quæ vera *Drabæ* species est. Nomen specificum mutavi ob confusionem cum *Dr. siliquosâ* MB.

BUCHINGERA Boiss. et Hohen.

Calyx basi æqualis. Petala oblongo-spathulata integra. Stamina erecta edentula. Silicula planissima orbicularis transversè latior stylo apiculata bilocularis disperma. Septum tenuissimum. Funiculi brevissimi ex apice loculi penduli. Semina pendula compressissima angustè marginata. Cotyledones planæ. Radicula accumbens. — Herba Persica annua tenera tota pilis ramosis scabrida, facie *Asperuginis*, floribus axillaribus minimis, siliculâ glochidiato-pilosâ. Genus amiciss. et cl. Profess. Buchinger Argentor. dicatum propè *Clypeolam* et *Peltariam* collocandum, ab eis siliculâ non indehiscenti septatâ diversum, ab *Alyso* valvis planissimis filamentisque edentulis, a *Farsetiâ* deniquè calyce basi æquali, loculis monospermis et ab omnibus floribus axillaribus habituque discedens.

BUCHINGERA AXILLARIS Boiss. et Hohen. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846.

Hab. ad versuras agrorum propè urbem *Teheran* Aprili Kotschy N° 10.

Radix tenuis simplex, caules 1-3 teneri subdecumbentes tenues subcompressi sulcati pilis ramosis obsiti 4-6 poll. longi totâ longitudine alternè foliosi. Folia viridia utrinquè pube brevi sparsâ ramosâ obsita oblonga utroque latere 3-4 dentato-serrata obtusa vel acutiuscula basi cuneatim in petiolum brevem attenuata 1-1½ poll. longa 6-9 lin. lata. Flores ex omnibus axillis solitarii pedicello per anthesin eis triplò longiori suffulti eos *Dr. vernæ* vix æquantes. Sepala puberula oblongovirentia. Petala calycem vix excedentia recta alba. Filamenta filiformia alba petalis breviora. Ovarium albo-strigosissimum. Pedicellus fructifer recurvato-patulus vel subpendulus 3-4 lin. longus. Silicula planissima transversè ovata 2 1½ lin. longa 3 lata stylo recto lineam longo terminata. Semen planum discoideum angustè albo-marginatum 2 lin. diametro latum totum loculum implens.

RICOTIA CRETICA Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1847.

R. glabriuscula tenera caulibus ascendentibus elongatis foliosis ramosis in racemos laxos abeuntibus, foliis primordialibus ovatis indi-

visis, cæteris bipinnatisectis laciniis oblongis obtusis integris vel lobatis, summis trisectis laciniis oblongo-linearibus integris, floribus roseis magnis, limbo obordato, filamentis majoribus antherâ lineari vix sesquolongioribus, siliquis pendulis pedicello eis dimidiò breviori suffultis lato-linearibus latitudine suâ 7-8 plò longioribus 7-9 spermis margine rectiusculis acutis stylo latitudine suâ quadruplò breviori apiculatis.

Hab. inter saxa montium *Sphacioticorum* in fauce *Askyphous* dictâ alt. 3000'. (Heldreich) Fl. Aprili.

Caules 3½-4 pedales, folia eis *R. lunariæ* similia, flores eis ejus ferè majores, siliqua 16-20 lin. longa 3 lata.

RICOTIA CARNOSULA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.

R. pumila glaucescens, caulibus pumilis a basi divaricatum ramosissimis petiolisque hirtulis, foliis carnosulis primordialibus ovatis sessilibus subretusis rubellis cæteris pinnatim vel bipinnatisectis laciniis margine crassiusculis minutis foliorum inferiorum oblongis superiorum elongatis angustè linearibus omnibus obtusis, floribus albis vel roseis, limbo obcordato, filamentis majoribus antherâ vix sesquolongioribus, loculis antheræ basi subdivergentibus, siliquis pendulis pedicello recurvo eis quadruplò breviori suffultis linearibus latitudine suâ 8-10 plò longioribus 12-15 spermis margine subincrassatis rectis aut irregulariter strangulatis acutis stylo brevissimo apiculatis.

Hab. inter saxa maritima ad occidentem urbis *Adalia* in *Pamphylia* (Heldr.) Fl. Mart. fruct. Aprili.

Planta 3-6 pollicaris, laciniæ foliorum eis aliarum specierum generis minores superiores præsertim angustissimæ. Siliqua 15-20 lin. longa 2 lata.

RICOTIA SINUATA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.

R. tenera fragillima, caulibus erectis petiolisque breviter hirtellis ramosis supernè racemos laxos edentibus, foliis bipinnatisectis partitionibus pétiolatis segmentis ovato-cuneatis profundè et obtusè 2-3 lobis, floribus parvis albis, limbo breviter obcordato, filamentis antherâ lineari vix longioribus, loculis basi subdivergentibus, siliquis pedicello recurvo eis sextuplò breviori suffultis linearibus latitudine suâ 7-9 plò

longioribus 7-8 spermis inter semina strangulato-sinuatis obtusiusculis rarius acutis stylo latitudine suâ triplò breviori terminatis.

Hab. in faucibus montis *Climax* propè *Kourmalu* Lyciæ et in promontorio *Alaya* Pamphyliae in saxis inter frutices. (Heldreich.)

Flores eis *R. lunariae* ferè dimidiò minores, siliqua 1 $\frac{1}{2}$ 2 poll. longa 2 $\frac{1}{2}$ lin. lata. A specie præcedenti distincta foliis tenerioribus magis dissectis lobis rotundatis, siliquis latioribus margine sinuatis. Species ternæ hic descriptæ in genere novam sectionem formant septi præsentia siliquisque linearibus insignem cum specie antiquiori autem habitu et characteribus optimè congruentem. *Ricotia* sic extensa a *Lunaria* tamen siliquâ non pedicellatâ seminibus immarginatis, a *Pteroneuro* nec placentis nec filamentis alatis optimè differt.

SAVIGNYA ÆGYPTIACA DC. var. *oblonga*. Boiss. — Major, glabrescens, caules $\frac{1}{2}$ –2 pedales, siliculæ pedicello elongato sæpè pollicari suffultæ oblongæ nec ovaes, 6 lin. longæ 3 latæ. Omnia cæterum speciei.

Hab. inter frutices in arenosis vallis *Wadi Mokatteb* jugi *Sinaitici* ubi legi. Mart. 1846.

FARSETIA MULTICAULIS Boiss. et Hoh. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Fibigia*.)

F. basi suffruticosa multicaulis tota pube brevissimâ stellatâ canescens aspera, caulibus simplicibus foliosis apice in racemum floriferum confertum dein elongatum abeuntibus, foliis lanceolato-linearibus subcanaliculatis integerrimis obtusis infernè in petiolum longè angustatis, petalis intensè aurantiaco-luteis, unguibus calyce stellato-piloso longioribus laminâ obovatâ, filamentis omnibus edentulis minoribus utrinquè glandulâ stipatis, siliculis erecto-patulis pedicello æquilongis orbiculatis basi subretusis planis breviter stellato-canis stylo deciduo muticis, loculis 1–2 spermis, seminibus orbiculatis immarginatis.

Hab. in monte *Elbrus* propè pagum *Passgala*. Kotschy. N° 203.

Planta circ. pedalis, folia 1–1 $\frac{1}{2}$ pollic. longa supernè 2 lin. lata, flores illis *F. clypeatæ* paulò majores, silicula diametro 4–5 lin. lata. *A. F. clypeatâ* distinguitur caule magis fruticoso, foliorum formâ, siliculis orbiculatis muticis. *F. cheiranthifolia* differt caulibus herbaceis, stigmate bifido. Nostra species præterea ab omnibus aliis seminibus non marginatis differt.

FARSETIA OVALIS Boiss. (Sect. *Eufarsetia*.)

F. suffrutescens dumosa tota pilis adpressis simplicibus cana, ramis intricatis indurato-subspinescentibus, foliis angustè linearibus integerrimis basi attenuatis, calyce basi æquali, petalis lividè flavis oblongo-linearibus, siliculâ adpressè canescenti ovatâ latitudine suâ 1 $\frac{1}{2}$ 2 plò longiori stylo brevissimo apiculatâ, valvulis ad medium subnerviis, loculis subhexaspermis, seminibus latè marginatis.

Hab. in desertis *Ægypti* et *Arabie petreæ* (Aucher ! Sieber ! Boiss !)

Valdè affinis *F. Ægyptiacæ* quæ differt siliquis latitudine suâ 3–4 plò longioribus, loculis sub 12 spermis. Eas plantas in locis natalibus semper distinctas esse vidi. Descriptio Forskahlei in quâ silicula oblonga semipollicaris esse dicitur me docuit *Ch. farsetiam* L. ad speciem macrocarpam spectare.

AUBRIETIA KOTSCHYI Boiss. et Hohen. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846.

A. cæspitosa tota indumento ramoso canescens, foliis teneris deltoideis obtusis utrinquè obtusè 1–2 dentatis in petiolum eis subæquilongum attenuatis, racemis terminalibus brevibus fructiferis subsecundis 6–9 floris, floribus parvis, calyce basi subsaccato, petalis pallidè roseis lineari-oblongis calyce duplò longioribus, filamentis angustè alatis alâ minorum in dentem lateralem medium versùs abeunti, majorum usquè ad apicem sensim attenuatâ, siliculis pedicello stricto eis duplò longiori suffultis stellato-tomentosis oblongis inflatis non compressis stylo eis dimidiò breviori superatis.

Hab. in saxosis præruptis regionis *Murch Mahal* montis *Elbrus* propè *Derbend*. Kotschy N° 80.

Flores eis *A. deltoideæ* dimidiò minores. Affinis *A. parvifloræ* Boiss. quæ differt filamentis omnibus dentatis, pedicello siliculam æquanti, stylo siliculæ æquilongo.

AUBRIETIA LIBANOTICA Boiss.

A. densè cæspitosa tota pube ramosâ cana, foliis minutis oblongo-deltoideis in petiolum attenuatis utrinquè supernè dente auctis acutiusculis supremis integris, racemis e cæspite breviter exsertis laxis 2–4 floris, floribus mediocribus, calyce basi saccato, petalis purpureis lineari-oblongis calyce plùs duplò longioribus, filamentis angustè alatis

alà minorum in dentem lateralem apicem versùs abeunti, majorum usque ad apicem sensim attenuatà, siliculis pedicello flexuoso eis 3-4 plò longiori suffultis oblongis inflatis non compressis stellato-canescensibus stylo eis æquilongo vel paulò longiori apiculatis, seminibus oblongis.

Hab. in *Libano* suprà *Cedros*. Legi Jul. 1846.

Habitus *A. Columnæ*, folia apice 1 $1\frac{1}{2}$ -2 lin. tantum lata, flores inter eos *A. deltoideæ* et *parvifloræ* magnitudine intermedii. Ab *A. deltoideæ*, *erubescens* et *Columnæ* siliculis non plus minusve compressis, a posteriori cui præsertim affinis stylo siliculà non duplò longiori. ab *A. Kotschy* foliorum formà, pedicellis stylisque elongatis diversa.

ALYSSUM ELATUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.

A. perenne basi caulem herbaceum elatum teretem parcè squamulis stellatis obsitum supernè paniculato-ramosissimum ramosque sterilea frutescentes basi nudos apice densè foliosos lepidoto-canos edenti, foliis ramorum steriliùm adpressissimè lepidoto-stellatis canis spathulatis apice rotundatis in petiolum longè attenuatis, caulinis sparsis viridibus parcè squamuloso-stellatis spathulato-subretusis, foliis ramorum minimis, floribus parvis intensè flavis, petalis calyce parcè squamulis albis consperso subduplò longioribus ovato-spathulatis integris, racemis fructiferis abbreviatis, pedicellis capillaribus patulis flexuosis siliculà sesquolongioribus, filamentis omnibus basi appendice linguæformi apice subbidentato eis æquilongo auctis, siliculà glaberrimà orbiculari apice retusà stylo brevi tenuissimo apiculatà loculis 4-spermis, funiculis liberis, seminibus immaturis angustè marginatis.

Hab. in totà *Anatolià meridionali*, *Carià* in regione sylvaticà ad meridiem *Cadmi* sità (Boiss.! Pinard.!) ad rupes portùs *Tcherali* *Lyciæ* (Heldreich), in *Tauro* *Kotchy* N° 44.

A. Corsicum var. *Oriente* Boiss. pl. exs.

Planta 1-2 pedalis, folia ramorum steriliùm cum petiolo 6-9 lin. longa apice 4 lin. lata, siliculæ diametro ferè 2 lin. latæ. Donec specimina fructifera legissem diù hanc plantam habui pro var. *A. Corsici* quod eodem gaudet habitu et crescendi modo sed differt foliis siliculisque triplò minoribus eis ovatis basi attenuatis.

ALYSSUM CRENULATUM Boiss.

A. perenne basi caulem elatum teretem parcè stellato-lepidotum apice

corymboso-paniculatum ramosque steriles breves suffrutescentes supernè lepidoto-canos confertim foliosos edens, foliis ramorum sterili-um densè lepidoto-canis angustè linearibus subcanaliculatis, foliis caulis floriferi parcè stellato-puberulis flavido-virentibus, floribus mediocribus flavis, petalis calyce parcè lepidoto vix duplò longioribus spathulatis retusis, filamentis staminum minorum intus basi appendice linguæformi auctis majorum utrinquè alatis alà apice in dentem abeunti, racemis fructiferis valdè contractis subumbellatis, pedicellis capillaribus flexuosissimis siliculà sesquolongioribus, siliculis ovato-subrotundis pilis stellatis adpressissimis non contigu-uis obsitis apice retusis stylo brevi tenui terminatis circumcircà margine angusto crenulato membranaceo cinctis, loculis uniovulatis, seminibus (immaturis) oblongis angustissimè marginatis.

Hab. in collibus ad radices meridionales jugi *Cassii* in viâ inter *Latakieh* et *Suadieh*. Legi Jun. 1846.

Pedalis vel altior, folia 4-4½ pollicaria. Corymbi terminales conferti. Silicula diametro sesquilineam lata. Species præcedenti affinis sed ab eâ formâ foliorum, fructu stellato-hirto et ab omnibus mihi notis siliculâ margine crenulato cinctâ distinctissima.

ALYSSUM CASSIUM Boiss.

A. bienne caule elato sæpiùs solitario rubro densè folioso pilis stellatis sparsis obsito supernè confertim et ramosissimè corymboso, foliis magnis oblongo-lanceolatis obtusiusculis basi longè attenuatis sessilibus virentibus utrinquè pilis sparsis stellatis obsitis, ramorum minoribus angustioribus, floribus mediocribus aurantiacis, petalis calyce parcissimè stellatim piloso vix duplò longioribus spathulatis apice retusis, filamentis staminum breviorum basi appendice linguæformi libero auctis, majorum utrinquè latè alatis alà in dentem apice abeunti, racemo fructifero brevi, pedicellis rigidulis patulis siliculà duplò longioribus, siliculà ovatâ utrinquè subattenuatâ pilis stellatis sparsis obsitâ stylo longiusculo apiculatâ, loculis uniovulatis, seminibus (immaturis) angustè alatis.

Hab. in agris derelictis et collibus ad radices jugi *Cassii* in latere meridionali cum præcedenti mixtum.

Caulis 2-3 pedalis, folia 4-2 poll. longa 3-4 lin. supernè lata, corymbi terminales densi multiflori diametro 4-6 pollicares, silicula ferè 2 lin. longa sesquilineam lata. A præcedentibus quorum faciem habet

cæteris neglectis radice bienni distinctissimum, hæc notâ solo *A. Wierzbickii* affine quod differt caule racemum simplicem longum edenti, floribus siliculisque majoribus etc.

ALYSSUM IDÆUM Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1847.

A. perenne multicaule totum squamulis margine minutissimè fimbriatis argenteo-virens, caulibus basi nudis tenuibus herbaceis prostratis ascendentibusve foliosis simplicibus brevibus in racemum etiam fructiferum brevissimum subumbellatum abeuntibus, foliis ovatis oblongisve obtusis basi in petiolum brevissimum attenuatis, petalis pallidè luteis oblongis integris, filamentis longioribus alatis alâ angustâ ad tertiam partem filamenti obliquè truncatâ, brevioribus basi appendice brevissimâ liberâ instructis, pedicellis patentibus siliculam ovatam apice retusam glaberrimam viridem subcæsiâ æquantibus, stylo terminali siliculæ dimidium latitudinem subæquantî, loculis monospermis, seminibus angustissimè alatis.

Hab. ad saxa cacuminum montis *Idæ* act 6000' rarum (Heldreich).

Habitus et modus crescendi *A. Wulfeniani* quod a nostro differt floribus duplò majoribus, indumento non squamulis sed pilis stellatis constanti, staminum minorum appendice multò majori filamentis vix breviori, stylo siliculæ latitudinem subæquantî, siliculâ plùs minùsve stellato-pilosâ etc.

ALYSSUM SPHACIOTICUM Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1847.

A. perenne cæspitosum totum squamulis stellatis densissimè argenteo-lepidotum, caulibus brevissimis herbaceis densè foliosis simplicibus apice racemum sub anthesi ob pedunculos inferiores longissimos corymbosum fructiferum subelongatum formantibus, foliis ovatis oblongisve obtusis basi attenuatis subsessilibus, petalis intensè luteis, oblongis integris medio dorso stellatim pilosis, filamentis majoribus alâ suprà medium in dentem abeunti minoribus appendice oblongâ eis dimidiò minori stipatis, pedicellis fructiferis rigidis patulis siliculâ ovato-rotundâ densè lepidoto-argenteâ apice retusâ stylo brevi apiculatâ duplò longioribus, loculis monospermis, seminibus angustissimè marginatis.

Hab. in monte *Stravopodia* cacumine excelso jugi *Sphaciotici* rarum (Heldreich).

Caules 1-3 pollicares, habitus et flores *A. Atlantici* a quo differt caulibus simplicibus non suffruticosis, racemis per anthesin propter pedicellos inferiores elongatos corymbosis. In *A. Atlantico* præterea dentes filamentorum majorum ad apicem siti sunt, appendix filamentum minoris eo vix brevior, siliculæ stylo longo apiculatæ.

DIDYMOPHYSA AUCHERI Boiss. var. *stenophylla* Boiss. et Hohen. — Foliorum lacinia lineari-setacea acutiusculæ nec oblongo-lineares. Siliculæ minores.

Hab. in montibus *Kuh Daëna* Persiæ australis Kotschy N° 781, monte *Elwend* Aucher N° 247.

Hæc planta forsân rursûs observata et quoad flores (nunc ignotos) nota, a *Didymophysa Aucheri* genuinâ ex alpinis *Elbrus* oriundâ specificè distincta erit et hinc *D. Kotschyi* appellanda. — *Didymophysa* flores mihi in Ann. Sc. Nat. 1842 ignoti, nunc e speciminibus Kotschyianis ex monte *Elbrus* sic describendi. Calyx basi æqualis glaber. Petala unguiculata calyce duplò longiora limbo ovato albo. Filamenta edentula. Glandulæ nullæ. Stigma capitatum.

CARPOCERAS. Boiss.

Thlaspi Sect. *Carpoceras* DC. Prodr. non A. Rich.

Calyx basi æqualis. Petala integra æqualia. Stamina libera edentula. Glandulæ minutissimæ binæ ad basin staminum minorum. Silicula a latere compressa a basi ad apicem dilatata obversè triangularis apice sinu lato lunulato bicornuta stylo apiculata. Valvulæ dorso acutè naviculares apteræ. Loculi bi-pluriovulati. Semina oblonga punctulata vel sulculosa pendula. Funiculi basi dilatati. Radicula propè commissuram cotyledonum sublateraliter sita. — Genus herbas Orientales annuas biennes vel perennes facie et characteribus *Thlaspidis* donatas sed quarum siliculæ apteræ sunt comprehendens; ab *Iberidellâ* quæ quoque valvis apteris gaudet siliculâ apice cornutâ seminibusque non notorrhizeis distinctum, non confundendum cun *Thlaspidis* Sect. *Apterygium* Ledeb. quod e *Th. pumilo* constans valvulas quoque ferè apteras habet sed utrinquè attenuatas prorsûs eornutas, semina regulariter pleurorrhizea et quod a *Th. rotundifolio* genericè sejungi nequit.

CARPOCERAS SIBIRICUM Boiss.

C. annuum glabrum, caule erecto simplici aut vix ramoso, foliis radicalibus obovatis subpetiolatis caulinis oblongo-lanceolatis integris denticulatisve basi hastato-amplexicaulibus, petalis lineari-cuneatis calyce paulò longioribus, siliculà ovatà cornubus planis lanceolato-triangularibus siliculæ subæquilongis subarcuatis, loculis dispermis, stigmate sessili, seminibus longitudinaliter et arcuatim sulcato-striatis.

Thlaspi ceratocarpon Murr. — DC. Prodr.

Hab. in *Sibiria*.

CARPOCERAS OXYCERAS Boiss.

C. glabrum bienne, caule elato erecto tereti lævi folioso superne corymboso-paniculato, foliis radicalibus oblongis longè petiolatis, caulinis oblongis obtusis basi rotundatim auriculato-amplexicaulibus, petalis albis lineari-cuneatis calyce duplò longioribus, racemis fructiferis longis densis, pedicellis patulis siliculà duplò longioribus, siliculà ovatà compressà quadrangulà cornubus subsetaceis rectis siliculà dimidiò brevioribus, stylo terminali cornubus paululùm breviori tandem deciduo, loculis dispermis, seminibus punctulatis.

Thlaspi oxyceras Boiss. in Pinard. pl. Syr. exs.

Hab. in nemorosis regionis inferioris jugi *Cassii* inter *Cassab* et *Suadieh*.

Planta 2-2½ pedalis, flores magnit. *Thl. arvensis*, valvula cum cornu 3 lin. longa. A. precedenti egregiè differt caule ramoso, siliculis minùs compressis placentarum prominentià quadrangulis, cornubus siliculæ tenuissimis, floribus duplò majoribus, seminibus punctulatis nec sulcatis.

CARPOCERAS STENOCARPUM Boiss.

C. glabrum perenne cæcio-virens multicaule, caulibus foliosis simplicibus pumilis racemum floriferum capitatum fructiferum elongatum edentibus, foliis radicalibus numerosis rosulatis ovatis petiolatis integris vel subrepandis, caulinis sessilibus hastato-amplexicaulibus basi minutè denticulatis auriculis minimis oblongo-linearibus, petalis oblongo-linearibus albis calyce apice violascenti duplò longioribus, siliculis pedicello erecto-patulo eis breviori suffultis obversè lanceo-

latis, cornubus planis triangularibus siliculâ sextuplò brevioribus, stylo terminali cornubus dimidiò breviori, loculis 4 spermis, seminibus minutè punctulatis.

Thlaspi stenocarpum Boiss. et Hohen. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846.

Hab. propè nives in monte *Totschal* propè *Teheran* Kotschy N° 165.

Caules fructiferi semipedales, planta florens *Th. præcoci* vel *cochleariformi* simillima, silicula 5 lin. longa apice vix sesquilineam lata.

CARPOCERAS HASTULATUM Boiss.

C. annuum glabrum pluricaule, caulibus ascendentibus simplicibus vel parcè foliosis racemum terminalem pauciflorum tandem elongatum edentibus, foliis minutis radicalibus ovato-rotundis breviter petiolatis caulinis oblongis vel oblongo-linearibus denticulatis acutiusculis basi hastato-amplexicaulibus auriculis minutis oblongis, petalis oblongis roseis calyce triplò longioribus, siliculis pedicello erecto-patulo eis paulò breviori suffultis obversè lineari-lanceolatis apice truncatis, cornubus valdè divergentibus subhorizontalibus lineari-lanceolatis siliculâ 6-8 plò brevioribus, stylo cornubus æquilongo, loculis 4-6 spermis.

Thlaspi hastulatum Stev. — *Hutchinsia hastulata* DC. Prodr.

Hab. in *Georgia Caucasica* et *Persia boreali*. (DC.)

THLASPI MICROSTYLUM Boiss. (Sect. *Neurotropis*.)

Th. bienne vel perenne glabrum cæsiò-virens, caulibus pluribus ascendentibus brevibus foliosis apice in racemum etiam fructiferum abbreviatum abeuntibus, foliis radicalibus minutis ovatis petiolo eis duplò longiori suffultis, caulinis oblongis acutiusculis basi acutiusculè auriculato-amplexicaulibus omnibus integris vel vix et parcè denticulatis, floribus....; siliculâ pedicello patulo crassiusculo eâ breviori suffultâ obovatâ basi angustatâ supernè profundè et sinu acuto obcordatâ, alâ nervo marginatâ supernè loculo latiori, lobis emarginaturæ latere exteriori rotundatis interiori acutiusculis, stylo brevissimo emarginaturâ quadruplò breviori, loculis quadriovulatis, seminibus lævibus.

Hab. in regione montanâ sylvaticâ *Cassii* in *Syria* boreali undè specimen unicum fructiferum retuli.

Caules 3-4 pollicares, folia 4-6 lin. longa, racemus fructifer pollicem longus 15-20 siliculosus. Siliculæ 4-4 1/2 lin. longæ apice 3 lin. latæ. Species in sectione cæteris neglectis radice non annuâ distincta.

THLASPI KOTSCHYANUM Boiss. et Hohen. in Kotschy pl. Pers. bor.
1846. (Sect. *Neurotropis*.)

Th. annuum glabrum glauco-virens, caule pumilo simplicissimo folioso racemum in anthesi densè capitatum dein subelongatum edenti, foliis radicalibus ovato-rotundis rubellis longiusculè petiolatis, caulinis ovatis obtusis integris auriculato-amplexicaulibus auriculis rotundatis, floribus minimis, petalis albis oblongo-linearibus calyce violascenti subduplò longioribus, siliculis pedicello erecto-patulo eis subæquilongo suffultis orbiculato-obcordatis, emarginaturâ profundâ ad loculorum apicem usquè productâ, stigmate in sinu angusto sessili, alâ basi angustatâ supernè latissimâ nervo tenui marginatâ lobis utrinquè rotundatis, loculis 4 spermis, seminibus lævibus.

Hab. in monte *Elbrus* suprâ pagum *Passgala* Kotschy.

Specimina mea florif. bipollicaria fructif. 5 poll. longa, flores illis *Th. arvensis* minores, silicula eâ hujus minor et præsertim brevior diametro 5 lin. lata; ab eo prætereâ differt alis marginatis, seminibus lævibus. *Th. orbiculatum* Stev. a nostro differt siliculâ majori, alâ nervo validissimo cinctâ lobis inter se contiguis, emarginaturâ angustâ parùm profundâ usquè ad apicem loculorum non productâ, stylo longiori, loculis 7-8 spermis.

THLASPI OCHROLEUCUM Boiss. et Heldr. (Sect. *Pterotropis*.)

Th. perenne glabrum multicaule, caudiculis brevibus induratis in cæspitem coarctatis, caulibus pumilis foliosis racemum unicum rariùs binos sub anthesi capitatos dein elongatos edentibus, foliis radicalibus ovatis oblongisve obtusis integris vel subdenticulatis in petiolum eis breviorē attenuatis, caulinis oblongis acutis cordato-amplexicaulibus brevissimè et rotundatim auriculatis, petalis pallidè ochroleucis calyce rubello plùs duplò longioribus, antheris flavis calycem superantibus, siliculis pedicello patulo eis paulò longiori suffultis (junioribus) obcordatis basi attenuatis apice breviter emarginatis, alâ supernè latitudinem loculi æquanti, stylo siliculâ vix breviori, loculis 4 ovulatis.

Th. elegans pl. Heldr. Anatol. exs 4846 non Boiss. Diagn.

Hab. ad nives in regione superiori montis *Davros dagh* alt. 5-6000' in *Pisidiâ* (Heldreich), in *Macedoniæ* alpinis si specimen a cl. Friwuldsky mihi sub *Th. alpini* nomine missum hùc rectè refero.

Habitus et flores *Th. præcocis* a quo differt petalis ochroleucis, stylo

multò longiori. *Th. elegans* cui primùm incautè retuleram diversissimum est caule corymboso, foliis caulinis abbreviatis ovato-rotundis, sepalis flavidis, petalis albis, loculis 5-6 ovulatis.

THLASPI TAYGETEUM Boiss. (Sect. *Pterotropis*.)

Th. perenne glabrum multicaule, caudiculis brevissimis in cæspitem coarctatis, caulibus foliosis simplicibus racemum floriferum capitatum fructiferum elongatum edentibus, foliis omnibus plus minùsve denticulatis radicalibus oblongis in petiolum eis longiorem attenuatis obtusis, caulinis oblongo-linearibus acutis basi acutè auriculato-cordatis, petalis albis calyce rubello subtriplo longioribus, antheris violaceis calyce longioribus, siliculis pedicello patulo-reflexo eis duplo longiori suffultis (junioribus) obcordatis basi attenuatis apice breviter emarginatis lobis brevissimis rotundatis, alà valvularum supernè loculo æquilatà, stylo siliculà dimidiò breviori, loculis 5 ovulatis.

Hab. in regione sylvaticà inferiori *Taygeti* suprà *Mistra* ubi legi florif. Aprili 1842.

Habitus et flores omninò *Th. præcoci*s vel *ochroleuci*, ab utroque foliis omnibus manifestè denticulatis caulinis angustioribus acutiùs auriculatis, antheris purpureis nec flavis, a priori iterùm lobis siliculæ multò obsoletioribus, foliis non rubellis, a posteriori petalis albis styloque breviori distinctum.

THLASPI STENOPTERUM Boiss. et Reut. (Sect. *Pterotropis*.) ■

Th. glabrum perenne, collo fibrillis foliorum deciduorum obsito caulem unicum pumilum simplicem parcè foliosum edenti, foliis parvis radicalibus rubellis ovato-rotundis petiolo eis longiori suffultis, caulinis remotis oblongis acutiusculis basi breviter cordato-auriculatis, petalis albis calyce duplo longioribus, antheris flavis, racemo fructifero abbreviato denso, pedicellis patulis siliculæ subæquilongis, siliculà angustà obcordato-lanceolatà basi longè attenuatà apice sinu rotundato emarginatà lobis rotundatis brevissimis, alà jam medium fructum versus loculo quadruplo angustiori ferè obsoletà, stylo emarginaturà triplo longiori, loculis biovulatis, seminibus lævibus.

Hab. in *Sierra de Guadarrama* Castellæ veteris suprà *El Paular* (Reuter).

Planta fructifera 3-4 pollicaris, folia radicalia diametro circ. 3 lineas

lata, caulina 3-4 longa, flores eis *Th. alpestris* majores, *Th. montani* minores, silicula 3 lin. longa apice 1 1/2 lata. Species siliculis bas longè attenuatis longè stylatis angustissimè alatis a *Th. montano* quod siliculas basi rotundatas habet diversissima. Affine radice perenni *Th. virenti* Jordan quod distinguitur foliis inferioribus oblongis basi longè attenuatis, antheris purpureis, siliculis multò brevioribus, emarginaturæ lobis subnullis.

SOBOLEWSKIA STYLOSA Boiss. et Hohen. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846.

S. glaberrima glaucescens collo cæspitosè pluricauli basi squamoso, foliis radicalibus petiolo eis multoties longiori suffultis rotundato-cordatis obtusè lobatis subcoriaceis lobis 7-9 triangularibus, caulinis ad ramorum ortum paucis minutis subsessilibus cuneato-trilobis indivisisve, caule supernè breviter paniculato, petalis albis calyce patenti-deflexo membranaceo duplò longioribus. racemis fructiferis vix elongatis, siliculis pedicello tenui patenti eis duplò longiori suffultis a latere compressis oblongo-ellipticis utrinquè attenuatis in stylum longiusculum stigmate capitato terminatum abeuntibus, loculis dispermis.

Hab. in declivibus septentrionalibus montis *Elbrus* propè *Derbend* Kotschy N° 85.

Habitu simillima *Graellsia Saxifragifoliae* quæ siliculà a dorso compressà non septatà monospermà genericè differt. *Sobolewschia lithophila* differt foliis multilobis, siliculis oblongo-linearibus muticis. Hoc genus in DC. Prodr. incompletè describitur et ejus silicula unilocularis monosperma esse dicitur sed cl. Ledebour qui probab. specimina meliora antè oculos habuit, in florà Rossicà siliculam a latere compressam dispermam esse dicit, quod meæ plantæ convenit. *Sobolewschiam* igitur inter *Thlaspidneas* recensendam esse censeo sed cum siliculas juniores tantum viderim nescio an septatæ vel prorsus esepatæ sint et embryonis formam non novi.

BROSSARDIA PAPYRACEA Boiss. var. *Kotschyi*. — Siliculæ apice et etiam basi subemarginatæ cæterum omnia speciei.

Hab. in declivibus septentrionalibus montis *Kuh Barfi* et *Kuh Delu* Persiæ australis Kotschy N° 523 et 327.

Ex specimine Aucheriano *B. papyraceæ* a me viso silicula basi atte-

nuata apice rotundata est, in altero speciminum cl. Kotschy siliculas juniores eadem formâ donatas vidi et hanc formam ideò variabilem esse autumavi. Si tamen ulterior observatio siliculas utriusque maturas suam formam peculiarem servare doceret hæc in speciem sub *Br. Kotschy* nomine erigenda esset.

EUNOMIA SUBULATA Boiss. et Heldr.

E. perennis glabra, caulibus brevissimis suffruticosis procumbentibus cæspitosè ramosis, ramis brevibus simplicibus usquè ad racemum sub anthesi capitatum densè foliosis, foliis tenuissimè subulato-subteretibus striatis acutis, petalis roseis calyce rubello bisaccato duplò longioribus integris lineari-oblongis, filamentis omnibus exalatis edentulis, antheris luteis, siliculâ pedicello stricto eâ vix breviori suffultâ ellipticâ compressâ basi rotundatâ apice subretusâ, alâ marginali angustissimâ a parte dimidiâ apicem versùs fimbriato-lacerâ, stigmatè sessili.

Hab. in parte occidentali montis *Gheidagh* Tauri Isaurici alt. 6000' (Heldreich). Fl. Julio.

Suffruticulus 1-2 pollicaris, folia 3-4 lin. longa tenuissima, flores amænè rosei eos *Æth. saxatilis* æquantes in racemum densè capitatum dispositi, siliculæ 2 lin. longæ vix sesquilineam latæ, habitus *Iberidellæ cæpsitosæ* Boiss.

Semina generis *Iberidellæ* quæ nondum observare potueram ex speciminibus fructiferis *I. trinerviæ* et *sagittatæ* e Persiâ a cl. Kotschy relatis notorrhizea sunt ut jam suspicaveram.

ÆTHIONEMA GRANDIFLORUM Boiss. et Hohen. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846.

Æ. perenne glaberrimum glauco-virens caulibus brevibus suffrutescentibus ramos tenues elongatos virgatos foliosos simpliciuscules ascendentes vel prostratos edentibus, foliis linearibus obsolete uninerviis basi attenuatis obtusis sæpè mucronulatis summis angustioribus, racemis floriferis laxiusculis, petalis purpureis aveniis integris calyce violaceo-nigrescenti 3-4 plò longioribus, filamentis majoribus basi in alam edentulam obliquè evanidam dilatatis, siliculis pedicello strieto eis æquilongo suffultis orbiculatis transversè sublatis basi rotundatis supernè sinu angustissimo ad medium usquè emarginatis, lobis

emarginaturæ amplis rotundatis diametro loculi subduplò latioribus sese margine obtegentibus emarginaturamque claudentibus, alà marginali a basi angustiori sensim dilatà circumcìrcà obsoletè denticulato-repandà, stigmate subsessili, loculis monospermis.

Hab. in fauce *Schirdere* montis *Elbrus* Kotschy N° 181.

Var. *β. parviflora*. — Flores ferè dimidiò minores cæterum omnia speciei.

Æth. coridifolium Hort. botan. plures non DC.

Hab. in *Persia* Aucher N° 342 et 4129 A, in monte *Elbrus* propè *Asadbar* Kotschy N° 455. Colitur frequenter.

Species pulchra floribus sæpè ea *Arabidis Alpinæ* magnitudine æquantibus, ab omnibus aliis specibus generis filamentis majoribus edentulis basi angustè alatis diversa. Varietas *β.* frequenter confunditur cum *Æ. coridifolio* cui ut synonymon adducendum *Lepidium leiocarpum* DC. et quod est planta Libanotica diversissima ramis brevibus firmis crassiusculis, siliculæ dimidiò minoris alis latere interiori concaviusculis, staminibus majoribus basi dentatis. Eadem varietas a me ipso in Ann. Sc. Nat. 1842 pro *Æth. membranaceo* DC. sumpta fuit simili quidem sed quod differt alis fructùs integerrimis, sinu emarginaturæ non clauso, staminibus majoribus apice dentatis, stylo sinum dimidium æquantì.

Æth. stylatum DC. quod in Ann. Sc. Nat. cum *Lepidio leiocarp.* — *Æth. coridifolio* conjunxeram ab eo specificè differt. — *Æth. Beyrichii* Tausch nihil aliud quàm *Æth. cristatum* esse videtur. — *Æth. polygaloides* DC. ex ins. Scio est *Crenularia orbiculata* Boiss.

ÆTHIONEMA CARDIOPHYLLUM Boiss. et Heldr.

Æth. perenne glabrum glauco-virens basi fruticosum, ramis rigidis erectis foliosis supernè 4-3 racemos post anthesin elongatos edentibus, foliis deltoideo-cordatis carnosulis sessilibus acutis lobis inferioribus rotundatis, petalis roseis calyce basi æquali sesquilonioribus, filamentis majoribus alatis sub apice latere interiori dentatis, siliculis pedicello recurvo eis subæquali suffultis ovatis basi breviter et sinu lato emarginato-retusis, alà a basi ad apicem sensim dilatà lacero-fimbriatà apice in lobos aetiusculos loculo æquilatos abeunti, stylo emarginaturam multò superanti, loculis biovulatis.

Hab. in montibus tophaceis suprà urbem *Bouldour* Pisidiæ rarum (Heldreich).

Caules semipedales, folia ea *Polygalæ cordifoliæ* referentia vix 4 lin. longa lataque. Racemi fructiferi 2-3 pollicares, flores eos *Æth. saxatilis* æquantes, silicula 2 lin. longa. Ab *Æth. fimbriato* foliorum formâ statim dignoscendum; habitu quoque *Eunomiam cordatam* refert a quâ floribus roseis et genericè filamentis majoribus dentatis discrepat.

ÆTHIONEMA THESIIFOLIUM Boiss. et Heldr. in pl. Pisid. exs. 1846.

Æth. perenne glabrum glaucescens basi fruticosum, ramis virgatis elatis teretibus foliosis supernè parcè corymboso-paniculatis, foliis numerosis strictis enerviis linearibus utrinquè angustatis acutis, racemis fructiferis capitatis dein elongatis, petalis pallidè roseis purpureo-pictis calyce basi bisaccato virescenti duplò longioribus, staminibus majoribus angustè alatis latere interiori sub apice dentatis, ovario elliptico angustè alato stylo eo longiori superato, siliculâ...

Hab. in saxosis montis *Olklatschi* propè *Egirdir* in *Pisidiâ*. (Heldr.)

Smipedalis, folia majora pollicem longa sesquilineam lata. Flores illis *Æth. saxatilis* subduplò majores; caulibus elatis racemisque floriferis confertis affine *Æth. stenoptero* quod differt foliis brevioribus obtusis, filamentis gibbosis etc.

LEPIDIUM CRASSIFOLIUM W. K. Var. *ramosissimum* Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. — Folia inferiora maxima ovata obtusissima 3 poll. longa 2 1/2 lata, caulina oblonga basi rotundato-auriculata, caulibus a basi subdivaricatis ramosissimus amplissimè corymbosus magis latus quam longus, flores et siliquæ omninò speciei.

Hab. in locis salsis hyeme inundatis planitie *Koniah* inter urbem et radices montis *Karadagh* (Heldreich).

ENARTHROCARPUS STRANGULATUS Boiss.

E. totus pilis albidis hirsutus asper, caulibus ascendentibus procumbentibusque elongatis simpliciusculis e basi ferè floriferis, foliis radicalibus et inferioribus pinnatipartitis segmentis oblongis sæpiùs iterum profundè dentatis vel lyratis terminali ovato basi confluenti petalis flavis purpureo-venosis unguibus violaceis calyce albo-hispido longioribus, racemis totâ longitudine bracteatis, bracteis oblongis vel oblongo-linearibus acutè denticulatis, siliquis pedicello stricto brevi contorto terminatis adpressè scabris lanceolato-linearibus a latere compressis

et utrinquè acutè carinatis ad semina valdè strangulatis paulò suprà basin articulatis articulo inferiori angustato plùs minùsve incurvis apice in rostrum conicum longiusculum tenue attenuatis.

Raphanus recurvatus Del. Fl. Æg. non Pers. — Defile Fl. Æg. tab. 36 quoad flores bona quoad fructus *E. lyratus* DC. potiùs referens.

Hab. in *Ægypto* (Aucher! Husson!), in *Arabia petraea* versùs Palæstinam copiosè. (Boiss.)

Flores magnitudinis eorum *Sinapidis arvensis*, siliqua bipollicaris modo cornu caprarum alpinarum (bouquetin) nodosa basi ferè 2 lin. lata. Species distinctissima a quâ *En. lyratus* DC. — *Raphanus recurvatus* Pers. qui in *Ægypto* copiosè crescit differt floribus magis violascentibus eos *Rapistri rugosi* vix æquantibus, siliculis brevioribus quoque compressis sed longitudinaliter striatis nec nodoso-strangulatis. *E. arcuatus* habet siliquas longiores moniliformes quidem sed teretes nunquam carinato-compressas. *En. pterocarpus* DC. deniquè differt siliquâ hispidâ infernè latiusculè alatâ non strangulatâ.

RAPHANUS AUCHERI Boiss.

R. annuus totus pilis retrorsis hispidus asper, caulibus ascendentibus tandem elongatis infernè ramosis, foliis rariùs oblongis indivisis sæpiùs lyrato-pinnatipartitis lobis ovatis obtusis irregulariter dentatis terminali ovato-oblongo majori, petalis sulphureis oblongo-spathulatis integris, ungue calycem bisaccatum plùs minùs hispidum superanti, siliquis pendulis pedicello brevi contorto suffultis longis teretibus retrorsùm strigosis a basi tenuiori sursùm incrassatis apice in rostrum breviter cylindricum obtusum læve asperum subangustatis tandem inter semina transversè in articulos secedentibus intùs medullâ fartis, seminibus oblongis orthoploceis longitudinaliter sulcatis.

Brassica Aucheri Boiss. Ann. Sc. Nat. 1842.

Hab. in *Mesopotamiâ* Aucher loc. cit., *Persia australi* Kotschy No 103, in *Galilæa* in declivibus siccis montium et vallium in ascensu occidentali montis *Thabor* suprà *Dabourieh* et in montanis calidis propè *Banias* (Boiss.).

Siliqua matura tripollicaris supernè infrà apicem diametro 1 3/4 lin. lata infernè longè attenuata teres præter scabritiem lævis nullo modo strangulata. Priùs hanc plantam fructu tantùm immaturo viso ad *Brassicam* retuleram, inter *Raphanos* siliquâ in articulos potiùs ruptili quam secedenti, seminibus oblongis sulculosis nec rotundis distinctissima.

RAPHANUS PUGIONIFORMIS Boiss.

R. annuus, caulibus procumbentibus ascendentibusque ramosis petiolisque papillis sparsis albis brevibus asperis, foliis lyratis lobis lateralibus oblongis vel triangularibus remotis ad basin folii sensim decrescentibus terminali ovato-oblongo obtuso multò majori basi sæpè confluenti, foliis superioribus ad ramorum basin parvis oblongo-linearibus, racemis terminalibus fructiferis longis, floribus violaceis amplis, petalis oblongo-spathulatis ungue calycem longum glabrum clausum superanti, siliquis pedicello brevi suffultis axi strictis papillis brevibus sursum directis asperrimis imâ basi suprâ stipitem brevissimum pedicello æquilatum articulatis suprâ articulationem crassis teretibus duris fungosis sensim in rostrum asperum teres medullosum asperum longissimè conicum rigidum apice tenuissimum parte seminiferâ triplò longiùs attenuatis, seminibus orthoploceis globoso-subcompressis eximè punctulatis.

Hab. in totâ *Galilæa* septentrionali a monte *Ithabure* ad *Banias* in pinguibus herbidis frequens.

Pulchra et distincta species floribus magnitudinis *R. sativi*, siliquis cum rostro 3-4 poll. longis, parte seminiferâ 3 linas diametro latâ, rostro rigido supernè tenuissimo subpungenti.

HUSSONIA Boiss.

Calyx basi bisaccatus. Petala rosea lineari-oblonga in unguem sensim attenuata calyce duplò longiora. Filamenta omnia filiformia edentula. Torus inter semina indistinctè glandulosus. Ovarium lineare. Stigma capitatum. Siliqua lineari-cylindrica basi breviter bivalvis septataque loculis dispermis suprâ valvulas convexas duras rostro eis multò longiori indehiscenti parte inferiori tereti seminifero inter semina fungoso supernè sensim attenuato uncato-recurvo superata. Semina loculorum pendula rostri erecta lineari-cylindrica notorrhizea. — Herba Arabica facie *Erucarice*. Genus cl. et am. Husson Bot. et Medic. Kahiræ professori dicatum, ab *Erucaridâ* cujus siliquam habet eximè distinctum seminibus notorrhizels nec spirilobeis. Hoc charactere in ordine Prodr. Candolleani propè *Anchonium* et *Sterigma* collocandum.

HUSSONIA UNCATA Boiss.

H. internè parçissimè hirtula cæterùm glabra , caulibus teretibus tenuibus erectis parçè ramosis , foliis inferioribus pinnatim vel bipinnatisectis laciniis linearibus costâ mediâ vix latioribus obtusis integris vel parçè dentatis , superioribus pinnatis laciniis paucis angustissimè linearibus , floribus in racemos terminales primùm densos post anthesin longissimos dispositis , siliquis pedicello brevissimo crasso recurvo suffultis pendulis rostro valvulis quadruplò longiori apice valdè attenuato uncinato-recurvo suffultis.

Erucaria uncata Boiss. in Pinard pl. exs.

Hab. in *Wadi Feiran* Arabiæ petreæ Schimper N° 453 , frequens in toto deserto Arabiæ petreæ Palæstinæ contermino inter *Nuckl* et *Gaza* in arenosis ad umbram suffruticum inter quos caules scandunt , in *Palæstinæ* desertis (Pinard). Fl. Aprili.

Flores pallidi rosei eis *E. Aleppicæ* minores , siliquarum valvulæ sesquilineam longæ basi et apice truncatæ , rostrum 8-12 lin longum basi lineæ 3/4 latum.

ERUCARIA MICROCARPA Boiss.

E. annua caulibus a basi subdivaricatim ramosis ramisque internè præsertim papillis albis retrorsum adpressissimis sparsis obsitis , foliis bipinnatisectis glabris vel parçè papillosis carnosulis laciniis linearibus angulo recto super costam mediam et inter se insidentibus foliorum radicalium abbreviatis latioribus obtusis superiorum attenuatis angustatis , racemis fructiferis elongatissimis strictis , floribus parvis roseis , petalis oblongo-spathulatis integris calyce glabriusculo subduplò longioribus , siliquis pedicello crasso brevi patulo insidentibus minutissimè pruinoso-scabridis glabrisve brevissimis longitudinaliter sulcato-striatis margine carinatis articulo inferiori 2-3 spermo valvis convexis , articulo superiori indehiscenti dimidiò breviori monospermio stylo tenui æquilongo superato , seminibus parvis ovatis lævibus.

Hab. in deserto *Arabie petreæ* contermino et in vallibus calidis inter *St.-Saba* et *mare Mortuum* (Boiss.)

Species distinctissima, flores eis *E. Aleppicæ* dimidiò minores , laciniæ foliorum tenuiores confertiores , siliquæ cum rostro 2 1/2 vix 3 lin. tantum longæ.

SCHIMPERA ARABICA Hochst. et St. var. *lasiocarpa* Boiss. — Siliqua tota cum rostro papillis brevibus albis obsita.

Hab. in deserto ad fines *Palæstinæ* cum formâ vulgari.

Sch. Arabica quam in vallibus Sinaiticis quoque abundè legi valdè variat foliis integris et profundè pinnato-lobatis, rostro vel siliquam vix superanti vel eâ 2-3plò longiori angusto aut dilatato. *Sch. Persicam* meam specificè differre nunc dubito.

ISATIS ICONIA Boiss. et Heldr.

I. glauca perennis, caule crasso subangulato, collo surculos breves apice foliosos edenti, foliis radicalibus et surculorum oblongo-lanceolatis in petiolum longè attenuatis, caulinis sessilibus basi attenuatis acutè et minutè auriculatis omnibus obtusis, rameis angustissimè linearibus, corymbo terminali denso amplo, siliculis pedicello filiformi deflexo apice incrassato eis æquilongo insidentibus junioribus etiam glaberrimis ovato-oblongis basi rotundatis apice retusis, margine dis-cum lævem latitudine æquanti.

Hab. in agris propè *Koniah* (Heldreich).

Planta 1-2 pedalis, folia radicalia 3-4 poll. longa 1-1 1/2 poll. lata, silicula 5-6 lin. longa 3 lata. Affinis *I. Candolleanae* a quâ glabritie totius plantæ et siliquis supernè non angustatis differt et *I. glaucae* quæ foliis non auriculatis, siliquis velutinis utrinquè attenuatis recedit.

ISATIS KOTSCHYANA Boiss. et Hohen. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846.

I. glaberrima glaucescens, radice perenni surculos breves apice foliosos edenti, foliis oblongis obtusis inferioribus in petiolum attenuatis caulinis sessilibus basi auriculatis auriculis rotundatis subdivergentibus, paniculâ laxâ subcorymbosâ, siliculis pedicello filiformi patentirecurvo apice incrassato eis breviori suffultis breviter tomentellis oblongis elongatis basi attenuatis apice rotundato-retusis margine latitudine partem seminiferam lævem æquanti.

Hab. ad radices montis *Demawend* in provinciâ *Lar*. Kotschy N° 333.

Planta 2-3 pedalis, folia circ. 3 pollicaria pollicem lata, siliculæ 7 lin. longæ supernè 2 1/2 latæ. Ab *I. oblongata* cui omnium magis affinis differt siliculis non glaberrimis nec acutis, ab *I. Iberica* loculo non jugato.

BOREAVA APTERA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.

B. annua glaberrima glaucescens, caule erecto tereti folioso supernè divaricatim corymboso-paniculato, foliis oblongis integerrimis obtusis cordato-amplexicaulibus rotundato-auriculatis, racemis post anthesin elongatis laxis, siliculis pedicello erecto eis subbreviori suffultis ovatis non compressis rostro complanato breviter triangulari acuto eis breviori terminatis, rostri marginibus utrinquè in carinam angustam acutam secus siliculam decurrentibus, disco utrinquè tricostato inter costas ruguloso.

Hab. propè *Bouldour* Pisidiæ (Heldreich).

Planta 1½-4 pedalis, folia inferiora pollicem longa superiora diminuta, silicula 1 ¾ lin. tantum longa 1 ½ lata rostro 1 ¼ lin. longo terminata. *B. Orientalis* differt fructu majori tetraptero, fructu inter alas tuberculato.

CISTINEÆ.

HELIANTHEMUM SYRIACUM Boiss. (Sect. *Halimum*.)

H. pumilum suffruticosum, caulibus tortuosis ramosissimis, foliis densis sessilibus lineari-convolutis suprâ pallidè virentibus subtus canescentibus ramisque novellis valdè viscoso-hirsutis, scapis e dumo breviter exsertis apice 3-4 flores umbellatos edentibus ad medium et iterum apice duo folia opposita aliis paulò latiora ferentibus, pedicellis crassis, petalis albis, calycis sepalis tribus ovato-triangularibus viscosissimis, capsulâ pedicello paulò breviori oblongo-trigonâ tomentellâ calycem æquanti trivalvi, seminibus brunneis compressis concavis eximè muriculatis.

Hab. in jugo *Libanotico* suprâ *Zachle* in consortio *Rhododendri Pontici*. Legi Julio 1846.

Fruticulus humilis habitu formæque foliorum affinis *H. umbellato* a quo etsi specimina ferè omninò deflorata tantum viderim specificè distinctum habeo propter pedicellos crassos nec attenuatos, hispiditem majorem totius plantæ, semina duplò majora brunnea nec nigra.

HELIANTHEMUM VENTOSUM Boiss. (Sect. *Eriocarpum*.)

H. dumosum puzilum, ramis intricatissimis vetustioribus albidis junioribus puberulis, foliis flavido-virentibus pube stellatâ brevissimâ tomentellis utrinquë concoloribus ellipticis planis vel margine convolutis subtus nervo prominulo percursis supernè sulcatis brevissimè petiolulatis, stipulis parvis triangulari-linearibus acutis petiolulos paulò superantibus, racemis brevibus laxis secundis 3-5 floris, bracteis oblongo-linearibus parvis cum floribus alternis, pedicello post anthesin erecto postea deflexo calyce triplò breviori, sepalis extus breviter et densè stellato-tomentellis intus adpressè pilosulis duobus exterioribus brevioribus lineari-setaceis tribus interioribus ovatis elevatim 5-6 nerviis, petalis aureis calycem parum excedentibus, stylo flexuoso filiformi, ovario adpressè hirsutissimo, fructu nutanti...

Hab. in cacumine jugi *Tih* Arabiæ petreæ in viâ inter montem *Sinai* et *Nuckl* locis ventosissimis. Legi Apr. ineunte.

Inter *H. ellipticum* Pers. et *Kahirinum* ferè medium, a priori differt floribus pedicellatis nec sessilibus majoribus, sepalis brevissimè tomentellis nec hirsutis, a posteriori cui floribus non sessilibus accedit distinctum sepalis interioribus ovatis nec triangulari-lanceolatis acutissimis, ab utroque racemis laxis paucifloris.

HELIANTHEMUM VESICARIUM Boiss. (Sect. *Euhelianthemum*.)

H. basi suffruticosum cæspitosum, caulibus brevissimis prostratis ramosis ramis brevibus simplicibus canis, foliis adpressè tomentoso-canis linearibus vel lineari-lanceolatis obtusiusculis margine plus minusve revolutis subtus nervo lato prominenti percursis, racemis laxis secundis bracteatis, bracteis lanceolatis pedicello triplò brevioribus, pedicellis filiformibus flexuoso-recurvis calyce longioribus præter tomentum breve hispidis apice subincrassatis, petalis intensè roseis, calyce scarioso fructifero vesicario sepalis duobus exterioribus minimis oblongo-linearibus obtusis tribus interioribus ovatis albidis sæpè obsoletè et inæqualiter bilobis albidis nervis quatuor rabis validis percursis præter pubem brevissimam tomentellam ad nervos longè setosis, nervis exterioribus latere externo tantum nervulosis, capsulâ tomentosâ calyce breviori, seminibus tuberculato-scabridis.

Hab. in jugo *Tih* Arabiæ petreæ in consortio præcedentis, in collibus

calidioribus *Judææ* v. gr. in monte *Olivet*o propè *Bethaniam*, in descensu inter *St-Saba* et *mare Mortuum*. (Boiss.)

Pulchra species affinis *H. Apennino* et *H. roseo*, ab eis nervis calycinis lateralibus pulchrè ramulosis, calycis indumento duplici, sepalis fructiferis majoribus magisque scariosis distincta.

VIOLARIÆ.

VIOLA CRETICA Boiss. et Heldr. (Sect. *Odorata*.)

V. acaulis minuta, stolonibus tenuissimis, foliis parvis ovato-cordatis obtusis crenatis crenis utrinquè 4-6 obsoletis latis longè petiolatis pilis longis albis sparsis facie superiori et ad margines præsertim obsitis, foliis stolonum minutissimis reniformibus, stipulis lanceolatis longè acuminatis margine fimbriatis glabris fimbriis glanduliferis diametro transverso stipulæ vix brevioribus, sepalis oblongo-linearibus obtusis, calcare obtuso sepalorum basin excedenti, pedunculis petiolo longioribus ad medium bibracteolatis fructiferis prostratis, floribus violaceis, petalis imberbibus, stigmate uncinato.

Hab. in montibus *Lassiti* Cretæ alt. 5000' (Heldreich).

Plantula hipollicaris, folia circiter 6 lin. longa lataque, flores dimidiò minores eis *V. odorata* a quâ ut et ab affinibus differt minutie omnium partium, stolonum gracilitate, indumento rariori pilis majoribus nitidis constanti, foliorum crenis obtusissimis, petalis ebarbatis.

VIOLA THESSALA Boiss. et Spr. (Sect. *Odorata*.)

V. acaulis, stolonibus elongatis, foliis utrinquè pilis albis nitidis adpressè tomentellis ovatis basi profundè cordatis apice acutis vel attenuato-acuminatis circumcircâ multicrenatis crenis ascendentibus acutiusculis, foliis stolonum reniformi-triangularibus acutis, pedunculis petiolo longioribus infra medium longè bibracteatis fructiferis prostratis, stipulis lanceolatis longè acuminatis fimbriatis fimbriis hispidulis diametro transverso stipulæ longioribus glanduliferis, sepalis oblongo-linearibus acutiusculis basi margine ciliatulis, floribus violaceis, petalis lateralibus barbatis inferiori emarginato, calcare obtuso sepalorum basin excedenti, stigmate uncinato.

Hab. in monte *Ætâ* Thessaliæ (Spruner).

Habitus et flores *V. odoratæ* a quâ eximiè differt foliis tomentello-puberulis eximiè acutis apice subattenuatis, stipulis tomentellis longè fimbriatis. *V. Dehnhartii* Ten. differt glabritie, *V. alba* Besser quæ folia quoque acuminata habet differt eorum crenis obtusis, floribus albis, stolonibus cum plantâ ipsâ florentibus, stipulis breviter fimbriatis.

VIOLA LIBANOTICA Boiss. (Sect. *Odoratæ*.)

V. rhizomate indurato sublignoso ramoso caudiculos numerosos abbreviatos apice foliosos cæspitemque formantes edenti, foliis longè petiolatis ovatis acutis acutiusculè et grossè denticulatis basi breviter cuneatis rariùs subcordatis pilis albis brevibus margine præsertim hirtulis, stipulis oblongis vel lanceolatis acuminatis glabris margine glandulis sessilibus conspersis, pedunculis folia æquantibus infra medium bibracteolatis, sepalis glabris oblongis acutiusculis angustè albo-marginatis, calcare obtuso calycem breviter excedenti, petalis pallidè violaceis exterioribus parçè ciliatis inferiori apice rotundato, stigmate uncinato, pedicello fructifero erecto apice nutanti, capsulâ globosâ tomentosâ.

Hab. in *Libano* suprâ Cedros, legi Julio 1846.

A. *V. hirtâ* et *ambiguâ* quibus affinis eximiè differt rhizomate lignoso multicipiti, foliis basi cuneatis grossè et acutè dentatis, stipulis non fimbriatis, pedunculis fructiferis non prostratis, etc.

VIOLA PAPILLARIS Bois. et Hohen. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846- (Sect. *Komimum*.)

V. tota pilis albis brevissimis tomentello-cinerea basi suffruticulosa caudiculis basi foliis vetustis obsitis apice foliosis cæspitosis, foliis oblongis integerrimis obtusis vel acutiusculis in petiolum longè attenuatis, stipulis papillari-tomentellis inferioribus triangularibus, superioribus linearibus integris vel lacinulâ setaceâ auctis, pedicellis tenuibus folia superantibus retrorsum densè hispidulis infra medium bibracteolatis, stipulis a basi rotundatâ hispidulâ oblongo-lanceolatis acutis superne glabris, petalis violaceis extus glabris intus et margine densè et minutè albo-papillosis, calcare obtuso calycem valdè excedenti,

stigmatè breviter uncinato, capsulà pedicello erecto flexuoso suffultà glabrà.

Hab. in saxosis propè *Meidan Abdallah* vallis *Loura* montis *Elbrus* Kotschy N° 536.

Habitus in flores *V. cinereæ* et *pachyrrhizæ*, ab eis stigmatìs formà, petalis intùs papillosis etc. distincta.

VIOLA CALYCINA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Melanium*.)

V. perennis viridis sub lente brevissimè hirtella, caudiculis brevibus prostratis nudis cæspitosis, caulibus brevissimis foliosis, foliis parvis ovatis vel rotundatis reniformibusque basi rotundatis truncatis vel breviter cuneatis obtusissimè et sæpè obsoletè crenulatis petiolo eis plerumque longiori suffultis, stipulis digitatim 5-8 partitis laciniis lateralibus linearibus medià petiolulatà oblongà folium referenti sed minori, pedunculis longissimis rectis alternè et minutissimè bibracteolatis, sepalis latè oblongo-linearibus acutiusculis glabris margine parcè ciliatulis appendice basilari obsoletè erosà, petalis flavis calyce sesquolongioribus intùs sub lente brevissimè pruinoso-papillaribus lateralibus basi breviter albo-barbatis, calcare appendicibus calycis duplò longiori.

Hab. in regione superiori montis *Davrosdagh Pisidiæ* alt. 5500' (Heldreich).

Folia majora 5-6 lin. longa, pedunculi 2 1/2-3 pollicares, flores eis *V. arvensis* paulò majores. Species inter *Melania* perennia calyce magno corollà non multò breviori distinctissima.

VIOLA HELDREICHIANA Boiss. (Sect. *Melanium*.)

V. annua subacaulis ad petiolos caules et foliorum margines breviter papillosa cæterùm glabra, foliis inferioribus ovato-rotundis superioribus oblongis omnibus basi brevissimè in petiolum attenuatis subintegrìs, stipulis linearibus integrìs basi petioli adnatis eoque brevioribus rariùs basi externà denticulo auctis, pedunculis folia superantibus supernè 2 bracteolis setaceis vix perspicuis obsitis, sepalis glabris semilanceolatis subincurvis acutis basi breviter appendiculatis, floribus parvis, petalis pallidè cæruleis calyce sesquolongioribus laterali-

bus parcè barbatis, calcare obtusissimo appendices calycis parùm excedenti.

Hab. in lapidosis inter frutices propè pagum *Karabahir* ad radices montis *Climacis Lyciæ* (Heldreich).

Affinis *V. parvula* Tin. et *V. ebracteolata* Fenzl, prior differt indumento densè hispidulo, sepalis latis valdè ciliatis longius appendiculatis, corollà calyce breviori, posterior pedicellis ebracteolatis, appendicibus calycis calcar superantibus etc.

RESEDACEÆ.

RESEDA EREMOPHILA Boiss. (Sect. *Eureseda*).

R. annua glabra caulibus erectis pumilis basi ramosis ramisque acutè striato-angulatis, foliis ambitu oblongo-lanceolatis pinnatisectis laciniis parvis linearibus acutis mucronulatis costæ angulo recto insidentibus et secùs eam angustè decurrentibus foliorum inferiorum aliquandò abbreviatis oblongis caulinorum angustè linearibus omnibus margine sub lente papillari-denticulatis, racemis tandem longissimis tenuibus infernè laxiusculis, pedicellis brevissimis bracteolà lineari-setaceà membranaceo-marginatà calycem subæquanti suffultis, sepalis quinque linearibus angustè membranaceis, petalis quinque albis glabris calyce subduplò longioribus oblongo-cuneatis ad medium ferè usquè tridentatis lacinià intermedià breviori angustiori lateralibus latere exteriori subincurvis eis petali superioris sæpè breviter trilobis, disco ferè obsoleto, ovario vesiculoso-papilloso, stigmatibus quatuor, capsulà oblongo-elongatà acutè tetragonà albo-vesiculosà apice truncatà breviter quadridentatà, seminibus reniformibus nigris eximè tuberculatis.

Hab. in arenà tenui deserti Ægyptiaci propè *Kahiram* et Arabici usquè ad fines *Palestinæ*.

Planta florifera 2-5 pollicaris fructifera 6-10 pollicaris, foliorum lacinia eis *R. albæ* tenuiores brevioresque, flores eis *R. albæ* ferè dimidiò minores, racemi fructiferi semipedales, capsula 3 lin. longa. Pulchra species affinis *R. albæ* quæ longè differt floribus pedicello eis æquilongò suffultis spicas triplò crassiores per anthesin pyramidatas nec cylindricas formantibus, petalorum duplò majorum laciniis æqualibus, ovario non vesiculoso, etc. *R. stenostachya* differt sepalis pe-

talisque senis his ad medium strangulatis laciniis spathulatis, stigmatibus ternis, etc.

RESEDA ALOPECUROS Boiss. (Sect. *Eureseda*.)

R. annua tota papillis elongatis albis hirsuta, caulibus teretibus ascendentibus validis basi ramosissimis, foliis primordialibus integris lanceolatis obtusis cæteris ambitu oblongis vel ovato-rotundatis pinnatisectim vel subpalmatis 3-7 sectis laciniis foliorum inferiorum oblongo-lanceolatis latis superiorum angustè linearibus omnibus latere exteriori secùs costam decurrentibus, racemis cylindricis densis post anthesin longissimis, pedicello floribus sesquiloniori capsulam æquantibus, floribus inodoris, calycis scabri laciniis senis linearibus corollam æquantibus, petalis senis ochroleucis superioribus ovatis cucullatis eximie ciliatis dorso extus multifidis inferioribus a basi ovato-rotundà ciliatà 4-3 laciniis edentibus, disco papillis albis hirsutissimo, filamentis papillois, stigmatibus tribus, capsulà maximà subnutanti ovatà ventricosà campaniformi tenui ad costas parè papillari basi breviter attenuatà apice truncato-tridentatà, seminibus maximis curvato-reniformibus transversè ruguloso-tuberculatis griseis nitidis.

Hab. in *Palæstinà* propè *Gaza*, *Ramla*, *Naplouse*. Legi Aprili 1846.

Caulis 1-2 pedales, racemi fructiferi pedales longioresque basi capsulas maturas supernè flores alabastraque ferentes. Capsula diametro 6-7 lin. lata, semina lineæ 4 1/4 longa. Species propè *R. phyteumam* et *odoratam* collocanda ab omnibus generis caulibus crassis elatis, petalis ochroleucis, capsulis maximis distincta.

In Diagn. I pag. 6. lin. 30 loco *R. Mediterraneæ* lege *R. inodora* Rchb. *R. Mediterranea* vera L. et Lindl. Coll. bot. tab. 22 est planta omninò diversa et *R. Mediterranea* Jacq. Ic. rar. tab. 475 ab utrâque quoque differt.

CARIOPHYLLEÆ.

GYPSOPHILA OLYMPICA Boiss. (Sect. *Struthium*.)

G. perennis glabra lutescenti-virens, caudicibus abbreviatis suffruticosis lignosis ramosis intricatissimis surculos steriles brevissimos in

cæspitem congestos caulesque tenues humiles simplicissimos apice capitatos edentibus, foliis carnosis subulato-triuetris acutiusculis subtus margine scabridulis basi breviter connatis subpatulo-incurvis, capitulis magnitudine pisi densis bracteatis, bracteis ovatis oblongisve calyces æquantibus utrinquè latè albo-marginatis dorso lato viridi enervi excurrenti acuminatis, calyce parvo obconico papillari-hirtulo infernè viridi enervi ad medium usquè in dentes nigricantes oblongos albo-marginatos nervo excurrente breviter setaceo-mucronatos fisso, petalis.....

Hab. in regione superiori *Olympi Bithyni* meridiem versùs ad rupes calcareas ubi Augusto ineunte 4842 nondùm floriferum legi.

Planta ut *Plantago serpentina* in cæspites lignosos crescens, folia 5-6 lin. longa lineam dimidiam lata erecta adpressa carnosà, scapi 4-5 pollicares folia pauca internodio multò breviora ferentes, calyx florifer vix 2 lin. longus. Species distincta e specimine imperfecto descripta propè *G. glomeratam* et *sphærocephalam* collocanda.

GYPSOPHILA PILULIFERA Boiss. et Heldr. in pl. Anatol. exs. 4846. (Sec. *Struthium*.)

G. perennis glabra, caulibus suffruticosis nudis erectiusculis abbreviatis cortice albidà vestitis surculos steriles breves apice foliosos caulesque longos tenues virgatos supernè parcè et dichotomè ramosos edentibus, foliis carnosis subulato-teretibus obtusiusculis strictis vel incurvo-subpatulis, caulinis internodio brevioribus sensim abbreviatis facilè deciduis, ramis rigidis filiformibus, floribus in capitulos pisiformes globosos densissimos basi et inter flores bracteis squamæformibus ovatis scariosis obtusis minutissimis obsitos ad ramorum apicem solitarios aggregatis minutis, calyce breviter obconico enervi albo-virescenti toto punctis calcareis tuberculato ad tertiam partem usquè in dentes ovatos latè albo-marginatos obtusissimos fisso, petalis cuneato-linearibus albis calyce longioribus, staminibus longè exsertis, capsulà globosà minutissimà calyci æquilongà, seminibus binis reniformibus eximè et regulariter tuberculatis.

Hab. in pineto aprico maritimo 2 leucis ab urbe *Adalià Pamphylicæ* orientem versùs distanti Julio (Heldreich.)

Planta 4-2 pedalis, folia 6-8 lin. longa lineæ $3\frac{1}{4}$ lata, capituli pedunculo pollicari vel longiori rigido tenuissimo suffulti, calyx lineæ $3\frac{1}{4}$ longus. Species insignis prope *G. glomeratam* et præsertim *G. sphæro-*

cephalam Fenzl. collocanda quæ posterior habitu et capitulorum magnitudine nostræ similis differt foliis 2 poll. longis, capitulis secus ramos subsessilibus, bracteis subcarinatis triangulari-ovatis acutis calyces æquantibus.

GYPHOPHILA DAMASCENA Boiss. (Sect. *Struthium*.)

G. glabra glaucescens basi suffrutescens surculos brevissimos parcè foliosos edens, caulibus elatis virgatis parcissimè foliosis teretibus infernè ad nodos incrassatis supernè dichotomè effuso-paniculatis, foliis minutis sessilibus oblongo-ellipticis acutis basi subangustatis carnosulis margine scabriusculis, bracteis minutissimis triangulari-lanceolatis scariosis, pedicellis capillaribus calyce 4-5 plò longioribus, floribus minimis, calyce breviter conico-campanulato 5 fasciis viridibus percurso inter eas albo-membranaceo albo-pustulato ultrà tertiam partem in 5 lobos ovatos latè albo-marginatos obtusissimos fisso, petalis albis lineari-cuneatis calyce duplò longioribus, capsulà....

Hab. in collibus aridis suprà *Damascum* ubi legi Maio 1846.

Planta pedalis, folia crassa rigidula 4-6 lin. longa 1 1/2 lata, flores e minutissimis generis. Omnibus notis *G. Aucheri* et *virgatæ* affinis et ab eis foliis brevioribus, paniculà glaberrimà et præsertim calycis lobis obtusissimis nec acutis vel mucronulatis discedens; flores illis *G. Libanotice* et *curvifoliæ* dimidiò minores.

GYPHOPHILA ANATOLICA Boiss. et Heldr. (Sect. *Struthium*.)

G. perennis caulibus basi induratis nudiusculis prostratis dein ascendentibus parte inferiori densiusculè foliosis tomentellis, supernè glaberrimis effusè paniculatis subaphyllis, foliis glaucescentibus brevissimè pubescentibus oblongo-lanceolatis acutiusculis basi attenuatis breviter connatis obsoletè trinerviis carnosulis, bracteis minimis triangulari-lanceolatis scariosis, pedicellis rigidulis inferioribus calyce subtriplò longioribus cæteris brevioribus, floribus minimis, calyce breviter campanulato enervi infernè albido-virescenti dentibus tubo subæquilongis oblongis obtusissimis nigricantibus albo-marginatis, petalis roseis lato-linearibus calyce duplò longioribus, capsulà...

Hab. in aridis planitie *Koniah* ad *Souliman-hatsi* propè radices montis *Karadagh* Junii fine vix florifera (Heldreich), in *Cappadocia* ad *Euphratem* Aucher N° 545.

G. perfoliata var. Boiss. in pl. Heldr. Anat. exs.

Caulis pedalis ad nodos subincrassatus flexuoso-geniculatus, folia majora pollicem longa 4-6 lin. lata, flores magnitudinis *G. paniculatae* a quâ differt foliis brevibus latis non acuminatis aliisque notis. *A. G. perfoliata* cujus specimina Hispanica comparavi, floribus minoribus, pedunculis abbreviatis, calycis lobis brevioribus, corollis calyci non subæquilongis longè discedit. Magis affinis *G. trichotomæ* Wend. quæ quoque differt foliis majoribus plurinerviis, pedunculis longissimis, floribus majoribus.

GYPSOPHILA NEBULOSA Boiss. et Heldreich. (Sect. *Struthium*.)

G. perennis glaberrima caulibus tenuibus erectis teretibus aliis sterilibus parçè ramosis remotiusculè foliosis aliis floriferis paulò suprà basin dichotomè et divaricatim ramosissimis paniculam effusissimam formantibus ad dichotomias inferiores tantum foliosis, foliis sessilibus tenuibus viridibus oblongis vel oblongo-linearibus obtusiusculis angustissimè albo-marginatis trinerviis, pedicellis setaceis calyce 3-6plò longioribus, floribus minutis, calyce subrotundo-campanulato parçè albopustulato inter 5 fascias virides albomembranaceo ultrà medium in dentes oblongos obtusissimos albomarginatos fisso, petalis albis lineari-oblongis calyce duplò longioribus, capsulâ globosâ calyce longiori, seminibus reniformibus tuberculatis.

G. paniculata var. *obtusifolia* in Heldr. pl. Anat. exs. 1846.

Hab. in vineis propè *Beychehr* Isauriæ (Heldreich).

Hæc species a nobis olim *G. paniculatae* adnumerata ab eâ differt foliis obtusiusculis brevioribus et inprimis pedicellis calyce 5-6 nec 2-3plò longioribus paniculam multò magis effusam formantibus; calyces magnitudine specimina Austriaca *G. paniculatae* æquant sed petala multò magis elongata sunt atque exserta. *G. trichotoma* quæ quoque pedicellis longis gaudet differt foliis multò amplioribus plurinerviis, pedicellis crassioribus etc.

GYPSOPHILA FRANKENIODES Boiss. Diagn. var. *fasciculata* Boiss. et Heldr. — Folia secus ramulos magis adpressa paulò breviora latioraque obtusiora, flores ad ramorum apicem congesti subfasciculati, petala intensius purpurea.

Gypsophila atropurpurea Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.

Hab. in pascuis siccis montis *Stavros* propè *Isparta* Pisidiæ. (Heldreich.)

Priùs pro novà specie habueramus sed notæ differentiales nunc mihi non satis graves esse videntur.

GYP SOPHILA SERPYLLOIDES Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846! (Sect. *Heterochroa*.)

G. perennis glaberrima cæspitosa, caulibus filiformibus foliosis prostratis subtùs radicantibus sæpè surchiliformiter elongatis, foliis parvis carnosulis enerviis obtusiusculis oblongo vel lineari-subspathulatis infernè attenuatis, axillis fasciculiferis, floribus in ramorum brevium parte superiori axillaribus et ad eorum apicem sæpiùs ternis racemos paucifloros brevissimos formantibus pedicello tenui calyci æquilongo suffultis, calyce conico-campanulato virescenti glabro 5 costato ad tertiam partem usquè in dentes triangulares acutos ciliatulos fisso, petalis lineari-cuneatis roseis obtusis calyce duplò longioribus, capsulà...

Hab. in pascuis siccis *Tauri Isaurici* in monte *Gheidagh* suprà *Alaya* alt. 6000-7000' (Heldreich).

Planta more *Thymi serpylli* radicans surculosaque, folia 2-3 lin. longa apice lineam lata, flores illis *G. repentis* paululùm minores.

In Diagn. I p. 15 pro *Heterochroa glandulosà* Boiss. pone *Gypsophila glandulosa* Boiss., cùm genus *Heterochroa* formis intermediis in *Gypsophilam* manifestè transeat.

ANKYROPETALUM CÆLESTYRIACUM Boiss.

A. perenne glaberrimum, caulibus subaphyllis teretibus a basi patentim et dichotomè ramosissimis ad nodos inferiores incrassatis ramisque rigidis divaricatis ramulosis intricatis fragillimis, foliis ad partem infimam caulium linearibus obtusis basi attenuatis carnosis plano-subconvexis enerviis, superioribus brevissimè et angustè lineari-subulatis teretiusculis omnibus post anthesin deciduis, floribus in dichotomiis supremis et ad ramulorum apicem solitariis pedicello setaceo ramulo triplò tenuiori calyce 1 1/2-2 plò longiori suffultis, calyce florifero cylindrico pube brevi glanduliferà obsito quinque vittis latiusculis viridibus rubellisque percurso inter eas hyalino dentibus breviter ovatis obtusis albo-marginatis, petalorum ungue lineari-cuneato e calyce exserto in laminam purpuream tripartitam abeunti, laciniis latera-

libus linearibus, intermedià vix longiori lineari apice cuneatà in appendicem obtriangularem transversè latiore truncato-retusam horizontaliter breviterque bimucronatam dilatatà, ovario 8-9 ovulato, calyce fructifero breviter ovato demùm ruptili, capsulà ovatà demùm basi in 4 valvulas secedenti basi incompletè biloculari, seminibus ternis nigris reniformi-subrotundis vix compressis eximè seriatim rugulosis.

Hab. in incultis *Cælesyriæ* inter *Balbeck* et *Zachle* et inter *Rascheya* et *Deir el Khamar* Julio florifera. (Boiss.)

Facie et characteribus affine *A. gypsophiloidi* quod differt foliis lineari-subtriquetris, calyce florifero breviori 2 nec 3 lin. longo obscure vittato, petali albi laminà intermedià acutius bicuspidatà basi utrinquè lacinulà lineari auctà, calyce fructifero ellipsoideo.

TUNICA GRAMINEA Boiss.

T. perennis caulibus numerosis tenuissimis sub lente brevissimè hirtulis ascendentibus parè ramulosis strictis apice dichotomè paniculatis paucifloris, foliis setaceo-triquetris supernè sulcatis margine scabridis subincurvis superioribus abbreviatis axillis inferioribus fasciculos foliorum edentibus, floribus solitariis, pedicellis tenuibus viscido-hispidulis calyce 4-3plò longioribus, calyce basi nudo breviter campanulato hispidulo enervi inter quinque vittas latas virides albo-membranaceo dentibus rotundatis obtusis albo-marginatis, petalis calyce duplò longioribus, ungue nudo in laminam obcordatam dilatato, capsulà calyci æquilongà, seminibus latere exteriori planis interiori carinatis umbilico centrali donatis obovatis obtusis extremitate attenuatis acutis acutè alatis.

Gypsophila graminea Fl. Græc. Prodr. I p. 279.

In lapidosis secùs vias propè *Calamata* Messeniæ. (Gittard in herb. Fauché.)

Habitus et florum magnitudo *T. saxifragæ* et *T. compressæ* F. et M. A priori calyce non bracteato, seminibus carinatis quidem sed marginatis etc. diversa, posterior differt caulibus supernè compressis, foliis planis latioribus, floribus aggregatis, calyce nervoso, seminibus utrinquè planis etc.

In Heldr. pl. Tayget exs. loco *T. Creticæ* lege *T. Illyrica* F. et M. var. Est forma e loco umbroso excelso orta minùs rigida caulibus tenuioribus incurvis, calyce paululùm breviori.

TUNICA SIBTHORPII Boiss.

T. perennis tota sub lente pilis minutissimis glanduliferis obsita multicaulis, caulibus erectis rigidis infernè simplicibus foliosis supernè angulosis alternè et breviter ramosis paniculam confertam sæpè subfastigiatam formantibus, foliis angustè linearibus acutis strictis trinerviis margine scabridis, pedicellis calyce brevioribus, calyce basi nudo oblongo-obconico glanduloso-hirsuto inter 5 fascias virides trinervias albo-membranaceo nervis tribus apice in unum coalitis dentibus ovatis acutis albomarginatis nervo excurrente breviter mucronulatis, petalorum unguibus in laminas albas angustè obovatas attenuatis, seminibus (ex Sibth.) oblongis planis.

Hab. ad radices *Taygeti* (Bory et Chaubard), ad montem *Delphi Eubææ* (Aucher), propè *Lebadeam* Bæotiæ (Spruner), in *Troade* (Olivier in DC. herb.), in collibus insulæ *Amorgi* (Sibth.).

Gypsophila Illyrica Fl. Græca non L.—*G. armerioides* Ser. in DC. Prodr.

Affinis *Tun. Illyricæ*. — *G. Illyricæ* L. quæ in Italiâ, Dalmatiâ et quoque in Græciâ crescit, ab eâ ut et a *T. ochroleucâ* calycis vittis 3 nec uninerviis statim dignoscitur; caulis insuper est rigidior, panicula nunquam laxa et sæpè divaricata sed brevis conferta fastigiata.

TUNICA OLYMPICA Boiss.

T. annua vel biennis glabra, caulibus teretibus erectis infernè ad nodos incrassatis ferè a basi ramosis ramis filiformibus erecto-patulis pluries dichotomis paniculam elongatam sparsifloram subeffusam formantibus, foliis radicalibus rosulatis expansis lato-linearibus abbreviatis acutiusculis subtùs trinerviis nervo medio validiori, caulinis strictis angustis acutis intermedio brevioribus omnibus margine scabridis, pedicellis capillaribus rigidis calyce 2-4 plò longioribus, calyce basi nudo glaberrimo obconico inter 5 nervos virides membranaceo, dentibus triangularibus acutis albo-marginatis, petalorum ungue nudo in laminam oblongo-linearem exsertam obtusam dilatato, capsulâ calyce longiori, seminibus minimis obovatis planis exalatis latere interiori concaviusculis carinatis exteriori convexulis.

T. stricta Boiss. pl. Anat. exs 1842 non F. et M.

Hab. in umbrosis montis *Tmoli* Lydæ ad *Bozdagh*, in sylvis abietinis regionis superioris *Olympi Bithyni*. Legi Jun. et Jul. 1842.

Hucusquē a me ipso cum simillimā *T. strictā* confusa quæ egregiē differt ramulis strictissimis paniculam valdē contractam formantibus, pedicellis crassioribus calyce 1-2 plò tantum longioribus, seminibus duplò majoribus oblongis acutioribus. Hæc *T. stricta* crescit in monte *Tauro* Kotschy n° 62, monte *Demawend* Persiæ bor. (Kotschy), montibus *Tarbagatai* Songariæ Kar. et Kir.

TUNICA ARABICA Boiss.

T. annua tota glanduloso-pubescens, caule pumilo a basi dichotomē et subdivaricatum paniculato-ramoso, foliis margine scabris cœterum glabris radicalibus oblongo-linearibus basi attenuatis obtusiusculis sub-
tùs obsoletè trinerviis, caulinis angustè linearibus brevissimis strictis acutiusculis, pedicellis crassiusculis rigidis calyce sesquolongioribus, calyce obconico parcè glanduloso-puberulo 15 nervi nervis elevatis in 5 fascias virides membranā albā sejunctas ternatim approximatis apice in unam confluentibus, dentibus triangularibus acutis membranā albā usquē ad apicem productā marginatis, petalorum unguibus in laminas albas lineares calyce inclusas subangustatis, capsulā æquilongā, seminibus planis concaviusculis nigris epunctatis alā e semine non distinctā cinctis apice emarginato bilobis umbilico suprā centrum sito.

Hab. in desertis *Arabiae petreae* Palæstinam versùs (Boiss.).

Planta 3-4 pollicaris, folia 3-4 lin. longa inferiora sesquilineam lata, calyx 3 lin. longus. Habitu et calycis formā valdē affinis *T. brachypetalæ* Jaub. et Sp. et *T. pachygonæ* F. et M. quæ tamen a nostrā faciliè distinguuntur foliis caulinis lineari-setaceis longè acuminatis 5-7 lineas longis, vittis trinerviis calycis magis prominulis intervallo latiori separatis, dentibus calycis glaberrimi in mucronem longum apice setaceum abeuntibus, seminibus subpellucidis et idè distinctè alatis.

TUNICA HISPIDULA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.

T. annua tota glanduloso-hispidula, caulibus tenuibus a basi dichotomē et divaricatum ramosissimis ramisque flexuosis paniculam effusam formantibus, foliis omnibus trinerviis glabriusculis margine lævibus angustè lineari-setaceis erecto-patulis superioribus brevissimis, pedunculis tenuibus calyce 2-4 plò longioribus, calyce angustè obconico glanduloso-puberulo elevatim 15 nervi nervis infernè æquidistantibus

apice tantum ternatim approximatis intervallis membranaceis, dentibus ovatis latè albo-membranaceis nervo excurrente breviter setaceo-mucronatis, petalis angustè linearibus calyce vix longioribus laminà pallidè ochroleucà bipartitâ laciniis brevibus ultrà medium acutè bifidis, capsulâ calyci subæquilongâ, seminibus planis nigricantibus epunctatis alatis apice emarginato-bilobis umbilico suprâ centrum sito.

Hab. in declivibus calidioribus *Tauri* Pamphylici in regione inferiori inter *Marla* et *Adalia*. Fl. Julio (Heldreich).

Planta 8-12 pollicaris, calyx vix 3 lin. longus, ex affinitate præcedentis et *T. pachygonæ*, ab eis egregiè distincta caulibus ramisque non rigidis sed flexuosis tenuioribus effusè paniculatis, calyce angustiori paulò minori, petalis quadridentatis nec integris obtusis.

TUNICA SYRIACA Boiss.

T. glaberrima nigrescenti-viridis perennis basi suffrutescens multicaulis, caulibus filiformibus rectis vel ascendentibus ad nodos superiores sæpè geniculatis simplicibus unifloris rariùs ramulo auctis nigricantibus asperulis, foliis parvis angustè lineari-triquetris crassiusculis obtusiusculis suprâ sulcatis subtùs carinatis margine scabridis strictis internodio 3-4 plò brevioribus basi breviter connatis, bracteis 8-10 calyci subæquilongis lanceolatis acutissimis subpungentibus præter nervum rubrum crassum angustè albo-membranaceis, calyce oblongo campanulato brevissimè puberulo tubo enervi albido dentibus tubo triplò brevioribus oblongis nigricantibus albo-marginatis, petalis angustè linearibus obtusis ungue nudo laminà pallidè roseà breviter exsertâ, capsulâ...

Hab. in rupibus *Syriæ* borealis ponè urbem *Antiochiam* sitis ubi specimina pauca Junio 1846 legi.

Caulis tenuissimi 6-8 pollicares, folia 3-5 lin. longa, calyx cum bracteis 4 lin. longus. Species distinctissima propè *T. dianthoidem* collocanda.

TUNICA THESSALA Boiss.

T. perennis glabra basi suffrutescens multicaulis, caulibus viridibus asperulis tenuibus strictis simplicibus junceis supernè angulatis apice capitulum bracteatum conicum 3-4 florum ferentibus, foliis sub anthesi jam exsiccatis angustè linearibus apice attenuatis uninerviis margine

læyibus internodio 3-4 plò brevioribus, bracteis calycem æquantibus ovatis dorso stramineis subcarinatis uninerviis margine latè albo-membranceis obtusis nervo excurrenti sæpè mucronulatis, calyce obconico glaberrimo præter 5 nervos validos infernè virescentes supernè nigricantes omninò albo-membranceo ad medium usquè in dentes oblongo-lineares obtusos muticos latè albo-membranceos diviso, petalis...

Hab. in *Thessaliâ* Aucher N° 537.

Caules ferè pedales ob folia citò decidua aphylla juncea, bracteæ 3 1/2-4 lin. longæ 2 latæ, calyx 3 lin. longus intrà bracteas pedicellatus, petala non vidi. Affinis *T. dianthoidi* a quâ differt bracteis ovatis obtusis nec lanceolatis acutis, calycis ad medium usquè nec breviter dentati dentibus linearibus obtusis muticis nec triangularibus acutis.

DIANTHUS VISCIDUS B. et Chaub. var. *Tymphrestea* Boiss. et Sprun. — Caules tantum 2-3 pollicares, petala facie superiori glabra nec papillosa suprâ basin limbi maculâ transversâ intensè purpureâ picta.

Hab. in monte *Velugo* (Tymphresto) *Ætoliæ* (Spruner).

D. viscido ut synonymon adnumerandus *D. Olympicus* Boiss. Diagn. I quem non differre comperi. Hæc pulchra stirps in omnibus montibus excelsioribus Græciæ crescit, monte *Delphi* Eubœæ (Aucher). *Tymphresto*, *Olympo Thessalo*, montibus *Macedoniæ* (Grisebach) *Taygeto* (Heldreich).

Pro *D. macrolepidi* Boiss. Diagn. I p. 18 pone *D. Cyri* F. et M. speciem mihi tunc ignotam cum specimina Aucheriana describebam.

D. macrolepis Fenzl. in Kotsch. pl. Pers. austr. N° 689 non Boiss. est *D. stenocephalus* Boiss. Diagn.

DIANTHUS HYMENOLEPIS Boiss. (Sect. *Armeriastrum*.)

D. infernè brevissimè puberulus supernè glaber basi suffrutescens, surculis sterilibus abbreviatissimis, caulibus erectis simplicissimis tenuibus obsolete quadrangulis apice capitatis, foliis subquinqvenerviis angustè linearibus surculorum angustioribus abbreviatis, caulinis erectis margine remotè scabriusculis internodio brevioribus acutis, vaginâ folii latitudine 2-3 plò longiori, capitulo denso 2-4 floro basi cuneato-attenuato bracteis oblongis in cuspidem squamas æquantem attenuatis suffulto, squamis calycinis quaternis albis enerviis a basi angustiori sursum dilatatis cuneato-obovatis apice membranâ latâ intensè

purpureâ plicatulâ subdenticulatâ obtusissimâ truncatâ subretusâ marginatis dorso supernè striatulo in aristam plùs minùs elongatam producto, calyce squamis vix terciâ parte longiori oblongo striato viridi dentibus rubris rotundis brevibus obtusissimis margine ciliolatis, petalorum laminis roseis parvis cuneatis acutè et profundiusculè denticulatis supernè papillari-punctulatis.

Hab. in *Mesopotamiâ* loco non indicato Kotschy pl. Assy. N° 164.

Caules 9-40 pollic., folia surculorum pollicem, caulis 1 $\frac{1}{2}$ poll. longa lineam lata. Flores magnitudine inter *D. polymorphum* MB. et *D. diutinum* W. K. medii. Dentibus calycis obtusissimis *D. polymorpho* accedit qui longè differt floribus majoribus, squamis ovatis tubo calycis triplò brevioribus muticis concoloribus supernè obsoletè marginatis.

DIANTHUS MULTIPUNCTATUS Ser. Prodr.

D. lineolatus Delile.

Species per totam Anatoliam meridiionalem et præsertim Syriam et Palestinam vulgatissima et cujus varietates sequentes nondùm cognitæ legi.

Var. β . *velutina*. — Caules foliaque indumento brevi denso canescentia.

Hab. in declivibus inter *Jerusalem* et *Jericho* et alibi in Syriâ. (Boiss.)

Var. γ . *micrantha*. — Velutina, caules decumbentes 4-5 poll. pauciflori, calyx 5 lin. tantùm longus.

Hab. propè *Cedros Libani* (Boiss.)

DIANTHUS POLYCLADUS Boiss. (Sect. *Caryophyllum*).

D. biennis vel perennis viridis a collo multicaulis, caulibus glabris vel infernè tomentellis crassiusculis subangulatis elatis virgatis strictis a medio in ramos tenuissimos strictos squamosos elongatos apice uniflores dichotomè ramosissimis, surculis nullis, foliis caulinis inferioribus sub anthesi jam exsiccatis cæteris angustè linearibus strictis subflexuosis trinerviis ciliatulo-scabridis internodia æquantibus, vaginâ folii latitudine breviori, nodis tumidulis albidis, foliis ramorum subulatis adpressis brevissimis squamæformibus, summis flori contiguus, floribus parvis, squamis calycinis quaternis ovatis stramineis subenerviis membranaceo-marginatis obtusiusculis in mucronem brevem

subulatum adpressissimum dorso productis, calyce stramineo oblongo-cylindrico bracteis subtriplo longiori in dentes lanceolatos acutos membranâ basi latiusculâ supernè sensim evanescenti marginatos fissis, tubo sub lente punctulato tenuiter viridi-striato striis ad basin tubi intervallis enerviis e dentium dorso decurrentibus sejunctis, petalis pallidè carneis laminâ lanceolatâ acutâ glabrâ demùm lineari-convolutâ calyce paulò breviori.

Hab. in montibus aridis et humilioribus Syriæ inter *Darkousch* ad *Orontem* et *planitiem Aleppensem*. Legi Jun. 1846.

Caulis 2-3 pedales, rami tenuissimi, calyces circ. 5 lin. longi medium versus 4 $\frac{1}{4}$ lin. lati. Floribus minutis ad *D. Anatolicum* vel *D. ramosissimum* Poir. accedit sed radicis indole et calycis nervatione naturalius propè *D. multipunctatum* Ser. et *D. striatellum* Fenzl collocandus est qui recedunt floribus triplo majoribus, petalis dentatis etc.

DIANTHUS JUDAICUS Boiss. (Sect. *Caryophyllum*).

D. perennis totus breviter et adpressè griseo-tomentosus, cæspitoso-multicaulis, foliis lanceolato-linearibus acutiusculis albo-marginatis facie superiori eximè canaliculato-plicatis inferiori carinatis patulo-recurvis, radicalibus brevissimis, caulinis internodia æquantibus, vaginâ folii latitudine breviori, caulibus unifloris quadrangulis, floribus magnis ebracteatis, squamis calycinis quaternis glabris erecto-patulis a calyce subdivergentibus ovato-oblongis medio striatis margine lævibus stramineis in mucronem foliaceum acutiusculum eis breviorē erecto-patulū attenuatis, calyce squamis subtriplo longiori cylindrico supernè angustato tenuiter striato virescenti dentibus lanceolatis acutis ciliatulis vix membranaceo-marginatis, petalorum ungue longissimè in laminam flavidam integram oblongam glabram eo quadruplo breviorē ampliato.

Hab. in declivibus calidis Judææ inter *Jerusalem* et *Jericho* ubi exemplar unicum legi.

Planta semipedalis, folia radicalia semipollicaria caulina pollic. explicata 2 lin. lata eximè plicata recurvaque, squamæ divergentes, calyx 16-17 lin. longus. Species pulcherrima squamis divergentibus folisque recurvis *D. libanotidem* referens a quo foliis non pungentibus et imprimis petalis non fimbriatis longius tamen differt et appropinquanda *D. monadelpho* Vent. — *D. procumbenti* Pers. qui glaber

est, habet folia elongata angusta nec complicata recurva, caulem dichotomum, flores dimidiò minores, tubum calycinum proportione breviorum et qui forsàn a formis *D. bicoloris* non specificè differt.

DIANTHUS XYLORRIZUS Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1847 (Sect. *Caryophyllum*).

D. glaber, caudicibus crassis teretibus lignosis tortuosis procumbentibus surculos steriles paucifolios abbreviatos caulesque breves teretes basi densè foliosos simplicissimos unifloros edentibus, foliis pallidè virentibus flexuosis flaccidis lanceolato-linearibus margine scabris subtùs trinerviis nervis lateralibus marginantibus, caulinis internodio paulò brevioribus, vaginà folii latitudine breviori, nodis subincrassatis, flore e bracteis summis brevibus lineari-acuminatis plùs minùsve distanti, squamis calycinis quaternis albis enerviis latè ovatis obtusis brevissimè in mucronulum viridem obtusum attenuatis calyce quadruplò brevioribus, calyce latè cylindrico striato supernè subangustato dentibus lanceolatis acutiusculis glabris angustè albo-membranaceis, petalis utrinqùe concoloribus flavidis ovato-cuneatis brevissimè et obtusè denticulatis in unguem laminà triplò longiorem tubum calycis paulò excedentem sensim attenuatis.

Hab. in rupibus ad *Palæocastro* suprà *Kissamos* Cretæ (Heldreich).

Magnitudine florum, calycis et squamarum formà *D. sylvestrem* omninò referens, differt caudicibus elongatis nudis crassitie pennæ anserinæ, foliis brevioribus flaccidis lineam et ampliùs latis, eis surculorum radicalium 1½-4 poll. longis, petalis lividis obsolete denticulatis, laminà ungue multò breviori.

In pl. Anatol. exs. Heldr. et Pinard loco *D. actinopetali* Fenzl pone *D. elegans* Urv., species *D. actinopetalo* equidem affinis sed diversa foliis 3 nec 7 nerviis, squamis calycinis 4 nec 6-8, aliisque notis.

DIANTHUS HYPOCHLORUS Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Caryophyllum*.)

D. perennis viridis pumilus cæspitoso-multiceps, caulibus ascendentibus abbreviatis tenuibus supernè angulatis simplicibus vel parvisimè et breviter ramosis 1-3 floris scabris vel brevissimè papillari-velutinis, foliis brevibus angustè linearibus subtùs sulcato-trinerviis ad margines et sæpè etiam ad nervos scabridis, turionum radicalium

paucis abbreviatissimis rigidulis, caulinis internodio multò brevioribus, vaginà folii latitudinem subduplò superanti, squamis calycinis quaternis stramineis enerviis ovatis membranà albo-hyalinà latiusculà tenerà supernè latiusculè marginatis in mucronem tenuem adpressum brevem attenuatis, calycis tubo cylindrico striato squamas plùs duplò superanti apice in dentes triangulari-lanceolatos acutiusculos margine ciliatulos basi rubellos supernè albo-membranaceos fisso, petalorum laminà suprà pallidè roseà vel utrinquè flavidà oblongo-cuneatà acutè denticulatà basi intus pilosulà.

Hab. in pascuis siccis *Tauri Isaurici* inter valles *Tourtchalar* et *Ermenek* alt. 3000' et in regione alpinà montis *Anemas* alt. 7000' (forma minor) (Heldreich).

Caules semipedales, in formà alpinà 2-3 pollic., folia radicalia 1½ pollicem caulina rarò pollicem longa, flores ferè dimidiò minores eis *D. zonati* a quo præterea differt dentibus calycis non acutissimis, foliis non 7-9 nerviis; affinis quoque *D. viridescenti* Vis. qui distinguitur caule elato tereti ramoso, squamis dentibusque calycis longè subulato-acuminatis, petalorum laminà longà angustà.

DIANTHUS KOTSCHYANUS Boiss. et Heldr. (Sect. *Caryophyllum*.)

D. pallidè virens basi suffruticosus caudicibus nudis sæpè subelongatis laxè cæspitosis surculos brevissimos caulesque plùs minùs elongatos tenues virgatos simplices vel parcè ramosos edentibus, foliis omnibus abbreviatis angustè lineari-lanceolatis acutis subtùs 5-7 sulcato-nervosis margine et ad nervos sæpè ciliato-scabris, surculorum brevissimis rigidis subulato-triquetris erecto-patulis, caulinis internodio 3-5 plò brevioribus, floribus terminalibus solitariis vel 2-3 confertis et tunc subsessilibus parvis, squamis calycinis quaternis ovatis stramineis enerviis obtusis angustè albo-marginatis dorso in mucronem brevem obtusum excurrenti, calyce ovato viridi toto striato squamis duplò longiori apice angustato in dentes ovato-triangulares obtusiusculos latiusculè albo-marginatos ciliatulos fisso, petalorum calyce sesquiflongiorum laminà oblongà integerrimà glabrà albà vel pallidissimè carneà subtùs concolori in unguem sensim attenuatà.

Hab. in *Tauro Ciliciæ* Kotschy N° 86 sub *D. pallenti*, *Tauro Lycaonico* in monte *Karadagh* suprà *Larenda* et inter *Beychehr* et *Koniah*. (Heldreich.)

Planta 1½ vel 1 pedalis, folia 1½-4 pollicaria, calyces 5-6 lin. longi.

D. pallens cui amiciss. Fenzl hunc retulerat et qui forsàn floribus basi bracteatis a *D. cinnamomeo* Fl. Gr. — *D. bicolori* MB. non satis differt est species a nostrà meo sensu longè diversa foliis trinerviis multò latioribus longioribusque, floribus triplò majoribus, petalis dentatis. *D. Anatolicus* magis affinis et pro cuius formà *D. Kotschyianum* olim habueram nunc sat mihi distinctus videtur squamis senis nec quaternis, caule elatiori simpliciori, calyce magis elongato. *D. parviflorus* affinis quoque differt floribus dimidiò minoribus, bracteis subulato-acuminatis, dentibus calycis acutis, petalis vix exsertis.

DIANTHUS MICRANTHUS Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Caryophyllum*.)

D. glaber viridis basi suffruticulosus cæspitoso-multicaulis, caulibus strictis tenuibus rigidulis teretiusculis simplicibus vel apice breviter furcatis 2-3 floris, foliis turionum radicalium caulinisque brevissimis rigidis acutis trinerviis margine scabridis inferioribus subtùs sæpè papillari-puberulis, caulinis adpressis internodio multoties brevioribus, vaginà diametro basi folii duplò longiori, bracteis quaternis breviter ovatis enerviis stramineo-virescentibus obtusissimis angustè albo-marginatis obsoletè et obtusè mucronulatis calycem dimidium non æquantibus, calyce brevi lato oblongo-dolioliformi viridi-striato dentibus ovato-rotundis obtusissimis angustè membranaceis ciliatulis, petalis calyce duplò longioribus laminà supernè albà subtùs virescenti-rubellà glabrà integerrimà obovatà.

Hab. in herbidis *Tauri Isaurici*, in montibus suprà *Tourtchalar* alt. 4000' et in parte occidentali montis *Gheidagh*. alt. 6000'. (Heldr.)

Caules pedales tenues stricti numerosissimi, folia 5-10 lin. longa sesquilineam lata, calyx 3-4 lin. longus sesquilineam vel paulò ampliùs latus. *D. Anatolico* et *Kotschyano* habitu, floribus minutis et petalis integris affinis sed ab eis calyce brevi lato dolioliformi obtusissimè et breviter dentato petalisque longiùs exsertis distinctissimus, hàc formà calycis accedens ad *D. brachyanthum* Boiss. Voy. Hisp. qui differt squamis acuminatis, calycis basi lævis dentibus acutis, petalis brevibus aliisque notis. — *D. emarginatus* Ser. calycis squamarumque formà *D. micrantho* quoque affinis egregiè differt caule 3-4 pollicari, foliis longioribus latioribusque flaccidulis, floribus duplò majoribus, petalis subdenticulatis.

DIANTHUS SPHACIOTICUS Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1847. (Sect. *Caryophyllum*.)

D. glaber cæzio-virens, caudiculis tenuibus suffrutescentibus nudis surculos paucos rosulatim paucifolios caulesque tenues nanos ascendentes geniculatos obtusè quadrangulos edentibus, foliis minimis ovatis vel ovato-oblongis subtus crassè trinerviis nervis lateralibus marginis cabrido contiguis, caulinis internodio 2-3 plò brevioribus, summis flores bracteantibus lineari-oblongis, squamis calycinis adpressis viridibus oblongis acutis 3-5 nerviis infernè latiusculè albo-marginatis, calyce squamis triplò longiori cylindrico supernè attenuato viridirubello densè striato in dentes lanceolatos albo-marginatos obtusiusculos breviter mucronulatos fisso, petalorum unguibus elongatis in laminas parvas roseas obovato-cuneatas integras glabras breviter exsertas dilatatis.

D. leucophæus Sieb. Reis. Cret. vol. 2 tab. 9 non Sibth.

Hab. in lapidosis summi cacuminis *Hagio Pneuma* montium *Sphacioticorum* Cretæ alt. 6000'. (Heldreich. Sieb.)

Caules 2-3 pollicares, folia 2 2-1½ lin. longa 1 1½ lata, calyx 7-8 lin. longus. Species pulchella *D. myrtinervio* Griseb. et *leucophæo* Sibth. affinis quorum prior caulibus prostratis imbricatim foliosis, foliis lanceolato-oblongis, posterior foliis lanceolato-linearibus caulinis a flore remotis bracteisque formæ diversæ ferè nerviis differunt.

DIANTHUS STRAMINEUS Boiss. et Held. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Fimbriati*.)

D. glaber pallidè virens, rhizomate lignoso incrassato multicauli, surculis paucis sessilibus paucifoliis, caulibus teretibus supernè parcè et strictè bifurcato-ramosis ad nodos incrassatis et geniculato-flexuosis, foliis strictis angustè lineari-subulatis subtriquetris suprà subcanaliculatis 3-5 nerviis margine scabridis, eis turionum elongatis apice longè attenuatis, caulinis internodio 3-4 plò brevioribus, vaginà folii latitudine 3-4 plò longiori, floribus terminalibus vel 2-5 approximatis subsessilibus vel inferiori remoto, bracteis senis stramineis calyci adpressis obsoletè striatis oblongis membranaceo-marginatis obtusiusculis dorso in mucronem tenem brevem productis, calyce squamis duplò longiori glauco-striato in dentes ovatos obtusiusculos ciliatulos mucronulatos fisso, petalorum ungue longissimo in laminam

minutam flavidam breviter exsertam ad medium usque palmatim 7-9 fimbriatam dilatato areolâ intermediâ ovatâ.

Hab. in fissuris rupium *Tauri Isaurici* inter *Karaman* et *Ermenek* in descensu ad vallem *Djoksu* alt. 3000'. (Heldreich.)

Pedalis, folia turionum 2-3 poll. longa basi $4\frac{1}{2}$ lin. lata superne setaceo-attenuata, caulina 6-10 lin. longa, calyces circ. 10 lin. longi. Ab affinibus *D. crinito* et *fimbriato* dignoscitur foliis longioribus setaceo-attenuatis longè vaginatis, squamis calyce dimidiò nec triplò brevioribus, floribus in caule non solitariis, laminâ multò minori.

DIANTHUS ATOMARIUS Boiss. (Sect. *Fimbriati*.)

D. glaberrimus viridis rhizomate sublig noso pluricipiti, surculis sterilibus subnullis, caulibus erectis herbaceis 1-3 floris, foliis latolinearibus subtrinerviis infernè subcanaliculatis flaccido-flexuosis, radicalibus citò exsiccatis abbreviatis, caulinis internodio longioribus supremis attenuato-acuminatis calyces dimidios æquantibus, vaginâ margine membranaceâ tenerâ folii latitudine sesquolongiori, floribus breviter pedunculatis, squamis calycinis quaternis oblongis margine rubellis subnerviis in mucronem foliaceum subulatum flaccidum eis longiorem basin dentium calycis attingentem attenuatis, calycis tubo elongato cylindrico viridi-striato dentibus triangulari-lanceolatis acutis margine ciliatulis, petalorum unguibus subexsertis longissimis in laminam parvam flavidam glabriusculam minutè nigro-punctatam ovato-cuneatam ad medium usque fimbriatam dilatatis, laminæ areolâ ovatâ.

Hab. ad radices montis *Demawend* suprâ pagum *Ask*, Kotschy pl. Pers. bor. N° 344 sub *D. libanotide*.

Planta 8-10 pollicaris, folia caulina intermedia 2-2 $4\frac{1}{2}$ poll. longa sesquilineam infernè lata, squamæ cum mucrone pollicares, calyx 15-16 lin. longus. Pulchra species *D. libanotidi* Lab. calyce elongato, petalorum formâ et colore afinis sed hic qui in *Libano* (Labill.), monte *Sinai* (Schimp.), *Persia* (Aucher!) crescit, differt foliis rigidis pungentibus, squamis calycinis senis pungentibus recurvis calyce plus dimidiò brevioribus etc.

SAPONARIA FILICAULIS Boiss. (Sect. *Bolanthus*.)

S. perennis imâ basi suffrutescens tota brevissimè et densè tomentello-canescens, caulibus filiformibus teretibus elongatis prostratis re-

motè foliosis laxè et dichotomè ramosis fragilibus, foliis inferioribus oblongo-linearibus basi attenuatis acutiusculis, superioribus ovato-oblongis obtusiusculis, floribus ad dichotomias sitis pedicello calyce breviori suffultis et in fasciculos 2-3 flores secùs ramulos sessiles vel subsessiles inter se remotos terminalesque dispositis, calyce tomentello cylindrico latitudine triplò longiori obscurè fasciato-virenti inter fascias albido dentibus 5 brevissimis triangularibus obtusis, petalorum laminà albà ovato-rotundà, capsulà.....

Hab. in fissuris rupium collium aridissimorum suprà *Damascus* sitorum, legi flor. Maio.

Caules 1½-4 pedem longi, internodia pollicaria, folia 3-5 lin. longa apice 1½-2 lata, calyx 2-4½ lin. longus. Affinis *S. hirsuta* et *S. thymifolia* Boiss., a priori caulibus filiformibus elongatis, floribus non capitatis, a posteriori indumento brevissimo non molli, foliis superioribus latioribus distincta.

SAPONARIA MOLLIS Boiss. (Sect. *Bolanthus*.)

S. perennis imà basi suffrutescens tota molliter hispida grisea viscidula, caulibus erectis tenuibus fragilibus simplicibus vel supernè dithomis, foliis inferioribus aggregatis linearibus basi attenuatis superioribus ovato vel oblongo-ellipticis omnibus acutiusculis, floribus in dichotomià solitariis pedicello calyce breviori suffultis et in fasciculos axillares et terminales 4-3 flores subsessiles inter se remotos dispositis, calyce molliter hispido oblongo-cylindrico latitudine duplò longiori inter costas angustas virides membranaceo dentibus triangularibus acutis, petalorum laminà albà ovato-rotundà, capsulà oblongà calyce breviori, seminibus sub lente minutè tuberculatis radiculà elongatà rostriformi.

Hab. in tissuris rupium calcarearum circà *Eden Libani*, legi flor. Julio 1846.

A præcedenti differt indumento elongato molli, caulibus abbreviatis erectis, calyce pro latitudine breviori 2 lin. longo; accedit propiùs ad *S. thymifoliam* quæ tamen foliis angustioribus, aliisque notis sat differre videtur.

SAPONARIA BARRADENSIS Boiss. (Sect. *Bolanthus*.)

S. perennis basi suffrutescens sub lente minutissimè tomentella fla-

vido-virens, caulibus erectis fragilibus tenuibus supernè parcè dichotomis, foliis infimis confertis angustè linearibus brevibus lineari-oblongis omnibus acutis basi attenuatis, floribus ad dichotomias et axillas solitariis vel binis pedicello calycem æquanti vel superanti suffultis, calyce brevissimè tomentello oblongo-campanulato latitudine vix duplò longiori inter 5 costas tenues virescenti-rubellas albo-membranaceo dentibus quinque triangularibus brevissimis acutis, petalorum laminà albà parvā ovato-rotundā, seminibus sub lente minutè tuberculatis radiculā prominenti.

Hab. in fissuris rupium *Antilibani* ad *Souk Wadi Barrada* ubi legi flor. Maio 1846.

Affinis præcedenti sed indumentum brevissimum lente tantum conspicuum, flores longius pedicellati, calyces sesquilineam tantum longi. Species ternæ e sect. *Bolantho* hic enumeratæ inter se valdè et forsanimis affines sunt, in loco natali tamen diversæ mihi visæ sunt et eas exploratoribus futuris observandas commendo. Eis admodum affinis est *S. hirsuta* Lab. quam legi in scopulis excelsis montis *Makmel Libani* et *Gebel Scheick Antilibani* et quæ staturâ pumilâ, indumento hispidulo sed brevi, floribus subcapitatis sat distincta videtur — *Sap. ocellata* Boiss. — *Gypsophila ocellata* Fl. gr. tab. 387 quam in Diagn. I ut varietatem *S. thymifoliæ* adjunxeram nunc ex icone et descriptione species distincta videtur. Tandem sectioni *Bolantho* adnumerandæ sunt *S. Persica* Boiss., *S. fruticulosa* Bory et Chaub. et *Sap. fasciculata* Boiss. et Reut. — *Gypsophila fasciculata* Reut. et Marg. n. Zac.

SAPONARIA SYRIACA Boiss. (*Proteinia*.)

S. annua ? tota hirsuto-viscida caule recto oppositè ramoso ramis pluriès dichotomè ramulosis, foliis inferioribus oblongis obtusis in petiolum attenuatis subtrinerviis, ramorum sessilibus elliptico-linearibus obtusiusculis, floribus ad dichotomias et axillas superiores pedicello tenui calyce paulò breviori suffultis, calyce florifero cylindrico fructifero oblongo-conico hirsuto-viscido viridi enervi dentibus triangularibus acutis, petalis linearibus apice acutè emarginato-bilobis, capsulâ calyce paulò breviori, seminibus reniformibus compressis seriatim tuberculatis.

Hab. in *Syriâ* undè specimen incompletum aliis plantis mixtum retuli.

Media inter *S. Orientalem* et *S. viscosam* quæ ambo petala bifida habent, prior differt ramis pedicellisque tenuioribus rigidulis elasticis nec fragilibus, foliis minoribus, calycis fructiferi obconici dentibus acuminatis, capsulâ calyce paulò longiori; *S. viscosa* distinguitur inflorescentiâ confertâ, calyce capsulâ quoque breviori, laminæ lobis truncatis.

S. tridentatæ Boiss. Diagn. I ut synonymon adjuugenda *S. astroites* Fenzl. Linn. 1843 quæ hujus forma pinguior procerior tantum est.

SAPONARIA PAMPHYLICA Boiss. et Heldr. in pl. Anatol. 1846 (Sect. *Bootia*.)

S. perennis infernè glaberrima inflorescentiâ valdè glanduloso-hirsutâ, caudicibus crassis lignosis apice ramosis fasciculos breves foliorum caulesque teretes foliosos subsimplices erectos edentibus, foliis lineari-lanceolatis viridibus uninerviis acutiusculis basi longè attenuatis supernè latioribus caulinis abbreviatis internodio paulò brevioribus, floribus 4-5 in fasciculum terminalem rariùs 2-3 approximatos confertis brevissimè pedunculatis magnis, foliis summis bractæformibus brevibus a basi oblongâ setaceo-recurvis pedunculos æquantibus vel superantibus, calyce florifero longè cylindrico viridi subenervi hirsuto viscosissimo dentibus lanceolatis setaceo-acuminatis, petalorum ungue apice exserto in laminam lineari-cuneatam ad medium usquè in lobos oblongos bilobam dilatato, coronâ in 2 lacinias lineares bipartitâ, capsulâ...

Hab. in saxosis *Tauri Pamphylici* in viâ inter *Marla* et *Adalia* alt. 4000'. Flor. Julio (Heldreich).

Caules 8-10 pollicares, folia inferiora 12-15 lin. longa apice 2 lin. ferè lata, calyx cum corollâ pollicem longus ferè 2 lin. latus. Pulchra species inter *S. officinalem* et *S. depressam* Biv. media.

In Diagn. I p. 18 pro *S. pumilione* Boiss. ponè *Sap. pulvinaris* Boiss. in pl. Anat. Heldr. exs. Nomen mutandum erat propter antiquiorem *Sap. pumilionem* Fenzl. — *Silene pumilio* L.

Silenes annuæ.

SILENE PENTEICA. Boiss.

S. annua tota breviter pubescens viscida, caulibus 1-5 pumilis su-

pernè bis vel ter dichotomis, foliis parvis oblongo-spathulatis inferioribus in petiolum brevissimum attenuatis supremis minimis bractei-formibus oblongo-linearibus acutisculis, floribus ad omnes dichotomias et ad apicem ramorum terminalium sitis, pedicello crassiusculo viscido florum dichotomiarum calyce longiori aliorum calycem æquanti fructifero semper erecto, calyce densè et breviter papilloso-viscido clavato-obconico viridi-rubello enervi obsolete lineato dentibus 5 triangularibus acutiusculis brevissimis, petalorum ungue lineari in laminam parvam cuneato-retusam sensim dilatato, coronâ usquè ad basin in 2 lacinias triangulari-oblongas obtusiusculas divisâ, capsulâ oblongâ crustaceâ flavidâ eximie puncticulatâ carpophoro eâ triplò breviori suffultâ, seminibus reniformi-compressis tenuissimè rugulosis dorso canaliculatis.

Hab. in arenosis ad radices montis *Pentelici* Atticæ, Boiss. Spruner sub *S. sedoidi*.

Planta 4-5 pollicaris, pedicelli florum inferiorum 6-8 lin. longi, calyces floriferi 3 lin., capsula cum carpophoro 4 lin. longa. A nobis confusa cum *S. sedoidi* quæ eximie differt caulibus ramosioribus infernè regulariter dichotomis supernè autem tantum flores laterales axillares edentibus, floribus dimidiò minoribus, pedicellis post anthesin erectopatulis, capsulâ clavato-cylindricâ hyalino-membranaceâ, carpophoro subnullo, seminibus dimidiò minoribus. — *S. ramosissima* Fl. Gr. huic quoque affinis ex descript. et icon. eximie differt calyce 10-costato, capsulâ crustaceâ cylindricâ, petalis profundè bifidis, coronâ 4 dentatâ.

SILENE PINETORUM Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1847.

S. annua infernè brevissimè papilloso-puberula supernè glabra viscidula, caulibus nanis a basi divaricatis semel terve dichotomis, foliis radicalibus carnosulis obovatis vel oblongo-spathulatis obtusis in petiolum brevem attenuatis, caulinis linearibus acutis minutissimis bractæformibus, floribus terminalibus vel in dichotomiis sitis pedicello filiformi fructifero erecto flore 2-3plò longiori suffultis, calyce florifero obconico fructifero ovato-clavato glaberrimo virescenti subenervi obsolete lineato dentibus quinque latè triangularibus obtusiusculis angustè albo-marginatis, petalis e sicco albidis vel pallidè carneis concoloribus laminâ exsertâ cuneatâ semibifidâ, coronâ ad basin usquè bipartitâ partitionibus quadratis truncatis subquadridentatis, capsulâ ovato-rotundâ crustaceâ flavidâ minutissimè punctulatâ carpophoro eâ

dimidiò breviori suffultà, seminibus reniformibus compressis dorso profundè canaliculatis tenuissimè rugulosis facie lævibus.

Hab. in apricis lapidosis pinetorum loco *Psycho* dicto in latere meridionali montis *Tavoutsi* prov. *Sitia* Cretæ alt. 3000'. Flor. Aprili. (Heldreich.)

Planta 2-3 pollicaris, folia radicalia 5-6 lin. longa 2 $\frac{1}{2}$ lata, calyx vix 3 lin. longus, capsula cum stipite 3 lin. longa. Species pulchella affinis præcedenti a quâ characteribus datis distinguitur. *S. ramosissima* quoque affinis differt foliorum formâ, capsulâ cylindraceâ, calyce costato etc.

SILENE HUSSONI Boiss.

S. annua brevissimè hirtella, caulibus pumilis a basi pluries divaricatum dichotomis, foliis radicalibus subrosulatis caulisque parvis oblongo-lanceolatis acutiusculis viridibus, floribus ad dichotomias et extremitatem ramulorum sitis pedicello setaceo calyci æquilongo vel longiori fructifero sæpè patulo-deflexo suffultis, calyce florifero obconico fructifero oblongo-clavato viridulo enervi viscidulo ferè ad tertiam partem usquè in dentes triangulari-lanceolatos acutos membranaceo-marginatos fisso, petalis angustè lineari-cuneatis e sicco flavidis apice brevissimè exsertis breviter bilobis nudis, capsulâ calycem æquantì tenerà ovatâ carpophoro eâ dimidiò breviori suffultâ, seminibus minimis reniformibus eximè rugulosis dorso non canaliculatis.

Hab. in arenosis ad *Wadi Sannour* deserti Arabico-Ægyptiaci. Comm. amiciss. prof. Husson Kahirensis.

Planta 2-3 pollicaris, folia radicalia 5-7 lin. longa 2 lata, calyx floriger 2 lin. tantùm longus, capsula cum carpophoro 3 lin. longa. Affinis præcedentibus a quibus calycis dentibus elongatis, petalis vix exsertis, seminibus dorso planis etc. diversissima est.

SILENE EXSUDANS Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.

S. annua brevissimè papilloso-tomentella secus caules et ramos viscidula, caulibus pluribus pumilis rubellis a basi pluries et divaricatum dichotomis, ramis tenuissimis rigidulis, foliis omnibus caulinis minutis oblongo-linearibus obtusiusculis basi attenuatis inferioribus supernè subcanaliculatis sæpè subrecurvis supremis linearibus minutissimis, floribus ad dichotomias supremas aut ad ramulos terminales sitis pe-

dicello setaceo calycem æquanti vel (in dichotomiâ) duplò longiori suffultis, calyce oblongo-clavato brevissimè papilloso—puberulo albido ecostato 5 lineis virescenti-nigricantibus sæpè obsoletis percurso dentibus triangularibus acutis margine ciliolatis, petalis roseis cuneatis semibifidis, coronâ brevissimâ vix perspicuâ ad basin usquè 5-6 denticulatâ, capsulâ calyce paululum longiori crustaceâ flavidâ tenuissimè punctulatâ ovatâ carpophoro eâ paulò breviori suffultâ, seminibus reniformi-compressis (immaturis) lævibus.

Hab. in arenosis maritimis portûs *Tchinova* Lyciæ (Heldreich).

Planta 4-6 pollic., folia inferiora 4-5 lin. longa 1-2 lata, calyces floriferi 3 lin. longi, laminæ petalorum calyci ferè æquilongæ, capsula cum carpophoro 3 1/2 lin. longa. Affinis *S. pinetorum* sed distincta formâ foliorum, calyce puberulo, carpophoro longiori etc. Propiùs accedit ad *S. Kotschy* quæ differt calyce nervis prominentibus costulato, dentibus acuminatis, seminibus tenuiter rugulosis. — Specimina ex aridis *Pamphylæ* ad fluvium *Catarrhactum* in pl. Heldr. sub *S. exsudans* var. nomine distributa ad *S. Kotschy* referenda sunt.

SILENE SALSA Boiss.

S. annua, parcè et breviter hirtula, caulibus pumilis a basi divaricatim dichotomis ramisque filiformibus rigidulis, foliis angustè linearibus convolutoplicatis acutiusculis, floribus in dichotomiis superioribus et ad ramulorum apicem pedicello setaceo calyce 1-2 plò longiori fructifero patulo suffultis, calyce patulè et sparsim puberulo angustè clavato lineis quinque viridibus e dentibus decurrentibus membranâ albo-hyalinâ separatis percurso, dentibus triangulari-lanceolatis acutis albo-marginatis longiusculè que ciliatis, petalis e sicco flavidis laminâ lineari-cuneatâ exsertâ calyce dimidiò breviori angustè semibifidâ, coronâ..., capsulâ oblongâ crustaceâ tenerâ calyce paulò breviori carpophoro eâ paulò longiori suffultâ, seminibus (immaturis) lævibus.

Hab. in solo salso ad lacum *Nemek Derja* propè *Schyras* Kotschy pl. Pers. austr. N° 453.

S. linearis var. *tenella* Fenzl. loc. cit.

Planta 3-5 pollicaris, folia majora 5-6 lin. longa, calyx florifer 5 lin. longus angustus. *S. linearis* meo sensu longè differt caule ramoso 1-1 1/2 pedali seminibusque rugulosis; magis affinis *S. exsudanti*, quæ calycis multò brevioris dentibus breviter triangularibus differt et *S. Kotschy* calycis asperuli dentibus non albo-marginatis, petalo-

rum laminā ampliā, seminibus tenuiter rugulosis, capsulā crustaceā durā distinctæ. *S. leyseroides* tandem differt pedicellis abbreviatis, calycis albi concoloris dentibus subulatis immarginatis.

SILENE CASSIA Boiss.

S. annua vel biennis viridis brevissimè scabrida, caule elato a basi oppositè ramosissimo ramis strictis rigidulis elongatis dichotomè ramosis viscidulis paniculam effusam formantibus, foliis angustè lineari-complicatis acutis apice sæpè subrecurvis supremis bractæformibus setaceis brevissimis, floribus ad dichotomias supremas et ramulos terminales pedicello filiformi semper recto calyce 2-3 plò longiori suffultis, calyce florifero elongato cylindrico-clavato breviter et sparsim scabrido 10 costato dentibus ex basi lanceolatā subulatis margine non membranaceis, petalorum laminā lineari-cuneatā breviter exsertā ultrā medium in 2 lobos lineares bipartitā, coronā minutissimā in 2 lacinias ovatas partitā, capsulā oblongā elongatā calycem æquanti crustaceā durā flavidā minutè punctulatā carpophoro eā paulò breviori suffultā, seminibus reniformi-compressis rugulosis dorso canaliculatis.

Hab. in sylvaticis jugi *Cassii* ubi exemplaria pauca Jun. 1846 legi.

Caulis 1 1/2-2 pedalis, folia 8-12 lin. longa lineam vel sesquilineam lata, calyx florifer et capsula cum carpophoro 6 lin. longi. Habitus *S. Cariensis* quæ differt caule minus ramoso, calycibus glabris, laminā petalorum amplā et *S. rigidulæ* eisdem notis dentibusque calycinis obtusis diversæ; A. *S. Kotschy* differt calycibus ferè duplò longioribus, caule elato oppositè paniculato-ramoso, capsulā oblongo-cylindricā.

SILENE ECHINOSPERMA Boiss. et Heldr.

S. annua vel biennis viridis infernè brevissimè scabriuscula supernè viscida, caule elato tereti a basi oppositè et laxè ramoso, ramis elongatis dichotomè ramulosis paniculam laxifloram formantibus, nodis albidis tumidis, foliis inferioribus angustè lanceolato-linearibus obtusis vel acutiusculis cæteris lineari-subulatis acutis summis minimis bractæformibus, floribus ad dichotomias supremas et ramulos terminales sitis pedicello calyce longiori fructifero erecto suffultis, calyce glabro elongato-clavato infernè angustissimo membranaceo-hyalino albidò concolori vel lineis nigris rubellive percurso dentibus latè et breviter triangularibus acutis, laminis petalorum amplis longè exsertis cuneatis

albis subtus pallidè rubello-pictis ad medium usquè divaricatim bilobis lobis linearibus obtusis, coronâ ad basin usquè fimbriato-multifidâ fimbriis longis setaceis asperulis, capsulâ oblongâ crustaceâ eximie punctulatâ carpophoro æquilongo suffultâ, seminibus reniformibus eximie et crebrè echinatis.

Hab. in collibus propè *Athenas* (Spruner), in fauce *Parori Taygeti* suprâ *Mistra* et circâ *Androuvisti* *Messenizæ*. (Heldr.)

S. rigidula pl. Tayg. Heldr. exs. non Sibth.

Sesquipedalis, folia 1-1 1/2 pollicaria 1-2 lin. lata, calyx cum petalis 40-44 lin. longus. *A. S. rigidulâ* quâcum olim confunderamus florum colore, seminibus echinatis etc. distinctissima. Habitu et petalorum colore magis affinis *S. pictæ* Pers. DC. — *S. junceæ* Fl. Græc. quam in Syriâ propè *Beyrout* legi et quæ differt foliis obovatis, caule infernè sulcato, floribus suprâ bracteolas supremas brevissimè pedicellatis, petalis minùs amplis intensiùs purpureo-lineatis, coronæ lobis tridenticulatis, seminibus rugulosis.

SILENE LASIOSTYLA Boiss.

S. annua tota densè griseo-tomentella viscida caulibus pluribus pumilis decumbentibus ascendentibusve basi parcè et alternè ramosis sessilibus linearibus subflaccidis acutiusculis obsolete uninerviis superioribus sensim angustatis abbreviatisque, floribus secùs ramos terminales paucis laxis secundis pedunculo tenui sub anthesi erecto-patulo calycem subæquanti suffultis, calyce per anthesin exactè cylindrico angusto basi abruptè truncato breviter hirtò viscido membranaceo 40 striis viridibus percurso in 5 dentes ovatos obtusos latè albo-membranaceos fisso, laminâ petalorum roseâ cuneatâ ad tertiam partem divaricatim bilobâ patulâ in unguem inclusum subitò contractâ, coronæ prominulæ bilobæ lobis ovatis obtusis, stylis longè exsertis ciliatisque, pedunculis defloratis patulis vel deflexis calyci erecto inflato oblongo subæquilongis, capsulâ calyce inclusâ crustaceo-tenerâ nitidâ flavâ conicâ apice attenuatâ dentibus aurantiacis mucronatis carpophoro æquilongo suffultâ, seminibus reniformibus dorso convexis vix compressis sub lente tenuissimè tuberculatis.

Hab. in arenosis calidis maritimis et montanis Lusitaniæ et Hispaniæ australis (Boiss., Webb., Guthnick) et ad *Tingidem* Salzm.

S. villosa Boiss. Voy. Hisp. et auct. Hisp. non Forsk.

Hanc speciem *S. villosâ* Forsk.—*S. Canopicâ* Del. eandem esse cre-

didi donec exemplaria numerosa hujus in arenosis Ægypti et Arabiæ petreæ lecta eam a plantâ Hispanicâ diversissimam esse docuerint. *S. villosa* est brevius hirsuta minùsque viscida, habet folia latiora oblongo-lanceolata, flores in dichotomiis inferioribus sitos quod in nostrâ specie nunquam occurrit, pedicellos crassiores, calycem etiam sub anthesi clavatum acutiusculè dentatum, ungues longè exsertos, stylos brevissimè papillosos, pedicellos fructiferos erecto-patulos, capsulam non erectam, semina dimidiò minora reniformi-compressa dorso concaviuscula tenuissimè rugulosa.

SILENE PALÆSTINA Boiss. •

S. annua tota longè hispido-viscida flavescens, caule crassiusculo a basi pluries dichotomè ramoso ramis rectis strictis in racemos longissimos abeuntibus, foliis oblongo-linearibus radicalibus obtusis basi breviter attenuatis cæteris acutiusculis, floribus in racemos laxos unilaterales dispositis pedicello erecto calyce triplò breviori suffultis, bracteolis binis alterâ setaceâ minimâ alterâ lineari pedicellum superanti, calyce cylindrico-subclavato albo-membranaceo 10 lineis rubris percurso patulè hirsuto glanduloso dentibus rubellis glandulosissimis oblongis obtusis, unguibus petalorum albis angustis, limbo amplo intensè purpureo ferè ad basin usquè in 2 lacinias obcordatas diviso, coronæ albidæ bipartitæ lobis brevibus truncato-tridenticulatis, pedicellis fructiferis erecto-patulis, capsulâ erectâ calyci æquilongâ eumque distendenti crustaceâ durâ puncticulatâ oblongo-cylindricâ apice subcontractâ carpophoro eâ ferè triplò breviori suffultâ, seminibus minimis reniformibus læviusculis dorso canaliculatis utrâque facie excavatis.

Hab. propè *Gaza* Palæstinæ ubi specimen unicum Apr. ineunte legi.

Planta pedalis, folia inferiora poll. longa 3-4 lin. lata, racemi fructiferi 9-10 pollic., calyx florifer 6 lin. longus, lamina petalorum ampla patula calycem dimidium æquans, capsula cum carpophoro 6 lin. longa. Pulchra distinctaque stirps propè *S. pendulam* vel *S. hirsutam* Lag. collocanda.

S. dichotoma pl. Heldr. Pisidicæ exs. propè *Bouldour* lecta et e *Cretâ* ad *Gerakari* distributa est *S. Sibthorpiana* Gris. — *S. dichotoma* Fl. Græca a plantâ Ehrharti petalis ecoronatis et capsulâ ovatâ nec oblongâ distincta. — *S. divaricata* Fl. Græc. affinis quoque ab utrâque tamen petalorum laminâ coronatâ elongatâ, capsulâque ovatâ dis-

tincta videtur; huic referenda sunt specimina sub nomine *S. dichotomæ* a cl. Pinard ex *Cariâ*, a me ipso e *Smyrnâ*, a cl. Heldreich e *Pamphylid* ad fl. *Melas* distributa.

SILENE HELDREICHII Boiss.

S. annua tota pilis papillaribus elongatis crispis hirtula griseo-virens, caulibus pluribus ascendentibus rubris vel infernè parcè ramosis in racemum longum unilateralem abeuntibus, foliis radicalibus oblongis vel oblongo-spathulatis obtusis in petiolum longè attenuatis caulinis sessilibus acutiusculis mucronulatis, floribus sessilibus basi 2 bracteis oblongis vel angustè linearibus acutis æqualibus calycem dimidium æquantibus vel superantibus basi suffultis, calyce cylindrico imâ basi subangustato 10 nervis elevatis viridibus percurso inter eos albo-hyalino pilis papillaribus crispulis densè hispido dentibus lanceolatis acutis angustè albo-marginatis, petalorum concolorum laminis cuneatis ad tertiam partem bifidis, coronæ brevis bilobæ lobis integris ovario cylindrico stipite ei subæquilongo suffulto, capsulâ...

Var. λ . Bracteæ lineares, petala alba.

Var. β . Bracteæ oblongæ eæ florum inferiorum calycem æquantes, petala rosea.

Hab. var. λ . in saxosis apricis propè *Alaya* Pamphyliæ, var. β . in colle *Kourmalu* non procul ab *Adaliâ*.

Hæc species quæ in coll. Heldr. Anatolicis cum *S. sibthorpiand* Griseb. a quo inflorescentiâ non dichotomâ abhorret per errorem distributa fuit, affinis est *S. imbricatæ* Desf. et *S. discolori* Fl. Græc. quæ eadem ac *S. setacea* Otth esse videtur. *S. imbricata* ab eâ differt floribus pedicellatis, calyce brevissimè aspero, *S. discolor* ex icone et descriptione distinguitur petalis discoloribus ad basin usquè bipartitis, coronæ lobis bifidis, foliis carnosulis, bracteis inæqualibus.

SILENE PAMPHYLICA Boiss. et Heldr. (Sect. *Conomorpha*.)

S. annua brevissimè pubescens subviscida, caulibus basi striato-sulcatis erectis simplicibus apice breviter dichotomis 3-5 floris, foliis lanceolato-linearibus uninerviis inferioribus basi angustatis, pedunculis erectis calycem æquantibus aut eo paulò longioribus, calyce breviter papillari-glanduloso florifero cylindrico fructifero campanulato ad medium usquè in dentes e basi triangulari-subulato fisso 50-60 nervis densis adpressis parallelis percurso, petalorum laminis purpureis cu-

neato-obcordatis patulis calyci dimidio subæquilongis, coronâ truncatâ retusâ, capsulâ brevissimè et crassè stipitatâ ovatâ dentibus calycinis breviori, seminibus reniformi-compressis dorso canaliculatis tuberculatis.

S. macrodonta pl. Heldr. Anat. exs. non Boiss. Diagn.

Hab. in campis aridis Pamphylîæ propè *Adalia* (Heldreich).

Habitu et calyce multistriato valdè affinis *S. macrodonta*, ab eo tamen distincta videtur petalorum laminâ amplâ obcordatâ nec minimâ retusâ vix exsertâ, capsulâ ovatâ nec oblongâ, calyce fructifero campanulato nec supernè constricto. — *S. macrodonta* Boiss. Diagn. ut synonymon adjungenda *S. grammatacalyx* Fenzl. in Kotschy pl. Kurd.

SILENE AMMOPHILA Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1847.

S. annua nana multicaulis tota brevissimè cinerea tomentella, caulibus tenuibus prostratis ascendentibusve infernè dichotomè et parcè ramosis ad nodos approximatos basi sæpè geniculatis, foliis oblongo-spathulatis obtusis radicalibus in petiolum eis longiorem attenuatis cæteris sessilibus summis oblongo-linearibus acutiusculis, floribus ad axillas superiores pedicello erecto-patulo eis æquilongo capsulâ duplò longiori suffultis parvis, calyce brevissimè et densè hirt-viscidulo florifero angustè cylindrico fructifero ovato-campanulato viridi sub-20 nervi dentibus triangulari-lanceolatis acutis, petalis minimis brevissimè exsertis, capsulâ breviter ovatâ dentibus calycinis paulò breviori tenerâ vix coriaceâ, seminibus reniformibus compressis tenuissimè rugulosis dorso concaviusculis.

Hab. in arenosis maritimis ad *Pilalimmata* provinciæ *Sitia* et in insulâ *Gaidouronisi* propè *Girapetra* in *Cretâ*.

Planta 2-3 pollicaris, calyces floriferi 2 $1\frac{1}{2}$ lin. longi lineæ $3\frac{1}{4}$ lati, capsula 2 lin. longa. Ob calyces per anthesin angustè cylindricos *Sect. Conomorpha* accedens sed nervatione calycis ab eâ discedens et melius propè *S. gallicam* et *brachypetalam* collocanda.

Loco *S. papillosæ* Boiss. Diagn. I p. 39 ponè *S. crassipes* Fenzl. Pugill. nomen antiquius.

Silenes perennes.

SILENE VARIEGATA Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1847. (*Sect. Behen.*)

S. perennis glaberrima, rhizomate elongato subterraneo repenti ra-

moso caudiculos tenues albidos nudos inter lapides serpentes apice breviter et subrosulatum foliosos scapiferos edenti, surculis sterilibus nullis, foliis glauco-cæsiis carnosis planis orbicularibus ovatis rariùs oblongis in petiolos brevissimos basi connatos plùs minùs abruptè cuneato-attenuatis sæpè basi rotundatis obtusissimis acutiusculisve margine cartilagineo angusto remotè denticulato-scabrido donatis, scapis e foliis brevissimè exsertis infernè folia minuta oblonga bina edentibus apice dichotomè 3-7 floris, bracteis minutissimis linearibus acutis ciliatulis, pedicellis calyce brevioribus, calyce florifero oblongo-cylindrico cæsiò albo purpureoque variegato 10 nervi nervis apice vix ramulosis non anastomosantibus dentibus ovato-triangularibus acutis apice ciliatulis, calyce fructifero ovato capsulà distenso, petalorum ungue albedo a basi sensim dilatato cuneato in laminam griseam violaceo-pictam eo angustiore in 2 lacinias breviter oblongo-lineares bipartitam contracto, coronæ albæ bipartitæ laciniis ovatis subtruncatis, staminibus violaceis stylisque ciliatulis longè exsertis, capsulà ovatà calycem æquanti carpophoro crasso brevissimo suffultà, seminibus reniformibus compressis facie concaviusculis convexis tenuiter rugulosis.

Hab. inter lapides montium altiorum *Cretæ*, monte *Idà* (Tournef.) montibus *Lassiti* (Sieber), montibus *Sphacioticis* ad *Hellino-Seli* suprà *Omalo* et monte *Stravopodia* alt. 6000-7000' (Heldreich).

Lychnis Cretica montis Idæ folio subrotundo cæsiò Tourn. Cor. — *Lychnis variegata* Desf. Cor. tab. 56. — *Cucubalus cyclamineus* Sieb. Reis. II tab. 44.

Species ab affinibus distinctissima calyce capsulà distento 10 nec 20 nervi nervis non anastomosantibus etc. *S. cæsia* Fl. Græca tab. 417 longè differt caulibus elongato-foliosis, foliis minoribus, floribus minoribus, calycibus floriferis ovatis inflatis, petalis flavidis.

SILENE PHYSALODES Boiss. (Sect. *Behen*).

S. perennis minutissimè crispulo-tomentella, caulibus crassis herbaceis intùs inanibus ramosis teneris proceris, foliis amplis teneris quinquenerviis ovatis attenuato-acuminatis inferioribus in petiolum longum breviter attenuatis, caulinis sessilibus basi cuneatà vel truncatà brevissimè connatis, ramis supernè dichotomis, floribus ad dichotomias sitis et racemos breves terminales bracteatos formantibus, bracteis inferioribus magnis cordato-acuminatis superioribus oblongis vel oblongo-linearibus pedicellos subæquantibus, pedicellis tenuibus

primùm brevissimis dein refractis cum calyce elongatis eis dichotomiarum præsertim longissimis, calyce tenuiter membranaceo-virescenti anthesi ineunte angustè cylindrico dein citò aucto fructifero inflatissimo plicato oblongo supernè subangustato dentibus triangulari-lanceolatis obtusiusculis ciliatis nervis 10 inter se per totam longitudinem reticulatim anastomosantibus, petalorum ungue glabro apice dilatato dein subcontracto in laminam flavescens brevissimam brevissimè exsertam linearem bipartitam laciniis linearibus in 2-3 fimbrias setaceas fissis, coronà in lacinulas setaceas multipartitâ, capsulâ ovatâ tenerè crustaceâ carpophoro eâ vix breviori suffultâ calycem dimidium vix æquanti, seminibus magnis reniformibus subcompressis dorso convexis eximiè secùs lineas periphericas tuberculatis.

Hab. in dumosis *Palæstinæ* borealis circà *Banias*, legi flor. Maio ineunte.

Planta plures pedes alta tenera inter frutices subscandens, folia inferiora 4-5 poll. longa 3 lata, superiora sensim minora, calyx florifer 6 lin. longus 4 $\frac{1}{4}$ latus, fructifer refractus pollicem longus 7-8 lin. latus, semen ferè lineas 4 $\frac{1}{4}$ diametro latum. Pulchra species affinis *S. fimbriatæ* et *S. laceræ* quæ differunt caulibus tenuioribus durioribus, pedicellis fructiferis erectis, calyce fructifero breviter ovato, petalorum laminâ ovatâ palmatim fimbriatâ, capsulâ brevissimè stipitatâ, seminibus dimidiò minoribus etc.

SILENE MACROCLADA Boiss. (Sect. *Otites*).

S. perennis vel biennis? dioica, caule elato tereti infernè brevissimè tomentello supernè viscosissimo oppositè ramoso, ramis viscidis gracilibus virgatis elongatis paniculam pyramidatam longissimam nudam formantibus, foliis tomentello-griseis obovatis obtusis vel acutiusculis margine eximiè undulato-crispis radicalibus in petiolum longum attenuatis, floribus secùs ramos in fasciculos remotos basi bracteis minutissimis ovatis latè albo-membranaceis ciliatis stipatos subverticillatis inæqualiter pedicellatis, pedicellis setaceis glabris, floribus minutis, calyce breviter obconico viridi glabro estriato dentibus brevibus ovatis obtusis albo-marginatis ciliatulis, petalis flavidis angustè linearibus crassiusculis breviter exsertis anthesi peractâ apice circinnatis genitalibus longè exsertis petala multò superantibus, stylis filiformibus recurvatis latere convexo ciliatulis, capsulâ ovato-oblongâ apice atte-

nuato calycem excedenti omninò sessili, seminibus reniformibus compressis rugulosis dorso canaliculatis.

Hab. in parte inferiori *Tmoli* suprà *Philadelphiam* ubi fructif. observavi; indè semina retuli et plantam vivam educavi.

Caulis 3-5 pedalis, folia inferiora 4-4 $1\frac{1}{2}$ poll. longa 8-10 lin. lata petiolo 2-3 pollicari suffulta, paniculæ rami simplicissimi inferiores pedales longioresque, flores magnitudinis *S. otitis*, effusæ et exaltatæ Friwalsky ab eis et affinibus distinctissima paniculâ amplissimâ, foliis undulato-crispis, petalis crassis linearibus, stylis longissimis, capsulâ omninò sessili majori durâ 3 $1\frac{1}{2}$ lin. longâ. *S. densiflora* d'Urv. quæ quoque caule elato foliis magnis gaudet, differt foliis non undulatis, florum verticillis approximatis, petalis filamenta æquantibus, capsulâ minori.

S. Iconia Boiss. et Heldr. pl. Anat. exs. est eadem ac *S. lasiopetala* Fenzl. Pugill., pulchra species *S. longipetalæ* affinis.

SILENE SPERGULIFOLIA MB.

Cùm sub hoc nomine plures species infrâ describendæ in pl. Anatol. Heldr. et Pin. distributæ fuerint, diagnosin *S. spergulifoliæ* veræ prius dare utile duxi.

S. foliis lineari-subulatis plus minùs recurvis rigidulis fasciculatis, floribus plus minùsve ad apicem ramulorum oppositorum confertis racemos interruptos capitatosque formantibus, calycibus albo-membranaceis sulcatis oblongis, capsulâ conico-attenuatâ carpophoro triplò breviori.

Hab. in regionibus *Caucasicis* ubi vulgaris, in *Persia boreali*! et *Armenia* (Aucher), *Syria boreali* ad *Antab* (Aucher), Antilibano ad *Rascheya* (Boiss.) et montibus *Kurdistanicæ* (Kotschy N° 322) (forma elatior calycibus magis tomentosis).

SILENE PRUINOSA Boiss. Diagn. I p. 23. — Hujus diagnosis sic emendanda.

S. perennis suffruticosa multicaulis tota papillis minutissimis retrorsis pruinoso-tomentella grisea, caulibus ascendentibus ramosis, foliis lanceolato-linearibus acutis supernè latioribus infernè longè attenuatis, ramis oppositis strictis brevibus apice dichotomè 3-7 floris rariùs abortu unifloris paniculam brevem racemosam formantibus, calyce membranaceo-albido nigricanti vel rubello plus minùs distinctè lineato florifero cylindrico fructifero clavato glanduloso-hirto membranaceo

rubro vel viridi-striato dentibus ovatis obtusis latè albo-membranaceis ciliatulis, ungue lineari-cuneato glabro, laminà ungue longiori cuneatà patulà ad $\frac{2}{3}$ bipartità lobis divergentibus linearibus, coronæ minimæ bipartitæ lobis ovatis, capsulà parvâ sub lente asperulo-punctatâ subglobosâ in mucronem eâ æquilongum acutum conico-attenuatâ stipite eâ (absque mucrone) æquilongo suffultâ, seminibus minimis reniformi-compressis dorso convexis seriatim rugoso-tuberculatis.

Hab. in Cariâ (Pinard sub. *S. spergulifoliâ*), collibus propè *Geyra* Cariæ (Boiss.), collibus tophaceis propè *Bouldour Pisidiæ*. (Heldr. pl. exs. sub *S. spergulifoliâ*.)

Caules ascendentes vel prostrati 4-6 pollic., calyx florifer 4 lin. longus, capsula diametro vix lineâ unâ latior mucrone plûs minûsve attenuato carpophoroque 4 $\frac{1}{4}$ lin. longis. Ab affini *S. spergulifoliâ* distinctissima racemis minûs laxis, laminis petalorum longis, capsulâ et seminum formâ.

SILENE CAPPADOCICA Boiss. et Heldr.

S. basi suffrutescens multicaulis, caulibus sub lente pruinoso-hirtulis cortice albicante vestitis ad nodos inflatis ascendentibus elatis simplicibus vel parcè ramosis aliis floriferis aliis sterilibus elongatis foliosis ramosioribus erectis, foliis viridibus scabridis lanceolato-linearibus acutis infernè longè attenuatis axillis, fasciculiferis foliis fasciculorum angustè linearibus, floribus in fasciculos oppositos confertifloros breviter pedunculatos racemos interruptè verticillatos formantes dispositis, calyce florifero oblongo fructifero oblongo-clavato albo-membranaceo plicatulo subenervi parciissimè ad costas sub lente scabrido cæterùm glabro dentibus brevissimis ovato-rotundis latè pellucido-marginatis ciliatulis, petalorum ungue glabro in laminam eo breviorē flavescentem ad $\frac{2}{3}$ bipartitam dilatatō laciniis divergentibus angustè linearibus, coronæ minimæ bipartitæ lobis ovatis, capsulâ minutâ calyce longiori oblongâ apice conico-attenuatâ carpophoro crasso eâ quintuplò breviori suffultâ, seminibus curvato-subreniformibus compressiusculis dorso convexis ruguloso-tuberculatis.

S. spergulifolia var *macrorrhiza* pl. Heldr. Anat. exs. 1846.

Hab. in *Cappadociâ* Aucher N° 462, vineis arenosis *Lycaoniae* propè *Konieh* (Heldreich).

Pedalis vel sesquipedalis, folia majora pollicem longa supernè 4 $\frac{1}{2}$ -2 lin. lata, calyx 3 lin. longus fructifer dilatatus abbreviatus

capsulâ distensus lateraliterque ruptus, capsula cum carpophoro 2 1/2 lin. longa. A *S. spergulifoliâ* quâcum confusimus egregiè differt foliis non rigidis, floribus multò minoribus, calycibus enerviis brevissimè dentatis præter angulos scabridulos glabris, capsulæ et seminum magnitudine et formâ. *S. Libirica* habitu et calyce albo-membranaceo similima distinguitur foliis longioribus latioribusque, calycis dentibus acutiusculis, petalis indivisis linearibus vix apice retusis, genitalibus longè exsertis, carpophoros elongato.

SILENE PESTALOZZÆ Boiss.

S. basi suffrutescens multicaulis tota brevissimè papilloso hirtula grisea, caulibus ascendentibus a basi ramulosis albidis ad nodos inflatis, foliis lanceolato-linearibus acutis infernè attenuatis axillis inferioribus folia fasciculata angustissima edentibus, floribus in fasciculos oppositos confertifloros remotos inferiores pedunculatos superiores subsessiles racemos interruptè verticillatos formantes dispositis minimis, calyce florifero conico-cylindrico fructifero ovato albo-membranaceo 10 costato-plicato ad costas virentes aculeolato cæterùm glabro dentibus ovato-rotundis latè albo-marginatis ciliatulis, ungue petalorum in laminam angustissimam lineari-cuneatam flavidam apice emarginatam abeunt, genitalibus longiusculè exsertis, capsulâ calyce paulò longiori ovatâ subsessili acutiusculâ, seminibus.....

Hab. propè *Elmalu Lyciæ* undè mihi comm. amiciss. Pestalozza.

S. Cappadociæ pluribus notis valdè affinis ab eâ tamen specificè differre videtur floribus saltem dimidiò minoribus, calyce vix 2 lin. longo evidenter costato costis muriculatis, laminâ angustissimâ apice tantùm emarginatâ, capsulâ minori apice vix attenuatâ.

SILENE AUCHERIANA Boiss. Diagn. I p. 27.

Ad hanc speciem infaustè specimina Aucherianæ (collect. N° 459 bis et ter) retuli quæ ad *S. argutam* Fenzl spectant; quâ causâ diagnosis sic mutanda.

S. basi suffrutescens multicaulis, brevissimè asperulo-tomentella grisea, caulibus elatis gracilibus supernè dichotomè ramosis, foliis lanceolatis acutis uninerviis basi attenuatis, floribus dichotomiarum longè cæteris breviter pedunculatis, calyce florifero cylindrico-subclavato fructifero clavato tomentello rubello subnervi dentibus oblongis ob-

tusis albo-marginatis ciliatulis, petalis e sicco albis vel flavidis ungue a basi angustiori lineari-cuneatâ apice contractâ, laminâ longiusculâ cuneatâ ad $\frac{3}{4}$ in lacinias lineares bipartitâ, coronæ bipartitæ lobis oblongo-linearibus integris, capsulâ oblongâ carpophoro sublongiori calycem æquanti, seminibus.....

Hab. in monte *Dalmkou Persiæ borealis* Aucher N° 4208, in monte *Elbrus* proprè *Derbend* et *Passgala* Kotschy N° 207 et 273.

S. arguta ab hac specie differt foliis rigidis nervosis plurinerviis calyceque argutè costato, appendicibus corollæ truncatis, carpophoro breviori. *S. Montbretiana* affinis quoque calyce breviori obconico obovato dentibus acutis tamen differt.

Specimina e. coll. Kotschy Pers. bor. N° 508 et 489 sub *S. eriocalycinâ* non ad hanc speciem sed ad *S. albescentem* Boiss. spectant.

SILENE GRISEA Boiss.

S. perennis cæspitosa, rhizomate crasso, foliis densè tomentello-griseis oblongo-spathulatis obtusis acutiusculisve in petiolum attenuatis radicalibus numerosis congestis caulinis paucis superioribus brevibus linearibus, caulibus tenuibus simplicissimis ad nodos subincurvis supernè viscidis 5-6 floris rariùs unifloris, floribus breviter pedicellatis remotiusculè oppositis solitariisve terminalibus ternis, calyce florifero oblongo-clavato viridi hirtulo obsoletè rubello vel nigricanti-lineato dentibus triangularibus acutiusculis latè albo-marginatis, petalis angustè linearibus ungue glabro in laminam flavido-virentem ad $\frac{3}{4}$ in lacinias lineares bipartitam subdilatato, coronâ minimâ bipartitâ, capsulâ pedunculo incurvato suffultâ cernuâ oblongâ calycem distendenti eoque paulò longiori carpophoro crasso eâ triplò breviori suffultâ, seminibus, minimis reniformi-compressis tenuissimè subrugulosis dorso subcanaliculatis.

Hab. ad rupes calcareas *Libani* suprâ *Eden*, in montosis proprè *El-malu Lyciæ* ex herb. Pestalozza.

Folia cæspitosa cum petiolo pollicaria ferè 3 lineas lata, caules pedales tenues, calyx ferè 5 lineas longus herbaceo-subcoriaceus, capsula 5 lin. longa crassiuscula. Habitu valdè affinis *S. leucophyllæ* Boiss. quæ distinguitur dentibus calycis obtusioribus, capsulâ carpophoro æquilongâ. Forma uniflora refert quoque *S. flavescens* W.K. quæ autem caulibus filiformibus, calycis subhyalini dentibus subulatis longè differt.

SILENE LIBANOTICA Boiss.

S. perennis glauco-virens caudiculis repentibus induratis cylindricis caules tenues subsulcatos erectos simplices vel parè et oppositè ramosos glabros supernè viscidulos edentibus, foliis subcoriaceis glabris inferioribus oblongo-spathulatis obtusis in petiolum brevem basi ciliatum angustatis caulinis paucis oblongo-linearibus acutis basi connatis, floribus 3-5-7 nis ad apicem ramulorum solitariis et in apice caulis ternis pedicello recto calycem æquanti vel eo paulò longiori suffultis, calyce glaberrimo obconico-oblongo coriaceo-membranaceo albido subnervi dentibus triangularibus albo-marginatis breviter acuminatis; petalis lineari-cuneatis flavo-virentibus subcoriaceis laminà cuneatà in 2 lobos lineari-oblongos ad medium usquè bipartitâ, coronâ ad 2 gibbos reductâ, genitalibus longiusculè exsertis, capsulâ oblongâ carpophoro æquilongo suffultâ.

Hab. in altioribus *Libani* suprâ *Cedros*. Legi Jul. 1846.

Planta 1½-4 pedalis, folia radicalia cum petiolo pollicaria 4 lin. ferè lata naturæ eorum *S. inflatæ*, calyx 6 lin. longus. Affinis *S. pedunculari* Boiss. quæ differt foliis longis lato-linearibus, floribus longè pedunculatis, calyce paulò longiori minùsque conico et *S. Armenæ* et *S. radicosæ* quæ distinguuntur quoque formâ foliorum aliisque notis. Accedit quoque ad *S. Nevadensem*.

SILENE MAKMELIANA Boiss.

S. perennis glabra glauco-virens, caudicibus prostratis suffrutescentibus surculos elongatim foliosos caulesque ascendentes elongatos tenues teretes infernè foliosos supernè subviscidos 1-3 flores edentibus, foliis tenuibus oblongo-lanceolatis vel lanceolato-linearibus uninerviis acutissimis basi longè angustatis margine et subtus ad nervos serrulato-scabridis superioribus angustissimè linearibus, floribus pedicello calyce pluries longiori recto suffultis magnis, calyce clavato basi longè attenuato coriaceo albido glabro tenuissimè 10 nervi dentibus ovato-triangularibus acutiusculis infernè latè albo-membranaceis ciliatulis, petalis e sicco flavo-virentibus laminà cuneatâ obcordato-bilobâ, capsulâ oblongâ calycem distendenti carpophoro æquilongo suffultâ, seminibus magnis reniformi-compressis eximè rugulosis dorso canaliculatis.

Hab. in *Libano* ad radices cacuminis *Makmel*, hùc quoque spectant

specimina e monte *Kuh Dāna* Persiæ australis N° 626 sub *S. Schimperianæ* β . *latifoliâ* Fenzl.

Folia majora vix pollicem longa supernè 2 lin. lata, caules 1-1 $\frac{1}{2}$ pedales, calyx florifer pollicaris, semen lineam et ampliùs longum. Habitus præcedentis sed folia multò angustiora, calyces duplò longiores. Inter omnes magis affinis *S. Schimperianæ* Boiss. quæ differt caule crasso ad nodos inflato a basi divaricatim ramoso, foliis longioribus rigidis, dentibus calycis acutioribus, floribus suprâ bracteolas brevissimè pedunculatis. *S. buplevroides* differt foliis elongatis bracteisque longè acuminatis, floribus breviter pedunculatis etc.

SILENE CARAMANICA Boiss. et Heldr.

S. perennis basi suffrutescens caudicibus cæspitosis surculos steriles breves caulesque numerosos glabros rectos foliosos ad nodos subincrassatos simplices vel parçè et alternè ramulosos edentibus, foliis inferioribus angustè lanceolato-linearibus longis acutis infernè longè angustatis, caulinis linearibus, supremis angustè linearibus abbreviatis omnibus carnosulis glauco-virentibus sub lente papillari-scabris, floribus magnis ad apicem ramorum et caulis solitariis longè pedunculatis, calyce florifero obconico-cylindrico fructifero clavato basi longè attenuato coriaccissimo subnervi albido-rubello glaberrimo punctis elevatis sæpè exasperato dentibus lanceolatis rigidis subpungentibus tandem patentibus, petali lineari-cuneati laminâ coriaceâ ad tertiam partem bifidâ lobis oblongis, coronâ in 2 laciniâs triangulares acutissimas bipartitâ, capsulâ oblongâ calycem subæquanti carpophoro crassiusculo suffultâ, seminibus reniformi-compressis rugulosis dorso canaliculatis.

S. buplevroides pl. Heldr. Anat. exs. 4846. non L.

Hab. in vineis propè *Bounarpatchi* inter *Karaman* et *Ermenek* Isauriæ (Heldreich).

Caules pedales, folia longiora 3 poll. longa apice 2-2 $\frac{1}{2}$ lin. lata, calyx circ. pollicaris. A. *S. Makmelianâ* differt foliis elongatis crassiusculis asperis dentibusque calycis acutissimis, a *S. buplevroidi* cui magis affinis caulibus simplicioribus nunquam paniculatis, foliis asperis magis carnosius superioribus non longè acuminatis, dentibus calycis rigidioribus minùs longè et tenuiter acuminatis.

SILENE LYCIA Boiss.

S. perennis virèns minutissimè glanduloso-tomentellâ, caudicibus

tenuibus suffrutescentibus prostratis surculos steriles breves caulesque simplices vel ramulis binis oppositis auctos apice trichotomè trifloros rariùs unifloros edentibus, foliis lineari-lanceolatis acutis rigidis subtùs elevatim trinerviis venulosisque in petiolum attenuatis, caulinis paucis linearibus subrecurvis, floribus pedunculo calyce 3-4 plò breviori suffultis, calyce florifero longè cylindrico infernè subattenuato fructifero clavato tenerè membranaceo rubello-lineato plicatulo glanduloso-hirtuto dentibus oblongis obtusis albo-marginatis, petalorum laminà cuneato-bipartitâ, coronâ...; capsulâ ovatâ apice attenuatâ carpophoro æquilongo suffultâ, seminibus...

Hab. in monte *Akdagh Lyciæ* ubi legit amic. Dr Pestalozza qui mihi benevolè communicavit.

Caules 7-9 pollicares, folia cum petiolo ferè pollicaria sesquilineam lata, calyx florifer ferè pollicaris. A. *S. buplevroidi* et affinibus pubescentiâ, calyce subplicato tenero nec coriaceo pubescenti-glanduloso facilè differt. Magis affinis *S. Sieberi* Fenzl. — *S. cæsiæ* Sieber non Fl. Græca quæ differt foliis inferioribus ovato-spathulatis obtusis nec rigidis nec nervulosis, calyce glabro 40 lin. tantum longo etc.

SILENE NODULOSA Boiss. var. *Schiraziana*. — Tota pilis brevissimis retrorsis tomentella densè multicaulis, caulibus pedalibus erectis stric-tis densissimè confertis simplicibus vel basi ramosis angulatis foliosis, floribus terminalibus solitariis rariùs binis brevissimè pedicellatis, calyce etiam florifero clavato retrorsum densè et breviter tomentello 9-40 lin. longo, capsulâ ovatâ carpophoro æquilongo suffultâ.

Hab. in rupestribus apricis ad monumentum *Nakschi Rustam* propè *Schiraz* Kotschy pl. Pers. aust. N° 303.

A plantâ genuinâ Persiæ borealis cui foliis angustè lineari-subtri-quetris crassiusculis elongatis congruit discrepat caule vix ramoso, calyce breviori retrorsum tomentello subnervi, carpophoro breviori, et intermediam formam præbent specimina in Kotschy pl. Pers austr. N° 653 e monte *Kuh Daëna*, uniflora quoque sed calycibus longioribus lineatis *S. nodulosæ* veræ donata.

SILENE PARNASSICA Boiss. et Spruner.

S. perennis viridis lente scabrida cæspitosa tenera caudiculis filifor-mibus fragillimis caules pumilos ascendentes geniculatos filiformes in-fernè foliosos supernè nudos unifloros surculosque steriles edentibus,

foliis angustè linearibus acutis basi subattenuatis, calyce obconico glabro membranaceo crassiusculo enervi virescenti vel violaceo dentibus triangularibus acutiusculis albo-marginatis, petalis e sicco albis lineari-cuneatis, laminæ ad medium usquè bifidæ lobis oblongis, coronæ minimæ bipartitæ lobis oblongis acutiusculis, capsulâ...

Hab. in monte *Parnasso* (Spruner).

Valdè affinis *S. petreæ* a quâ differt caule basi tantum nec totâ longitudine folioso medium versus 2 foliis brevissimis instructo, calyce enervi minus tenerè membranaceo acutiùs dentato, petalis substantiæ crassioris, laminâ breviori et angustiori. Forsàn huc ut varietas vel saltem species affinis referenda est *Saponaria cæspitosa* Fl. Græc. tab. 389 quæ tantum ex icone foliis paulò latioribus et brevioribus a nostrâ plantâ differt et quæ etsi bistylis exhibita certè Silenis adnumeranda. Numerus styli in hac sectione monstrosè variare videtur et eorum quatuor in *S. Parnassiæ* quoque sæpè observavi.

SILENE OREADES Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.

S. densè pulvinari-cæspitosa nana, caudiculis intricatis nudis apice densè et confertim foliosis, foliis angustè linearibus crassiusculis obtusis basi ad margines retrorsum ciliatulis cæterum glabris, caulibus unifloris filiformibus brevibus 4-2 paria foliorum brevium ferentibus supernè puberulo-viscidis, calyce puberulo-glanduloso obconico anthesi peractâ subclavato tenuiter membranaceo albo nigroque vittato dentibus oblongis nigricantibus obtusis latè albo-marginatis, petalis e sicco albidis subtus rubellis cuneatis, ungue ciliato in laminam ad medium usquè bifidam sensim dilatato, coronæ bipartitæ lobis oblongis obtusis, capsulâ ovatâ carpophoro eâ paulò breviori suffultâ, seminibus...

Hab. in fissuris rupium montis *Gheidagh Pamphyliæ* suprâ *Alaya* et montis *Stavros Pisidiæ* (Heldreich).

Folia 2-3 lin. longa 1½ lin. lata in pulvinum congesta, scapi bipollicares, calyx vix 3 lin. longus. Species pulchella ex affinitate præcedentis et *S. petreæ*, notabilis foliis crassiusculis obtusis glabris calyceque eximie nigro-vittato.

VELEZIA FASCICULATA Boiss.

V. annua, caulibus pumilis paulò suprâ basin dichotomè ramosis, supernè præsertim glanduloso-hirsutis, foliis angustè linearibus su-

pernè attenuatis acutis rigidulis subtùs trinerviis margine ciliatis basi inter se connatis, floribus sessilibus in fasciculos densos 5-9 flores ad ramorum apicem congestis, calyce viridi tenuiter cylindrico valdè hirsuto-viscido tenuiter 15 nervi dentibus brevissimis lineari-subulatis inæqualibus, petalis angustissimè linearibus limbo brevissimè exserto pallidè roseo indiviso vel obsoletè retuso, capsulà calyce paulò longiori, seminibus oblongis complanatis canaliculato-concavis radiculà abruptè terminatis.

Hab. in montosis Syriæ borealis inter fluvium *Orontem* et urbem *Laodiceam*. Legi Jun. 1846.

Specimina mea 4-6 poll. longa, calyces eis *V. rigidæ* paulò breviores 6 lin. longi sed subcrassiores. Ab hac specie egregiè differt floribus non secus caulem axillaribus sed terminalibus fasciculatis, petalorum minùs exsertorum laminà vix retusà nec bifidà, capsulà apice exsertà, seminibus æquilongis sed duplò latioribus.

JORDANIA Boiss. et Heldr.

Heterochroæ sp. Jaub. et Sp. Illustr. pl. Or. I tab. 12 et 13.

Calyx tubulosus membranaceus 5 nervius brevissimè et inæqualiter 5 dentatus. Petala 5 cupulæ membranaceæ hypogynæ summo margini cum staminibus inserta lineari-cuneata ungue sensim in laminam parvam dilatato. Filamenta filiformia alternatim inæqualia. Ovarium breviter stipitatum uniloculare panci-ovulatum ovulis campylotropis, placenta centrali abbreviatà. Styli duo filiformes papilloso. Capsula minima substipitata calyce multò brevior ab apice ad basin in 4 valvas dehiscens 2-3 sperma. Semina reniformi-subcompressa sub lente minutè tuberculata. Embryo periphericus radiculà inferà in rostellum productà. — Herbæ perennes orientales foliis subulato-setaceis strictis basi connatis, floribus parvis in cymas fasciculiformes densas bracteatas squarrosas terminales sessiles vel breviter pedunculatas facillimè secedentes confertis, calyce 2 bracteis setaceis basi connatis suffulto, facie *Queriam*, *Minuartam* vel *Arenariam aggregatam* referentes.

Genus cl. Al. Jordan Lugdunensi plantarum Galliæ indefesso strenuoque scrutatori dicatum, ab *Heterochroæ* (quæ nobis *Gypsophila* tantum sectio) calyce angustè tubuloso basi bracteato breviter et inæqualiter dentato, staminibus inæquilongis et præterea habitu alienis-

simo omninò Alsineo diversum. Omnia habet *Acanthophylli*, inflorescentiam, capitula bracteata facillimè decidua, calyces bracteatos subinæqualiter dentatos, seminum formam et ab eo tantum differt capsulâ quadrivalvi nec transversè lacerâ.

JORDANIA MINUARTIOIDES Boiss. et Heldr. in pl. Anatol. 1846.

J. cæspitosa hispidula caulibus ascendentibus vel prostratis ramulosis, foliis subulatis rigidulis, bracteis subulatis apice subrecurvis, fasciculis plurifloris densis, petalis lineari-cuneatis apice retusis.

Heterochroa minnartioides Jaub. et Sp., loc. cit. tab. 12.

Hab. in Phrygiâ propè *Selenti* (Jaub.), in collibus aridis propè *Egirdir* Pisidiæ (Heldr.), propè *Elmalu* Lyciæ (Pestalozza).

β. *compacta* Boiss. et Heldr. loc. cit. — Speciei quod folia et flores similis sed caules subnulli, fasciculi florum e pulvino vix exserti.

Hab. in collibus aridis inter *Beychehr* et *Koniah*. (Heldr.)

JORDANIA SPERGULÆFOLIA Boiss.

J. hispidula caudiculis fruticulosis repentibus, ramis rectis brevibus foliosis apice fasciculos paucifloros subsolitarios ferentibus, foliis bracteisque filiformibus, petalis lineari-cuneatis integris.

Heterochroa spergulæfolia J. et Sp. loc. cit. tab. 13.

Hab. in Phrygiâ cum specie præcedenti. (Jaub.)

A specie præcedenti differre videtur caulibus fruticulosis magis elongatis, foliis longioribus, capitulis paucifloris, petalorum formâ.

BUFFONIA BRACHYPHYLLA Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1846.

B. perennis glabra, caudiculis suffrutescentibus tenuibus prostratis caules filiformes ascendentes simpliciusculos adpressè foliosos edentibus, foliis minutis subulatis cauli adpressissimis internodio brevioribus basi connatis infernè subdilatis membranaceo-marginatis ciliatulis dorso infernè trinerviis, floribus ad axillas superiores sitis et terminalibus 4-3 nis approximatis pedicello brevissimè hirtulo sæpè cernuo calycem æquantibus vel eo longiori suffultis, sepalis angustè lanceolatis adpressè et parallelè quinquenerviis acutis angustè albo-marginatis virenti-cærulescentibus, petalis albis orbiculatis brevissimè stipitato-ungiculatis calycem dimidium æquantibus, staminibus octo,

capsulâ calyce breviori, seminibus complanatis ovatis disco læviusculis ad marginem latum eximè tuberculatis.

Mæhringia stricta Fl. Græc. tab. 362.

Hab. in saxosis montium *Sphacioticorum* rara, monte *Hagio Theodoro*, *Hellino Seli* alt. 5500-7000'.

Caules tenuissimi bipollicares, folia 2 lineas tantum longa cauli arcuè adpressa, calyx ferè 2 lin. longus; ab omnibus speciebus generis hisce notis et antheris octonis distincta. Nomen specificum *Sibthorpium* huic speciei minùs quàm aliis generis speciebus congruens negligere debui.

ALSINE TENUIFOLIA Cr. var. *maritima* Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1847. — Glabra viridis, caulibus abbreviatis ramis pedicellisque strictissimis, petalis nullis, staminibus quinis, capsulâ cylindrico-conicâ calycem æquanti, seminibus dorso obsoletissimè tuberculatis.

Hab. gregariè in arenosis maritimis ad *Cydoniam* (Heldreich fine Martis).

Varietas strictitie foliorum ramorum et pedicellorum notabilis. *Alsine mucronata* Fl. Græca videtur quoque forma *A. tenuifoliæ* huic affinis sed petalis abbreviatis donata.

ALSINE BILLARDIERI Boiss. (Sect. *Minuartiæ*.)

A. annua pumila a basi ramosa tota pilis tenuibus patulis glandulosis obsita, foliis viridibus gramineis planis linearibus acutis 5-7 nerviis elongatis internodia superantibus, cymis paucifloris ab ortu sæpè racemiformibus, floribus in dichotomiis sitis terminalibusque pedunculo tenuissimo recto calyce longiori suffultis magnis, sepalis glanduloso-hispidulis inæquilongis angustè lanceolatis subulato-attenuatis trinerviis herbaceis, petalis ovali-oblongis calyce triplò brevioribus, staminibus 40 subinæqualibus, capsulâ (ex Labill.) oblongâ trivalvi, seminibus reniformibus ambitu rugoso-tuberculatis.

Arenaria globulosa Labill. Déc. pl. Syr. Déc. 4 tab. 3.

Hab. in Libano ad *Tripolim* Syriæ (Labill.), in cultis ad radices montis *Sinai* (Boiss.).

Planta 3-4 pollic., folia inferiora ferè pollicem longa basi lineam lata, calyces floriferi 4 lin. longi. Species foliis latis herbaceis, floribus magnis a sequentibus quibuscum confusa fuit distinctissima. Nomen specificum *Billardieri* neglexi ut improprium et speciei sequenti jam tributum.

ALSINE MEYERI Boiss. (Sect. *Minuartiæ*.)

A. annua pumila pilis brevibus patulo-crispulis viscidulis obsita, caulibus basi simplicibus dein strictè ramosis, foliis a basi latiori attenuatis lineari-subulatis strictis rigidiusculis sub 7 nerviis internodiâ superantibus, cymis axillaribus fasciculiformibus breviter pedunculatis terminalibusque paniculam brevem strictam formantibus, floribus mediocribus pedicello valdè glanduloso-hispido calyce breviori suffultis, sepalis glanduloso-hispidis lanceolatis subpungentibus inæqualibus quinquenerviis nervis lateralibus marginantibus, petalis oblongis utrinquè attenuatis calyce quadruplò brevioribus, filamentis 10 valdè inæqualibus, capsulâ oblongo-trigonâ calyce paulò breviori ab apice ad basin, trivalvi seminibus reniformi-compressis subangulatis minutè tuberculatis radiculâ in rostellum elongatum obtusum productâ.

Arenaria globulosa var. C. A. Meyer Ind. Cauc.

Hab. in tractu *Swant* prov. *Talysch*. (Hohenack.) (C. A. Mey.), in *Syriâ*. (Boiss.)

Planta 4-5 poll. stricta, folia 8-10 lin. longa 1½ lata, calyx 3 lin. longus. A præcedenti diversissima habitu strictiori, inflorescentiâ, foliis multò angustioribus et brevioribus duriusculis strictis nec teneris, floribus dimidiò minoribus, sepalis multò minùs elongatis attenuatisque 5 nec 3 nerviis. Affinis quoque habitu et florum magnitudine *Als. irregulari* Vis. — *A. Smithii* Fenzl. — *Aren. fasciculatæ* Fl. Græc. non Gouan quæ longè differt indumento glandulosissimo, floribus subsessilibus horizontaliter patentibus, sepalis mucronato-aristatis, petalis orbiculatis.

ALSINE BREVIS Boiss. (Sect. *Minuartiæ*.)

A. annua pumila tota breviter pubescenti-glandulosa, caulibus nanis sæpè subnullis simplicibus vel ramosis, foliis lineari-subulatis strictis rigidiusculis sub 7 nerviis internodio longioribus, cymis axillaribus in paniculam sæpiùs corymbosam terminalem approximatis, floribus pedicello erecto tenui calyci æquilongò suffultis, sepalis patulè hispidulis inæquilongis lanceolatis attenuato-acuminatis trinerviis demùm apice patulo-incurvis, petalis oblongis calyce triplò brevioribus, staminibus decem subæquilongis, capsulâ oblongo-triquetrâ ab apice ad basin trivalvi calyce paulò breviori, seminibus reniformi-orbiculatis subcompressis minutè tuberculatis radiculâ prominulâ.

Hab. in *Arabia petraea* Schimp. N° 446 et Boiss., Persia propè *Teheran* Kotschy pl. Pers. bor. N° 22 et ad *Dalmkou* Aucher N° 4264, in arenosis montis *Cadmi* Cariae (Boiss. forma viscidior).

Planta 1½-1 1½ pollic. similis præcedenti sed distincta paniculâ abbreviatâ subcorymbosâ, calyce paulò minori apice magis attenuato-acuminato subrecurvo, sepalis 3 nec 5 nerviis, staminibus æquilongis, seminibus magis rotundatis plùs dimidiò minoribus. *Ab A. montana* Boiss. — *A. campestris* Fenzl non Boiss. floribus nec sessilibus nec squarroso-bracteatis aliisque notis longius differt.

ALSINE ANATOLICA Boiss. (Sect. *Minuartiæ*.)

A. perennis basi suffrutescens secùs caules et foliorum basin minutissimè pilis patulo-deflexis puberula supernè glaberrima, caulibus filiformibus flexuosis simplicibus vel parcè ramosis apice densiusculè cymoso-corymbosis, foliis a basi trinervi latiori subitò attenuatis subulato-setaceis strictis plerumquè cauli adpressis internodio brevioribus axillis inferioribus fasciculiferis, bracteis pedicellum æquantibus vel subsuperantibus, floribus pedicello eis æquilongo sæpiùs breviori suffultis, calyce glaberrimo basi truncato post anthesin clauso oblongo-cylindrico sepalis subinæquilongis lanceolatis fasciâ viridi nervo albo bipartitâ marginibus albo-scariosis angustiori percursis, petalis oblongis obtusis calyce tertiâ parte brevioribus, staminibus 10 subæquilongis, capsulâ calycem æquanti vel subsuperanti cylindricâ ab apice ad basin trivalvi, seminibus parallelè bicurvis oblongis subcompressis secùs lineas concentricas eximè muriculato-tuberculatis extremitate radiculari longiori.

A. setacea var. *Athoa* Gris. Spicil. Rumel. e descriptione.

Hab. in montibus totius *Anatoliæ* occidentalis, propè *Bolu* Bithyniæ (Pestal.), *Olympo* Bithyno Aucher N° 567 et *Gargaro* Aucher N° 577, *Cadmo* suprà *Denisleh*, *Sypilo* suprà *Magnesiam* et *Tmolò* suprà *Philadelphiam*. (Boiss.) Probabiliter in monte *Atho* Macedoniæ.

Planta 1 1½-1 pedalis, folia majora 4-5 lin. longa, calyces 2 1/4-2 1½ lin. longi; affinis *A. glomerata* et *A. setacea* ab eis foliis cauli adpressis paniculâ corymbosâ densiusculâ quæ ob calyces ferè omninò scariosos albida est facilè dignoscenda. *A. setacea* quæ cum eâ radice perenni congruit præterea differt paniculâ multò laxiori vix corymbiformi, pedicellis calyce pluries longioribus, calycis brevioris ovati sepalis ovatis fasciâ latâ percursis post anthesin non strictis,

petalis calyce longioribus, seminibus reniformibus ovato-rotundis. *A. glomerata* differt indumento canescenti subglanduloso totius plantæ, radice bienni, floribus subsessilibus, inprimis sepalis longissimè setaceo-attenuatis, seminibus minoribus tantum tuberculatis.

ALSINE ERYTHROSEPALA Boiss. (Sect. *Minuartiæ*.)

A. perennis densè cæspitosa glabra, caudiculis filiformibus basi nudis supernè foliis vetustis vestitis caules nanos simplices edentibus, foliis subulato-setaceis basi trinerviis obtusis muticis vel brevissimè mucronulatis strictis ad turiones steriles præsertim falcatis ad basin caulium densè imbricatis ad eorum partem superiorem remotissimis, floribus in cymas terminales densiusculas dispositis rariùs solitariis, pedicellis calycem æquantibus vel superantibus bracteas oblongo-lanceolatas acutas æquantibus, calyce glabro vel sublente brevissimè et parçè hirtulo basi truncato oblongo sepalis æquilongis oblongo-lanceolatis acutis fascià viridi nervo bipartitâ marginibus rubellis submembranaceis æquilatâ percursis, petalis oblongis obtusis calyce paulò longioribus, staminibus æquilongis, capsulâ...

Hab. in regione superiori *Tmoli* proprè *Bozdagh* in *Lydiâ* et in fallor quoque in *Olympe Bithyno*. (Boiss.)

Densè cæspitosa caulibus 2-3 pollicaribus, rariùs pulvinaris floribus in cæspite subsessilibus, calyx 4 1/2 lin circ. longus. Species habitu floribus foliisque *A. recurvam* omnimò referens sed ab eâ et affinis sepalis non concoloribus plurinerviis sed uninerviis viridi fasciatis membranaceo-marginatis egregiè diversa.

ALSINE LIBANOTICA Boiss. (Sect. *Minuartiæ*.)

A. perennis glaberrima, caudiculis filiformibus arenâ sepultis caules nanos simplices apice 3-7 flores cymosofas-cicucatos ferentibus, foliis minimis subulatis teretibus obtusis suprâ sulcatis subtus convexis, inferioribus tetrastichè et densissimè imbricatis brevissimis subnerviis superioribus paulò longioribus inter se remotiusculis basi subtus trinerviis, pedicellis calyce paulò brevioribus bracteas triangulari-lanceolatas membranaceo-marginatas acutas æquantibus, calycis glaberrimi ovato-oblongi basi subtruncati sepalis æquilongis oblongo-lanceolatis acutis fascià viridi nervo albo bipartitâ marginibus albo-membranaceis subæquilatâ percursis, petalis oblongis obtusis calyce sublongioribus, staminibus 10 æquilongis, capsulâ....

Hab. in arenosis cacuminis *Makmel* Libani ubi legi florif. Jul. 1846.

Caules parte exsertâ foliiferâ 1-1 $1\frac{1}{2}$ pollicares, folia inferiora lineam aut vix paulò amplius longa, superiora 2-2 $1\frac{1}{2}$ lin. longa, calyces vix ultrâ 2 lin. longi. Species affinis *A. setaceæ* sed distinctissima foliis obtusis teretibus brevissimis in parte inferiori caulis eximiè tetrastichis.

ALSINE DIANTHIFOLIA Boiss. (Sect. *Lanceolata*.)

A. perennis glabra vel minutè et patulè glanduloso-pubescens, caudiculis induratis nudis suffrutescentibus apice ramosis caules virgatos elatos angulatos simplicissimos edentibus, foliis abbreviatis linearibus rigidis acutis parallelè 7-9 nerviis turionum sterilium approximatis squarroso-patulis caulinis erectis basi longiusculè connatis internodio multò brevioribus, floribus 3-4 in cymam fasciculiformem terminalem aggregatis, pedicello calyce bracteisque oblongis acutis membranaceo-marginatis dorso parallelè multinerviis paulò breviori, calyce glabro vel parcè glanduloso-hirtulo oblongo-cylindrico, sepalis coriaceis oblongo-lanceolatis acutis angustè albo-marginatis dorso parallelè 9-13 nerviis, petalis oblongis obtusis calyce tertiâ parte brevioribus, staminibus 10 inæquilongis, capsulâ brevi trivalvi, seminibus....

Hab. in monte *Akdagh* Lyciæ ubi legit cl. Dr. Pestalozza.

Caules $1\frac{1}{2}$ -4 pedales, folia caulina majora 6-9 lin. longa lineam circ. lata, calyces 3 $1\frac{1}{2}$ -4 lin. longi. Species distinctissima nulli propiùs affinis habitu *Arenarias* e Sect. *Eremogone* quodammodo referens sed huic sectioni ob sepala foliaque multinervia referenda.

ALSINE PESTALOZZÆ Boiss. (Sect. *Lanceolata*?)

A. caespitosa perennis, caudiculis foliis vetustis densè vestitis ramosis turiones abbreviatis spinoso-squarrosos caulesque pumilos tenues angulatos minutè glanduloso-hirtulos apice 1-3 flores edentibus, foliis glaberrimis lanceolatis rigidis apice longè attenuatis acerosis facie superiori præter 2 nervos marginantes flavidos validos enerviis subtus parte inferiori parallelè multinerviis nervo medio validiori, eis turionum densissimè imbricatis squarrosis, caulinis angustioribus lineari-carinatis basi longiusculè connatis erectiusculis internodio paulò brevioribus, summis bractæformibus basi dilatatis membranaceo-flavidis oblongo-cucullatis longè attenuato-acuminatis, pedicello bracteis non æquanti calyce triplò breviori, floribus maximis, calyce glabro vel sub lente pruinoso-puberulo a basi latiori eximiè truncatâ attenuato cylin-

drico-conico, sepalis longis lanceolatis acuminatis acerosis dorso parallelè 9-13 nerviis margine angustissimè membranaceis, petalis albis ovato-oblongis obtusis calyce quintuplò brevioribus, staminibus 10 subinaequalibus, capsulà calyce multò breviori obtusissimè trivalvi, seminibus...

Hab. in cacuminibus *Cadmi* suprà *Colossam* ubi nondùm floriferam Jun. 1842 observavi, accepi floriferam ex monte *Bereket Dagħ* Lyciæ ab amiciss. Dre Pestalozza lectam.

Omnium *Alsinearum* pulcherrima et princeps. Cæspites cum caulibus 4-5 pollicares, folia turionum rosulas elongatas squarrosas formantia 6-9 lin. longa basi lineam aut paulò ampliùs lata, flores illos *Arenariæ pungentis* referentes sed calyces magis acerosi 7-8 lin. longi. Petala brevissima.

ALSINE VILLARSHII M. K. var. *stricta* Boiss. et Heldr. — *Puberula* folia tenuiter subulata subtriquetra secùs turiones abbreviatos adpressè imbricata stricta, flores terminales solitarii vel bini.

A. Heldreichiana pl. Heldr. exs. 1846.

Hab. in saxosis montis *Gheidagh* Tauri Isaurici alt. 6000'.

Primà fronte ob folia tenuissima stricta 3-4 lin. longa ab *A. Villarsii* diversissimam habueram sed characteres florum iidem et *A. lineata* C. A. Meyer inter eas intermedium præbet.

Arenaria Aucheriana Boiss. Diagn. indicante amiciss. Fenzl. est vera *Alsines* species ob capsulas trivalves et a me priùs tantùm ob speciminis nimiam compressionem ut sexdentatas descriptas; ea *Als. Aucheriana* Fenzl. nominanda est. Planta a me descripta est tantùm forma nana hujus speciei quæ in montibus Persiæ australis etiam 4-6 pollicaris occurrit et *A. juniperinæ* proxima est.

ALSINE SINAICA Boiss. (Sect. *Spergella*.)

A. annua caule abbreviato tereti infernè strictè ramuloso densè folioso, foliis glabris setaceis longissimis strictis apice sæpè patulo-subrecurvis basi parcè ciliatulà breviter connatis suprà planiusculis subtùs convexis in mucronem longiusculum attenuatis, pedunculis folia superantibus pluriès dichotomis, pedicellis capillaribus calyce 2-3 plò longioribus fructiferis deflexis glanduloso-puberulis, sepalis glabris ovato-oblongis planis herbaceis sub lente epunctatis obtusissimis infernè tantùm angustè membranaceis, petalis roseis calyce sesquilon-

gioribus oblongis obtusis, capsulâ calyce longiori, seminibus reniformi-compressis serialiter tuberculatis extremitate radiculari longiori.

Hab. in arenosis jugi *Sinaitici* (Schimp. N° 220, Boiss.), *Persiae borealis* ad *Dalmkou* Aucher N° 4260.

Valdè affinis *A. pictæ* Fenzl. — *Aren. pictæ* Fl. Græc. tab. 440. — *Ar. filiformi* Labill. Dec pl. Syr. quæ dignoscitur foliis abbreviatis basi longiùs copiosiùsque ciliatulis, floribus majoribus, sepalis latius et semper apice membranaceis sub lente præsertim marginè eximiè lineolato-punctatis basi subcarinatis, petalis calyce 2-3 plò longioribus truncato-retusis et quæ in Asiâ minori, Cypro, Syriâ et Palæstinâ crescit.

ARENARIA CASSIA Boiss. (Sect. *Euthalia*.)

A. annua vel biennis sub lente tota brevissimè pubescens multicaulis, caulibus brevibus filiformibus foliosis in cymam foliosam demùm racemiformem laxam paucifloram solutis, foliis subsessilibus ovatis obtusis mucronulatis obsoletè plurinerviis sub lente tuberculis minimis piligeris obsitis, pedicellis calyce triplò longioribus semper erectis, calycis breviter et patulè piloso-viscidi sepalis ovatis acutis elevatim trinerviis exterioribus angustè interioribus latius albo-marginatis fructiferis capsulæ arcuè adpressis, petalis oblongis obtusis calyce triente brevioribus, capsulâ ovatâ in collum 6 dentatum e calyce exsertum attenuatâ, seminibus reniformibus transversè latioribus crebrè tuberculatis.

Hab. in sylvaticis regionis super. montis *Cassii* Syriæ borealis. Legi fructiferam Junio 1846.

Caules prostrati 3-5 pollicares, folia 2-3 lineas longa lataque, capsula 2 1/2 lin. longâ ferè 2 lata. Affinis *A. serpyllifoliæ* a quâ differt sepalis ovatis nec elliptico-lanceolatis multò latioribus minùsque acuminatis, capsulâ majori in collum calyce exsertum attenuatâ nec ovoidèâ calyci æquilongâ, seminibus plùs duplò majoribus acutiùs tuberculatis. *A. conferta* quoque affinis differt indumento cinerascenti, foliis confertis, pedicellis calyce brevioribus, sepalis lanceolatis, petalis calycem æquantibus.

ARENARIA TREMULA Boiss. (Sect. *Euthalia*.)

A. annua, caule sub lente brevissimè pruinoso-papillari tenet tereti infernè approximativè folioso ad foliorum insertionem noduloso infrâ medium dichotomè ramosissimo, ramis strictis capillaribus rigidis,

foliis parvis sessilibus oblongis vel oblongo-lanceolatis utrinquè attenuatis acutis 9-11 nerviis margine scabriusculis ramealibus angustatis oblongo-linearibus, pedunculis setaceis rectis rigidulis flore multoties longioribus, floribus parvis, calycis glaberrimi ovato-sphærici sepalis ovato-oblongis apice attenuatis subacuminatis medio viridibus trinerviis margine lato albo-membranaceo cinctis, petalis oblongis obtusiusculis calyce triente brevioribus, capsulâ ovato-subglobosâ lente punctulatâ calyce sublongiori, seminibus reniformi-globosis subcompressis tenuissimè et seriatim tuberculatis.

Hab. in sylvaticis jugi *Cassii* in *Syriâ boreali*. Legi fructiferam Jun. 1846.

Planta circ. semipedalis, folia 3-4 lin. longa 1 1/2-2 lata, pedunculi 8-10 lin. longi ramique tenuissimi rigiduli duri, calyx lineam longus, capsula 1 1/2 lin. longa; formâ capsulæ quoque affinis *A. serpyllifoliæ* a quâ dignoscitur inflorescentiâ ramosissimâ dichotomè strictâ et pedunculorum longitudine, habitu magis affinis *A. oxypetalæ* et speciei sequenti quæ caulibus ramisque fragilibus, calyce elongato, foliis petiolatis longius differunt.

ARENARIA PAMPHYLICA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Euthalia*.)

A. annua tota sub lente brevissimè pruinoso-tomentella tenera, caule tenui filiformi pumilo erecto a basi vel supernè strictè et dichotomè ramoso folioso foliis parvis teneris pellucidis enerviis inferioribus breviter ovatis vel deltoideis obtusis mucronulatis vel acutiusculis, in petiolum eis æquilongum vel longiorem basi breviter contractis superioribus elliptico-linearibus vel angustè linearibus acutis floribus in paniculam laxam subcorymbosam paucifloram dispositis minimis pedunculo setaceo recto fructifero erecto-patulo eis 3-6 plò longiori suffultis, calycis hirti ovati sepalis angustè lanceolatis acuminatis obsoletè trinerviis angustissimè albo-marginatis, petalis obovato-spathulatis obtusissimis calyce tertiâ parte longioribus, capsulâ oblongâ calyce tertiâ parte longiori, seminibus reniformibus transversè oblongis tenuiter tuberculatis.

Hab. ad lapides et muros amphitheatri urbis *Perge* in Pamphylia (Heldreich), in Lyciâ propè *Castelrosso* (Pestalozza).

Planta tenera gracillima 2-3 rariùs 5-6 pollicaris, folia inferiora 2-3 lin. longa lataque petiolo sæpè 5 lin. longo suffulta, pedicelli 3-5 lin.

longi, calyces lineam longi. Facie et characteribus proxima *A. oarypetalæ* Sibth. — *A. Rhodiæ* Boiss. quæ egregiè differt floribus duplò majoribus, sepalis plurinerviis nervis anastomosantibus, capsulà calycem vix excedenti, petalis lanceolatis acutis.

ARENARIA NANA Boiss. et Heldr. (Sect. *Euthalia*.)

A. annua tota breviter glanduloso-hirta viscida, caulibus a collo 1-3 nanis sæpè subnullis densiusculè foliosis apice 1-3 flores inter folia suprema subsessiles majusculos ferentibus, foliis infimis angustè linearibus infernè attenuatis superioribus sessilibus ovatis omnibus obtusiusculis trinerviis, calycis ovato-conici valdè glanduloso-hirti sepalis oblongo-lanceolatis acutiusculis trinerviis binis interioribus basi albo-marginatis cæteris immarginatis, petalis oblongis obtusis calyce triplò brevioribus, capsulà.....

Hab. in cacumine *Authenti* montium *Lassiti* Cretæ rarissimè. (Heldreich.)

Specimina quæ vidi 6-8 lin. longa, folia 2-3 lin. longa, calyces 2 1/2 lin. longi. Affinis *A. macrosepalæ* Boiss. quæ differt foliis multinerviis, calycis laciniis acuminatis apice patulo-subrecurvis multò elevatius nervosis.

ARENARIA ACEROSA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Euthalia*.)

A. perennis multicaulis basi suffruticosa, caulibus procumbentibus ramos ascendentes pumilos foliosos glabros edentibus, foliis parvis rigidis setaceo-subulatis triquetris præter margines scabridos glabris tenuissimè acerosis viridibus vel rubellis eis turionum densè et strictè fasciculatis, caulinis strictis internodio brevioribus, floribus 5-9 majusculis terminalibus confertè cymosis pedicello valdè viscido calyci æquilongo vel breviori suffultis, calycis ovati valdè glanduloso-hirti sepalis duris ovato-oblongis breviter acuminato-subpungentibus dorso herbaceo nigricanti convexo-carinatis obsoletissimè subquinquenerviis latè albo-marginatis intùs concavis, petalis oblongis obtusis calyce tertià parte longioribus, capsulà ovatà calyce tertià parte longiori, seminibus...

Hab. in collibus tophaceis aridis calidissimis ad occidentem planitiæ *Koniah* inter hanc urbem et *Beychehr* sitis, Junio (Heldreich), in monte *Bereket Dag* Lyciæ (Pestalozza), in regione alpinà montis *Anemas* (Heldreich).

Planta circ. semipedalis, folia tenuissima 3-4 lin. tantum longa, flores magnitudinis ferè *A. Lessertianæ*. Affinis *A. Ledebourianæ* Fenzl quæ differt glabritie, foliis brevioribus pauloque crassioribus, floribus duplò vel triplò minoribus.

CERASTIUM SCAPOSUM Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1847. (Sect. *Orthodon*.)

C. annuum totum breviter et patulè hirtum viscidulum, caulibus abbreviatissimis simplicibus vel basi semel vel bis dichotomis, foliis oblongis obtusis in petiolum eis breviorē attenuatis præter indumentum brevem margine ciliatis, pedunculis longissimis nudis tenuibus rectis retrorsum et adpressè hirsutis caule longioribus, floribus mediocribus, sepalis pilis adpressiusculis hirsutis ellipticis acutiusculis medio viridibus enerviis latè albo-marginatis, petalis cuneato-spathulatis obtusissimis subretusis calyce paulò longioribus, capsulà oblongo-cylindricà calyce tertià parte longiori valvulis rectis truncatis, seminibus reniformibus subcompressis subangustatis minutè tuberculatis.

Hab. in arenosis montium *Sphacioticorum* suprà *Askyphous* alt. 3000-4000'. (Heldr.)

Caules 6-15 lin. longi, folia cum petiolo 5-6 lin. longa 3 lata, flores 3-10, pedicelli subæquilongi 1 1/2-2 pollic., calyx 2 1/2 lin. longus. Affinis *C. pedunculari* et *laxo* a quibus differt caulibus brevissimis, pedunculis elongatis scapiformibus, petalis vix retusis nec bilobis etc.

Loco *Cerastii cærulei* Boiss. Diagn. I tab. 53 ponè *Mænchia cærulea* Boiss. — *Malachium cæruleum* Jaub. et Sp. Illustr. Hæc planta ut et *Cerastium manticum* infaustè cl. Rchb. ineunte ad genus *Malachium* relatæ fuerunt.

LINEÆ.

LINUM CARNOSULUM Boiss. (Sect. *Eulinum*.)

L. perenne glaberrimum glaucum caudiculis subterraneis cylindricis caules infernè filiformes denudatos inter lapides repentēs supernè exsertos brevissimos densè foliosos simplices edentibus, foliis parvis carnosulis obsoletè uninerviis oblongo-linearibus acutiusculis basi sessili rotundatis vel subtruncatis margine lævissimis, pedicellis 2-3 ter-

minalibus et ex axillis supremis ortis calyce subduplò longioribus infernè sæpè bibracteolatis, sepalis viridibus ovatis obtusis latè albo-marginatis basi prominulâ 5-7 nerviis, petalis... filamentis calyce longioribus basi dilatatis ferè usquè ad ovarii apicem inter se connatis, antheris oblongis sub lente impunctatis, stylis calycem æquantibus, stigmatibus oblongo-capitatis, capsulâ...

Hab. in glareosis *Libani* suprâ *Cedros* ubi legi Jul. 1846.

Caules tenuissimi parte foliiferâ vix bipollicares, folia densa 3-4 lin. longa 4 1/2 lin. lata, pedunculi 5-6 lin. longi, calya 2 lin. longus. Quamvis hanc plantam tantum petalis delapsis et absque fructu legerim hanc descripsi nam inter *Lina cyanantha* insignis est foliis carnosulis densis, pedicellis paucis terminalibus calyceque brevi.

LINUM TMOLEUM Boiss. (Sect. *Eulinum*.)

L. glabrum viride radice, annuâ vel bienni 1-3 caules virgatos tenues teretes foliosos simplices vel medium versùs strictè ramulosos edenti, foliis alternis lanceolatis strictis acutis ramulosè uninerviis margine denticulato-scabris sessilibus obsoletè cordato-auriculatis, racemis demùm elongatis virgatis laxis ad et inter pedicellos bracteatis bracteis oblongo-linearibus acutissimis pedicello brevioribus, sepalis angustè lanceolato-linearibus acutissimis trinerviis basi subcarinatis angustè membranaceo-marginatis margine glandulis sessilibus regularitèr denticulatis, petalis cæruleis calyce subtriplo longioribus, stylis filiformibus antheras multò superantibus in stigmata oblongo-clavata abeuntibus, capsulæ conico-globosæ calyce brevioris pedicello recto subincrassato eâ vix longiori suffultæ valvis in mucronem longum tenuem capsulæ subæquilongum conjunctis, seminibus tuberculato-punctatis.

Hab. in regione sylvaticâ subalpinâ *Tmoli* suprâ *Philadelphiam* in *Lydiâ*, legi Jun. 1842.

Habitus et magnitudo florum *L. alpini*, folia 12-15 lin. longa 2 lin. infernè lata. Species pulchra affinis *L. nervoso* sed egregiè distincta radice non perenni, foliis angustioribus basi subcordatis nec rotundatis nervis 4 nec 3-5 elevatis, sepalis angustioribus.

LINUM VIRGULTORUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. (Sect. *Eulinum*.)

L. glabrum viride radice annuâ vel bienni 1-3 caules virgatos

tenues teretes foliosos medium versùs strictè ramulosos apiceque 2-3 fidos edenti, foliis alternis oblongo-lanceolatis strictis acuminatis margine eximiè sub lente denticulato-scabris basi rotundatis subtrinerviis nervo medio non ramuloso lateralibus duobus ferè obsoletis, racemis demùm elongatis virgatis laxis ad et inter pedicellos bracteatis bracteis oblongo-linearibus acutissimis pedicellos subæquantibus, sepalis ovato-oblongis acuminatis trinerviis basi angustè membranaceo-marginatis supernè margine denticulato-scabris glandulis sessilibus intermixtis, petalis pallidè cæruleis calyce duplò longioribus, stylis stamina non æquantibus stigmata capitata ferentibus, capsulæ globoso-subconicæ calyce paulò brevioris pedicello subincrassato erecto-patulo eà duplò longiori suffultæ valvis apice in mucronem brevissimum coalitis, seminibus lævibus punctulatis nitidis.

Hab. in herbidis inter frutices faucis suprà *Tsimbouckkan Pamphylicæ* sitæ (Heldr. Maio. 1845).

Pedalis, folia sæpè 9 lin. longa basi 4 1/2 lata, flores magnitudinis *L. usitatissimi*; habitu valdè affine speciei præcedenti sed eximiè distinctum foliis minoribus basi rotundatis, sepalis latioribus brevioribus, floribus minoribus, stigmatis formà, etc.

LINUM FLAVUM L. var. *Pamphylicum* Boiss. et Heldr. — Cæspitosum, caulibus pumilis supernè divaricatis ramulosis, foliis radicalibus ovato-spathulatis in petiolum breviter attenuatis obtusis, caulinis oblongo vel lineari-lanceolatis acutis basi subangustatis, sepalis angustis lineari-lanceolatis denticulatis corollam dimidiam subæquantibus.

L. Pamphylicum Boiss. et Heldr. in pl. Anatol. exs. 1846.

Hab. in *Pamphylia* Heldreich.

Quamvis hæc planta habitu a *L. flavo* Austriaco longè differat, in eà notæ essentielles speciei id est folia basi biglandulosa et sepala denticulata occurrunt nec discrimina satis gravia detegere possum.

MALVACEÆ.

ALTHEA DIGITATA Boiss. (Sect. *Alcea* L.)

A. caule elato stricto simplici indumento adpressissimo pilis stellatis constanti aspero, foliis longè petiolatis ferè ad basin usquè digitatim

partitis utrinquè indumento brevi denso velutino supernè nitido pilis simplicibus constanti infernè magis griseo stellato obsitis partitionibus oblongo-lanceolatis obtusis basi angustatis irregulariter lobulatis circumcìrcà obtusè crenulatis margine subcrispis, racemo terminali simplici laxo infernè foliis flores superantibus stipato, floribus subsessilibus amplis, involucello adpressè stellato-tomentoso ultrà medium in lobos acutissimos triangulares diviso obsolete striato, calycis stellato-tomentosi involucrum tertià parte superantis laciniis triangularibus acutis, petalis intensè purpureis obcordatis calyce triplò longioribus unguibus penicillato-ciliatis.

Hab. in collibus Palæstinæ in prov. *Samariâ*. Legi Apr. 1846.

Planta 4-5 pedalis, folia diametro 4-5 pollicaria, flores magnitudinis *A. roseæ* a quâ ut et ab affinibus indumento asperulo formæque foliorum eximiè differt. — Hanc speciem in loco natali pro *A. lavateræflorâ* DC. habueram sed hæc ex descriptione et ex specimine archetypo herb. Candolleani differt indumento hirsuto, foliis vix ad medium lobatis, involucri et calycis lobis obtusis et verosimiliter nihil est nisi *A. roseæ* forma. Libanus ex errore ut ejus patria a cl. DC. indicatus fuit nam specimen unicum herb. Candolleani, descriptioni mirè congruens, ex itinere Urvilleano orientali et igitur ex Archipelago vel Byzantii viciniis nec e Syriâ oritur.

ALTHÆA SETOSA Boiss. (Sect. *Alcea*.)

A. caule elato stricto simplici setis e tuberculo fasciculatis deflexis longis hispido inter eas glabro, foliis cordato-subrotundis plus minus obtusè 5-7 lobis crenatis pilis faciei superioris subsimplicibus nitidis adpressis inferioris fasciculato-stellatis tomentellis sæpè glabrescentibus, petiolis retrorsum et sparsim fasciculato-setosis, racemo terminali elongato laxo, pedunculis solitariis vel binis flavido-villosissimis involucello æquilongis, involucello longè et densè stellato-tomentoso ultrà medium in lobos acutos triangulari-lanceolatos diviso calyce vix breviori, calycis stellato-tomentosi laciniis vix striatis oblongo-triangularibus obtusis, petalis incarnatis obcordatis calyce triplò longioribus ad ungues penicillato-ciliatis.

Hab. in collibus *Samariæ* et *Galilææ* in consortio sp. præcedentis.

Planta 4-6 pedalis in Palæstinâ *A. roseæ* vices agens, ab eâ distincta caulibus deflexim setosis nec tomentosis, involucello calycem subæ-

quantum, calycis lobis obtusis nec acutis. Cum *A. digitata* hybridas formas gignit.

ALTHÆA REMOTIFLORA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. 1846. (Sect. *Alcea*.)

A. perennis a basi multicaulis tota pilis stellatis densè pulverulento-scabrida, caulibus ascendentibus tenuibus infernè foliosis in racemum longum laxiflorum abeuntibus, foliis flavo-virentibus inferioribus longè petiolatis ambitu cordato-subrotundis profundissimè palmatim 5-7 lobis, lobis oblongis vel oblongo-linearibus basi subattenuatis obtusissimis denticulatis lateralibus brevioribus, foliis floralibus parvis breviter petiolatis ferè ad basin tripartitis, pedicellis solitariis brevissimis, involucelli sexlobi lobis triangularibus acutis calyceque stellato-tomentosis, calycis involucello duplò longioris laciniis triangulari-lanceolatis acutis obsolete multistriatis, petalis pallidè roseis obcordatis calyce plus duplò longioribus ad unguem penicillato-ciliatis, carpellis puberulis dorso sulcatis utrinquè transversè sulcato-rugosis.

Hab. in campis mari finitimis versus fluvium *Catarrhactum* Pamphyliae (Heldreich) Julio.

Folia inferiora majora diametro tantum bipollicaria, folia eis *A. roseæ* dimidiò minores; ab *A. lavateræ* florà involucello brevissimo, ab *A. fœtifolià* indumento crasso aspero foliorum, floribus roseis nec luteis, ab utrâque caulibus humilioribus tenuioribus distincta.

ALTHÆA SULPHUREA Boiss. et Hohen. in pl. Kotsch. Pers. bor. 1846. (Sect. *Alcea*.)

A. perennis a basi multicaulis basi suffrutescens tota densè pannoso-flavescent, caulibus erectis rigidis simplicibus vel parè ramosis infernè foliosis supernè in racemum brevem pauciflorum laxum abeuntibus, foliis crassis petiolo eis subæquilongo suffultis ovatis obtusè crenulatis integris vel obsolete multistriatis repando-trilobis inferioribus obtusis basi rotundatis superioribus acutiusculis basi cuneatis, floralibus oblongis parvis, pedunculis solitariis involucello subæquilongis tomentosis crassis, involucello sexfido calyceque estriatis densè et longè tomentosis hoc vix longiori laciniis utriusque triangulari-lanceolatis acutis, petalis sulphureis calyce plus duplò longioribus ad unguem ciliato-penicillatis, carpellis facie dorsali subsulcatis laterali profundè scrobiculato-rugosis junioribus stellato-tomentosis.

Hab. ad radices montis *Demawend* loco *Gerdene Kutschek* dicto Kotschy N° 624.

Caules 1 1/2 pedales, folia majora sesquipollicem longa, flores illis *A. roseæ* dimidiò minores. Pulchra species propè *A. striatam* collocanda.

MALVA OXYLOBA Boiss. (Sect. *Fasciculatæ*.)

M. annua multicaulis caulibus diffusis ascendentibusve ramosis glabriusculis rubellis, foliis petiolo longo parcè hirsuto suffultis ambitu rotundis basi sinu apertissimo cordatis profundè 3-5 fidis lobis cuneatis supernè dilatatis profundè divisis in lacinias lanceolatas acutissimas integras vel trifidas ad nervos glabris vel pilosulis, floribus axillaribus 3-4 petiolo eis æquilongo vel 2-3 plò longiori suffultis, petalis pallidè roseis calyce vix sesquilingioribus cuneato-truncatis retusis, sepalis exterioribus lineari-setaceis brevioribus interioribus oblongis acuminatis reticulato-nervosis glabris margine ciliatis, fructus receptaculo centrali depressissimo, carpellis glabris dorso planis scrobiculatis transversèque rugosis margine acutis denticulatis facie interiori radiatim elevato-rugulosis.

Hab. in pinguibus planitie *Esdraelon* Galilææ et colui e seminibus Palæstinis.

Species distinctissima ex affinitate *M. parvifloræ* et floribus ejusdem magnitudinis donata, insignis foliorum laciniiis elongatis acutissimis, petiolis longissimis sæpè 6-7 pollicaribus.

HYPERICACEÆ.

HYPERICUM UNIFLORUM Boiss. et Heldr. (Sect. *Drosocarpium*.)

H. caulibus cæspitosis filiformibus angulato-bilineatis foliosis simplicibus apice unifloris, foliis minutis subsessilibus ovatis obtusis præter marginem papilloso-scabridum glabris parcè nigro-punctatis et pellucido-punctatis, flore e summis foliis breviter pedunculato, calyce corollà triplò breviori in lacinias lanceolatas acutiusculas dorso nigro-punctatas supernè margine glandulis nigris sessilibus obsitas profundè diviso, petalis nigro-punctatis margine integris, capsulà vesticulis magnis oblongo-clavatis aspersa.

Hab. in schistosis regionis alpinæ montis *Anemas* Lycaoniæ (Heldreich).

Plantula 2-3 pollicaris, caules tenuissimi, folia et flores *H. Rhodopæi* Friv. — *Campylopi cerastoidis* J. et Sp. quod longè differt caulibus plurifloris, foliis tomentosis, calyce magno glanduloso, capsulâ glanduloso-vittatâ.

HYPERICUM TRICHOCAULON Boiss. et Heldr. (Sect. *Drosocarpium*.)

H. glaberrimum rubellum basi suffrutescens caules numerosissimos pumilos erectos filiformes rigidulos basi nudos simplices rariùs trifidos edens, foliis parvis myrtiformibus ovato-oblongis obtusis subsessilibus nervulosis vix pellucido-punctatis serie simplici punctorum nigrorum marginatis integerrimis, floribus ad caulium apicem solitariis vel trichotomè 3-6 nis, bracteis oblongis breviter denticulatis, calycis dimidiâ corollâ brevioris laciniis oblongis obtusis nigro-punctatis margine obsolete et remotè denticulato-glandulosis glandulis minimis, petalis nigro-punctatis integris subtus rubellis, capsulâ vesiculis ad margines valvarum transversis obsitâ.

Hab. inter saxa in quercetis montis *Idæ* in latere australi suprâ *Vorisa* alt. 3000-4000'. (Heldreich.)

H. repens pl. Heldr. Cret. 4847 non L.

Primum habuimus pro *H. repenti* cujus specimina macriora nostram plantam referunt sed quod longè differt caulibus non tenuissimis, paniculâ pluriflorâ, sepalis acutissimis stipitato-glandulosis, capsulâ glanduloso-vittatâ.

HYPERICUM PAPILLARE Boiss. et Heldr. (Sect. *Drosocarpium*.)

H. glaucescens totum brevissimè et densissimè papillis tuberculi-formibus leprosum, radice crassâ, caudice lignoso, caulibus brevissimis filiformibus teretiusculis foliosis simplicibus procumbentibus ascendentibusve eximie nigro-punctatis apice laxè brevissimè et trichotomè paniculatis 6-9 floris, foliis minutis ovato-rotundis carnosulis opacis pellucidè et parcius nigro-punctatis ad partem inferiorem caulium diminutis confertioribus, bracteis minimis lanceolatis subdenticulatis, calycis minuti carnosuli estriati corollâ triplè brevioris laciniis oblongis obtusis nigro-punctatis glandulis nigris subsessilibus remotiusculis marginatis, petalis nigro-punctatis, capsulâ...

Hab. in *Anatoliâ* (Heldr.) sed schedula locum proprium indicans amissa fuit.

Caules 2-3 pollicares, folia 2-3 lineas diametro lata, habitus *H. leprosi* quod differt indumento cano, caulibus acutè angulosis, sepalis lanceolatis acutis etc.

HYPERICUM HELDREICHII Boiss. in pl. Cret. Heldr. 1847. (Sect. *Drosocarpium*.)

H. glaberrimum rhizomate indurato caules plurimos graciles simplices ascendentes pumilos foliosos utrinquè bilineatos apice cymosè et confertim 4-9 flores edenti, foliis elliptico-linearibus obtusis pellucido-punctatis margine remotè nigro-punctatis sessilibus infimis basi subattenuatis superioribus basi truncato-subauriculatis auriculis minutissimis nigro-fimbriolatis, summis margine glanduloso-stipitatis superne subattenuatis, bracteis e basi subdilatatâ auriculatâ lineari-setaceis longè fimbriatis fimbriis glanduliferis, calycis corollâ triplò brevioris segmentis oblongo-lanceolatis acutiusculis circumcîcâ densè et tenuiter ciliatis ciliis glandulâ terminatis tricostatis inter costas pellucidè 2-3 vittatis nigro-punctatis punctis in lineas longitudinales sæpè coeuntibus, petalis parçè nigro-punctatis margine tenuissimè sub lente stipitato-glandulosis, capsulâ...

Hab. in siccis propè *Roukaka* prov. *Sitia* in Cretâ. (Heldr.)

Habitu et characteribus valdè affine *H. Aucheri* Jaub. et Sp. Illustr. tab. 34 pro quo priùs hoc habui sed quod a meâ specie ex icone et descriptione sat specificè differre videtur foliis nec nigro-punctatis nec basi subauriculatis, sepalis acutissimis remotè fimbriolatis corollâ vix duplò brevioribus.

HYPERICUM CASSIUM Boiss. (Sect. *Drosocarpium*.)

H. glaberrimum glaucum caulibus erectis elatis teretibus elineatis superne corymboso-paniculatis ramis paniculæ strictis, foliis coriaceis inferioribus oblongis basi subangustatis cæteris oblongo vel ovato-cordatis margine revolutis acutiusculis evesiculosis vel supremis parçè pellucido-punctatis sparsim ad margines nigro-punctatis omnibus integerrimis, bracteis lineari-lanceolatis fimbriatis fimbriis glanduliferis, calycis corollam dimidiam superantis laciniis linearibus acutis punctis elongatis pellucidis conspersis fructiferis deflexis costatis margine

parcè fimbriatis fimbriis brevissimis ascendentibus remotis apice nigro-glandulosus, petalis nigro-punctatis, capsulâ calyce duplò longiori cylindricâ apice subattenuatâ trisulcâ vesiculis magnis globosis inordinatis aspersâ, seminibus longitudinaliter striatis.

Hab. in umbrosis jugi *Cassii* in consortio *H. spectabilis* J. et Sp. Legi Jun. 1846.

Planta elata habitu et foliis *H. ciliati* a quo differt sepalis remotè et breviter nec densè et longè ciliatis, foliis ferè eglandulosus, capsulâ 5 lineas longâ attenuatâ, calyce deflexo nec capsulæ adpresso. *H. Montbretii* differt foliis teneris punctatissimis, petalis glanduloso-ciliatis.

HYPERICUM SPRUNERI Boiss. (Sect. *Drosocarpium*.)

H. glabrum viride caulibus ascendentibus simplicibus obsoletè bilineatis laxè foliosis supernè laxè corymboso-cymosis, foliis pellucidis oblongis obtusis sessilibus inferioribus minoribus epunctatis basi attenuatis superioribus subcordatis valdè pellucido-punctatis margine parcè nigro-punctatis, bracteis magnis calyci æquilongis e basi auriculato-dilatatâ lanceolatis acutissimis fimbriatis fimbriis glanduliferis, calycis laciniis corollâ dimidiò brevioribus lanceolato-linearibus acutissimis lacero-fimbriatis fimbriis diametrum dimidium laciniæ æquantibus ascendentibus in glandulam capitatam abeuntibus tenuiter trinerviis valdè nigro-punctatis, petalis integris parcè nigro-punctatis, capsulâ...

Hab. in monte *Velugo* (*Tymphresto*) Oetoliæ Spruner.

Affine *H. Richeri* et *barbato* diversum cymâ laxâ, bracteis magnis, sepalis angustis acutissimis, fimbriis brevioribus capitato-glandulosus.

HYPERICUM BITHYNICUM Boiss. (Sect. *Drosocarpium*.)

H. glabrum viride, caulibus tenuibus ascendentibus simplicibus teretibus laxè foliosis supernè densè corymboso-cymosis paucifloris, foliis subpellucidis breviter ovatis obtusis basi sessilibus breviter cordatis prorsus eglandulosus margine nigro-punctatis, bracteis basi subauriculatis lineari-setaceis fimbriatis fimbriis bractearum diametro longioribus nigro-glandulosus, calycis laciniis corollam dimidiam superantibus lanceolato-linearibus acutissimis fimbriatis punctis nigris elongatis valdè aspersis fimbriis in glandulam capitatam abeuntibus laciniarum dimidiam latitudinem æquantibus, petalis margine stipitato glanduloso, capsulâ vesiculis inordinatim dispositis ovatis sæpè elongatis obsitâ.

Hab. in regione inferiori *Olympi Bithyni* Boiss.

Caulis 1½-4 pedalis, folia majora ferè pollicem longa. Affine *H. Richeri* a quo differt cymà confertiori sepalis acutioribus dimidiòque angustioribus fimbriis apice capitato nec clavato-glandulosis, petalis denticulato-glandulosis. A specie præcedenti sat distinctum foliis prorsus pellucido-eglandulosis, foliis magis rotundatis, corymbo conferto.

HYPERICUM RUMELIACUM Boiss. (Sect. *Drosocarpium*.)

H. glabrum glaucescens caulibus plurimis basi induratis virgatis simplicibus teretibus bilineatis apice confertim et pauciflorè corymbosis, foliis strictis subcoriaceis oblongo-linearibus obtusis margine valdè revolutis opacis non pellucido-punctatis parè nigro-punctatis, bracteis magnis oblongo-lanceolatis acutissimis fimbriis nigro-glanduligeris latitudinem bractæ æquantibus, calycis corollam dimidiam æquantis laciniis oblongis acutis margine fimbriis ascendentibus crebris ejus dimidiam latitudinem æquantibus apice glandulas nigras capitatas ferentibus obsitis nigro-punctatis punctis infernè in lineas longitudinales coalitis, petalis margine minutissimè stipitato-glandulosis.

Hab. in *Rumeliâ*, Frivaldsky sub *H. Richeri*.

Habitu et formâ foliorum valdè affine *H. barbato* quod differt bractearum sepalorumque fimbriis multò longioribus apice non glandulosis, petalis margine non glanduloso-denticulatis.

HYPERICUM PESTALOZZÆ Boiss. (Sect. *Tamnocarpium*.)

H. caulibus filiformibus simplicibus basi nudis ascendentibus apice paniculam divaricato-patentem brevissimam laxam ferentibus, foliis minutis sessilibus ovatis obtusis utrinquè breviter velutino-canis minutè pellucido-punctatis, paniculæ ramis pedicellisque tenuissimis, bracteis minimis lineari-setaceis, floribus parvis, calyce corollâ plus dimidiò breviore nec fimbriato nec nigro-punctato parè pellucido-punctato in lacinias lineari-oblongas obtusas ad basin usquè fisso, petalis epunctatis, capsulâ...

Hab. in *Pamphylâ* propè *Adalia* ubi legit cl. Pestalozza.

Species pulchella quasdam formas pumilas *H. tomentosum* referens a quo tamen floribus dimidiò minoribus sepalisque obtusis eglandulosis longè recedit, aptius collocanda propè *H. australe* Ten. et *H. lineari-folium* Vahl. Caules tenuissimi basi suffruticulosi 8-10 pollicares, foliâ

majora 6 lin. longa, panícula capillaris triangulari-ovata, calyx vix sesquilineam longus.

HYPERICUM ATOMARIUM Boiss. (Sect. *Tæniocarpium*.)

H. totum papillis albis minutissimis tomentoso-velutinum canescens, caulibus teretibus simplicibus erectis apice in paniculam brevem ovatam abeuntibus, foliis remotiusculis internodio brevioribus oblongo-lanceolatis obtusiusculis basi cordato-amplexicaulibus punctis pellucidis nigrisque sparsis obsitis, bracteis minimis lanceolato-linearibus utrinquè 1-2 glanduloso-denticulatis integrisve, calyce corollà dimidiò breviori ad basin usquè in lacinias oblongo-lanceolatas acutiusculas valdè nigro-punctatas trinervias margine 4-5 glandulis stipitatis ascendentibus denticulatas diviso, petalis nigro-punctatis integris, capsulà longitudinaliter glanduloso-vittatà.

Hab. in dumosis montis *Sipyli* suprà *Magnesiam* in *Lydià*. (Boiss.)

Affine *H. lanuginoso* et *H. tomentoso*, prius differt calycibus minoribus non nigro-punctatis, sepalis obtusis glandulis sessilibus crebris denticulatis, posterius indumento denso hirsuto, sepalis acuminatis, etc.

HYPERICUM NEUROCALYCINUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Tæniocarpium*.)

H. basi suffrutescens cæspitoso-multicaule totum densè et minutissimè puberulum glaucescens, caulibus procumbentibus ascendentibusve gracilibus pumilis duris densè foliosis simplicibus supernè in paniculam propter ramulos brevissimos racemiformem brevissimè oblongam abeuntibus, foliis parvis sessilibus linearibus ob margines valdè revolutos subteretibus obtusis nervo medio valido percursis parcè pellucido-punctatis omnibus axillis fasciculum foliorum subæquilongorum tereti-linearium edentibus, bracteis ovato-rotundis breviter denticulatis, calycis corollam dimidiam æquantis laciniis oblongis apice rotundatis densè parallelè et elevatim 8-9 costato-striatis inter costas lineis pellucidis totidem longitudinaliter percursis margine regulariter pectinato-fimbriatis fimbriis brevibus glandulam capitata nigram ferentibus, capsulà...

Hab. in montibus humilioribus aridis inter lacum *Beychehr* et planitiem *Koniah* in dumosis (Heldr.) Junio.

Caules 4–6 pollicares, folia 3–4 lin. longa majora sesquilineam lata, racemus contractus 1–2 pollicaris. Folia et habitus omninò *H. conferti* Chois. — *satureiaefolii* Jaub. et Sp. laciniis calycinis angustè lanceolatis acutissimis longè fimbriatis distincti. *H. velutinum* Boiss. quod eodem ferè indumento gaudet sepalis subrotundis corollà quadruplò brevioribus margine glandulis subsessilibus adspersis statim distinguitur.

HYPERICUM STENOBOTRYS Boiss. (Sect. *Tæniocarpium*.)

H. basi suffrutescens multicaule glabrum caulibus rubellis pumilis virgatis simplicibus densè foliosis in paniculam propter ramulos inferiores brevissimos angustè racemosam abeuntibus, foliis sessilibus oblongo-linearibus obtusis margine subrevolutis nervo medio valido percursis punctis pellucidis magnis conspersis, axillis omnibus fasciculum foliorum breviorum ob margines valdè revolutos tereti-linearium edentibus, bracteis ovatis breviter denticulatis, calycis corollà triplò brevioris laciniis ovato-oblongis obtusis parallelè subquinque-nerviis inter nervos pellucidè lineatis circumcircuità fimbriis apice nigro-glandulosis earum latitudine triplò brevioribus pectinatis, petalis vesiculis flavis obsitis, capsulà...

Hab. in sylvis jugi *Cassii* ubi rarum videtur. (Boiss.)

A. præcedenti distinctum defectu indumenti, numero nervorum calycis et ejus cum corollà proportionè, ab *H. conferto* sepalis non angustè lanceolatis acutissimis nec longè fimbriatis.

HYPERICUM MICROCALYGINUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. 1846. (Sect. *Tæniocarpium*.)

H. glabrum glaucum multicaule, caulibus ascendentibus crassis elatis teretibus ramulosis supernè longè racemoso-paniculatis, foliis omnibus primariis axillaribusque convolutis tenuiter linearibus depresso-punctulatis, floribus longiusculè pedunculatis pedunculo medium versùs bi-bracteolato, bracteis minimis oblongis integris eglandulosis, calyce minuto obsoletè striato ad medium usquè in lobos rotundos vel ovato-rotundos glandulis sessilibus nigris regulariter marginatos diviso, petalis calyce 5–6 plò majoribus margine breviter nigro-fimbriatis, capsulà attenuatà vittis crebris longitudinalibus percursà.

Hab. in campis aridis propè *Kuralu* non procul a lacu *Beychehr* in *Lycæoniâ*. (Heldreich.)

A. binis præcedentibus et *H. conferto* caulibus crassioribus sesquipedalibus ramulosis longèque paniculatis primà fronte diversum, ab eis et *H. elongato* Ledeb. iterùm calycis minuti lobis brevissimis subrotundis sessiliter glandulosis discrepans. Habitus *H. Lydii* quod foliis majoribus tenuioribus formæque calycis prorsus differt.

Characteres quibus cl. Spach *Drosanthes* genus ab *Hyperico* distinguit nec satis graves nec præsertim agmen naturale circumscribentes mihi visi sunt; ejus species *Hypericis* sect. *Taniocarpii* habitu et characteribus simillimæ sunt, eas igitur in pl. Persicarum Kotschy et Syriacarum mearum determinatione ad *Hyperica* reduxi et sic nominavi.

Drosanthe hirtella Spach — *HYPERICUM HIRTELLUM* Boiss.

Drosanthe fimbriata Spach — *HYPERICUM ASSYRIACUM* Spach.

Drosanthe helianthemoides Spach — *HYPERICUM HELIANTHEMOIDES* Boiss. — *H. confertum* Chois. Mon. Hyp. tab. 9 nomen improprium. Hæc species vulgatissima est in collibus Antilibani, Damasci, Antiochiæ, Mesopotamiæ et totius Persiæ, varians foliis vel convolutis vel plantis dilatatis.

GERANIACEÆ.

GERANIUM GLABERRIMUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. 1846. (Sect. *Batrachium*.)

G. perenne glaberrimum rhizomate crasso colloque petiolis foliorum vetustorum densè vestito folia caulesque erectos a medio dichotomos edenti, foliis ambitu orbiculatis palmatim ultrà medium 5-7 fidis laciniis basi cuneato-attenuatis obtusissimis 3-5 lobis lobis rotundatis subtruncatisve breviter mucronulatis radicalibus longè caulinis brevius petiolatis, stipulis breviter triangulari-lanceolatis rufo-membranaceis, pedicellis demùm divaricatis, sepalis sub lente minutissimè et parè papillois sæpè glaberrimis ovatis trinerviis obtusis mucronatis apice ciliatulis, petalis obovato-spathulatis purpureis calyce plùs duplò longioribus ad ungues ciliatis, filamentis purpureis glabris, valvulis glabris minutissimè pruinosis totà superficiei transversè reticulato-nervosis.

Hab. in fissuris rupium montis *Gheidag* Tauri Isaurici suprà *Alaya* alt. 5500-6000'. Julio. (Heldreich.)

Habitus, modus crescendi et flores *G. macrorrhizi* sed folia paulò minora et ob lacinias obtusissimas ea *G. lucidi* potiùs referentia lobis

obtusis mucronatis nec ovatis acutis, valvulæ totâ superficie nec tantum ut in *G. macrorrhizo* dorso rugosæ sunt. Nec stamina nec styli declinata videntur, planta insuper glaberrima est nec tota pubescens.

GERANIUM LASIOPUS Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Batrachium*.)

G. perenne totum pilis patulis densis brevibus tomentoso-hispidum griseo-virens tenerrimum, rhizomate crasso colloque vestigiis foliorum vetustorum densè vestito, caulibus folia radicalia paulò superantibus medium versùs foliosis dichotomè 2-4 floris, foliis ambitu orbiculatis palmatim usquè ad $\frac{3}{4}$ 5-6 fidis laciniis basi cuneato-attenuatis obtusissimis subæqualitèr et rotundatim 3-4 lobis, radicalibus longè caulinis breviter petiolatis, stipulis minutis triangularibus longè ciliatis, pedunculis flore 2-3 plò longioribus cauli æquicrassis, sepalis hispidis trinerviis ovatis mucronulatis, petalis obovato-oblongis calyce duplò longioribus in unguem parçè ciliatum sensim attenuatis, filamentis glabris, valvulis oblongo-linearibus puberulis dorso transversè rugosis.

Hab. in fissuris rupium Lycaoniæ inter *Ghelindost* et *Karagatch* Jun. (Heldreich.)

Planta 2-4 pollicaris, folia diametro pollicaria formâ suâ ea *G. lucidi* referentia, flores eis *G. macrorrhizi* minores. Species pulchra a præcedenti et a *G. macrorrhizo* quibus affinis est primâ fronte pedunculis elongatis hirsutis crassiusculis distinguenda.

GERANIUM CRENOPHILUM Boiss. (Sect. *Batrachium*.)

G. perenne totum pilis patulis albis aliis eglandulosis aliis apice minutè glanduliferis hispidum molle, radice cylindrico-fasciculatâ, foliis ambitu orbiculatis ultrâ medium palmatim 5 fidis partitionibus cuneatis acutiusculè inciso-lobatis radicalibus longissimè petiolatis, caulibus procumbentibus ramosissimis, floribus pedunculo eis longiori suffultis roseis, sepalis adpressè et glandulosè hirsutis oblongo-lanceolatis acutiusculis mucrone longiusculo terminatis, petalis roseis obovatis exungiculatis basi utrinquè densè albo-ciliatis, filamentis basi subdilatatâ ciliatulis, valvulis lævibus glanduloso-hirsutis caudâ glanduloso-hirsutâ suspensis, seminibus ovatis secùs lineas longitudinales densè favosis.

Hab. secùs fontem et rivum e pariete septentrionali rupium ponè pagum *Eden* Libani sitorum oriundum. Legi Julio ineunte.

Radice, habitu et characteribus valdè affine *G. asphodeloidi* quod differt indumento eglanduloso pilis retrorsum accumbentibus brevibus constanti rariùs versùs apicem plantæ nonnullis glandulis intermixto, sepalis longiùs lanceolatis acutioribus, seminibus ovato-rotundis, foveolis minoribus magis approximatis.

ERODIUM CINEREUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 4846.

E. perenne totum breviter et adpressissimè cinereum, radicis cæspitosæ collo petiolis vetustis incrassato, caulibus cæspite 2-3 plò longioribus a medio ramosis foliosis, foliis radicalibus densè congestis petiolatis ambitu oblongis bipinnatisectis laciniis oblongo-linearibus acutis, caulinis sessilibus pinnatisectis laciniis paucis, stipulis bracteisque scariosis minimis, pedunculis umbellatim 8-10 floris pedicellisque tenuissimis flore 3-4 plò longioribus tenuissimè et patulè glanduloso-hispidulis, sepalis oblongo-ellipticis brevissimè mucronulatis nigrovittatis parcè et brevissimè hispidulo-viscidis membranaceo-marginatis, petalis roseis calyce duplò longioribus, carpellis adpressè albo-villosis caudà longà adpressè et eglandulosè hirtà terminatis.

Hab. in apricis argillosis inter *Ghelindost* et *Karagatch*, inter *Egirdir* et *Koniah* Lycaoniæ. (Heldreich.)

Valdè affine *E. Olympico* et *absinthoidi* ab eis differt indumento foliorum et caulium adpressissimo non glanduloso, pedunculis multifloris, pedicellis elongatis tenuissimis, calycibus minoribus multò brevius parciusque glandulosis.

ERODIUM TUBEROSUM Boiss.

E. perenne pube brevi patulà eglandulosà plùs minùs copiosà cinereum sæpè glabriusculum, radice elongatà durà in tubera solitaria vel plura incrassatà, collo demùm lignescenti cæspitoso-multicauli, caulibus folia parùm superantibus a medio parcè ramosis, foliis radicalibus numerosis petiolatis ambitu ovato vel oblongo-cordatis subpalmatim bipinnatisectis partitionibus secùs rachidem latam decurrentibus laciniis brevissimis acutis integris vel 3-4 fidis, foliis caulinis brevius petiolatis, stipulis bracteisque ovatis scariosis, pedunculis umbellatim 5-6 floris, pedicellis flore longioribus fructiferis deflexis, sepalis oblongis nigro-trivittatis sub apice e dorso mucronulatis intùs ciliatis membranaceo-marginatis, petalis ovato-cuneatis roseis infernè intensè

purpureo-maculatis basi albo-ciliatis, carpellis adpressè rufescenti-hirsutis caudà longà hirtulà terminatis aristis intùs longissimè rufescenti-barbatis.

Var. α. glabriusculum. — Folia viridia glabra vel parcè hirtula, rami ut tota plantæ pars superior glabri.

Var. β. canescens. — Tota planta pilis brevibus patulis albis densè et molliter cana. Formæ intermediæ inter eas varietates occurrunt.

Hab. in lapidosis et rupestribus totius Arabiæ petreæ, inter *Suez* et jugum Sinaiticum in valle *Wadi Useit* (Boiss.), in ascensu australi jugi *Tih* copiosè, in montibus deserti Ægyptiaco-Arabici legit quoque cl. *Husson*.

Pulchra species cujus radix *Arabis edulis* est, foliorum divisione formas magis dissectas *E. laciniati* Cav. referens floribus eis hujus tertià parte majoribus aristis carpellorum 2-3 pollicaribus.

ERODIUM HUSSONI Boiss.

E. perenne, caudicibus lignosis elongatis squamosis, caulibus elongatis ramosis petiolisque sub lente brevissimè tomentellis, foliis viridibus carnosius utrinquè parcè et minutissimè pruinoso-tomentellis ovatis obtusiusculis indivisis vel obsoletè subtrilobis basi cordatis vel truncatis margine crenulato-crispis, radicalibus longè caulinis minoribus breviter petiolatis margine acutiùs crispisusque denticulatis, stipulis magis triangulari-ovatis rufescenti-membranaceis crassis tomentellis, pedunculis tomentosius 4-6 floris, bracteis ovatis tomentosius crassis rufo-membranaceis involucrum sexlobum sub floribus simulantibus, pedicellis calyci æquilongis, sepalis oblongis tomentosius apice brevissimè mucronatis, petalis ovato-cuneatis calyce sesquilogioribus.

Hab. ad rupes calcareas deserti Ægyptiaco-Arabici ad *Wadi-Arabah* cl. *Figari*, ad *Gebel Achmar* propè *Kahiram* cl. *Husson*.

Pulchra species habitu et foliis *E. glaucophyllum* referens ab eo distincta caudicibus lignosis elongatis foliosis, caulibus abbreviatis, stipulis et imprimis bracteis crassis scariosis 2 1/2 lin. longis 2 latis, pedicellis brevissimis, floribus duplò majoribus.

ERODIUM PELARGONIFLORUM Boiss. et Heldr. in pl. Anatal. 1846.

E. perenne viride totum pilis papillaribus nitidis conspersum viscidulum, rhizomate squamis petiolaribus et stipularibus vetustis vestito, caulibus fragilibus ascendentibus elongatis ramosis, foliis teneris radicalibus longè petiolatis ovato-cordatis obsoletè 3 lobis indivisisque

acutiusculè dentatis, sti ulis bracteisque oblongis acuminatis valdè hispidis albo-membranaceis, pedunculis umbellatim 8-10 floris, pedicellis longè hispidis flore triplò longioribus, sepalis oblongis albis viridi 3-5 lineatis ad costas longè papilloso-ciliatis mucrone eis dimidiò breviori terminatis, petalis obovatis basi subciliatis albis 2 inferioribus maculà purpureà in quinque lineas ramulosas supernè extensà insignitis, carpellis parcè et adpressè hirsutis caudà adpressè hirsutà eis quadruplò longiori terminatis.

Hab. in rupestribus umbrosis et speluncis Isauriæ, in viâ inter *Karman* et *Ermenek* ad descensum montis *Ghelipel* propè *Ermenek* alt. circ. 3000' Junio (Heldreich).

Caules pedales, folia radicalia petiolo 4-5 pollic. suffulta 2 pollices longa ferè tantùm lata, flores amænissimè purpureo-picti majores eis *E. hymenodis* propè quod nostra species collocanda.

MONSONIA HISPIDA Boiss.

M. perennis basi suffrutescens tota virescenti-grisea pilis patulis longis albis hispidissima, caulibus elongatis sulcato-striatis ramosis, foliis ovatis obtusis basi rotundato-truncatis margine crispulè denticulatis supernè sectis nervos lineatis subtùs elevato-nervosis, pedunculis etiam inferioribus longissimis folia superiora multò superantibus 6-8 floris, pedicellis inæqualibus tenuissimis brevius et adpressius hirsutis, floribus parvis, sepalis adpressè canis obovatis mucronatis, petalis..., carpellis adpressè et parcè hirtis caudà longissimà terminatis, aristis intùs longissimè albo-barbatis.

Hab. ad rupes graniticas *Gebel Gareb* et *Gebel Dara* deserti Thebaico-Arabici. (cl. Husson.)

Caules in meo specimine pedales, folia inferiora poll. ferè longa $3\frac{1}{4}$ poll. lata; species affinis *M. niveæ* quæcum crescit et quæ differt indumento foliorum adpressissimè niveo, foliis minoribus oblongis utrinquè valdè lineato-sulcatis, sepalis submuticis, caudà carpellorum sesquipollicem nec tres pollices longà....

ZYGOPHYLLÆ.

TRIBULUS SINAICUS Boiss.

T. totus adpressè villosus-canus, foliis 5-6 jugis foliolis oblongis acutiusculis approximatis, petalis oblongis calyce hirsuto longioribus,

capsulâ 6 coccâ, carpellis setis brevibus sparsis obsitis dorso rotundatis scrobiculatis medium versûs bidentatis dentibus carpelli latitudine brevioribus basin versûs bidenticulatis.

Hab. in deserto Arabico inter *Kahiram* et *Suez* et in vallibus jugi *Sinaitici*.

Hæc planta a varietatibus incanis *T. terrestris* quæ in eâdem regione crescunt mihi specificè differre visa est carpellis dorso rotundatis scrobiculatis nec inter cornua carinato-cristatis, cornua prætereâ multò minora sunt lineam unam non excedentia duo inferiora ad rudimenta reducta sæpè evanida.

FAGONIA GRANDIFLORA Boiss.

F. glabra, caulibus suffrutescentibus cæspitosis intricatis, ramis erectis profundè quadrisulcatis, spinis quaternis validis teretibus viridibus apice flavido-acerosis folia æquantibus superantibusve, foliis trifoliolatis foliolis carnosis ovatis vel ovato-oblongis obtusis mucronulatis lateralibus paulò angustioribus subæquilongis, petiolo foliolis paulò breviori, pedicello calyci subæquilongo, floribus magnis, sepalis ovato-oblongis longè attenuato-acuminatis, petalis roseis calycè triplo longioribus, capsulâ pedicello recurvo æquilongâ pendulâ glandulosohirtulâ rotundâ 5 carpellari ad costas acutè carinâtâ stylo mucronatâ.

Hab. in declivibus calidis Palæstinæ circâ *St. Saba* ubi legi florëntem Apr. 1846.

Dumus vix semipedalis, spinæ 7-9 lin. longæ, flores in genere maximi diametro 8-10 lin. lati. Valdè affinis *F. molli* Del. — *F. cistoidi* Del. in Bovè et Schimp. pl. exs. quam in vallibus Sinaiticis et locis elatis déserti *Tih* abundè reperi et quæ differt hispiditate viscidâ, spinis dimidiò tenuioribus brevioribusque folia non æquantibus. Si tamen ulterior observatio in loco natali eas speciei unicæ varietates esse doceret tunc nomen omninò inaptum *F. mollis* relinquendum esset.

FAGONIA THEBAICA Boiss. in Pinard pl. exs. 1847.

F. basi suffruticosa densè dumulosa glabriuscula viridis, ramis erectis ramosis sulcatis articulis brevissimis, spinis 2-4 nis petiolos æquantibus superantibusve cylindricis teretibus viridibus callo albo in mucronem attenuato terminatis superioribus brevissimis, foliis parvis inferioribus trifoliolatis petiolo tereti æquilongis suprà eum breviter

stipitatis carnosis subæqualibus tereti-subcomplanatis oblongo-cylindricis obtusissimis callo albo brevissimè mucronulato terminatis, foliis superioribus ad petiolum brevem spinis æquilongum eisque similem sed submuticum reductis rariùs et in speciminibus junioribus unifoliolatis foliolo lineari-lanceolato, floribus mediocribus purpureis, sepalis subpapillosis ovato-oblongis acuminatis corollà dimidià brevioribus, capsulà tomentellà pedicello deflexo extremitate incrassato æquilongà depresso-turbinatà stylo subæquilongo apiculatà, carpellis quinque dorso obtusè carinatis.

Hab. in arenosis partis inferioris vallis *Biban el Molouk* propè *Thebas* in *Ægypto* superiori ubi legi flor. Januar 1846.

Dumi lati pedem dimidium alti, spinæ sæpè 3-4 lin. longæ sed plerumquè multò breviores, flores magnitudinis *F. viscidæ* Presl.

FAGONIA KAHIRINA Boiss.

F. suffrutescens viridis parcè et brevissimè viscidula, ramis quadrangulis secus planum horizontalem dichotomè ramosissimis, articulis brevibus, spinis binis quaternisve brevissimis patenti-subrecurvis petiolos æquantibus superantibusve, foliis minimis trifoliolatis petiolo foliolis æquilongo suffultis, foliolis oblongis utrinquè acutis mucronatis intermedio ferè duplò majori, foliis summis subsessilibus minutissimis sæpè ad foliolum unicum reductis, floribus ad dichotomias et apicem ramorum summorum pedicello calyce longiori suffultis amænè et intensè roseis, sepalis oblongis acuminatis tomentellis corollà quintuplò brevioribus, petalis longè unguiculatis unguibus subexsertis, capsulis pedicello deflexo eis sæpiùs breviori suffultis depressè turbinatis tomentellis stylo eis paulò breviori apiculatis carpellis obtusè carinatis.

Hab. in desertis ad orientem *Kahiræ* sitis in valleculà quâdam rupibus circumdatà ferè sesquileucam ab urbe remotà. (Boiss.)

F. Cretica Delile. Cat. pl. *Ægypti* e loco non L. — *F. glutinosa* Schimp. pl. Arab. N° 540 non Del.

Omnium deserti specierum pulcherrima, frondes 4-6 pollices longæ 3-4 latæ planæ a terra remotæ horizontales nec ut in *F. glutinosâ* humi adpressæ et in arenâ subsepultæ, flores eos *F. Creticæ* ferè æquantes, spinæ 1-2 lin. tantum longæ. A. *F. Creticâ* et *glutinosa* brevitiè spinarum, foliis minutis etc. distinctissima, magis affinis *F. Sinaicæ* meæ quæ differt glandulositate copiosâ, ramulis magis sulcatis, foliolis subæqualibus, floribus minoribus, petalis calyce vix triplò longioribus, etc.

FAGONIA MYRIACANTHA Boiss.

F. basi suffrutescens glabra vel ad folia et spinas brevissimè pubescenti-viscidula, ramis quadrangulis sulcato-striatis diffusis ramosissimis intricatis articulis longis, spinis quaternis longissimis patentibus acerosis folia multò superantibus, foliis subsessilibus trifoliolatis foliolis oblongo-linearibus subfalcatis obliquè et longè mucronulatis intermedio latiori longiorique, foliis superioribus sæpè monophyllis minutis, floribus axillaribus pedicello eis subæquilongo suffultis pallidissimè roseis mediocribus, sepalis vix puberulis lanceolatis longè acuminatis corollam dimidiam æquantibus, capsulà pedicello deflexo eà longiori suffultà ovato-turbinatà brevissimè hirtulà 5 carpellari stylo subæquilongo apiculatà, carpellis acutè carinatis.

Hab. in vallibus *Sinaiticis* et deserto *Tih* ubi eam pluribus locis observavi, Aucher N° 798.

Caules procumbentes intricati sæpè semipedales, spinæ 7-11 pollicares, foliola majora 4-5 lin. longa vix lineam lata. Flores inter minutos generis eos *F. glutinosæ* non superantes. Species cum *F. Arabicà* verà (Schimper N° 251) probabiliter in variis herbariis confusa, ab eà egregiè distincta caulibus procumbentibus nec erectis dumosis, foliis nec petiolatis nec carnosus, ramis sulcato-quadrangulis nec striatulis, capsulà dimidiò minori.

FAGONIA ECHINELLA Boiss.

F. tota sub lente glandulis stipitatis minimis obsita viscidula ramis procumbentibus abbreviatis quadrangulis valdè sulcatis intricato-ramosissimis, internodiis brevissimis, spinis quaternis tenuibus acerosis erecto-patulis foliis duplò longioribus, foliis minutissimis petiolo foliolis breviori suffultis, foliolis ternis oblongis carnosulis longè albomucronulatis intermedio paulò majori, floribus axillaribus minutissimis copiosis subsessilibus, sepalis ovatis puberulis mucronulatis corollam dimidiam pallidè carneam æquantibus, capsulà pedicello deflexo eà breviori suffultà tomentellà ovato-turbinatà stylo eà breviori apiculatà, carpellis 5 acutè carinatis.

Hab. in planitie excelsiori deserti *Ægyptiaci* inter *Kahiram* et *Suez* et inter *Suez* et *Tor*. Legi Mart. 1846.

Inter omnes generis insignita ramis abbreviatis 2-4 poll. longis, spinis tenuibus 5-8 lin. longis copiosis folia minuta occultantibus, floribus pallidis eis *F. glutinosæ* etiam minoribus.

FAGONIA ACEROSA Boiss.

F. glaberrima basi suffrutescens dumosa, caulibus ramosissimis ascendentibus ramisque teretibus striatulis, internodiis longis, spinis quaternis longis patentibus acerosis folia multò superantibus, foliis trifoliolatis petiolo foliola æquanti vel superanti suffultis, foliolis stipitatis convolutis linearibus teretibus in mucronem longiusculum attenuatis, floribus axillaribus pedicello eis æquilongo suffultis magnis, sepalis lanceolatis mucronatis glaberrimis corollam roseam dimidiam vix æquantibus, capsulâ...

Hab. in Persiâ australi inter *Djavoun* et *Darap* Aucher N° 4306 B, et forsân Aucher N° 4307 ex *Arabia Mascatensi* (forma aphylla).

Spinæ pollicares, foliola 3 lin. longa lineæ $3\frac{1}{4}$ vix lata, flores eos *F. mollis* vix æquantes. Affinis facie et characteribus *F. myriacanthæ* a quâ ramis teretibus nec quadrangulis, floribus duplò majoribus egregiè differt.

FAGONIA PARVIFLORA Boiss. in Pinard pl. exs. 1847.

F. glabra aut supernè parè sub lente puberula, caulibus ascendentibus erectisve a basî ramosissimis dumos latos formantibus ramisque teretibus striatis, spinis quaternis tenuibus acerosis patulis sæpius inæqualibus folia paulò superantibus, foliis unifoliolatis foliolo plano angustè lanceolato lineari-elongato breviter et obliquè mucronato petiolo sextuplò longiori, foliis summis sessilibus, floribus axillaribus pedicello eis longiori suffultis minimis, sepalis triangulari-lanceolatis papillois mucronatis corollam dimidiam pallidè roseam æquantibus, capsulâ pedicello deflexo eâ duplò longiori suffultâ globoso-turbinatâ hirtulâ stylo brevi apiculatâ, carpellis 5 acutiusculè carinatis.

Hab. in arenosis secus cataractas Nili suprâ *Assouan*, legi Jun. 1846 et in *Nubiâ* superiori Kotschy N° 312 sub *F. Arabicâ*.

Caules basi prostrati sesquipedales dumos extensos erinaceos formantes, spinæ 6-11 lin. longæ, foliola majora 6-8 lin. longa 1-4 $\frac{1}{2}$ lin. lata, flores illis *F. glutinosæ* genuinæ minores. Species inter *Fagonias simplicifolias* spinis elongatis foliisque parvis distincta, a *F. Olivieri* cui magis affinis statim ramis non quadrangulo-sulcatis distinguenda.

Præter species suprâ enumeratas legi quoque in itinere meo Ægyptiaco-Syriaco *F. glutinosam* in desertis Kahirinis abundè occurrentem ramis sæpè pedibus prostratis et aliquandò arenâ omninò sepultis et *F.*

viscidam Presl. Bemerk.—*F. latifoliam* Schimp. exs. N° 498 non Delile quæ a *F. glutinosâ* floribus paulò majoribus intensius roseis, foliolis acutatis canescentioribus tantum differt et probabiliter ab eâ specificè non distincta est. Hujus *F. viscidæ* in Arabiâ Judææ conterminâ observavi varietatem floribus eis *F. glutinosæ* genuinæ duplò majoribus. *F. Olivieri* tandem legi in regione inter Antilibanum et Damascum sitâ non procul a *Souk Wadi Barrada*.

ZYGOPHYLLUM DUMOSUM Boiss.

Z. fruticosum caulibus erectis a basi ramosissimis ramisque lignosis epidermide albâ farinosâ vestitis dumum 3–5 pedalem intricatissimum formantibus, foliis ad ramos juniores brevissimos fasciculatis adpressissimè canis, petiolo teretî bifoliolato subpersistenti, foliolis teretibus subcompressis oblongo-linearibus caducissimis petiolo paulò brevioribus, floribus axillaribus solitariis pedicello calyci æquilongo suffultis, sepalis membranaceis oblongis acutiusculis adpressè hirtulis, petalis albis angustè oblongis obtusis in unguem longum attenuatis calyce subtriplò longioribus, capsulâ pedicello eâ paulò longiori patentî-deflexo suffultâ globoso-depressâ ad axim usquè in 5 carpella stellatim divisâ, carpellorum dorso acuto in alam membranaceam eis subæquilatam expanso.

Hab. in aridissimis deserti *Arabie petree* in viâ inter *Nuckl* et *Gaza* Legi ineunte Aprili florif. fructiferumque.

Foliola 2 lin. circ. longa petiolo 3 lin. longo sed foliolis tandem delapsis elongato et aucto suffulta, flores illis *Z. albi* et *coccinei* duplò majores, capsula cum alis diametro 4–5 lin. lata. Species caulibus fruticosis 3–5 pedalibus florumque magnitudine a congeneribus desertorum Arabicorum distinctissima.

RUTACEÆ.

RUTA FUMARIÆFOLIA Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 4847.

R. glabra glanduloso-punctata griseo-virens, caulibus suffruticosis tortuosis, ramis tenuibus erectis vel ascendentibus flexuosis ad apicem usquè foliosis, foliis longiusculè et tenuiter petiolatis ambitu oblongis

tenuissimè bipinnato-decompositis pinnis a folio medio utrinquè decrescentibus foliolis minimis oblongo-obovatis in petiolulum attenuatis, corymbis paucifloris contractis, bracteis oblongis acutiusculis pedunculo latoribus, petalis cucullatis obtusis longè margine fimbriatis in unguem subitò contractis, capsulæ lobis acutis.

Hab. in fruticetis propè conventum *Megalo Monastiri* non procul a promontorio *Sidero* prov. *Sitia* Cretæ. (Held. Maio 1846.)

Caules lignosi ramos tenuissimos semipedales vel paulò longiores edentes, folia majora cum petiolo bipollicaria lobulis sesquilineam circiter longis. Affinis *R. bracteosa* et *R. angustifolia* ab utrâque descendens ramis gracilibus foliisque tenuissimè dissectis; prior iterùm differt capsulis acuminatis, posterior petiolis crassis ramisque supernè nudis.

HAPLOPHYLLUM SYLVATICUM Boiss.

H. perenne glaberrimum flavo-virens multicaule dumulos extensos formans, caulibus erectis simplicibus teretibus rubellis densè foliosis apice densè corymbosis, foliis omnibus sparsis strictis oblongo-lanceolatis utrinquè attenuatis acutis, corymbi ebracteati ramis pedicellisque glabris vel breviter puberulis, calycis glabri minutissimi lobis triangulari-ovatis acutis corollâ sextuplò brevioribus, petalis amplis ovatis acutiusculis subcucullatis, filamentis filiformibus stylum subsuperantibus e basi sublatori intus barbatâ sensim attenuatis, ovario glanduloso ecoronato glabro.

Hab. in sylvaticis regionibus alpinæ montis *Cassii* in declivitate austro-orientali, legi Junio 1846.

Dumi e caulibus centenis numerosioribusque constantes pedales vel sesquipedales, folia 4-4 1/2 poll. longa 4-6 lin. lata, flores e maximis generis; species pulcherrima ab *H. suaveolenti* cui magis affinis distincta glabritie, filamentis basi vix latoribus, calycis lobis acutis glabris.

HAPLOPHYLLUM VULCANICUM Boiss. et Heldr. in pl. Anatol. exs. 1846.

H. perenne pluricaule secus caules margines et nervos foliorum brevissimè hirtellum cæterum glabrum, caulibus simplicibus teretibus foliosis apice laxiusculè corymbosis, foliis omnibus sparsis ovato-oblongis sessilibus utrinquè attenuatis acutis glanduloso-punctatis

subtùs prominenter nervosis, corymbi bracteati ramis viscidis sparsimque setosis, bracteis linearibus obtusis ciliatis, calycis basi lineari-bracteolati laciniis ovatis hispidis acutiusculis, petalis pallidè ochroleucis lineari-oblongis obtusis calyce quintuplò longioribus, filamentis e basi subdilatatà longè ciliatà attenuatis filiformibus, ovario albo-villoso.

Hab. in arenosis vulcanicis montis *Karadagh Lycaoniæ* in regione inferiori ad ruinas urbis *Larenda*. (Heldreich.)

Affine *H. fruticoso*, *myrtifolio* et *sulphureo*, prius differt indumento tomentoso, foliis angustis linearibus, petalis abbreviatis, *H. myrtifolium* distinguitur foliis obovatis obtusis enerviis, *H. sulphureum* deniquè distinctum est tomento denso totius plantæ, foliis obtusissimis, petalis ovatis.

HAPLOPHYLLUM ARABICUM Boiss.

H. glaucescens glabrum vel breviter et parcissimè hirtulum, caulibus decumbentibus ascendentibusve ramosis supernè ramisque glandulis prominentibus scabriusculis, foliis obovatis vel oblongo-lanceolatis glandulis plus minus prominentibus obsitis basi attenuatis sessilibus, corymbis terminalibus laxè dichotomis paucifloris, floribus saltem terminalibus pedicello eis longiori suffultis ebracteatis, sepalis ovatis albo-membranaceis ciliatulis, petalis calyce quadruplò majoribus intense flavis ovatis obtusis, filamentis basi dilatatà ovatà parcè hirtulis supernè attenuatis setaceis, ovario inter glandulas albo-hirsuto.

Hab. in valle *Fatme* propè *Meccam*. Schimp. Arab. fel. N° 943 sub *R. tuberculatà*.

Var. α . — Folia minuta obovata 3-5 lin. longa valdè tuberculata obtusa.

Var. β . — Folia oblongo-lanceolata 4-4 $\frac{1}{2}$ pollicaria viridiora superiora acutiuscula.

Hæc species a *R. tuberculatà* longè differt floribus duplò majoribus pedunculatis nec subsessilibus, filamentorum basi parcè hirtulà ovatà nec triangulari-lanceolatà, ovario villosa, nec cum ullà alià specie confundi potest. Ambo formæ a me descriptæ quamvis facie dissimiles floribus et characteribus mirè congruunt.

HAPLOPHYLLUM LONGIFOLIUM Boiss.

H. perenne multicaule glaberrimum viride totum glandulis promi-

nentibus creberrimis scabrum viscosum, caulibus strictis virgatis elongatis strictè ramosis, foliis sparsis longissimè et angustè linearibus margine facie superiori convolutis denticulato-crispis basi subatenuatis incurvis obtusis, corymbis terminalibus dichotomis confertis minutis ebracteatis, sepalis ovatis obtusis glaberrimis, petalis intensè flavis oblongis obtusis, filamentis infernè dilatatis lanceolatis intus tomentosis extus glabris ad apicem partis dilatatæ 2-4 glandulis obsitis, parte superiori setaceo-attenuatis, ovario glabriusculo glandulosissimo.

Hab. in vallibus calidissimis inter *St. Saba* et *mare Mortuum* sitis, legi Maio 1846.

Caules pedales, folia inferiora 2-2 $1\frac{1}{2}$ pollicaria lineam atque paulò amplius lata, superiora breviora magis convoluta, flores eis *H. tuberculati* majores, eis *H. Buxbaumii* minores. Species foliis angustissimis denticulatis distinctissima.

HAPLOPHYLLUM CANALICULATUM Boiss.

H. glaucum, caulibus rectis virgatis minutè et obsolete glanduligeris ramosis parè foliosis, foliis carnosis angustè linearibus elongatis suprà canaliculato-concavis subtus convexis obtusis infernè attenuatis parè glandulosis supremis sensim diminutis lineari-filiformibus, corymbis terminalibus paucifloris capitato-confertis, floribus subsessilibus, sepalis glabris triangularibus obtusis, petalis pallidè ochroleucis ovatis calyce vix triplò majoribus, filamentis eglandulosis infernè dilatato-lanceolatis facie exteriori glabris inferiori hirsutis supernè setaceo-attenuatis, ovario hirtulo.

Hab. in *Persia australi* Aucher N° 4344.

Caules elati virgati firmi, folia sparsa 4 $1\frac{1}{2}$ pollicaria inferiora 4 $1\frac{1}{2}$ lin. lata cætera multò angustiora, corymbi vix nuce avellanæ majores. Affine *H. longifolio* a quo differt caule non glanduloso-scabro, foliis non denticulatis, corymbis capitatis, eglandulosis.

H. glabrum DC. eadem species ac ejus *H. dichotomum* esse videtur.



DIAGNOSES
PLANTARUM ORIENTALIIUM NOVARUM.

**PARISIS. — TYPIS MARCI DUCLOUX ET CONS.,
VIA ÉCOLE-DE-MÉDECINE, 80.**

DIAGNOSES PLANTARUM ORIENTALIU NOVARUM

N° 9.

AUCTORE

E. BOISSIER,

SOC. PHYS. GENEV. SODALI.

—◆◆◆—

PARISIIS.

TYPIS MARCI DUCLOUX ET CONS.

VIA ÉCOLE-DE-MÉDECINE, 80.

—
1849.

DIAGNOSES

PLANTARUM ORIENTALIUU NOVARUM.



RHAMNEÆ.

RHAMNUS CORNIFOLIA. Boiss. et Hohen. — Planta sub hoc nomine in plantis Heldreichianis Anatolicis e monte *Gheidagh* Isauriæ distributa ad hanc speciem non pertinet sed ad *Rh. Sibthorpianum* R. et Sch. — *Rh. pubescentem* Fl. Græc. non Poiret qui quoque in rupibus calcareis Libani crescit.

PISTACIA PALESTINA Boiss.

P. fruticosa, foliis deciduis 4-5-jugis absque impari, petiolo sub-quadrangulo ut et rami juniores breviter et crispulè puberulo, apice inier foliola suprema in mucronem setaceum hirsutum citò deciduum abeunti, foliolis ovatis vel oblongis obtusis longiusculè setaceo-mucronatis vel acutis iu mucronem attenuatis basi semper rotundatis brevissimè petiolulatis inæqualibus junioribus teneris adultis subcoriaceis utrinquè et supernè præsertim nitidis parallelè multinerviis nervis venisque pellucidis margine breviter hirtulis cæterum glabris, floribus..., racemis fructiferis super ramos vetustos nudos sub foliis gregarè oriundis et ex eadem gemmâ pluribus elongatis ramosis flexuosis patulis, rachidis ramis tenuibus e sicco angulatis patulis, vel refractis, fructibus rubellis pedicello eis æquilongo suffultis obliquè ovato-rotundis obtusissimis obliquè et breviter mucronulatis.

Hab. in *Judæa* et *Galilæa*. Boiss.

Frutex affinis *P. terebintho* quæ a nostrâ specie differt foliis jugatis cum impari, foliolis brevius mucronatis basi æqualibus, racemis fructiferis brevioribus crassioribus rectis strictis, fructu rotundato subcompresso æquali.—*P. Atlantica*. De Prodr. quoad plantam e Byzantio aplantâ Fontanesii planè differt petiolis margine acutis vel alatis, foliolis oblongis obtusis muticis nec angustè oblongo-lanceolatis acutiusculis et ad *P. muticam*. F. et M. spectat quæ arbor 50-70 pedalis est comâ densissimâ rotundâ notabilis, in Oriente omni a regionibus transcaucasicis ad Asiam minorem et Syriam usquè frequens.

LEGUMINOSÆ.

GENISTA MELIA Boiss.

G. fruticosa patulè densèque ramosa ramis intricatis rigidis brevibus tomentellis striatis alternatim et crebrè spinosis, spinis brevibus patulis subincurvis infernè striatis folia floresque ferentibus apice breviter acerosis, ramulis novellis ex axillâ foliorum deciduorum spinas superiores fulcientium oriundis flavido-sericeis, foliis simplicibus minimis hirtulis cuneato-ovatis retusisve vel in gemmas sessiles floriferas secùs spinas superiores dispositis vel secùs ramulos novellos sparsis et tunc oblongo-linearibus breviter acerosis, stipulis gemmarum triangularibus ferè obsoletis ramorum juniorum tubulato-spinosis flavidis, pedicellis e gemmarum centro subbinis calyce paulò longioribus apice vel sub apice bibracteolatis, calycis albidii tubo glabro campanulato 5 angulato dentibus tubo brevioribus triangularibus margine hirtulis subæquilongis superioribus paulò latioribus, corollâ glaberrimâ, vexillo oblongo subretuso basi attenuato-stipitato striato alis carinâque longiori, legumine lineari glaberrimo plano toruloso subarcuato 3-4 spermo basi angustato apice breviter mucronato ad marginem seminiferum præsertim strangulato.

Hab. in insulâ *Melos* Archipelagi. (Herb. Fauché.)

Species foliorum minutie formâ leguminum affinis *G. Corsicæ* quæ ab eâ differt ramis gracilioribus, spinis tenuioribus sæpè furcatis, stipulis non spinosis, foliis muticis etc. *G. sphacelata* Decaisne longius distat ramis atropinosis, foliolis in squamulas nigras mutatis, vexillo piloso, etc.

GENISTA CASSIA Boiss.

G. suffrutescens pumila cespitosa, caulibus procumbentibus, ramis erectis simplicibus brevibus tenuibus striatis longè et patulè hirsutis spiniferis, spinis tenuibus glabris simplicibus vel tripartitis angulatis in mucronem longiusculum acerosum abruptè attenuatis erecto-patulis, foliis simplicibus estipulatis lineari-lanceolatis acutis muticis margine patulè et longè ciliatis superioribus lineari-setaceis, floribus in racemum terminalem brevem pauciflorum apice spinosum dispositis brevissimè pedicellatis, bractea ad basin pedicelli setacea calyci subæquilongà, bracteolis sub calyce binis hirsutis tubo calycino æquilongis, calycis tubo glabro laciniis setaceis hirsutis tubo longioribus, vexillo glabro alis glabris æquilongo, carinà rectà obtusà vexillo longiori ad suturam hirsutà cæterum glabrà, legumine...

Hab. in regione montanà *Cassii* Syriæ borealis ubi legi flor. Junio.

Affinis characteribus *G. Anatolicæ*. Boiss. — *G. Orientali* Jaub. et Sp. quæ differt indumento tomentello, dentibus calycis basi dilatatis, vexillo carinàque extus tomentellis etc.

GENISTA LIBANOTICA Boiss.

G. inermis, caulibus brevibus lignosis prostratis vel humo sepultis, ramis brevissimis foliosis simplicibus valdè angulato-striatis pilis rigidis adpressis parcè obsitis cæspitem vix prominentem formantibus, foliis simplicibus sessilibus oblongis vel oblongo-linearibus obtusissimis immarginatis crassiusculis uninerviis pilis sparsis adpressiusculis margine obsitis, stipulis brevibus subulato-spinescentibus, floribus 2-4 ad ramorum apicem sitis, pedicello tubum calycis æquanti basi bractea setacea eo longiori apice 2 bracteolis brevissimis ciliatis obsito, calycis obconici parcè hirtuli laciniis a basi sublitori linearibus tubo subæquilongis inferioribus tribus paulò longioribus angustioribusque, corollà glabrà, vexillo carinam deflexam æquanti, alis brevioribus, legumine juniore parcissimè et adpressè hirtulo plano oblongo-elliptico 1-2 spermo basi attenuato acuto mucronulato.

Hab. in summis convallibus herbidis siccis *Libani* suprà cedros alt. 7000'.

Rami 1-2 pollicares, folia 2-3 lineas longa. Affinis *G. Amantica* Ten. quæ simili foliorum formà gaudet sed habet flores duplò majores.

res, calycis dentes basi latè triangulares etc. Stirps modo crescendi ferè *Salicis herbaceæ* insignis.

GENISTA ANTIOCHIA Boiss.

G. inermis suffruticosa, caulibus abbreviatis ascendentibus vel procumbentibus ramos numerosos erectos virgatos tenues foliosos elevato-striatos glabros simplices vel supernè parcè paniculatos edentibus, foliis simplicibus angustè lineari-lanceolatis uninerviis basi et apice attenuatis in mucronulum flavidum abeuntibus junioribus adpressiusculè pilosulis adultis glabris, stipulis longiusculis subulato-spinosis, floribus racemos densiusculos terminales subsecundos formantibus, pedicello hirtulo calyce breviori bracteà setaceà eo longiori suffulto, bracteolis binis setaceis sub calyce sitis ejus tubo paulò brevioribus, calycis adpressè et parcè hirtuli dentibus triangulari-lanceolatis subæquilongis tubo paulò brevioribus, corollà glabrà, vexillo alis carinàque deflexis vix longiori, legumine glaberrimo lineari plano recto 3-5 spermo basi attenuato apice mucronato ad marginem seminiferam scèpè irregulariter undulato-substrangulato.

Hab. in summis collibus quibus ruinæ arcis *Antiochiæ* insident in Syria boreali. Legi florif. Junio.

Suffrutex ferè pedalis, folia 6-8 lin. longa 4-4 1/2 lata, stipulæ circ. lineam longæ, flores 4 lin. longi. Proxima *G. Lydiæ* Boiss. — *G. leptophyllæ* Spach quæ differt foliis paulò latioribus brevioribusque obtusis, stipulis dimidiò brevioribus, floribus majoribus, legumine longiori sesquilineam lato ad semina toruloso.

GENISTA PESTALOZZÆ Boiss.

G. caulibus prostratis lignosis tortuosis ramos breves filiformes cæspitosos elevato-striatos edentibus, ramis novellis flavido-velutinis, foliis minimis simplicibus oblango-obovatis obtusis basi attenuatis facie superioris concaviusculis utrinquè sed subtus densius patulè flavido-hirsutis pulvino hirsuto insidentibus estipulatis, floribus 4-3 ad ramulorum apicem pedicellis hirsutis calyci æquilongis suffultis e gemmis foliorum oriundis, bracteà bracteolisque nullis, calycis patulè et densè flavido-tomentosi dentibus superioribus binis triangularibus tubo æquilongis labio inferiori paulò longiori ad medium usquè tridentato, vexillo carinàque æquilongis extus sericeis, alis glabris brevioribus, legumine.....

Hab. in monte *Bereket Dagħ*. Lyciæ ubi legit cl. Pestalozza.

Suffrutex terræ adpressus ramis vix pollicem longis intricatis, folia majora vix 2 lineas longa, flores 4 $1\frac{1}{2}$ –5 lin. longi. Affinis *G. pulchellæ* Vis. quæ differt indumento adpressiori sericeo nec patulè tomentello. *G. albida* et *G. Monbretii* foliis sericeis 2–3 plò majoribus longius distant.

CYTISUS CRETICUS Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 4847. (Sect. *Tubocytisus*.)

C. suffruticosus dumosus, caulibus crassis rectis a basi ramosissimis, ramis brevibus strictis teretibus iterum ramulosis, ramulis rigidis cortice rubellà vestitis in spinas validas abeuntibus, foliis minutis trifoliolatis, petiolo foliolis æquilongo. foliolis ovatis obtusis crassiusculis in petiolulos brevissimos attenuatis suprà glabris subtus adpressissimè et parcè sericeis, floribus minutis in foliorum gemmis solitariis racemos terminales breves paucifloros ovatos formantibus, pedicello sericeo ebracteato tubo calycis æquilongo, calycis adpressè hirsuti campanulati ad tertiam partem usquè bilabiati labio superiori ad tertiam partem usquè bilobo dentibus latè triangularibus, inferiori subbrevisiori ad tertiam partem fisso dentibus linearibus villo conniventibus, vexillo plicato valdè incurvo ad marginem superiorem hirsuto cæterum glabro alas carinamque incurvam cymbiformem excedenti, stigmate recto minutè capitato, legumine juniore longo recto angustè lineari longè et adpressè albo-hirsuto.

Hab. in collibus dumosis *Cretæ* inter *Melidoni* et *Damasta* Éparchie *Mylopotamo* Heldreich. Floret Aprili.

Pedalis aut elatior scopariè et strictè ramosissimus, folia cum petiolo lineas tres longa, calyx circ. 3 lin., corolla 5 longa. Inter *Tubocytisus* ramulis strictissimis, florum foliorumque minutie, corollà eximie curvatà insignis.

CYTISUS CASSIUS Boiss (Sect. *Tubocytisus*.)

C. fruticosus, ramis erectis densis ramulosis teretibus lævibus glabris nigricantibus, ramulis foliosis junioribus longè et adpressè sericeis, foliis trifoliolatis junioribus subtus adpressè hirsutis tandem glabris, petiolo crassiusculo plano foliolis dimidiò breviori, foliolis ovato-oblongis obtusissimis mucronulatis basi in petiolulum attenuatis

uninerviis, floribus ad ramorum apicem capitato-congestis, pedunculo tubo calycis æquilongo basi bractea hirsutissima lineari ei æquilonga apice 2-3 bracteolis hirsutissimis suffulto, calycis patulè hirsutissimi labio superiori in 2 dentes triangulares diviso, inferiori paulò longiori angustiorique in tres dentes lineares fisso, corollà....., leguminibus 2-5 capitatis linearibus patulis subincurvis nec basi nec apice attenuatis acutiusculis breviter mucronatis lanà densà adpressà vestitis 3-4 spermis.

Hab. in sylvaticis regionis inferioris *Cassii* in Syrià boreali, legi fructiferum Junio.

Frutex 6-10 pedalis, foliola foliorum majorum circ. 6 lineas longa, legumina fere pollicaria 2 1/2 lineas lata. Affinis *C. eriocarpo* Boiss. qui differt indumento foliorum et ramorum patulo non secedenti, petiolo tenuiori foliolis æquilongo, calycis labio superiori indiviso, legumine longiori planiori apice manifestius attenuato.

CYTISUS DREPANOLOBUS Boiss. (Sect. *Tubocytisus*.)

C. fruticosus humilis, caulibus tenuibus teretibus virgatis infernè nudis supernè corymbosè ramosis, ramis tenuibus erecto-patulis adpressissimè et tenuiter pilosis, foliis trifoliolatis petiolo foliolis paulò breviori suffultis inferioribus minoribus, foliolis oblongis vel oblongo-ellipticis utrinquè attenuatis suprà glabris subtùs parcè et adpressissimè pilosis pallidè virentibus inferioribus obtusis superioribus acutiusculis mucronulatis, floribus in capitulos densos multifloros terminales foliis supremis bracteatos aggregatis, pedicellis tubo calycino brevioribus basi vel medium versùs bractea eis vix longiori et ad apicem 1-2 bracteolis oblongo-linearibus obsitis, calyce campanulato pilis sparsis adpressissimis obsito ultrà medium bilabiato labio superiori ferè ad medium usquè in 2 dentes e basi triangulari subulatos diviso, inferiori apice attenuato in 3 dentes lineari-setaceos fisso, corollà albidà, vexillo secùs marginem superiorem adpressè hirtò cœterùm glabro ovato retuso alas carinamque glabras superanti, stigmatè capitato extrorsum subdeclivi, legumine lineari planissimo falcato patenti-recurvo adpressissimè piloso margine sæpè undulato obtusiusculo mucrone brevi terminato 12-15 spermo.

Hab. in regione sylvaticà *Cassii* cum præcedenti. Legi florif. Junio.

Suffrutex 3-4 pedalis corymbosè ramosus, folia foliorum superiorum 5-6 lineas longa, capitula 9-12 flora nucem æquantia, calyx 4 lineas

longus, legumen 12-15 lin. longum 2 latum. Affinis *C. chrysotricho* et *Austriaco* ab eis calyce abbreviato legumine insigniter falcato distinctus.

PODOCYTISUS Boiss. et Heldr.

Calyx membranaceus campanulatus bilabiatus labio superiori ovato obtusissimo breviter fisso dentibus triangularibus, inferiori longiori apice minutè tridenticulato prius ovato recto dein basi tandem lacerà attenuato oblongo-deltaideo deflexo deciduoque. Vexillum orbiculare obtusum subreflexum abruptè in stipitem brevem basi attenuatum carinæ æquilongum. Alæ liberæ carinâ subbreviares oblongæ latere superiori rectiusculæ inferiori incurvæ infernè utrinquè eximiè plicatæ abruptè et breviter stipitatæ. Carina incurva apice ascendens attenuata acuta bidentata latere superiori concava inferiori convexa basi abruptiusculè et breviter stipitata. Antheræ lineares glabræ. Ovarium angustè lineare rectum glabrum longè attenuato-stipitatum 6-9 ovulatum. Stylus super ovarium angulo recto insidens. Stigma terminale rectum capitato-discoideum papilloso-ciliatum. Legumen planissimum foliaceum oblongo-lineare falcatum basi attenuatum longiusculèque stipitatum indehiscens suturâ utrâque in alam integram latiusculam dilatatâ, semina exarillata. — Frutex Anatolicus facie *Cytisi nigricantis* vel *C. angulati* Boiss. ab omnibus Genisteis fructu indehiscenti utrinquè latè marginato genericè distinctus.

PODOCYTISUS CARAMANICUS Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.

S. glaberrimus glaucovirens, caulibus virgatis tenuibus subherbaceis teretibus foliorum decurrentia parcè et obsoletè striatis foliosis supernè ramulos floriferos parcè foliosos abbreviatos erecto-patulos edentibus pyramidato-paniculatis, foliis trifoliolatis exstipulatis petiolo foliolis longiori vel æquilongo suffultis supremis subsessilibus minoribus; foliolis breviter petiolulatis obovatis obtusis vel truncatis mucronulatis uninerviis, floribus in racemos terminales nudos abbreviatos dispositis nutantibus, pedicello tenui curvato calyce longiori basi nudo apicem versùs 1-2 minutè bracteolato, calycis viridis labiis nigricanti-

marginatis, corollâ flavâ, legumine 3-5 spermo in stipitem tenuem calyce vix longiorem attenuato apice rotundato breviter mucronulato alis utrinquè diametro loculi quadruplò angustioribus exteriori (marginis seminiferi) solâ a loculo nervo elevato separatâ, seminibus nigris compressis.

Hab. in collibus apricis Tauri Isaurici in valle fluvii *Djoksu* inter *Karaman* et *Ermeneke* Fl. Junio (Heldreich).

Caules e meis speciminibus ferè bipedales, foliola 6-9 lin. longa, rami floriferi 5-3 pollicares 6-9 flori terminalis longior, flores vexilli formâ eos *Coluteæ* sp. referentes sed minores, vexillum lin. 5-6 longum 5 latum legumen 15-18 lin. longum 4 1/2 — 5 latum.

LUPINUS LEUCOSPERMUS Boiss.

L. annuus, caule erecto, foliis petiolo plano adpressè hirsuto apice ad petiolulorum insertionem subdilato flavo-sericeo foliolis longiori suffultis, foliolis 7-9 angustè linearibus ex apice truncato vel retuso sensim attenuatis brevissimè petiolulatis suprâ glabris subtùs sparsim et adpressissimè hirtulis margine supernè subconvolutis, stipulis linearibus, floribus alternis in spicam laxiusculam oblongam dispositis, bracteis ovato-oblongis mucronatis calyci æquilongis citò propè basin truncatis deciduisque, calycis adpressiusculè hirsuti labio superiori ad basin ferè usquè in 2 dentes triangulares acutos fisso, inferiori ferè duplò longiori acutiori apice minutè tridenticulato, bracteolis linearibus minutissimis utrinquè tubo calycino ad labiorum basin adnatis, vexillo erecto plicato alis carinæque æquilongo, alis carinâ incurvâ acutâ ferè duplò latioribus, legumine oblongo subtrispermo inter semina substrangulato hirsuto nervis elevatis longitudinaliter anastomosantibus irregulariter reticulato, seminibus legumine dimidiò angustioribus lævibus albis breviter ovatis immaculatis.

Hab. in Hispaniâ propè *Matritum* (herb. Pavon.).

Simillimus *L. angustifolio* ab eo ex speciminibus a me visis sat differre videtur foliolis paulò latioribus 4 1/2 lin. latis glabrescentibus, bracteis brevioribus summis alabastra non superantibus, inprimis legumine majori 15-18 lin. longo 6-7 lato, seminibus majoribus pisi magnitudine albis ovato-globosis nec variegatis ovatis latereque superiori concaviusculis. *L. linifolius* Roth quem e descriptione tantum novi seminibus variegatis legumine tertiâ parte angustioribus globosis diversus quoque videtur.

LUPINUS PHILISTÆUS Boiss.

L. annuus, caulibus erectis simplicibus vel basi ramosis pumilis foliosis in racemum pauciflorum petiolis foliorum supremorum brevioribus abeuntibus, petiolis planiusculis foliolo longioribus basi 2 stipulis linearibus elongatis auctis, foliolis 7-9 angustissimè linearibus apice truncatis basi in petiolulos flavido-hirsutos subattenuatis, floribus sessilibus minimis, bractea oblonga hirsuta calycem subæquanti, calycis adpressè hirsuti labio superiori bipartito dentibus triangularibus acutis, inferiori longiori lanceolato acuto integro, bracteolis oblongis minutissimis vix perspicuis utrinquè inter labia tubo calycino adnatis, corollà cærulescenti calyce vix duplò longiori, vexillo alas carinamque æquanti, alis carinà angustà acutà parùm curvatà vix latioribus, legumine lineari hirsuto 5-6 spermo toruloso acuminato, seminibus 2½ diametri leguminis occupantibus griseis nigro reticulatim maculatis lenticulari-subcompressis.

Hab. in cultis regionis Philistææ inter *Gaza* et *Ramla*, legi Apr. 1848.

Planta semipedalis, foliola 6-9 lin. longa lineæ 1½ lata, corolla cum calyce 5 lineas tantùm lata, legumen 15-18 lin. longum 4 latum. Semen 2 1½ lineas longum latumque. Affinis quoque *L. angustifolio* ab eo videtur distinctus floribus minoribus 3-5 in racemos brevissimos confertis, corollà calyce duplò tantùm longiori, alis angustis, carinà parùm curvatà, seminibus lenticulariter compressis.

LUPINUS PALÆSTINUS Boiss.

L. annuus pluricaulis, caulibus pumilis patulè et longè hispidis, petiolis hispidis folio pluriès longioribus, foliolis obovato-linearibus obtusis infernè attenuatis complicatis utrinquè adpressiusculè hirsutosericeis, stipulis setaceis elongatis, floribus in 3-5 verticillos terminales remotiusculos 5-6 flores sæpè basi irregulares dispositis, pedicellis calycem æquantibus, bracteis linearibus citissimè deciduis, calycis basi gibbi flavido-hispidi labio superiore ad 2½ usquè in 2 dentes e basi triangulari lineari-subulatos partito labio inferiori paulò longiori lanceolato acuto integro, bracteolis lineari-setaceis inter 2 labia tubo calycino adnatis, corollà pallidè flavidà cæruleo tinctà, vexillo ovato obtuso alis et carinæ æquilongo, carinà angustà lineari apice violaceà acutà angulo recto ferè curvatà, legumine flavido-pannosissimo recto

lato-lineari acuminato, semine (immaturo) tantum secus peripheriam vermiculatim tuberculato.

Hab. in cultis regionis Philistæorum cum præcedenti et in Arabiâ Palæstinæ conterminâ.

Semipedalis rarius pedalis, foliola pollicaria apice 3 lineas lata, verticilli florum pollicem vel sesquipollicem invicem remoti, pedunculi 3-4 lineas longi, flores eis *L. variis* paulò minores, legumen ferè bipollicare 5 lineas latum. Affinis *L. vario* qui differt foliis latoribus, indumento totius plantæ adpressiori, labii superioris dentibus brevioribus inferiori tridentatq, floribus cæruleo-violaceis brevius pedicellatis minùs regulariter verticillatis, carinâ curvatâ nec angulo ferè recto infractâ. *L. Forskahlei* Boiss. — *L. digitatus* Forsk. Visian. Egypt. tab. 5 quem in Egypto superiori abundè legi est planta multò major foliolis amplis oblongis, corollâ intensè cæruleâ, vexillo basi flavo-maculato, carinâ cymbiformiter incurvâ apice truncatâ.

MEDICAGO LACINIATA All. var. *brachyacantha* Boiss. — Fructus minor, spinæ diametro anfractûs sæpiùs multò breviores, stipulæ acutè denticulatæ nec pinnatifidæ.

Hab. in arenâ mobili deserti Arabiæ *Petreæ* cum *Hippocrepide cornigerâ* Boiss., ad *Wadi Hamme* Schimper N° 196.

MEDICAGO GALILÆA Boiss.

M. annua glabriuscula, caulibus elongatis ramosis angulatis sulcatis, stipulis semisagittatis acutis latere exteriori profundè et acutè denticulatis, petiolo patulo deflexo planiusculo foliolis dimidiò breviori, foliolis ovato-oblongis parallelè nervulosis circumcîrâ argutè spinuloso-denticulatis denticulis ascendentibus margine subincrassatis, foliolo superiori petiolulato, pedunculis 2-4 floris folio paulò longioribus, floribus minutis intensè flavis, calyce glabro, vexillo alis carinâque duplò longiori, legumine depresso subrotundo glabro anfractibus quinis laxiusculè incumbentibus superficie elevatim reticulato-venosis margine obtusis distichè et horizontaliter spiniferis spinis tenuibus teneris acutis ob situm horizontalem inter se intricatis anfractûs diametro triplò quadruplòque brevioribus sulcato-bicruribus crure posteriori in venam obliquam anfractûs superficie abeunte.

Hab. in herbidis planitie *Esdraelon* Galilææ, legi Maio florentem.

Legumen circ. 4 1/2 lin. diametro latum, pericarpio tenui subchar-

taceo, spinis non pungentibus. Species spinis horizontalibus nec in plano anfractuum sitis insignis, hæc notâ *M. rotatam* cum quâ crescit referens sed hæc egregiè differt spinis brevioribus obtusis crure posteriori in venam non abeunti, anfractus superficie obsolete reticulatâ, stipulis basi pinnatifidis, foliis truncatis supernè tantùm dentatis, etc.

MELILOTUS ARMENA Boiss. (Sect. *Cælorutis*).

M. biennis glabriuscula, caule elato angulato virgato ramoso ramisque duriusculis strictis, foliis oblongis obtusis argutè denticulatis elevatim et parallelè nervulosis terminali majori petiolulato, stipulis setaceis integerrimis petiolo dimidio æquilongis, racemis laxis denique elongatis, pedicellis calyci æquilongis bracteolâ setaceâ suffultis apice curvatis, floribus nutantibus flavis, vexillo alas carinamque paulò superanti, alis carinam æquantibus, legumine glabro ovato acuto mucronato transversè et grossè rugoso-plicato ad suturam superiorem obtusè carinato.

Hab. in *Armeniâ* Aucher n° 547, in Mesopotamiâ inter *Orfa* et *Sue-rek*. Kotschy, n° 70.

Facie et florum magnitudine affinis *M. arvensi* quæ ut et *M. alba* a nostrâ specie fructu obtuso minùs crassè rugoso distinguitur.

POCOCKIA DC.

Character fructûs emendatus.

Legumen pleiospermum planissimum chartaceum samaræforme rectum vel incurvum subindehiscens nervis transversis parallelis elevatis inter se sæpè anastomosantibus striatum, suturâ utrâque vel seminiferâ tantum alatis vel dilatato-carinatis.

Hoc genus meo sensu omnes *Trifolieas* amplectitur legumine plano recto vel curvato donatas in quibus vel ambo suturæ vel seminifera sola alatæ aut carinato-dilatatæ sunt. Hic igitur adnumerandæ sunt species sequentes hucusquè sub *Trigonellâ* enumeratæ et quæ ab eâ ut a *Meliloto* legumine plano nunquam rostrato notisque præcedentibus differunt. *Pocockia* propius quoque accedit ad *Medicaginem* mediante *Poc. ruthenicâ* et *platycarpâ* quas auctores jam plures *Medicagini* adjunxerunt, sed immeritò, nam rugæ transversæ parallelæ suturæ-

que subcarinatæ quæ in speciebus citatis faciliè observantur nec in *M. falcata* occurrunt nec in *Med. hybrida* Boiss. — *Trigonella hybrida* Pourret, nec in ullâ aliâ *Medicaginis* specie. Præter species ulterius describendas sequentes *Pocockiæ* adscribendæ sunt.

Medicago radiata L. — *POCOCKIA RADIATA* Trautv. Flora 1842. II, p. 122.

Trigonella lunata, Boiss. Diagn. 44. — *POCOCKIA LUNATA*, Boiss. — *Trig. biflora* Griseb. Spic. Rumel. 4 pag. 44!

Trigonella ovalis Boiss. Hisp. tab. 54. — *POCOCKIA OVALIS* Boiss.

Trigonella glomerata Hort. Par. — *POCOCKIA GLOMERATA* Boiss. — *Med. brachycarpa* Fisch. — *Melil. glomerata* Fisch.

Trigonella Aucheri Diagn. II. — *POCOCKIA AUCHERI* Boiss.

Trigonella Ruthenica L. — *POCOCKIA RUTHENICA* Boiss. — *Med. Ruthenica* Trautv. Ledeb.

Trigonella platycarpus L. — *POCOCKIA PLATYCARPOS* Boiss. — *Medic. platycarpus*, Trautv. Ledeb.

Trigonella elliptica Boiss. Diagn. II. — *POCOCKIA ELLIPTICA*, Boiss. — *Botryolotus Persicus* Jaub. et Sp. Illustr. Orient, vol I, tab. 63.

Trigonella Cachemirica Camb. in Jacq. Voy. — *POCOCKIA CACHEMIRICA* Boiss. — *Botryolotus Cachemiricus*. Jaub. et Spach. Illustr. loc. cit.

POCOCKIA KOTSCHYI Boiss.

P. glaberrima caulibus erectis elatis teretibus ramosis, foliis petiolo foliolis breviori suffultis, foliolis crassiusculis rigidulis pallidè virentibus breviter cuneatis obtusis vel truncato-retusis obtriangularibus elevatim nervulosis margine integris supernè denticulatis nervo excurrenti breviter mucronulatis, stipulis lineari-setaceis brevibus indivisis, racemis 3-6 floris subsecundis pedunculo ex axillis superioribus orto folio quintuplò longiori suffultis, pedicellis filiformibus calyci æquilongis incurvis, floribus nutantibus magnis, calyce glabriusculo sæpiùs cærulescenti breviter obconico-campanulato dentibus subæqualibus a basi lineari-subulatis tubo paulò brevioribus, vexillo alis carinæque subæquilongis, legumine oblongo-elliptico recto plano calyce triplò longiori pilis sparsis brevissimis hirtulo basi rotundato apice acutiusculo nervis parallelis anatomosantibus transversè et densè striato, suturâ seminiferâ carinato-subalatâ inferiori apterâ, seminibus duobus oblongis.

Trigonella rytidocarpa, Boiss. in Kotschy pl. Pers. bor. 4346.

Hab. in monte *Totschal* propè *Teheran* loc. cit. N° 555.

Radix perennis? *Caules* 1 $1\frac{1}{2}$ –2 pedales, *foliola* circ. 3 lin. longa apice 2 $1\frac{1}{2}$ lata, *flores* magnit. eorum *Loti corniculati*, *legumen* 4 lin. longum 4 $\frac{3}{4}$ latum. Affinis *P. ellipticæ* quæ differt indumento tomentello, *foliolis* triplò majoribus, *floribus* dimidiò minoribus, *calyce* tubuloso, *legumine* basi attenuato 8–9 lin. longo. Proxima quoque *P. Cachemiricæ* quæ differt *stipulis* triangulari–lanceolatis, *legumine* lanceolato–oblongo acinaciformi etc.

POCOCKIA ARABICA Boiss.

P. annua glabriuscula pluricaulis, *caulibus* brevibus angulatis erectis vel ascendentibus, *foliis* petiolo plano *foliolis* paulò breviori suffultis, *foliolis* cuneato–obcordatis apice denticulatis nervo excurrente mucronatis, *stipulis* minimis semiovatis profundè et argutè 7–9 dentatis, *floribus* 2–8 umbellatis nutantibus pedunculo ex axillis superioribus orto *foliis* longiori apice inter pedicellos breviter mucronato suffultis, *pedicellis* capillaribus hirtulis *calyci* æquilongis, *calycis* breviter campanulati *dentibus* triangulari–lanceolatis parcè hirsutis tubo dimidiò brevioribus, *corollâ* pallidè ochroleucâ *calyce* quadruplò longiori, *vexillo* oblongo apice retuso alas carinamque superanti, *alis* linearibus obtusis carinam sublinearem rectiusculam apice violascentem ferè superantibus, *legumine* glabro plano lineari falcato obtusiusculo basi substipitato 6–8 spermo nervis transversis parallelis elevatis densè striato nervo marginali utrinquè in cilia 2–3 serialia tenuia rigidula simplicia vel bifida basi subdilata diametro fructûs triplò breviora abeunti, *seminibus* oblongis subcompressis sub lente tenuissimè tuberculato–punctatis.

Trigonella Arabica Delile in Laborde Voy. Arab. Petr. cum Icone. — *Tr. pecten* Schenk plant. spec. p. 34.

Hab. in totâ Arabiâ Petreâ, in vallibus Sinai rara, ad fines Palæstinæ ad meridiem Gaza vulgarissima. Legi aprili 1846.

Caules 3–6 pollicares, *flores* cum *calyce* 4 lin. longi, *legumen* arcuatum pollicare 2 $1\frac{1}{2}$ lin. latum. Pulchra species affinis *Poc. radiatæ* sed distinctissima.

TRIGONELLA CASSIA Boiss. (Sect. *Fænum græcum*.)

T. annua, *caulibus* brevissimis prostratis simplicibus subangulatis

supernè crispulo-pilosulis, foliis petiolo plano pilosulo foliolis paulò breviori suffultis, foliolis glabriusculis cuneatis apice truncatis emarginatisve nervulosis apice tantum obtusiusculè denticulatis, stipulis lanceolatis hirtulis, floribus axillaribus solitariis sessilibus, calycis tubulosi glabri dentibus lineari-lanceolatis hirtulis tubo triplò brevioribus, corollà calyce sesquolongiori pallidè violaceà, vexillo oblongo elongato retuso alas superanti, alis obtusis carinam obtusissimam rectam infernè angustatam paulò superantibus, legumine longo glabro lineari vix curvato lateraliter compresso nervis longitudinalibus anastomosantibus elevatis percurso striato polyspermo in rostrum lineare subulatum subangulatum eo dimidiò brevius attenuato, seminibus subquadratis tuberculato-scabridis.

In sylvaticis regionis superioris montis *Cassii* in Syrià boreali orientem versùs, legi flor. fruct. Junio.

Florifera 4-4 $\frac{1}{2}$ pollic; fructifera 3-4 pollicaris, flores angusti 3 $\frac{1}{2}$ lineas circ. longi, legumen cum rostro 2-2 $\frac{1}{2}$ pollicare 2 lineas aut paulò ampliùs latum. Species pulchella *Tr. fænugræco* affinis ab eà facilè distinguenda floribus parvis violaceis, legumine breviori longiùs rostrato, *Tr. gladiata* et *Tr. Cariensis* leguminibus villosis brevioribus magis compressis longiùs distant.

TRIGONELLA SIBTHORPII Boiss. (Sect. *Fænum græcum*.)

T. annua tota tomentella albicans, caulibus abbreviatis procumbentibus, foliis petiolo eis æquilongo suffultis, foliolis breviter cuneatis obtusis vel truncatis apice tantum argutè denticulatis, stipulis triangulari-lanceolatis apice subulatis brevibus, capitulis sphaericis, pedunculis folio brevioribus in mucronem pedicellis æquilongum abeuntibus post anthesin incrassatis, pedicellis calyce brevioribus tandem incrassatis, floribus parvis flavis nutantibus, calycis adpressè hirsuti tubuloso-campanulati dentibus subulatis duobus superioribus tubo æquilongis inferioribus brevioribus, corollà calyce plùs duplò longiori, vexillo carinæ incurvæ obtusissimæ æquilongo, alis brevioribus, leguminibus subpatulè hirsutis calyce multoties longioribus cylindricis angulatis subnerviis sensim attenuatis breviter mucronatis deflexis parte inferiori inter se arcuè approximatis extremitate curvatis divergentibus, seminibus ovatis flavidis lævibus.

Hab. in *Asià minore* (Boiss.) in *Cypro* (Sibth.)

Trigonella hamata Fl. Græca tab. 764 non L.

Legumen 8-10 lineas longum infernè lineam latum. Planta affinis *Tr. Sprunerianæ* Boiss. sed ab eà distincta foliolis magis truncatis argutiùs denticulatis, pedunculo foliis breviori, leguminibus brevioribus minùs rostratis curvatisque non reticulato-nervosis extremitate tantùm divergentibus nec ascendentibus.

TRIGONELLA HIEROSOLYMITANA Boiss. (Sect. *Fœnum græcum*.)

T. annua crispulè hirtula, caulibus procumbentibus erectisve angulato-sulcatis, foliis inferioribus petiolo eis longiori superioribus eis æquilongo suffultis, foliolis oblongis obtusis circumcìcà denticulis ascendentibus argutis obsitis, stipulis e basi triangulari elongatis subulatis, floribus in racemos capituliformes sub anthesi ovatos dein oblongos dispositis, pedunculo folia superanti in mucronem pedicellis longiorem abeunti, pedicellis curvatis calyce brevioribus, floribus magnis nutantibus, calyce hirsuto breviter campanulato elevato-nervoso dentibus lanceolato-subulatis subæqualibus tubo subæquilongis, corollà aurantiacà calyce triplò longiori, vexillo carinam obtusam margine superiori rectam æquanti, alis multò brevioribus, legumine (juniori) adpressè hirsuto angulato-cylindrico calyce multoties longiori deflexo valdè curvato extremitate erecto brevissimè attenuato acuto.

Hab. in collibus circà *Hierosolymam*, præsertim in monte *Olivetò* frequens, in *Syrià* ad *Aleppum* Kotschy n° 461. Hùc quoque probab. spectant specimina Heldreichiana et *Alaya* Pamphyliæ sub *Tr. Sprunerianà* distributa.

Legumen 8-9 lin. longum basi vix lineam latum. Affinis *Tr. Sprunerianæ* a quà distinguitur foliolis majoribus magis elongatis, capitulis ovatis nec sphaericis, floribus aurantiacis ferè duplò majoribus, dentibus calycis æqui nec inæquilongis, legumine curvatori non rostrato.

Ex locis *Tr. Sprunerianæ* in Diagn. II p. 48 dele specimina Kotschyana e Cilicià n° 463 quæ novam sistunt speciem, *Trig. Kotschyi* Fenzl *Tr. Hierosolymitanæ* propiùs quam *Tr. Sprunerianæ* affinem sed ab eà diversam capitulis paucifloris brevissimis, corollà pallidissimè ochroleucà, carinà latà brevi deflexà extremitate rubescenti, leguminibus sparsim et adpressè hirsutis in rostrum subulatum attenuatis curvatis circ. 9 lin. longis infernè 2½ lin. diam. latis.

TRIGONELLA PLAGIONEURA Boiss. (Sect. *Fænum græcum.*)

T. annua adpressiusculè et parcè hirtula virens, caulibus pumilis procumbentibus brevibus divaricatim ramosissimis ramisque tenuibus, foliis pedicello tenui brevi suffultis, foliolis cuneatis vel cuneato-linearibus obtusis truncatisve apice tantum argutè denticulatis, stipulis e basi triangulari setaceis, floribus parvis in capitulum rotundum congestis subsessilibus, pedunculo filiformi apice mucronato florifero folia non superanti fructifero elongato, calycis parcè hirtuli nervulosi breviter tubulosi dentibus lanceolatis superioribus binis tubo brevioribus inferiores paulò superantibus, corollà flavà calyce sesquolongiori, vexillo carinam curvatam obtusam æquanti, alis brevioribus, leguminibus adpressissimè puberulis cylindricis nervis elevatis obliquè longitudinalibus anastomosantibus percursis deflexis curvatis extremitate sensim attenuatis acutis patulè ascendentibus, seminibus elongatis cylindricis lævibus.

Hab. in arenosis ad *Gazam* Palæstinæ. Legi fl. et fr. Aprili.

Foliola 2-3 lin. longa, flores eis *Medicaginis minimæ* vix majores, legumen ferè pollicare diametro lineam dimidiam latum. A præcedentibus floribus parvis, legumine tenuiori obliquè nervato distincta.

TRIGONELLA FILIPES Boiss. (Sect. *Fænum græcum.*)

Tr. annua, pilis crispulis hirta, caulibus filiformibus brevibus procumbentibus, foliis breviter petiolatis, foliolis nervulosis cuneato-ovatis oblongisve circumcîrca minutè denticulatis parvis, stipulis e basi triangulari setaceis, floribus minimis in capitulum sphæricum congestis pedunculo setaceo folia superanti apice aristato suffultis, calycis tubulosi adpressè hirti dentibus lanceolatis superioribus tubo subæquilongis cæteris brevioribus, corollà flavà calyce vix sesquolongiori, vexillo carinà obtusà paulò longiori, alis carinæ æquilongis, leguminibus deflexis cylindricis curvatis extremitate ascendentibus præter pilos adpressos patulè hispidulis basi 1-2 spermis supernè in rostrum sensim angustatis, seminibus cylindricis subincurvis.

Hab. in collibus siccis dumosis circà *Rascheya* Antilibani cum pluribus aliis ejusdem generis, legi Maio.

Caules ex eadem radice plures 2-6 pollicares, capitula et flores formà et magnitudine ea *Trifolii filiformis* referentia. Legumen 6-7 lineas

longum basi lineæ $3\frac{1}{4}$ latum angulato-curvatum. A præcedentibus quibus quoque affinis differt florum minutie caulium et pedunculorum ternuitate, leguminis indumento duplici.

TRIGONELLA LILACINA Boiss. (Sect. *Fænum græcum.*)

Tr. annua adpressiusculè hirta, caulibus tenuibus erectis ramosis, foliis petiolo tenui canaliculato suffultis, foliolis cuneato-oblongis obtusis nervoso-sulciosis subtus subcanescentibus apice minutè denticulatis, stipulis subulatis adpressè hirsutis, floribus in racemos ovato-oblongos laxiusculos dispositis, pedunculo foliis longiori apice aristato, pedicellis calyce brevioribus bracteolâ setaceâ suffultis, floribus nutantibus lilacinis, calycis tubulosi nervosi adpressè hirsuti dentibus subulatis superioribus tubo cæterisque paulò longioribus, corollâ calyce plus duplò longiori, vexillo lineari carinam elongatam parùm incurvam obtusam æquanti, alis paulò brevioribus, leguminibus deflexis cylindricis curvatis extremitate sensim attenuatâ acutâ ascendentibus patulè hispidulis obsoletè et obliquè nervulosis, seminibus oblongo-cylindricis minutè tuberculatis.

Hab. in Carmelo, in collibus propè Nazareth. (Boiss. Pinard.)

Planta semipedalis, foliola 5-6 lin. longa apice tres lata, flores angusti 3 lineas longi, legumen 8-9 lin. longum basi $3\frac{1}{4}$ lineæ latum. Species formâ et colore corollæ a præcedentibus imprimis a *Tr. plagioneurâ* cui magis affinis distincta.

TRIGONELLA STRANGULATA Boiss. (Sect. *Fænum græcum.*)

Tr. annua pilis crispulis brevissimis hirta virescens, caulibus pumilis erectis, foliis petiolo brevi suffultis, foliolis cuneato-obtriangularibus obtusissimis truncatis minutissimè et obtusè denticulatis, stipulis brevibus e basi triangulari setaceis, floribus 4-7 in racemum laxum brevem dispositis, pedunculo foliis longiori apice aristato, floribus nutantibus pedicello calyce breviori suffultis, calycis parçè hirtuli campanulati dentibus subulatis superioribus tubo æquilongis inferioribus paulò brevioribus, corollâ flavâ calyce duplò longiori, vexillo alis paulò longiori, carinâ rectiusculâ obtusissimâ alis subbreviori, leguminibus deflexis subcurvatis cylindrico-subcompressis apice breviter attenuatis adpressè hirtulis 3-4 spermis inter semina angustatis torosis longitu-

dinaliter grossè et elevatim plurinerviis, seminibus ovatis subcompressis minutè tuberculatis.

Hab. in collibus siccis *Antilibani* circà *Rascheya*. Legi Maio.

Caules 3-4 pollicares, foliola 4-5 lin. longa lataque, flores ferè 3 lineas longi, legumen 6-7 lin. longum lineam latum. Species a præcedentibus foliolis brevibus latis, racemis laxis, legumine subcompresso toruloso strangulato distinctissima.

TRIGONELLA SINUATA Boiss. (Sect. *Buceras*.)

Tr. annua tota pilis brevissimis crispis hirtula, caulibus tenuibus brevissimis erectis vel procumbentibus, foliis petiolo filiformi eis æquilongo suffultis, foliolis minimis brevissimè cuneato-obcordatis elevatim nervulosis circumcircà basi exceptà argutè denticulatis, stipulis semisagittatis basi parcè dentatis, floribus minimis in capitulos parvos subglobosos densos pedunculo mutico foliis æquilongo suffultos congestis, calycis parcè et adpressè puberuli dentibus lanceolato-subulatis æquilongis tubo paulò longioribus, corollà flavà calyce duplò longiori, vexillo alas carinamque æquilongas paulò superanti, leguminibus parcè puberulis subsessilibus ex apice pedunculi stellatim patentibus ængustissimè linearibus compressis rectis attenuato-mucronatis 3-4 spermis, margine seminifero crassiusculo recto, altero inter semina undulato-sinuato, pericarpio ad semina præsertim rugoso-gibbo, seminibus (junioribus) cylindricis lævibus.

Hab. in collibus circà *Rascheya Antilibani*, legi Maio.

Caules bipollicares, foliola 2 lin. circ. longa lataque, flores sesquilineam longi, legumen 6-7 lin. longum dimidiam lineam vix latum. Species minutie omnium partium et legumine sinuato insignis, collocanda juxtà Tr. *Fischerianam* quæ differt floribus triplò majoribus, legumine utroque latere flexuoso, etc.

Inter Tr. *cancellatam* Desf., Tr. *tenuem* Fisch. et Tr. *striatam* floræ Altaicæ nulla discrimina detegere queo. Hæc species igitur nomine Tr. *cancellatæ* designanda, nam Tr. *striata* Linn. fil. ob patriam Abyssiniam et legumina recta et longissima dicta certè ad aliam stirpem spectat.

TRIGONELLA POLYCARPA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Buceras*.)

Tr. annua tota densè et adpressiusculè hirtula multicaulis, caulibus

procumbentibus demum elongatis, foliis petiolo eis subæquilongo suffultis, foliolis minutis cuneato-suborbiculatis obtusis obtusiusculè denticulatis, stipulis semisagittatis latere exteriori denticulatis, floribus magnis subsessilibus in capitulos multifloros rotundos densos dispositis, pedunculo mutico foliis 2-3plò longiori fructifero apice incrassato, calycis adpressè hirsuti dentibus lanceolatis apice subulatis inter se et tubo æquilongis, corollà aurantiacà calyce triplò longiori, vexillo alas superanti, alis carinà rectà obtusà longioribus, leguminibus pedicello brevissimo incrassato eis æquilato suffultis rectis rigidis angustè linearibus subcompressis apice attenuatis adpressè pilosulis valdè rugoso-scribiculatis polyspermis ad pedunculi apicem densè fasciculatis strictis apice divergentibus, seminibus breviter prismaticis (junioribus) lævibus.

Hab. in campis sterilibus ad orientem urbis *Adalia* in Pamphylia. (Heldreich.)

Caules floriferi 4-5 pollicares, fructiferi sæpè pedales. Capitula magnitudinis et formæ illorum *Trifolii aurantiaci*, flores ferè 4 lin. longi. Legumina 13-18 in eodem capitulo, 10-12 lin. longa lineæ 2/3 lata. Species pulchra florum magnitudine et colore *Tr. aurantiacam* referens quæ longè differt leguminibus laxè capitatis tenuiter pedicellatis patulis arcuatis, etc.

TRIGONELLA CALESYRIACA Boiss. (Sect. *Buceras*.)

Tr. annua parcè et brevissimè pilosula, caulibus crassiusculis ascendentibus angulatis basi ramosissimis, foliis petiolo striato eis æquilongo vel longiori suffultis, foliolis glabriusculis viridibus cuneato-obcordatis supernè tantum denticulatis, stipulis brevibus inferioribus semisagittatis basi denticulatis superioribus lanceolatis acuminatis, floribus in capitula laxa rotunda dispositis, pedunculo mutico foliis æquilongo, pedicellis tenuibus calyci æquilongis longioribusve, calycis glabri dentibus lanceolatis inter se et tubo æquilongis inferiori angustiori, corollà flavà calyce triplò longiori, vexillo alis paulò longiori, carinà parùm curvatà alis subbrevisiori, legumine pedicello incrassato eo angustiori insidenti erecto arcuato longè et angustè lineari compresso apice attenuato acuto glaberrimo tenuissimè longitudinaliter striato, seminibus subquadratis compressis tenuissimè punctato-tuberculatis.

Hab. ad margines agrorum in *Calesyria* inter *Zebdani* et *Zachle*.

Caules 6-10 pollicares, foliola 4-7 lin. longa apiceque lata, flores eis *Tr. corniculata* paulò majores. Legumen super pedunculum rectum sed arcuatum 1½-2 pollic. longum lineam latum. Pulchra stirps ab omnibus sectionis distincta legum. longissimo non transversè vel obliquè sed longitudinaliter et tenuissimè striato.

TRIFOLIUM PAMPHYLICUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.
(Sect. *Lagopus*.)

Tr. annuum caulibus teretibus adpressè hirsutis, foliis minutis breviter petiolatis, foliolis adpressè hirtis lineari-ellipticis integris, stipulis patulè hirsutis angustis oblongo-linearibus subscariosis nervosis caudà brevissimà setaceà terminatis, capitulis ovatis bracteatis fructiferis oblongis densis, calyce tubuloso densè et longè rufescenti-piloso dentibus æquilongis setaceis villosis rectis fructiferis patulis tubo obsoletè striato sesquilateralibus, fauce margine tomentellà, corollà purpureà calyce sesquilaterali, vexillo angustè lineari alas multò superanti, alis carinà apice subattenuatà longioribus.

Hab. in arenosis Pamphyliæ ad fluvium *Melas* infrà *Monargat* (Heldreich) Aprili.

Caules 4-4 pollices 2-3 longi, foliola 3-4 lin. longa lineam lata. Capitula demum pollicem longa 8-9 lin. lata. Corolla vix 5 lineas lata. Affine *Tr. angustifolio* et *purpureo* quorum prius foliis majoribus, capitulis longioribus apice attenuatis, corollà calycinis dentibus breviori, posterius foliis multò majoribus, corollà duplò majori, calyce subtriplo longiori dentibus inæqualibus, stipulis longè caudatis differunt. *Tr. Roussæanum* deniquè foliolis oblongis, capitulis subrotundis, dentibus calycis tubo duplò longioribus, corollà calyce plus duplò longiori dignoscitur.

TRIFOLIUM DICHROANTHUM Boiss. (Sect. *Lagopus*.)

Tr. annuum, caulibus teretibus procumbentibus pilis griseis adpressiusculis plus minus hirsutis, foliis inferioribus longiusculè petiolatis, foliolis elliptico-linearibus obtusis sæpè subtruncatis pilis adpressissimis micantibus utrinquè obsitis, stipulis patulè hirsutis oblongis subinflatis scariosis nervosis caudà brevissimà setaceà terminatis, capitulis pedunculo foliis breviori suffultis basi nudis floriferis ovatis

fructiferis cylindricis, calyce pilis longis murinis sub anthesi adpressis dein patulis hirsutissimo dentibus setaceis tubo nigrostriato paulò longioribus, inferiori paulò longiori omnibus rectis dein fructiferis erecto-patulis, corollà angustè lineari infernè purpureà supernè pallidè carneà calyce triplò longiori, vexillo alis tertià parte longiori, alis carinam acutiusculam paulò superantibus.

Hab. in collibus Judææ circà *Gazam*. Fl. ineunte aprili.

Variat caulibus 2-3 pollic. pedalisque, foliola 6-9 lin. longa 2-3 lata, capitula fructifera sæpè sesquipollicaria. Corolla 10-12 lin. longa. Pulchra species affinis *Tr. purpureo* a quo differt stipularum caudà brevi, corollis proportionè calycis multò longioribus et inprimis vexillo longissimo supernè discolori.

TRIFOLIUM PALÆSTINUM Boiss. (Sect. *Lagopus*.)

Tr. annuum, caulibus pilis griseis patulis longis molliter hispidis teretibus, foliis saltem inferioribus longè petiolatis, foliolis patulè et breviter hirtis oblongis vel elliptico-linearibus obtusiusculis, stipulis hirsutis scariosis ovato-oblongis nervosis subinflatis in caudam setaceam eis subæquilongam subito contractis, capitulis pedunculo brevi suffultis vel foliis supremis involucreis ovatis tandem oblongis, calyce pilis griseis longis densissimis erecto-patulis hispidissimo sericeo-nitenti dentibus setaceis hispidis tubo paulò longioribus inferiori sublongiori post anthesin deflexo, corollæ albidæ calycem vix quartà parte excedentis vexillo angustè lineari alas acutiusculas tertià parte excedenti, carinà acutiusculà alis paulò breviori.

Hab. in arenosis circà *Gaza* Palæstinæ. Legi Aprili.

Variat ut species præcedens caulibus 1-2 pollic. pedalisque, foliola 5-12 lin. longa circ. 3 lata. Capitula fructifera 8-9 lin. longa sericeo-murina, corolla circ. 7 lin. longa. Affine præcedenti sed pili longiores magisque patuli corollæque cum calyce proportio diversa. *Tr. formosum* d'Urv. — *Tr. dasyurum* Presl. quoque affine differt caudà stipularum longissimà, calycis dentibus longissimis tandem stellatim patentibus.

TRIFOLIUM BITHYNICUM Boiss. (Sect. *Eutriphyllum*.)

Tr. perenne adpressè pilosulum, rhizomate suffrutescenti caules plures ascendentes simplices subangulatos edenti, foliis petiolo plerum-

quæ eis breviori suffultis, foliolis oblongo-ellipticis obtusis elevatim et densè nervulosis suprâ glabris subtus pallidioribus ad nervum medium marginemque ciliatulis cæterum glabris, stipulis lanceolato-linearibus acutis nervoso-sulcatis parte liberâ longiori, capitulis geminatis ovato-rotundis foliis supremis involucretis, calycis tubo glabro 10 nervi dentibus setaceis patulè et parcè hirsutis tubo æquilongis fructiferis patentibus inferiori aliis vix longiori, fauce pilosâ, corollâ roseâ calyce sesquilongiori, vexillo alis æquilongo carinâ paulò breviori.

Hab. in sylvaticis regionis mediæ *Olympi Bithyni* Legi Julio 1842.

Facies *Trifolii alpestris*. Caules semipedales, foliola pollicem aut paulò amplius longa 6 lin. lata, corolla 7 lin. longa. A *Tr. pratensis* foliolis elongatis stipulis lanceolatis nec ovatis abruptè aristatis dentibus calycinis subæquilongis faciliè distinguendum. *Tr. expansum* W. K. magis affine tamen differt stipularum parte liberâ breviori subulato-attenuatâ, capitulis solitariis, calycis tubo hirsuto, dente inferiori duplò longiori, vexillo alas superanti, etc.

TRIFOLIUM CAUDATUM Boiss. (Sect. *Eutriphyllum*.)

Tr. perenne secus caules et petiolos pilis patulo-deflexis subviscidis densis brevibus molle, caulibus ascendentibus vel procumbentibus elongatis crassiusculis parcè ramosis, foliis longè petiolatis, foliolis ovatis retusis subsessilibus densè nervulosis subintegris adpressiusculè hirsutis viscidulis, stipulis hispidissimis infimis basi angustè linearibus parte liberâ longiori setaceâ superioribus basi ovato-triangularibus in caudam linearem foliaceam supernè sæpè subdilatatam obtusam parte adnatâ 1-2plò longiorem attenuatis, capitulis terminalibus solitariis breviter ovatis foliis binis eorumque stipulis involucretis, calyce pilosulo 10nervi dentibus lanceolato-subulatis uninerviis 4 inferioribus nigricantibus tubo albido æquilongis superiori paulò longiori, fauce breviter fimbriatâ, corollâ purpureâ calyce triplò longiori, vexillo ineari subrecurvo alas longè superanti, alis carinâ sublongioribus.

Hab. in herbidis partis superioris montis *Mesogis* suprâ *Tralles* in *Lydiâ* ubi Junio 1842 legi.

Caules 1½—1 pedales. Folia alia radicalia cæspitosa foliolis minoribus alia caulina foliolis 7-9 lin. longis, stipularum superiorum cauda 5-8 lin. longa 1½—3¼ lineæ lata. Capitula eis *Tr. pratensis* paulò majora. Ab eo ut et a *Tr. expanso* indumento molli viscidulo subdeflexo, stipularum caudâ herbaceâ longâ lineari nec subulatâ, calycis

dentibus lanceolato-subulatis nec setaceis, corollâ calycis proportionem multo longiori distinctum. *Tr. caudatum* inter gregem *Tr. pratensis* et *Tr. ochroleuci* dentium calycis formâ intermedium est; in *Tr. ochroleuco* et affinibus dentes quoque lanceolato-subulati sunt sed tri nec uninervi, corolla calycis proportionem brevior, faux annulo elevato coarctata, stipulæ supernè subulato-attenuatæ.

TRIFOLIUM CASSIUM Boiss. (Sect. *Eutriphyllum*.)

Tr. perenne adpressissimè canescens, caulibus pluribus procumbentibus vel ascendentibus longis teretibus, foliis longè petiolatis, foliolis amplis elliptico-oblongis integris inter pilos adpressos utrinque glanduloso-punctatis inferioribus integris obtusis superioribus angustioribus elliptico-lanceolatis acutis vel mucronatis obsoletè denticulatis, stipulis lanceolatis sensim attenuato-acuminatis apice setaceis parte liberâ duplò saltem longiori, capitulis priùs rotundis dein oblongis suprâ folia superiora breviter pedunculatis sessilibusve, calycis tubo adpressè hirsutissimo obsoletè 10nervi dentibus lanceolato-subulatis trinerviis 4 superioribus tubo æquilongis rectis inferiori 2-3plò longiori deflexâ, fauce annulo velutino coarctatâ, corollâ pallidè roseâ calyce subtriplò longiori, vexillo lineari alis carinam acutam subsuperantibus longiori.

Hab. in sylvaticis regionis inferioris montis *Cassii* ubi legi Junio 1846.

Caules 1-2 pedales, foliola inferiora sæpè sesquipollicem longa, capitula fructifera sesquipollicaria, calycis fructiferi dens inferior deflexus 5-6 lin. longus, corolla linearis pollicaris. Pulchra planta quam primùm pro formâ rhodanthâ *Tr. ochroleuci* habui sed quæ ab eo specificè satis differre videtur foliolis superioribus acutis vel acuminatis nec obtusis, floribus majoribus, corollâ calycis proportionem longiori, tubo calycis obsoletè nec sulcatum nervoso dentibus multò longioribus.

TRIFOLIUM PLEBEIUM Boiss. (Sect. *Eutriphyllum*.)

Tr. annuum, caulibus brevibus diffusis patulè tomentellis, foliolis adpressè pilosis ovatis obtusis obsoletè denticulatis, stipulis lanceolatis acutis parte liberâ sublongiori, capitulis ovatis fructiferis ovato-rotundis breviter pedunculatis, calyce florifero breviter tubuloso ad-

pressè hirtò dentibus rectis lanceolato-subulatis superioribus tubo æquilongis inferiori subduplò longiori, calycis fructiferi tubo 40 sulcato-striato ovato-compresso dentibus breviter triangularibus acutis patulis trinerviis inferiori longiori, fauce clausâ, corollâ ochroleucâ lineari calyce triplò longiori tandem deciduâ, vexillo alis carinâque æquilongis longiori.

Hab. in siccis Antilibani inter *Rascheya* et *Damascus* ubi legi Maio 1848.

Caules in meis speciminibus 3-4 pollicares, foliola 3 lin. circ. longa, capitula fructifera avellanâ minora, corolla subincurva 5-6 lin. longa. Affine *Tr. scutato* in Galileæ herbidis humidiusculis frequentissimo et quod differt indumento parco crispulo, calycis tubo glabro, dentibus etiam floriferis duplò latioribus lanceolatis, calycibus fructiferis duplò majoribus arcuè imbricatis. *Tr. maritimum* longius differt calyce corollam subæquanti dentibus lanceolatis fructiferis erecto-patulis.

TRIFOLIUM FILICAULE Boiss. et Heldreich. (Sect. *Eutriphyllum*.)

Tr. annuum pilis parçissimis brevibus adpressis hirtulum, caulibus procumbentibus filiformibus teretibus elongatis, foliolis ovatis obtusis basi cuneatis nervis utrinquè versùs marginem curvatis parallelis elevatis crebris obsitis obsoletè denticulatis, stipulis parvis e basi triangulari abruptè et breviter setaceo-caudatis, capitulis longè pedunculatis foliis summis bracteatis floriferis ovatis fructiferis oblongis, calycis tubo 40 sulcato-striato basi latere superiori penicillato-piloso cœterùm parçè hirtulo dentibus lanceolato-subulatis rigidis nervo albo valido percursis duobus superioribus tubo æquilongis inferioribus longioribus, calyce fructifero aucto subincrassato dentibus patulè squarrosis, fauce annulo inflato glabro coarctatâ, corollâ pallidè carneâ gamopetalâ calyce subduplò longiori, vexillo subrecurso alas superanti, alis carinam mucronulatam paulò superantibus.

Trifolium rotundifolium pl. Tayget. exs. non Fl. Græca.

Hab. in saxosis faucis *Parori* Taygeti propè *Mistra* Heldreich, Fl. Junio.

E diagnosi incompletissimâ Prodromi floræ Græcæ hanc plantam primum ad *Tr. rotundifolium* Sibth. retuleramus quod ex icone nunc visâ est species planè diversa ex affinitate *Tr. stellati* aut forsân *Tr. globosi*. Nostrium *Tr. filicaule* est affine *Tr. scabro* et præsertim *Tr. Dalmatico* quod differt caulibus validioribus, stipulis majoribus,

foliis supremis capitulum superantibus nec eo multò brevioribus, capitulis minoribus etiam fructiferis ovatis, floribus multò brevioribus, corollà polypetalà calycem parùm superanti.

TRIFOLIUM ERIOSPHÆRUM Boiss. (Sect. *Trichocephalum*.)

Tr. annuum, pilis adpressis canescens, caulibus elongatis diffusis angulato-striatis, foliolis obovato-cuneatis obtusissimis obsolete denticulatis, stipulis semiscariosis ovatis obtusis mucronulatis integris, capitulis oblongis basi attenuatis fructiferis globosis pedunculo foliis æquilongo vel sublongiori suffultis, floribus sessilibus exterioribus corollatis, calyce tubuloso longè et densissimè albolanato dentibus tenuiter setaceis æquilongis rectis tubo paulò longioribus, corollà calyce sesquilongiori versicolori basi rubellà apice carneo-flavidà, vexillo oblongo-lineari alas carinà longiores superanti, floribus interioribus sterilibus mutatis in setas apice radiatim et horizontaliter 5 fidas longè densèque lanatas in capitulo fructifero expansas intricatas globum densè et molliter lanatum formantes, semine ovato-compresso nigro.

Hab. in herbidis Palæstinæ propè *Hierosolymam*. Legi Aprili.

Caules filiformes 1½-4 pedales, corolla cum calyce 7 lineas longa, capituli fructiferi magnitudinis nucis avellanæ parvæ. Affine *Tr. nidi-fico* Griseb. et præsertim *Tr. globoso* L., distinctum stipulis non longè acuminatis, floribus duplò longioribus, corollà calyce sesquilongiori nec vix exsertà, lanà capitulorum molliori albà nec griseà.

In Diagn. II p. 28 et 29 pro *Tr. globoso* Boiss. non L. pone *Tr. nidi-ficum* Gris. et loco *Tr. Oliveriani* Ser. pone *Tr. globosum* L., nam suadente cl. Grisebach in Fl. Rumel. nomen Linnæi speciei in icone floræ Græcæ exhibitæ et circà Byzantium frequentiori aptius tribuendum.

TRIFOLIUM NERVULOSUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Trifolium*.)

Tr. annuum glabrum, caulibus teneris erectis flexuosis, foliis petiolo eis æquilongo vel breviori suffultis, foliolis minutis cuneato-oblongis vel lineari-cuneatis obtusis argutè denticulatis elevato-nervulosis, stipulis centro scariosis margine herbaceis semiovatis obtusis nervulosis argutè denticulatis propè apicem usquè petiolo adnatis,

capitulis ovatis densis pedunculo foliis pluries longiori suffultis, floribus sessilibus, bracteis ad squamulas tridentatas vix lente perspicuas reductis, calycis glabri tubo albido valdè sulcato acutè 10 striato obconico dentibus viridibus lanceolatis in mucronem attenuatis nervoso-carinatis tubo æquilongis calycis fructiferi squarroso-patentibus, corollâ carneâ calyce plûs duplò longiori, vexillo recto lineari apice retuso carinâ obtusâ duplò longiori, alis carinam paulò excedentibus, legumine calyce longiori ovato compresso obliquo basi in stipitem brevem attenuato apice gibbo rostro laterali ei æquilongo obsito, semine oblongo.

Hab. in herbidis siccis collium ad *Alaya* Pamphyliæ (Heldr.), in arenosis ad *Gaza* Palæstinæ (Boiss.)

Caulis 4-6 pollicares, foliola 2 1/2-4 lin. longa, capitulum avellanâ minus, flores angusti 3 1/2 lin. longi. Affine *Tr. stricto* et *glandulifero*, a priori foliolis non lineari-lanceolatis, dentibus calycinis nec tubo longioribus nec corollam subæquantibus etc., a posteriori foliis eglandulosis, capitulis non globosis exinvolucratis etc. facîle distinguendum.

TRIFOLIUM GALILÆUM Boiss. (Sect. *Trifolium*.)

Tr. annuum glabriusculum, caulibus erectis tenuibus angulatis simplicibus, foliis petiolo æquilongo vel breviori suffultis, foliolis inferioribus oblongo-ovatis superioribus linearibus omnibus subsessilibus elevato-nervulosis obtusiusculè denticulatis obtusis, stipulis ovatis valdè nervulosis acutè denticulatis præter marginem virescentem alboscariosis suprâ medium petiolo adnatis apice triangularibus acutis, capitulis globosis pedunculo foliis multoties longiori suffultis, floribus sessilibus, bracteis ad squamulas lente tantum conspicuas brevissimas denticulatas reductis, calycis tubo albido glabro obconico profundè 10 sulcato striatoque dentibus viridibus subulatis longè mucronato-attenuatis tubo longioribus post anthesin præsertim squarroso-patentibus sinibus inter dentes margine ciliatis, corollâ calyce plûs duplò longiori roseâ, vexillo oblongo-lineari obtuso carinâ duplò longiori, alis carinam excedentibus, legumine calycem non excedenti obovato compresso basi angustato apice obtuso gibbo oblique stylo eo longiori rostrato, semine oblongo compresso.

Hab. in *Galilæa* circâ *Banias* ubi Maio ineunte legi.

Tr. nervuloso et *glandulifero* valdè affine, prius differt capitulis

ovatis nec rotundis, calycis glaberrimi dentibus tubo non longioribus, vexillo magis attenuato retuso. Posterius foliis stipulis dentibusque calycinis glanduliferis, calycis fructiferi tubo membranaceo obsolete nervoso facile dignoscitur.

TRIFOLIUM MODESTUM Boiss. (Sect. *Trifolium*.)

Tr. perenne glabrum caespitosum subacaule, foliis longiusculè et tenuiter petiolatis ad caudicorum apicem congestis, foliolis petiolulatis obovatis vel cuneato-obcordatis parvis elevatim et dènsè nervulosis crebrè denticulatis, stipulis scariosis longè lanceolato-acuminatis, capitulis paucifloris pedunculo folia æquanti suffultis, bracteis membranaceis minimis calyce triplò brevioribus 3-4 dentatis, pedicello hirtulo calyce triplò breviori, calyce adpressè hirsuto obconico nervuloso dentibus subulatis subæqualibus tubo dimidiò brevioribus, corollà carneà calyce duplò longiori, vexillo oblongo alas carinà longiores superanti.

Hab. in declivibus *Libani* suprà *cedros* Legi Julio.

Plantula caespitosa foliolis vix 2 lineas longis, capitulis 5-7 floris collarè 2 1/2 lin. longà. Affine *Tr. Parnassi* Boiss. Diagn. II. floribus minutis subsessilibus quoque donato sed quod differt bracteolis oblongis indivisis, calycis acutè nervosi glaberrimi dentibus triangularibus albomarginatis, etc. *Tr. modestum* habitu quoque *Tr. tumentem* quodammodo refert sed differt caulibus abbreviatis, floribus minoribus, dentibus calycis tubo brevioribus et ejus calyx insuper post anthesin ut in eo non inflatus esse videtur.

TRIFOLIUM RADICOSUM Boiss. et Hohen. in Kotschy pl. Pers. Bor. 4846. (Sect. *Trifolium*.)

Tr. perenne glabrescens vel parcè hirtulum, rhizomate crasso lignoso verticali ramoso apice caespitoso, caulibus filiformibus procumbentibus, foliis radicalibus numerosis caulinis paucis, foliolis parvis ovatis subsessilibus basi cuneatis obtusè denticulatis, stipulis albidis brevibus semiovatis ad 2/3 usque petiolo adnatis apice triangularibus, capitulis globosis pedunculo foliis pluriès longiori suffultis, pedicellis calyce triplò brevioribus basi bracteolis minimis squamiformibus denticulatis suffultis, floribus post anthesin deflexis, calycis adpressiusculè hirsuti dentibus lanceolato-subulatis æquilongis tubo sublongioribus, corollà

intensè purpureà calyce duplò longiori, vexillo oblongo extremitate subrecurvo alis longiori, carinà rectà apice in mucronulum attenuatà alis vix breviori.

Hab. in sommo jugo *Atscha Pasch* montis *Demawend* Persiæ borealis Kotschy N° 620.

Affine *Tr. Anatolico* Boiss. Diagn. II sed eximiè distinctum rhizomate crassiori, pedicellis brevissimis, calyce hirsuto, floribus majoribus purpureo-violaceis 3 $\frac{1}{2}$ lin. longis, carinà attenuato-mucronatà nec acutà.

TRIFOLIUM SCLERORRHIZUM Boiss. (Sect. *Vesicastrum*.)

Tr. perenne pilis patulis hispidulum, radicibus tenuibus elongatis tenacissimis e collo indurato caules plures breves filiformes procumbentes angulato-striatos simplices edentibus, foliis petiolo eis longiori suffultis, foliolis glabris brevissimè petiolulatis ovatis vel oblongis obtusis densè nervulosis minutè serrulatis, stipulis semioblongis petiolo ad medium usquè adnatis longissimè acuminatis, capitulis globosis pedunculo foliis æquilongo suffultis, pedicello brevissimo basi bracteolà vix perspicuà membranaceà tridenticulatà suffulto, calyce glaberrimo florifero angustè tubuloso-striato labio superiori brevissimo truncato margine utroque 2 dentibus subulatis aucto, labio inferiori tubo longiori lineari infrà medium in 3 dentes subulatos divergenti-patulos partito, calyce fructifero inflato-globoso elevato-reticulato dentibus subdilatatis lanceolato-subulatis inæqualibus patulis ejus diametro æquilongis coronato, corollà roseà calycis dentes vix tertià parte superanti, vexillo lineari retuso alas longè superanti, alis carinam breviter mucronatam paulò superantibus, legumine oblongo stylo longè mucronato.

Hab. in rupestribus siccis Antilibani circà *Rascheya* Fl. Maio.

Proximum *Tr. Cupani* Tin. et *Tr. ovatifolio* Bory quæ differunt capitulis longius pedunculatis, calycis valdè hirsuti et post anthesin amplioris dentibus minùs tenuibus rectis nec patentibus proportionè corollæ brevioribus.

TRIFOLIUM MORIFERUM. Boiss. (Sect. *Vesicastrum*.)

Tr. annum, parcissimè hirtulum, caulibus numerosis brevibus prostratis cæspitosis, foliis parvis petiolo brevissimo suffultis, foliolis subsessilibus rigidulis glabris ovato-cuneatis obtusis densè

et elevatim utrinquè multistriatis circumcircà minutè et crebrè denticulatis denticulis ascendentibus mucronulatis, stipulis subscariosis multinerviis lanceolatis ultrà medium petiolo adnatis supernè acuminatis, capitulis floriferis breviter basi attenuatis inter folia subsessilibus, fructiferis oblongo-cylindricis densissimis pedunculo elongato sulcato eis æquilongo suffultis, floribus sessilibus, bracteis ovatis mucronatis dorso virescentibus multinerviis margine albo-membranaceis calyce dimidiò brevioribus glabris, calyce florifero tubuloso adpressiusculè hirtulo densè striato dentibus lanceolato-subulatis tubo quintuplò brevioribus, fructifero inflato turbinato infernè longè attenuato præter dentium basin hirtulam glabro, corollà roseà calyce sesquilingiori post anthesin scariosà persistenti, vexillo post anthesin reflexo alis æquilongo ut eæ obtusiusculo fructifero tenuiter striato carinà paulò breviori, legumine papyraceo ovato sessili stylo eo quadruplò longiori terminato, semine ovato flavescenti.

Hab. in arenosis regionis superioris Libani in vià a *Zachle* ad regionem *Kesraouan* dictam alt. 5000! 6000! Legi Julio.

Caules 4-6 pollicares, foliola 2-2 1/2 lin. longa, capitula florifera 4-5 lin. fructifera 8-10 lin. longa. Species valdè affinis *Tr. xerocephalo* Fenzl quod differt stipulis nervosioribus longiùs et regidiùs acuminatis, capitulis fructiferis brevioribus latioribus ovato-oblongis, bracteis calyci æquilongis, dentibus tubo calycis dimidiò brevioribus, calyce fructifero basi brevius attenuato, corollà pallidà.

TRIFOLIUM RYTIDOSEMIUM, Boiss. et Hohenack. in Kotschy, pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Chronosemium*.)

Tr. perenne viride, caulibus procumbentibus vel ascendentibus herbaceis parcissimè et adpressiusculè hirtulis simplicibus elongatis, foliis petiolo eis æquilongo vel longiori suffultis, foliolis teneris glabris subsessilibus ovato-oblongis utrinquè rotundatis apice sæpè retusis nervulosis obsoletissimè denticulatis, stipulis lato-linearibus ad 2/3 longitudinis petiolo adnatis apice triangularibus acutis breviter mucronatis penicillatis cæterùm nudis, capitulis ovato-rotundis pedunculo ex axillis supremis orto folia multoties superanti apice adpressè hirtulo suffultis, pedicellis brevissimis, floribus defloratis deflexis, calycis minimi albo-membranacei glabri labio superiori brevissimo ferè obsoleto dorso obliquè truncato dentibus binis minutissimis triangularibus, labio inferiori tubo triplò breviori ferè ad basin usquè in tres dentes

lineares pilis paucis penicillatos diviso, corollâ e sicco pallidè carneâ vel carneo-flavescenti albidâ, vexillo calyce triplò longiori oblongo concavo obtuso striato fructifero longitudinaliter sulcato infernè dorso carinato alis longiori, alis rectis linearibus carinâ rectâ obtusâ duplò longioribus, legumine oblongo-spathulato compresso basi attenuato vix stipitato stylo incurvo eo paulò breviori terminato.

Hab. in monte *Totschal* propè *Teheran* Kotschy n° 704.

Caules 4½ et etiam 1 pedem longi, foliola 7-9 lin. longa 3 1½-4 lin. lata, capitula magnitudinis nucis avellanæ parvæ, flores circ. 3 lin. longi. Affine radice perenni *Tr. badio* a quo differt caulibus tenuioribus non angulatis, pedunculis 5-6 pollicaribus, capitulis minoribus, floribus pallidis, dentibus calycis non subulatis etc.

TRIFOLIUM STENOPHYLLUM Boiss. in, Pinard pl. exs. 1847. (Sect. *Chronosemium*.)

Tr. annuum multicaule, caulibus procumbentibus tenuibus teretibus ramosis glabrescentibus, foliis adpressiusculè hirtulis breviter petiolatis, foliolis inferiorum oblongo-ellipticis superiorum angustè linearibus omnibus acutis apice minutè denticulatis terminali petiolulato, stipulis oblongis acuminatis integris multinerviis ad medium usquè petiolo adnatis superioribus eo paulò longioribus, pedunculis folio 2-3 plò longioribus, capitulis magnis ovatis post anthesin oblongis, floribus magnis subsessilibus priùs erectis pallidè carneis dein deflexis intensè roseis, calycis minuti labio superiori dimidiò breviori glabriusculo membranaceo obliquè truncato dentibus binis triangularibus brevibus, labio inferiori extùs piloso porrecto trinervi in 3 dentes lineari-subulatos ad medium usquè diviso, vexillo calyce ferè quadruplò longiori oblongo-spathulato obtuso valdè nervuloso margine circumcà denticulato dentibus inferioribus acutioribus basi valdè carinato-plicato alas superanti post anthesin scarioso, alis oblongo-linearibus rectis divergentibus carinâ multò longioribus, carinâ minimâ rectâ supernè longè attenuato-acuminatâ margine inferiori serrulatâ, legumine longè stipitato e calyce exserto minimo oblongo membranaceo, semine oblongo subcompresso lævi.

Hab. in arenosis Palæstinæ circâ *Gaza* ubi legi Maio ineunte.

Species pulchra et distinctissima. Caules semipedales, foliola 5-8 lin. longa 1-2 lata, capitula sæpè pollicem longa, flores illis *Tr. badii* paulò majores.

Tr. erubescens Fenzl. Pupill. n° 44, postea ab auctore ipso in Illustr. plant. Tauri et Syriæ ad *Tr. speciosum* ut var. *erubescens* reductum est absque dubio species propria distinctissimaque. Hoc legi ad pedem et in fissuris rupium calcarearum totius regionis montanæ Palæstinæ et Syriæ littoralis.

Planta quam in Diagn. II p. 33 pro *Tr. specioso* W. habui, collato herb. Willd ab amiciss. prof. Klotzsch ab eo certè differt et *Trif. Boissierianum* Guss. Syn. 2 pag. 858 sistit. Verum *Tr. speciosum* observantibus cl. Guss. in herb. Tournef. et cl. Klotzsch in herb. W. est eadem species quam postea cl. Tineo *Tr. Gussonii* nominavit.

BONJEANIA SYRIACA Boiss.

B. perennis tota pilis raris patulis tenuibus hirsuta pallidè virens, caulibus pluribus erectis teretibus rubellis foliosis simplicibus vix basi suffrutescentibus, foliis brevissimè petiolatis ob stipulas foliolis similes quinatis, foliolis stipulisque ovato-oblongis acutiusculis infernè subattenuatis, capitulis basi bracteatis pedunculo folio axillari vix longiori suffultis paucis ad caulis partem superiorem subunilateraliter dispositis breviter paniculatis, floribus..., calycis patulè hirsuti laciniis lanceolato-subulatis inferioribus tubo duplò longioribus superioribus eis paulò brevioribus, legumine ovato turgido glabro calyci subæquilongo breviter mucronato ovulis 12-15, seminibus 3-4 reniformibus compressiusculis nitidis viridibus.

Hab. in rupestribus sylvaticis Syriæ borealis in valle *Orontis* inter *Suadieh* et *Antiochiam*. Legi fructiferum Junio.

Caules ferè pedales, folia eis *Dorycnii latifolii* similia foliolis 7-9 lin. longis 3-4 latis, legumen 3-3 1/2 lin. longum 2 diametro latum, semina lineæ 2/3 lata. Ab affini *B. hirsuta* differt indumento multò parciore, fructu breviori turgidiori, seminibus viridibus nec nigris, caulibus simplicibus nec suffruticosis ramosis. Fructus eis *Dor. latifolii* duplò crassiores obtusi nec acuti. Quamvis flores non viderim *Bonjeaniæ* nec *Dorycnio* ob legumine transversè membranaceo-septulata adnumero.

DORYCNIUM ANATOLICUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.

D. basi suffrutescens totum indumento denso patulo tomentoso-

hirtum canescens, ramis herbaceis subsimplicibus teretibus ascendentibus foliosis, foliis sessilibus ob stipulas foliolis similis pentaphyllis, foliolis oblongo-linearibus obtusiusculis mucronulatis basi longè attenuatis subinæqualibus, capitulis 12-15 floris rotundis pedunculo folio axillari multò longiori supra medium folio minuto trifoliolato instructo suffultis in paniculam brevem secundam dispositis, pedicellis tubo calycino æquilongis, calycis hirsutissimi dentibus superioribus binis triangularibus acutis tubo brevioribus inferioribus tribus lanceolato-subulatis tubo æquilongis, vexillo subreflexo alis valdè gibbis paulò longiori, carinà nigricanti acutiusculà alis inclusà, ovario oblongo-elongato-acutiusculo 5-6 ovulato, legumine...

Hab. in collibus apricis inter *Beychehr* et *Koniah* sitis. Legit Junio cl. Heldreich.

Caules in meis speciminibus 5-10 pollicares, foliola 4-6 lin. longa 1 1/2-2 lata, capitula et flores magnitudinis eorum *D. latifolii*. Ab eo et a *D. suffruticoso* distinctum indumento denso tomentoso-hirsuto dentibusque calycinis inæquilongis inæquilatisque. Ex ovarii formà oblongà legumen ut in *D. latifolio* elongatum acutiusculum esse suspicor.

LOTUS LIBANOTICUS Boiss.

L. perennis totus patulè albo-tomentosus, rhizomate lignoso tortuoso ramoso caules plures procumbentes vel ascendentes flexuosos subsimplices edenti, foliis petiolo eis paulò breviori suffultis, stipulis ovatis vel ovato-cuneatis obtusis lateratibus subobliquis, stipulis ovatis basi truncatis acutiusculis petiolo æquilongis, capitulis 2-4 floris pedunculo foliis 3-4 dlò longiori suffultis ex axillis superioribus subsecundis foliolis 2-3 calycem subæquantibus involucrentis, calycis densè et longè flavescenti-tomentosi dentibus subæqualibus triangulari-lanceolatis apice hreviter attenuato-subulatis tubo dimidiò brevioribus, corollà pallidè carneà calyce duplò longiori, vexillo ovato plicato reflexo alas lato-lineares subquadratas æquanti, carinà obtusè incurvâ extremitate ascendenti longè attenuatà rubello-violascenti acutiusculà alas subsuperanti, stigmatè minimo obliquo capitato subbilabiato, legumine juniore glabro cylindrico calyce duplò longiori stylo longè rostrato.

Hab. in montibus calcareis *Libani* suprà *Eden*. Legi flor. Julio.

Caulēs 6-10 pollicares, foliola 4-5 lin. longa 3-3 1/2 lata, flores ferè magnitudinis *L. corniculati*. Affinis *L. sulphureo* Boiss., differt colore florum minorum, indumento denso, foliolis obtusioribus, calycis dentibus non lanceolatis, carinà subtùs obtusè nec angulatim incurvâ. *L. gebeliæ* differt glabritie, dentibus calycis tubo æquilongis, etc. *L. Michauxianus* dentibus calycis tubo æquilongis, indumento adpresso cano distinguitur.

LOTUS ALEPPICUS Boiss.

L. perennis totus patulè hispidulus, caulibus tenuibus foliosis simplicibus, foliis minutis petiolo eis breviori suffultis, foliolis ovatis obtusis, stipulis foliolo petioloque æquilongis ovatis acutiusculis basi subcordatis vel obliquè truncatis, capitulis subquadrifloris pedunculo foliis æquilongo suffultis basi bracteis tribus calyce brevioribus stipatis, calycis patulè hispidi dentibus e basi lanceolatâ subulatis æqualibus tubo longioribus, corollâ e sicco roseâ, vexillo ovato alas oblongas superanti, carinâ alas æquanti subtùs rotundatâ incurvâ apice ascendenti attenuatâ acutiusculâ, stigmatè obliquè capitato pilosulo, legumine lineari-cylindrico recto calyce 4-5 plò longioris.

Hab. in Syriâ ad *Aleppum* Aucher. N° 4037.

Affinis *L. Michauxiano* a quo differt indumento hispido nec canotomentoso, foliolis minoribus vix 3 lineas longis, calycinis laciniis angustioribus apice subulatis, carinâ magis incurvâ. *L. Michauxiano* ascribenda specimina e monte *Demawend* in Kotschy pl. Pers. bor. sub n° 697 distributa ut et planta in collect. Kotsch. Alep. Kurd. e monte *Gara Kurdistanicæ* sub *L. corniculato* var. *hirsutissimo* distributa.

LOTUS LAMPROCARPUS Boiss.

L. perennis pilis patulis densis brevibus cinerascens, caulibus diffusis virgatis longissimis ramosis teretibus, foliis breviter petiolatis, foliolis infimorum obovatis obtusis superiorum oblongis acutis, stipulis ovatis acutiusculis basi latiori sæpè subcordatis, capitulis 2-3 floris pedunculo foliis 3-4 plò longiori suffultis apice bracteis 4-3 ob longis acutis calycem subæquantibus suffultis, calycis cinereo-hispidi dentibus angustè lineari-subulatis tubo obconico sesquolongioribus inferiori deflexo, corollâ flavâ calyce sesquolongiori, vexillo alas ovato-spathulatas subsuperanti, carinâ latere inferiori rotundatâ

apice attenuatà alis vix longiori, stigmate minuto obliquè capitato, leguminibus rectis angustè linearibus subcompressis calyce quadruplò longioribus cinereo-nitentibus quasi sericeis sed glaberrimis, valvulis septatis, seminibus minutis globosis viridibus.

Hab. in humidis herbidis Atticæ ad *Phalerum* Spruner! Heldreich. Floret æstate.

Caules sæpè bipedales, foliola majora 6-7 lin. longa 3-4 lata, flores magnitudinis *L. hispidi* et *angustissimi*. Legumen 9-10 lin. longum lineam circ. latum. A speciebus suprà citatis differt radice perenni, carinà subtus non angulatà, legumine latiori, caulibus robustioribus. Affinis quoque *L. decumbenti* Poiret cujus specimina herb. De ex horto Paris. differunt floribus duplò majoribus, calycis corollà dimidiò brevioris dentibus tubo æquilongis, legumine non sericeo-nitenti.

LOTUS CASTELLANUS Boiss. et Reuter.

L. annuus multicaulis, caulibus procumbentibus rigidis filiformibus elongatis glabriusculis a basi ramosissimis, foliis subsessilibus, foliolis oblongo-ellipticis acutis tuberculato-hirtulis terminali majori, stipulis semiovatis acutis, floribus 1-3 minutis pedunculo tenuissimo folio duplò longiori apice 1-2 bracteis minutis oblongo-linearibus obsito suffultis, calycis hispiduli dentibus lineari-subulatis tubo sesquilongioribus erecto-patulis, corollà flavà calyce duplò longiori, vexillo ovato alas obovatas obliquas superanti, carinà angulo recto curvatà parte superiori valdè attenuatà acutà, legumine tenui cylindrico calyce 2-3 plò longiori.

Hab. in arvis circa *San Pablo* propè *Toletum* in Hispanià, cl. Reuter legit Julio 1844.

Caules pedales vel longiores tenuissimè virgati a basi strictiusculè ramosissimi paniculam amplam valdè sparsifloram formantes, flores magnitudinis eorum *L. hispidi*, legumina 4-8 lin. longa. Ab affini *L. hispido* Desf. distinguitur glabrescentià, caulibus virgatis ramosissimis, calycis dentibus angustius subulatis, legumine breviori.

LOTUS CARMELI Boiss.

L. annuus, pilis adpressissimis brevissimis sparsis sub lente obsitus pallidè virens, caulibus basi ramosis decumbentibus tenuibus tere-

tibus flexuosis, foliis breviter petiolatis, foliolis ovatis vel obovato-cuneatis obtusissimis, stipulis ovatis petiolulatis petiolo vix longioribus, floribus subnutantibus solitariis rarissimè binis pedunculo folium axillare multò superante suffultis basi 2-3 bracteis oblongis calyci æquilongis obsitis, calycis adpressè pilosuli dentibus lanceolatis acutis tubo obconico paulò longioribus inferiori subreflexo, vexillo alis obovato-spathulatis vix longiori, carinà angulatum ad ipsam basin limbi incurvâ attenuatâ acutâ, stigmate capitato, leguminibus glaberrimis cylindrico-linearibus rectis torulosis polyspermis calyce multoties longioribus brevissimè mucronatis, seminibus globoso-subcompressis viridibus utrâque facie (an semper?) foveolatis, valvis transversè septatis.

Hab. in monte *Carmelo*, legi Maio 1848.

Caules 3-8 pollicares, foliola majora 4-5 lin. longa, flores illis. *L. peregrini* paulò minores, legumen ferè sesquipollicare diametro 1 1/2 lin. latum. Affinis *L. peregrino* qui differt indumento subsericeo, floribus binis, pedunculis folio brevioribus fructiferis incrassatis, leguminibus seminibusque dimidiò minoribus etc.

L. Aucheri Boiss. Diagn. II p. 28 est species delenda. Ex specimenibus a me ipso in arenosis propè *Gaza* lectis ad formam majorem *L. pusilli* Viv. reducendus est.

COLUTEA MELANOCALYX Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 4846.

C. fruticosa caulibus striatis fuscescentibus ramis junioribus viridibus pilis albis adpressissimis brevibus obsitis, foliis 3-4-jugis, foliolis ellipticis retusis supernè glaberrimis subtùs adpressissimè et paròe hirtis canescentibus, racemis 2-5 floris folio axillari subduplò longioribus, calyce campanulato obliquè pedicellato pedicelloque pilis densis fuliginosis brevibus tomentoso dentibus triangulari-lanceolatis acutis tubo subtriplò brevioribus, corollâ aurantiaco-luteâ, vexillo ovato-spathulato obtusissimo subretuso gibbis baseos (saltem e sicco) ferè obsoletis, alis angustè linearibus paulò suprâ basin angulo recto infracto curvatis parte superiori verticali carinâ sublongiori, lobo basilari stipite paulò breviori, carinâ valdè curvatâ obtusissimâ truncatâ, leguminibus stipite calyce duplò longiori suffultis acutis clausis.

Hab. in sylvis abietinis Lyciæ in monte *Climaci* et monte *Solya* floret Mart. fruct. Maio Heldr. Eandem speciem se nuper in Græciâ quoque legisse me monuit am. Heldreich.

Species calycibus nigris elegans insuper a *C. arborescente* distincta floribus majoribus, calycis tubo magis elongato, alis angustioribus acutiusculis basi angulo recto fractis nec subincurvis. *C. cruenta* legumine hianti et *C. Aleppica* et *Persica* alis convolutis longiùs distant.

OXYTROPIS KOTSCHYANA Boiss. et Hoh. in pl. Pers. bor. exs. 1846.

O. tota indumento flavido patulo ad foliola adpressiori sericeo obsita caulescens, caulibus pluribus sulcatis foliosis, foliis breviter petiolatis 12-17 jugis foliolis lineari-ellipticis basi rotundatis acutiusculis, stipulis virescentibus liberis foliorum inferiorum linearibus superiorum oblongo-lanceolatis acutis foliolo paulò majoribus, racemis oblongis laxiusculis pedunculo crassiusculo striato hispido folia multò superanti ex axillis supremis orto suffultis 1-3, pedicellis calycis tubo triplò brevioribus basi bracteolà setaceà eis duplò longiori suffultis, calycis nigrescentis pilis nigris brevibus aliisque longioribus albis patulis hirsuti tubo cylindrico dentibus a basi latiori setaceis tubo paulò brevioribus, corollà lilacinà calyce duplò longiori, vexillo oblongo elongato acutiusculo plicato subreflexo alas lanceolatas acutas superanti, carinà margine superiori rectà inferiori curvatà in mucronem setaceum longiusculum alas æquantem abeunti, legumine brevissimè et sparsim tomentello oblongo-cylindrico subcompresso infernè sulcato in stipitem calyci subæquilongum abruptè attenuato in rostrum longiusculum rectum abeunti.

Hab. in collibus argillois ad radices montis *Demawend* Persiæ borealis propè *Lar*. Kotschy N° 332.

Caules cum pedunculis 10-12 pollicares, folia 5-4 pollicaria, foliola 6-7 lineas longa 2-3 lata, corolla circiter 8 lin. longa, mucro carinæ sesquilineam longus. Pulchra species habitu dentibus calycinis setaceis foliorum formà *O. Aucheri* referens sed caulescens nec acaulis, folia 11-17 nec 6-7 juga, calycis tubus longior angustior etc.

ASTRAGALUS EMARGINATUS Labill. Dec. I tab. 9 (Sect. *Hypoglottidei*.)

A. griseo-tomentosus, foliis ambitu latè linearibus elongatis 20-30 jugis foliolis demùm sejunctis oblongo-ellipticis retusis, pedunculo longissimo, floribus etiam post anthesin densè ovato-capitatis, denti-

bus calycinis tubo subæquilongis, legumine ovato oblongo acuto pilis rufescentibus densissimis patulis ejus diametro æquilongis obsito.

Hab. in *Libano* (Labill.) monte *Hermone* in latere occidentali supra *Hasbeya* (Pestalozza!)

A. emarginatus B. *Billardieri* DC.

A. emarginati diagnosem hic dare utile duxi propter species plures cum eo hucusquē confusas et hic describendas.

ASTRAGALUS OXYTROPIFOLIUS Boiss. (Sect. *Hypoglottidei*.)

A. acaulis, totus griseo vel flavido lanatus, caudicibus brevibus nudis rosulas paucifolias edentibus, foliis ambitu oblongo-linearibus 20–25 jugis, foliolis valdè approximatis breviter lineari-rectangularibus apice truncatis, pedunculis ascendentibus folia paulò superantibus pilis patulis supernè sæpius nigricantibus hirsutis, spicâ densâ ovatâ fructiferâ oblongo-cylindricâ, bracteis linearibus nigro-hispidis calycino tubo æquilongis, calycis densè rufescentis hispidi dentibus setaceis tubo dimidio sublongioribus, corollâ violaceâ calyce sesquilongiori, vexillo oblongo alas carinamque quartâ parte superanti, legumine oblongo-triquetro pilis sordidè albis patulis ejus diametro æquilatis densè hirsuto in mucronem subincurvum tenuem eo sublongiorem attenuato.

Hab. in alpinis totius Anatoliæ meridionalis, *Cadmi* supra *Colossam* Boiss., *Curie* Pinard, ad *Tcheltichtchi* et in monte *Davros* *Pisidiæ* Heldreich, Aucher N° 4323 in Asiâ minori, in collibus propè Aleppum Kotschy N° 400.

A. emarginatus varior. auct. non Labill.

Folia 3–5 poll. longa medium versùs 6–8 lin. lata, foliola 3 1/2–5 lineas longa 2–3 lata, capitata fructifera magnitudine nucis, legumen cum rostro 9–10 lin. longum. Species ab *A. densifolio* et *chrysophyllo* foliolis lineari-quadratis multò majoribus, pedunculis crassis patulè hirsutis capitulis magnis distincta. Ab *A. emarginato* cujus foliola elongata habet dignoscenda pedunculis foliisque abbreviatis, foliolis multò densioribus et inprimis legumine longissimè nec brevissimè rostrato.

ASTRAGALUS LISTONIÆ Boiss. (Sect. *Hypoglottidei*.)

A. subacaulis totus crispo-lanatus griseus, caudicibus abbreviatis

prostratis nudis, foliis radicalibus paucis remotiusculè 25-30 jugis ambitu lato-linearibus, foliolis lineari-rectangularibus apice truncatis retusis, pedunculis crassis rectis racemum longum densiusculum cylindricum ferentibus, bracteis lineari-setaceis calyceque patulè rufescenti-hirsutissimis subæquilongis, dentibus calycis lineari-setaceis tubo subæquilongis, corollà e sicco purpurascenti calyce duplò longiori, legumine.....

Hab. ad rivulos in parte superiori montis *Elmadagh* Anatoliæ, Lady Liston in herb. Hooker. Fl. Junio.

Folia 8-9 pollices longa, foliola 6-8 lin. longa 3-4 lata, pedunculi in specimine non integri probabiliter longi, racemus 5 $1\frac{1}{2}$ poll. longus 8-9 lin. latus, calix 4 $1\frac{1}{2}$ lin. longus. Species foliis *A. emarginati* donata ab eo ut et ab *A. oxytropifolio* statim spicà longè cylindricà nec ovatà distinguenda.

ASTRAGALUS DENSIFOLIUS Lam. Dict. I, p. 317. (Sect. *Hypoglottidei*.)

A. griseo-sericeus, foliis ambitu angustè linearibus brevibus 20-25 jugis, foliolis minimis valdè approximatis rotundis retusis, pedunculo folia vix superanti, floribus in capitulum ovato-rotundum densissimè aggregatis, calycis adpressiusculè nigricanto-hirsuti dentibus setaceis dimidio tubo longioribus, legumine ovato compresso lanà longà laxiusculà hirsuto in mucronem tenuem rectum eo triplò breviorè attenuato.

Hab. in *Armenià* Tourn. ! in monte *Argeh* Cappadociæ Rostan in herb. D C., monte *Gheidagh* Tauri Isaurici alt. 7500'-8000 (Heldreich).

A. Rostani Boiss. Diagn. II ex parte.

Folia 2-3 pollices longa, foliola diametro 4- $1\frac{1}{2}$ lin. lata, pedunculi 3-4 pollicares, capitula magnitudine inter nucem et avellanam media.— Sub *A. Rostani* meo conjunxeram hanc speciem mihi nunc ex autopsiâ specim. Tournef. benè notam et sequentem quæ nunc sat differre videtur.

ASTRAGALUS CHRYSOPHYLLUS Boiss. (Sect. *Hypoglottidei*.)

A. basi suffrutescens pluriceps subacaulis totus indumento flavo-virenti sericeo obsitus, foliis ambitu latè linearibus sub-40 jugis, foliolis ovatis retusis valdè approximatis, pedunculis folia paulò superantibus, floribus in capitulum priùs globosum post anthesin ovatum

densè congestis, bracteis linearibus tubum calycis subæquantibus, calycis patulè rufescenti-hirsuti dentibus lineari-setaceis dimidio tubo sublongioribus, corollà leucophæo-violaceâ calyce sesquolongiori, leguminibus pilis rufis longissimis hispidis ovato-triangularibus subcompressis in rostrum rectum eis æquilongum sensim attenuatis.

Hab. in Syriæ montibus propè *Antab* et in monte *Mouzourdagh* Cappadociæ Aucher n° 1351.

A. Rostani Boiss. Diagn. ex parte.

Folia 4-5 pollicaria 4-5 lin. lata, foliola 2 lin. circiter longa, legumen cum rostro 6-7 lin. longum. *A. densifolio* formâ foliolorum et foliolis abbreviatis affinis differt foliolis 40 nec 20-25 jugis, legumine longissimè rostrato, indumento aureovirenti nec griseo.

ASTRAGALUS ERIOPHYLLUS Boiss. (Sect. *Hypoglottidei*.)

A. acaulis nanus totus densissimè et adpressè sericeo-lanatus griseus, foliis abbreviatis ambitu linearibus 18-22 jugis, foliolis minutis ovato-oblongis etiam adultis contiguis villo connexis, pedunculis folia vix superantibus, floribus in capitulum pauciflorum rotundum dein ovatum congestis, bracteis oblongo-linearibus calycinum tubum subæquantibus calyceque densè et adpressiusculè hirsutis, dentibus calycinis lineari-setaceis tubum dimidium subæquantibus, corollà albidâ calyce subsesquolongiori, legumine pilis longissimis rufescentibus hirsutissimo oblongo-compresso in mucronem brevem rectum attenuato.

Hab. in monte *Tauro* Kotschy N° 426.

Planta vix bipollicaris, folia pollicem longa, foliola vix 2 lin. longa. Corolla lin. 6, legumen cum mucrone 6 lin. longum. Affinis *A. densifolio* a quo foliolis non orbiculatis, calyce non nigro-piloso brevità dentato, legumine multò densius hirsuto differt. Intermedius inter hunc et *A. lanatum* Labill. Déc. I tab. 40 — *A. libanotidem* W. quem in summo cacumine Hermonis legi atque *A. hirsutissimum* DC. Astrag. tab. 49 in monte *Makmel* Libani frequentem, ambo inter se distinctissimos quamvis in Prodromo Candolleano conjunctos et ab *A. eriophyllo* foliolis magis dissitis leguminibus ovatis magis compressis rostro incurvo instructis facilè distinguendos.

ASTRAGALUS CEDRETI Boiss. (Sect. *Hypoglottidei*.)

A. acaulis totus brevissimè tomentosus griseus, caudiculis filiformi-

bus nudis apice paucifoliatis, foliis 20–25 jugis, foliolis minimis ovato-oblongis retusis approximatis sed demum non contiguis, pedunculo ascendenti foliis subduplò longiori, capitulo ovato denso, bracteis lineari-setaceis calycino tubo subæquilongis, calycis patulè hispidi infernè valdè attenuati dentibus setaceis patulis flexuosis tubo triplò brevioribus, corollà roseà calyce sesquilongiori, legumine.....

Hab. in ipso Cedreto *Libani* septentrionem versùs rarus, Julio florum legi.

Folia 1–4 1/2 pollicaria, foliola 2 lin. longa. scapus 2–3 pollicaris, flos 5–6 lin. longus. Species pulchella affinis *A. densifolio* et *eriphyllò* ab eis calycis tubo infernè attenuato, dentibus tenuissimis flexuosis, corollà roseo-purpurascenti nec violascenti-leucophæà distinctissima.

Astragali omnes præcedentes inter *Hypoglottideos* sectiunculam formant distinctam foliis multijugis foliolis ad basin et apice folii decrescentibus adpressissimis in folio juniore inter se adeò intricatis ut folium indivisum simulent. Huic gregi sed minùs arctè accedunt *A. lanatus* et *A. hirsutissimus*.

ASTRAGALUS CAPITO Boiss. et Hohen. in Pl. Kotsch. Pers. bor. 1846.
(Sect. *Hypoglottidei*.)

A. totus pilis adpressis griseus sericeus, radice verticali crassà, collo caules plures brevissimos procumbentes in cæspitem densè confertos edenti, foliis brevissimis 40–45 jugis, foliolis minimis ellipticis complicatis imbricato-confertissimis, stipulis membranaceis triangularibus acutis basi exteriori in unam breviter connatis, pedunculo tomentoso foliis æquilongo cæspite vix exserto, capitulo denso compacto ovato-globo, bracteis oblongis virescentibus hirsutis calycis tubo subbrevioribus, calycis albidì hirsuti dentibus lineari-setaceis hispidis tubum subæquantibus corollà flavido-leucophæà vix brevioribus, vexillo oblongo alas carinamque subæquilongas parùm superanti, legumine.

Hab. in monte *Totschal* propè *Teheran* Kotschy N° 574.

Folia lin. 9–10 longa, foliola sesquilineam vix longa, capitula magnitudine inter nucem et avellanam media. Affinis *A. sphaerantho* qui differt foliolis longioribus, capitulis duplò majoribus, calycinis dentibus tubo duplò longioribus. Ambo propè *A. barbatum* Lam. et cum *A. hirsuto*, *globoso*, *cylindræo* et *pelligero* inter *Hypoglottideos* propè gregem *A. emarginati* collocandi.

ASTRAGALUS PESTALOTZÆ Boiss. (Sect. *Hypoglottidei*.)

A. perennis, cauliculis tenuiter filiformibus repentibus, caulibus 1-3 pumilis tenuibus adpressè canescentibus, foliis paucis petiolo tenuissimo suffultis 14-17 foliolatis foliolis elliptico-linearibus retusis utrinquè adpressè canescentibus, stipulis margine foliaceis pilis nigris albisque adpressis hirtis in unam oppositifoliam ad tertiam partem usquè bifidam coalitis, pedunculo subsolitario foliis æquilongo, capitulo 6-9-floro, bracteis oblongis nigro-setosis calyce triplò brevioribus, calyce cylindrico adpressè albo nigroque setoso dentibus setaceis patulis dimidià tubi parte longioribus, corollà pallidè violaceà calyce tertià parte longiori, vexillo glabro lineari alis quartà parte longiori, alis retusis carinam paulò superantibus, legumine.....

Hab. in montibus propè *Elmalu* Lyciæ Pestaloza.

Planta 2-3 pollicaris, folia 1 1/2-2 pollices, foliola 3-3 1/2 poll. longa, pedunculi bipollicares, corolla 5 1/2 lin. longa. Planta tenella fructu carente incompletè nota quoad habitum affinis *A. Lasiglottidi* qui longè differt petiolis a basi nec a medio folioliferis, caulibus minùs tenuibus, calycinis dentibus minùs setaceis.

ASTRAGALUS EUBRYCHIOIDES Boiss. (Sect. *Hypoglottidei*.)

A. perennis, caulibus elatis teretibus striatis adpressè pilosulis simplicibus vel ramulo uno alterove axillari instructis, foliis a basi petioli 12-15 jugis, foliolis utrinquè adpressè canescentibus elliptico-linearibus acutiusculis, stipulis membranaceis in unam oppositifoliam ultrà medium in 2 dentes triangulares bifidam concretis, pedunculis crassis folio longioribus, capitulis densis oblongis sub fine antheseos apice attenuatis, bracteis linearibus calycis tubo æquilongis, calycis tubulosi pilis albis adpressis hirsuti dentibus setaceis tubo triplò brevioribus, corollà roseà calyce plùs duplò longiori, vexillo lineari alas ferè duplò superanti, alis linearibus obtusis carinam paulò superantibus, legumine stricto breviter oblongo-lineari tereti suturà inferiori subsulcato in rostrum brevissimum subrecurvum attenuato.

Hab. in *Cappadocià orientali* Aucher n° 1368.

Caulis sesquipedalis, folia circ. tripollicaria, foliola circ. 5-8 lin. longa 1-1 1/2 lata, spica florifera 15 lin. longa, flores circ. 8 lin. longi, legumen 4 lin. longum diametro 1 1/4 latum. Ab affini *A. onobrychioidi* præter caulem elatum foliola angustiora stípulas altius con-

cretas differt floribus dimidiò minoribus secùs spicæ axim multò magis strictis, calycis dentibus setaceis, leguminibus glabrescentibus axi strictissimis brevissimè rostratis.

ASTRAGALUS MEDICAGINEUS Boiss. (Sect. *Hypoglottidei*).

A. caulibus sulcato-striatis pilis albis brevibus parçè et adpressissimè sub lente obsitis supernè ad pedunculorum ortum divergentim et subdichotomè corymbosis, petiolis suprà basin 6-7 jugis, foliolis ellipticis acutiusculis utrinquè parçè et adpressissimè hirtis, stipulis membranaceis in unam oppositifoliam bidentatam breviter concretis, pedunculis sulcatis rigidis folio 2-3 plò longioribus, capitulo ovato, bracteis lineari-setaceis calyce multò brevioribus, floribus patentibus, calycis adpressè albo-hirsuti dentibus lineari-setaceis tubo triplò brevioribus, corollà cæruleo-violaceà calyce plus duplò longiori, vexillo lineari glabro carinà duplò longiori, alis carinam paulò superantibus, legumine adpressè cano minimo calycem vix superanti oblongo-lineari in mucronem subincurvum brevissimum attenuato subtùs sulcato.

Hab. in *Mesopotamià* inter *Orfa* et *Suerek* Kotschy N° 53.

Caules pedales corymbosè 3-5 cephalì, foliola 5-6 lin. longa 4 1/2 lata, capitula fructifera pollicaria, corolla 6 lin. longa, legumen 3 lin. longum; habitus quodammodo *Medicaginis sativæ*. Species ab *A. onobrychioidi* et affinibus caulibus subdichotomis, floribus leguminibusque multò minoribus distincta.

ASTRAGALUS LILACINUS Boiss. (Sect. *Hypoglottidei*).

A. collo indurato multicaulis totus adpressissimè sericeo-canescens, caulibus ascendentibus brevissimis, foliis radicalibus caulinis paucis, petiolo tenui a medio 8-12 jugo, foliolis angustè ellipticis acutiusculis utrinquè sericeis, stipulis hyalino-membranaceis in unam oppositifoliam bicuspidatam concretis, pedunculis caule foliisque multò longioribus strictis, spicis densis ovatis fructiferis oblongis, bracteis setaceis nigro-hirtis calyce triplò brevioribus, calycis pilis albis nigrisque densè sericei dentibus nigris tubo dimidio æquilongis, corollà lilacinà calyce duplò longiori, vexillo lineari glabro alis carinàque subæqualibus tertià parte longiori, legumine adpressè hirtò minimo calycem fissum vix superanti oblongo subcompressò subtùs sulcato in rostrum breve subincurvum attenuato.

Hab. in Persiâ boreali ad radices montis *Demawend* propè *Lar*. Kotschy n° 342.

Caules 4-2 pollicares, pedunculi 1½-1 pedales, capitulum floriferum pollicare, flores 7 lin. longi, legumen 2 1½-3 lin. longum rostro sesquilineam longo terminatum. Species spicis nigro-sericeis insignis a grege *A. Mesogitani* et *Lydi* legumine non valdè curvato discedens. Affinis quoque *A. canescenti* DC. Astr. tab. 16 qui differt pedunculis brevioribus, spicis paucifloris, bracteis ovato-oblongis, dentibus calycinis triangularibus brevissimis.

ASTRAGALUS EXPANSUS Boiss. (Sect. *Hypoglottidei*.)

A. totus adpressè canescens basi multicaulis, caulibus basi ramosis longissimis humi expansis tereti-striatis tenuibus, petiolis paulò suprâ basin 6-8 jugis, foliolis inferiorum ovato-oblongis superiorum elliptico-linearibus, stipulis parvis membranaceis in unam oppositifoliam truncato-bidentatam concretis, pedunculis folio subduplò longioribus, capitulis floriferis ovato-rotundis densis fructiferis oblongis, bracteis oblongis brevissimis, calyce latere superiori (sub vexillo) albido hyalino, inferiori plis albis nigrisque adpressis hirtis dentibus lineari-setaceis dimidio tubo sublongioribus, corollâ cæruleo-violaceâ calyce triplò longiori, vexillo glabro oblongo-lineari recurvo alis tertiâ parte longiori, carinâ alis breviori, legumine adpressè cano calycem parùm excedenti oblongo subtùs sulcato in mucronem brevem vix curvatum attenuato.

Hab. in collibus calcareis propè *Rascheya* Antilibani, legi florif. Maio ineunte.

Caules numerosi 4-2 pedales prostrati pedunculos plures edentes, folia 4-4 1½ poll. foliola 4 1½-3 lin. longa, capitula florifera avellanâ paulò majora dein elongata, flos 5 lin. legumen 3 lin. longum. Ex affinitate *A. medicaginei* et *lilacini*, ab eis caulibus prostratis etc. distinctus. Affinis quoque *A. Kotschyano* Boiss. qui caules abbreviatis floresque duplò majores purpurascens habet.

ASTRAGALUS HELDREICHII Boiss. (Sect. *Hypoglottidei*.)

A. basi suffrutescens totus indumento adpressissimo substrigoso sericeus vel sericeo-flavidus, caulibus abbreviatis prostratis, foliis brevibus a basi densè 7-10 jugis, foliolis oblongis vel oblongo-ellip-

ticis minimis, stipulis in unam oppositifoliam ovato-rotundam obtusè truncato - bidentatam coalitis, pedunculis folio 3-4plò longioribus, capitulis ovato-rotundis, bracteis minutissimis ovatis, calycis pilis albis nigrisque adpressis sericei dentibus nigerrimis tubo triplò brevioribus, corollà calyce 2 1/2 plò longiori, vexillo glaberrimo angustè oblongo alis quartà parte suà vix longiori, carinà alas subæquanti, legumine...

Hab. in pascuis saxosis regionis alpinæ montis *Davros dagh Pisidiae* alt. 5000-6000, in *Cadmo* suprà *Geyra*. (Boiss.)

Caules cum pedunculis 3-5 pollicares, foliola 4 1/2-2 1/2 lin. longa, flores 6 lin. longi. Valdè affinis *A. Lydio* quocum olim ejus specimina in *Cadmo* lecta confusi undè erroneè vexillum *A. Lydii* quod reverà dorso adpressè setulosum est glabrum esse dixi. *A. Lydii* ab *A. Heldreichii* differt foliolis paulò majoribus, stipulis longiusculè nec brevissimè bidentatis, bracteis sæpiùs calycis tubum subæquantibus, calycis dentibus duplò longioribus, vexillo subsericeo alis saltem tertià parte longiori, alis carinam multò superantibus. *A. canescens* DC (ab *A. onobrychioides* diversissimus) utrique speciei valdè affinis differt caule subnullo, bracteis latioribus ovato-oblongis, calycis dentibus brevissimis latioribus, indumento minùs sericeo et eadem species est ac *A. psoraloides* W. herb! et Sp! non Lam. Error Willdenowii in hâc confusione ortus est e synonymo Tournefortii *Astragalus capitulis trifolii bituminosi* duabus plantis diversis communi.

A. onobrychioides Pinard pl. Anat. exs. non MB ad *A. Lydium* referendus est.

ASTRAGALUS TEHERANICUS Boiss et Hohen. in Kotsch. pl. Pers. bor. exs. 1846. (Sect. *Hypoglottidei*.)

A. totus pilis adpressis cano-argyreus rhizomate lignoso cæspitosè multicauli, caulibus filiformibus ascendentibus pedunculos 4-4 divaricatos folio duplò longiores edentibus ad eorum insertionem divaricatis, foliis brevissimis densè 4-7 jugis, foliolis minimis oblongis acutiusculis subcomplicatis, stipulis minimis herbaceis in unam acutè bidentatam brevissimè concretis, capitulis densis subrotundis, bracteis ineari-setaceis calycis tubo dimidiò brevioribus, calycis densè et adpressè albo hirsuti dentibus lineari-setaceis tubo tertià parte brevioribus, corollà purpureo-violaceà calyce subduplò longiori, vexillo oblongo apice attenuato acutiusculo alis carinæque subæqualibus

quartâ parte longiori, ovario lineari recto adpressè hirtulo, legumine..

Hab. in lapidosis propè urbem *Teheran* Kotsch. l. cit n° 49.

Caules 3-5 pollic., folia semipollicem, foliola 2 lin. circ. longa, capitula avellanâ paulò majora, flos 4 $\frac{1}{2}$ lin. longus. Species quantum fructu ignoto dijudicare possum affinis *A. onobrychioidi* M. B. et *A. Georgico* Boiss. ab eis distincta caulibus abbreviatis, foliis brevissimis minimis, pedunculis breviter divaricatis, calyce non patulè hirsuto, vexillo breviori etc.

ASTRAGALUS LYCIUS Boiss. (Sect. *Hypoglottidei*.)

A totus pilis adpressissimis griseo-canescens, caudice lignoso pluricauli, caulibus rectis tenuibus striatis simpliciusculis, petiolis paulò suprà basin densè 11-13 jugis, foliolis minutis oblongo-ellipticis subcomplicatis obtusis, pedunculis folio 2-3 plò longioribus, spicis brevibus ovatis paucifloris laxiusculis, bracteis lanceolatis calyce multoties brevioribus, calyce adpressè albo-hirsuto dentibus setaceis tubo quadruplò brevioribus, corollâ purpureo-violaceâ calyce triplò longiori, vexillo lineari retuso alis carinâque subæqualibus tertiâ parte longiori, legumine adpressissimè hirtulo angustissimè lineari-cylindrico suprà nervo prominenti subtùs sulco percurso calyce duplò longiori in rostrum longum deflexo-recurvum apice attenuato.

Hab. in *Lyciâ* propè *Elmalu* ubi legit amic. Dr. Pestalozza.

Caules circ. semipedales, folia sesquipollicem foliola 4 $\frac{1}{2}$ -2 lin. longa, capitula 8-10 flora, flores lineares angusti circ. 8 lin. longi, legumen absque rostro 5 lin. longum vix diametro lineæ $\frac{3}{4}$ latum rostro tenoi 2 lin. longo terminatum. Habitu valdè refert *A. Stevenianum* legumine recto longissimo diversum, affinis quoque *A. ornithopodioidi* qui est planta humilior, foliis 6-7 jugis, floribus ferè dimidiò minoribus, legumine e descriptione sursum nec deorsum curvato. *A. mesopterus* Griseb. tandem a nostro racemis laxioribus, dentibus calycis tubo quintuplò brevioribus, vexillo alas tantum paulò superanti etc. differt.

ASTRAGALUS ELBRUSENSIS Boiss. (Sect. *Hypoglottidei*.)

A. totus densè et adpressè argyreo-canus, caudicibus induratis, caulibus ad rosulas foliorum subelongatas reductis, foliis confertis breviter petiolatis densè 7-9 jugis foliolis minutis ovato-ellipticis ob-

tusis, stipulis membranaceis albis in unam oppositifoliam breviter bidentatam coalitis ad basin pedunculi imbricatis, pedunculis scapiformibus folio triplò longioribus, capitulis breviter ovatis densifloris, bracteis setaceis tubo calycis dimidiò brevioribus, calycis pilis albis nigrisque paucis adpressiusculis sericeo-hirsuti dentibus nigris setaceis tubo subæquilongis, corollà violascenti calyce sesquilongiori, vexillo oblongo-linearì supernè subattenuato obtuso alis quartà parte longiori, alis carinam paulò superantibus, legumine adpressè cano angustè elongato-oblongo apice in mucronem rectum brevem attenuato calyce vix longiori.

A. alyssoides Kotsch. pl. Pers. bor. non Lam.

Hab. in jugo *Char Gerdene* suprà *Asadbar* in parte occid. montis *Elbrus*. alt. 8000 Kotschy N° 469.

Folia cum petiolo 6-10 lin. longa, foliola 2-2 $1\frac{1}{2}$ lin. longa, pedunculi 2-2 $1\frac{1}{2}$ lin. longi, capitula avellanà vix majora multiflora, flores 3 $1\frac{1}{2}$ lin. longi, legumen 2 $1\frac{1}{2}$ lin. longum. Valdè affinis *A. alyssoidi* pro quo eum ex descriptione et icone Candolleanà eum habui sed nunc planta Tournefortiana Armena quam vidi mihi differre videtur, floribus flavis, calyce parciùs hirsuto, corollà calyce plùs duplò longiori, vexillo angustissimo carinà duplò longiori, legumine breviori ovato-oblongo.

ASTRAGALUS AMALECITANUS Boiss. (Sect. *Hypoglottidei*.)

A basi suffrutescens cæspitosus totus adpressissimè pilis bipartitis cano-sericeus, caulibus brevissimis erectis, foliis radicalibus caulisque brevissimè petiolatis 3-4 jugis, foliolis oblongis acutiusculis, stipulis glumaceis fusciscentibus glabris apice ciliatis in unam oppositifoliam vaginantem elongatam lanceolatam apice breviter bidentatam petioli parte nudà longiorem concretis, pedunculo folio paulò longiori apice 4-5 flores capitatos ferenti, bracteis lineari-lanceolatis calyce triplò brevioribus, calycis pilis albis paucisque nigris hirsuti dentibus nigricantibus linearibus tubo quadruplò brevioribus, floribus,..... legumine juniore calyce lacero vix longiori oblongo acuto submutico lanà albà densissimà ejus diametro æquilongà villosa.

Hab. in regione *Amalecitarum* ad fines Palæstinæ ad meridiem urbis *Gaza*, legi jam fructif. Aprili 1847.

Caules cum pedunculo 3 poll. longi, foliola 3-3 $1\frac{1}{2}$ lin. longa, sti-

pulæ 3 $1\frac{1}{2}$ –4 lin. longæ, flores ex reliquiis vaginæ stamineæ ampli videntur forsā pollicares, legumen junius 5 lin. circ. longum. Affinis indumento, legumine et habitu *A. Helmi* Fisch. qui tamen differt caulibus subnullis, foliolis majoribus obtusis, stipulis, lanā leguminis breviori crispā nec rigidā etc. *A. nanus* DC. Astr. tab. 47. cujus descriptionem et iconem quoque comparavi longiūs distat stipulis profundè bipartitis brevioribus, calyce profundè 5 partito, floribus multò minoribus etc.

ASTRAGALUS SANCtus Boiss. (Sect. *Dissitiflora*.)

A. basi suffrutescens cæspitoso-multicaulis totus pilis bipartitis adpressissimè cano-sericeus asper, caulibus brevissimis rigidis fragilibus erectis angulato-flexuosis, petiolis erecto-patulis rigidulis 6–7 jugis, foliolis oblongis vel oblongo-linearibus obtusiusculis, stipulis minimis a petiolo et inter se liberis triangularibus acutis pilis nigris adspersis, pedunculis ex eodem caule sæpius pluribus rigidis folio subæquilongis racemum laxum brevem 5–7 florum ferentibus, bracteis triangulari-linearibus brevissimis petiolulo æquilongis, calycis longè tubulosi basi subgibbi pilis albis nigrisque adpressis hirsuti dentibus linearibus nigricantibus tubo multoties brevioribus, corollā flavidā calyce vix duplò longiori, vexillo subrecurvo alas carinæ æquilongas vix superanti, leguminibus deflexis linearibus subcompressis falcato-recurvis calyce plūs triplò longioribus apice attenuatis acutis margine inferiori convexis superiori vix carinatis adpressè pilosis asperis.

Hab. in monte *Olivet* propè *Bethaniam* in Judæā, in *Arabia petræa* Palæstinæ conterminā ubi forma foliolis angustè linearibus quoque occurrit.

Quoad faciem et indumentum *A. Amalecitorum* similis, caules cum pedunculis et floribus 3–5 pollicares, foliola 3–4 lineas longa, flores 40–44 lineas longi, calyx lineam aut vix ampliūs longus, legumen 4 $1\frac{1}{2}$ –2 poll. longum sesquilineam vix latum. Pulchra species *A. eriocerati*, *eriolobo* et *trigonelloidi* inprimis affinis ab eis distinctissima.

ASTRAGALUS ANGUSTATUS Boiss. (Sect. *Dissitiflora*.)

A. basi suffrutescens pluricaulis totus pilis bipartitis adpressissimè canus asper, caulibus brevissimis rigidis rectis, foliis subtrijugis,

foliolis remotiusculis oblongo-ellipticis utrinquè attenuatis acutis, stipulis minimis a petiolo et inter se liberis lanceolato-linearibus, pedunculis folio subæquilongis racemum laxum 7-9 florum ferentibus, floribus subsessilibus patulis, bracteis minimis triangularibus petiolulum subæquantibus, calyce longè tubuloso basi subgibbo pilis albis nigrisque mixtis adpressis hirsuto dentibus breviter linearibus tubo multoties brevioribus, corollà flavidâ calyce subduplò longiori, vexillo oblongo apice reflexo alas carinamque subæquilongas parùm superanti, leguminibus deflexis angustissimè lineari-teretiusculis falcato-recurvis calyce plùs quadruplò longioribus adpressissimè pilis albis nigrisque asperis.

Hab. in *Persia* propè *Ispahan*, Aucher. N° 4431.

Valdè affinis habitu, florum magnitudine et formâ *A. sancto* a quo differt foliis trijugis, foliolis acutis, legumine ferè longiori sed multò angustiori lineæ $3\frac{1}{4}$ lato; ab *A. subulato* et affinibus foliis latioribus, legumine multò magis falcato distinctus.

ASTRAGALUS CABULICUS Boiss. (Sect. *Dissitiflora*.)

A. basi suffrutescens pilis adpressissimis sparsis multifloris asperulus pallescens, caulibus virgatis tenuissimis erectis parcè ramosis remotè foliosis, foliis paulò suprâ basin 3-4 jugis, foliolis oblongo-ellipticis utrinquè attenuatis acutiusculis subtùs margine subrevolutis albicantibus, stipulis foliaceis triangularibus a petiolo et inter se liberis, pedunculo virgato foliis multoties longiori in racemum tenuem supernè densiusculum infernè laxissimum abeunti, floribus minimis subsessilibus, calycis obconici pilis albis nigrisque adpressè hirtuli dentibus lineari-setaceis tubo subæquilongis, corollà (e sicco) leucophæâ calyce duplò longiori, leguminibus demùm pendulis oblongo-linearibus rectis teretiusculis subtùs profundè sulcatis acutis calyce quintuplò longioribus pilis sparsis tenuibus nigris adpressis sub lente obsitis.

Hab. in regno *Cabulico* Griffith N° 1099 in herb. Hooker.

Planta ferè pedalis, folia circ. 4-4 $1\frac{1}{2}$ poll. longa, foliola majora 4-5 lin. longa 4 $1\frac{1}{2}$ lata, racemus fructifer 3-4 pollicaris, flores 2 $1\frac{1}{2}$ lin. longi, legumen ferè *Phacæ* sed biloculare 6-8 lin. longum ferè 2 latum. Affinis *A. consanguineo* qui differt racemis densioribus, legumine dimidiò angustiori et *A. longipedi* Kar. et Kir. quoque laxifloro

sed stipulis minimis lanceolatis, dentibus calycis abbreviatis, legumine ovato-oblongo distincto.

ASTRAGALUS PODOLOBUS Boiss. et Hohenack. in Kotsch. pl. Pers. bor. exs. 1846. (Sect. *Dissitiflori*.)

A. totus pilis bipartitis medifixis adpressissimis canus basi suffrutescens, caulibus ascendentibus virgatis brevibus paucifoliis in pedunculos sæpius binos folio multò longiores virgatos laxissimè racemosos abeuntibus, foliis 2 vel 3 foliolatis foliolis longis angustissimè linearibus acutis sericeis, stipulis flavido-membranaceis in unam brevem breviter bifidam oppositifoliam concretis, calyce pedicello eo triplò breviori basi minutè bracteolato suffulto oblongo basi attenuato pilis albis nigricantibusque brevibus adpressiusculis hirsuto dentibus triangularibus acutis tubo quintuplò brevioribus, corollà cæruleo-purpurascenti calyce plùs duplò longiori, vexillo oblongo attenuato acutiusculo alas acutiusculas carinà paulò longiores breviter superanti, legumine ovato-oblongo compresso in mucronem brevem acutum attenuato pilis flavidis ejus diametro æquilongis densè hispido in stipitem calycem dimidium æquantem basi attenuato.

Hab. in schistosis montis *Elbrus* propè *Derwend* Kotschy N° 439 A. Caules 3-5 poll., pedunculi 6-10 poll. laxissimè 6-8 fori, foliola 10-15 lin. longa lineæ 1/2-1 lata, flos circ. 8 lin. longus linearis subrecurvus, legumen junius cum stipite 5 lin. longum. Affinis *A. oligophyllo* qui differt vexillo magis elongato, legumine sessili albo-hirsuto et *A. podocarp*o foliis plurijugis non sericeis, spicis densis, corollis flavis, legumine parcè et breviter lanato distincto.

ASTRAGALUS SCHISTOSUS. Boiss. et Hohen. in Kotsch. pl. Pers. bor. exs. 1846. (Sect. *Dissitiflori*.)

A. totus adpressissimè pilis bipartitis canescenti-sericeus, caudice suffruticoso caules plures herbaceos erectos teretes edenti, petiolis a medio remotè 4-5 jugis, foliolis foliorum radicalium ovato-oblongis brevibus caulnorum angustè linearibus elongatis acutis, stipulis inferioribus in uam abbreviatam albo-pellucidam brevissimè bidentatam oppositifoliam coalitis, superioribus triangularibus inter se ferè liberis, pedunculis longissimis folia multoties superantibus laxè floriferis demum laxissimis, bracteolis lanceolatis minimis, calycis subsessilis.

rubelli adpressiusculè hirti dentibus linearibus tubo triplò brevioribus , corollà purpureo-violaceà calyce duplò longiori, vexillo oblongo alas paulò superanti, alis carinà paulò longioribus, legumine juniore angustè lineari sericeo calyce triplò longiori arcuato.

Hab. in schistosis montis *Elbrous* propè *Derwend* Kotschy N° 439.

Caules semipedales, pedunculi cum racemo demùm pedales, racemus 42-45 florus, flores 7-8 lin. longi, foliola foliorum superiorum 6-7 lin. longa lineam vix lata. Species affinis *A. mesoptero* Griseb. qui differt foliis sub 42 jugis, foliolis superioribus dimidiò minoribus, dentibus calycinis setaceis tubo quintuplò brevioribus, floribus minoribus.

ASTRAGALUS DEMISSUS Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Radici-flori*.)

A totus adpressè sericeus basi suffrutescens acaulis cæspitosus, foliis brevissimis humi expansis 7-9 jugis, foliolis minimis ellipticis obtusis plicatulis valdè approximatis, stipulis breviter triangulari-lanceolatis acutis petiolo basi adnatis, pedunculis folio 2-3 plò longioribus, floribus 5-8 densè capitatis, bracteis linearibus calyce triplò brevioribus, calycis adpressiusculè hirsuti dentibus lineari-setaceis tubo dimidiò brevioribus, corollà flavescenti calyce duplò longiori, vexillo oblongo obtuso alas carinà longiores superanti, legumine.....

Hab. in monte *Gheidagh* Tauri *Isaurici* alt. 6000'. Legit Julio cl. Heldreich.

Folia cum petiolo 8-10 lin. longa, foliola 4 1/2 lin. longa, pedunculi 4 1/2-2 pollicares, corolla 7 lin. longa. Affinis *A. Sibthorpiano* Boiss. qui capitulis multifloris, calycis hirsutissimi dentibus lineari-lanceolatis tubo æquilongis differt.

A. Sibthorpiano ut synonymus adducendus *A. pæcilanthus* Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. foliolis longioribus acutioribus specificè non distinctus.

ASTAGALUS MELANOCEPHALUS Boiss. (Sect. *Vesicarii*.)

A totus pilis bipartitis adpressissimis obsitus canescens pallidè virens, caudicibus suffrutescentibus procumbentibus, caulibus erectis brevibus canis pedunculum unicum foliis multò longiorem edentibus, foliis remotiusculè 4 jugis, foliolis oblongo-spathulatis obtusis in-

fernè attenuatis, suprà pallidè virentibus subtùs griseis, stîpulis brevissimis triangularibus liberis nigro-pilosis, floribus 6-40 densissimè capitatis subsessilibus, bracteis linearibus pedicello duplò longioribus, calycis pilis aliis albis aliis copiosioribus atris erecto-patulis densè hirsuti fuliginosi dentibus linearibus atris patulis tubi tertiam partem æquantibus, corollà flavidà calyce vix duplò longiori, legumine calycem distensum dein fissum paulò superanti oblongo-subcompresso in rostrum breve tenue subobliquum abruptè attenuato densè albo-lanato.

Hab. in montibus *Tauri Cilici* Kotschy N° 423.

Caules 2 pollicares, folia 3 poll., foliola 8-9 lin. longa supernè 2 1/2 lata, pedunculus 6-8 poll. longus, calyx 7 lin. longus, legumen diametro majori 3 lin. latum. Species capitulis atropilosis nuce majoribus insignis *A. vesicario* et *albicauli* affinis a quibus foliolis majoribus, floribus densioribus, pedunculis elatis, legumine latiori multò longiùs densiusque villosò abruptè nec attenuatim rostrato differt.

ASTRAGALUS NITENS Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Vesicarii*.)

A. totus adpressè sericeo-argyreus, caudicibus lignosis prostratis, caulibus brevibus ascendentibus densiusculè foliosis, foliis brevissimis 2-4 jugis, foliolis patulis linearibus acutiusculis, stipulis liberis adpressè setosis triangularibus acutis, pedunculis in caulibus parte superiori solitariis binisve folio multoties longioribus, floribus 6-9 per anthesin densè capitatis dein laxiusculè et brevissimè racemosis, bracteis ovato-triangularibus brevissimis, calyce cylindrico pilis albis vix adpressiusculis densè sericeo dentibus nigricanti-pilosis linearibus brevissimis tubo multoties brevioribus; corollà e sicco flavescenti calyce sesquolongiori, vexillo oblongo alas alisque carinam paulò superantibus, leguminibus calyce distenso dein fisso sesquolongioribus flavido-lanatis oblongo-cylindricis subcompressis subarcuatis latere inferiori (convexo) sulcatis in mucronem brevissimum rectum abruptè attenuatis.

Hab. in collibus aridis propè *Koniah* Lycaoniæ (Heldreich), in Lycià propè *Elmalu* (Pestalozza), in Cappadocià propè *Malatia* Aucher N° 4356.

Caules 4-4 pollicares, folia cum petiolo vix pollicem longa, foliola 5-8 lin. longa lineam aut rariùs 2 lin. lata. Pedunculi rigidi sempe-

dales, flores ferè 8 lin. longi, legumen cum rostro 7 lineas longum 2 latum. Ab *A. vesicario* et affinis faciliè distinguendus calyce magis cylindrico, foliolis angustis, legumine arcuato; magis affinis *A. sericophyllo* Griseb. qui differt foliolis brevioribus, pedunculo tenuiori, corollà calyce duplò longiori, calyce breviori, legumine recto nigrescenti-piloso calyce triplò longiori.

ASTRAGALUS CHIONOPHILUS Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Anthylloidei*.)

A. pilis adpressiusculis densè argyreo-sericeus, caudiculis longis nudis subterraneis filiformibus, caulibus brevissimis foliosis, foliis brevibus sæpiùs recurvo-patulis 8-10 jugis, foliolis subcontiguis minimis oblongis vel oblongo-ellipticis obtusis, stipulis in unam oppositifoliam ad medium usquè triangulari-bidentatam connatis, pedunculis folio vix longioribus incurvis in capitulum 5-8 florum etiam fructiferum rotundum confertis, bracteis nigro-pilosis oblongo-linearibus calyce triplò brevioribus, calyce florifero subcylindrico adpressè et nigricanti-sericeo dentibus nigro-pilosis linearibus tubo dimidio æquilongis, fructifero inflato ovato rubello-lineato, corollà e sicco leucophæà calyce vix duplò longiori, vexillo oblongo rotundato vel retuso alas carinà paulò longiores breviter superanti, legumine...

Hab. in saxosis ad nives in cacumine montis *Gheidagh* Tauri Isaurici alt. 7000'-8000'. (Heldreich.)

Caules $1\frac{1}{2}$ -4 pollicares, folia pollicem, foliola 4 $1\frac{1}{2}$ -2 lin. longa, pedunculi pollicares, flores magni recurvi 9 lin. circ. longi, calyx fructifer 5 lin. latus. Collocandus juxtà *A. lineatum* qui proximè affinis tamen differt caule basi suffrutescenti paulò longiori ramuloso, indumento flavescenti, stipulis a petiolo et inter se liberis, corollà calyce plus duplò longiori, vexillo elongato carinà duplò longiori, capitulo fructifero elongato laxo etc. Ambo invito caractere nimis artificiali stipularum *Anthylloideis* adjungendi.

ASTRAGALUS GRAMMOCALYX Boiss. et Hohenack, in pl. Kotsch. Pers. bor. 1846. (Sect. *Anthylloidei*.)

A. totus patulè et breviter tomentellus griseus, caudiculis filiformibus nudis caules breves edentibus, foliis 10-12 jugis, foliolis ap-

proximalis ovatis oblongisve subretusis, stipulis inter se et a petiolo liberis foliaceis latè et breviter triangularibus acutis, pedunculo superne sæpè nigro-piloso folia paulò superanti, racemo ovato-oblongo laxiusculo, bracteis lanceolatis nigro-pilosis calyce dimidiò brevioribus, calyce patulè et sordidè hirsuto florifero tubuloso fructifero inflato ovato, dentibus calycinis setaceis dimidio tubo æquilongis, corollâ violaceâ calyce sesquilongiori, vexillo oblongo-lineari alas carinamque æquilongas quintâ parte suâ superanti, legumine...

Hab. in collibus argillosis ad radices montis *Demawend* propè *Lar*. Kotschy N° 320.

Caules cum pedunculo 3-5 pollicares, capitulum fructiferum bipollicare, foliola majora 3-3 1/2 lin. longa, flos recurvus 9 lin. longus. Ab *A. chionophilo* et *A. lineato* foliolis et stipulis majoribus, a priori indumento non argenteo capitulisque fructiferis elongatis, a posteriori corollæ et calycis proportionè diversus. Forsan nimis affinis *A. Cappadocico* qui tamen mihi sat differre videtur capitulis densissimis, dentibus calycinis corollâ parùm brevioribus, floribus purpurascensibus.

ASTRAGALUS SACCATUS Boiss. (Sect. *Anthylloidei*?)

A. totus adpressè canus asperulus, caudice cylindrico duro elongato caulem brevissimum foliatum sæpè basi ramosum edenti, foliis remotiusculè 6-8 jugis foliolis oblongis obtusiusculis utrinquè canis, stipulis parvis a petiolo et inter se liberis canis a basi triangulari breviter lineari-attenuatis, pedunculo foliis subbrevisiori ascendenti, floribus in racemum abbreviato-capitatum post anthesin elongatum laxum confertis, bracteis linearibus pedicello brevissimo duplò longioribus, calyce breviter et densè tomentello griseo basi latiori oblongo saccato superne subattenuato dentibus lineari-setaceis tubo quintuplò brevioribus, corollâ intensè sulphureâ calyce sesquilongiori, vexillo oblongo acutiusculo plicato alas carinamque subæquilongas paulò superanti, legumine.....

Hab. ad *Ispahan* Persiæ Aucher N° 4431 A.

Caulis cum pedunculo 2-4 pollicaris, racemus qui e speciminibus siccis compresso-distichus videtur 15-20 floras, flores ferè 10 lin. longi, calyx infernè 2 lineas latus, ovarium lineare hirtum. Species nulli mihi notæ affinis quoad fructum non nota et quoad sectionem igitur subdubia.

ASTRAGALUS SUBSECUNDUS Boiss. et Hoh. in pl. Pers. bor. Kotsch.
1846. (Sect. *Incani*.)

A. acaulis radice verticali crassâ, foliis radicalibus numerosis erectis longiusculè petiolatis 15–18 jugis, foliolis ovatis obtusis vel subretusis pallidè virentibus utrinquè sub lente pilis albis brevibus adpressis parcellis obsitis, stipulis breviter triangulari-lanceolatis nervulosis petiolo adnatis, pedunculo folia æquanti vel paulò superanti, racemo terminali oblongo-elongato laxiusculo fructifero subsecundo, bracteis minutissimis albidis, floribus brevissimè pedicellatis rectis, calyce albo-membranaceo oblongo subinflato fructifero paululùm aucto pilis nigris brevissimis adpressis veluti nigro-punctato denticulis triangularibus brevissimis, corollâ sulphurèâ calyce duplò longiori, vexillo apice longè attenuato acuto carinam apice violaceam quartâ parte suâ superanti, alis linearibus apice bidentatis carinam superantibus, leguminibus rectis lineari-subcompressis glabrescentibus acutis utrâque suturâ subcarinatis calycem paulò superantibus.

Hab. in collibus argillosis montis *Syach Nalas* ad radices montis *Demawend* Persiæ borealis Kotschy N° 337.

Folia 12–18 pollices longa, foliola majora 5–7 lin. longa, racemus florifer 2–3 poll. fructifer 4–5 pollic., flores 7–9 lin. longi, legumen circ. 7 lin. longum diametro latiori 1 1/2 lin. latum. Habitus *A. macrocroui* et *cylindracei* DC sed ob legumina subtus non sulcata, alas apice bidentatas aliasque notas sect. *Incanorum* potiùs adnumerandus, ab omnibus affinis colore florum, calyce subinflato distinctissimus.

ASTRAGALUS ATROPURPUREUS Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1847.
(Sect. *Incani*.)

A. perennis acaulis, rhizomate indurato crasso, foliis remotiusculè 4–8 jugis, foliolis magnis ovatis acutis utrinquè adpressissimè sericeo-canescens, stipulis triangulari-lanceolatis acutis rubellis basi nervosis petiolo adnatis, pedunculis floriferis folia æquantibus demùm elongatis, racemo florifero ovato densifloro fructifero laxissimo valdè elongato, bracteis linearibus calycis dimidiam vel tertiam partem æquantibus, floribus breviter pedicellatis patulis, calyce tubuloso nigricanti-rubello pilis albis nigrisque adpressissimè et parcè hirsutibus linearibus tubo dimidiò vel triplò brevioribus, corollâ atro-violaceâ calyce duplò longiori, vexillo medium versùs valdè curvato

oblongo-lineari apice retuso alis tertiâ parte longiori, alis angustè linearibus margine superiori gibbis extremitate obsolete retusis, carinâ angustâ elongatâ parùm curvatâ alis paulò breviori, legumine adpressè canescenti nigro-maculato pendulo cylindrico-subincurvo calyce duplò longiori obtusiusculo mucronato ad latus convexum obsolete sulcato.

Hab. in arenosis ad vias planitie *Isbarta* Pisidiæ ubi flor. et fruct. initio Junii (Heldreich).

Folia 6-8 poll., foliola majora 6-8 lin. longa 5 lata, pedunculi cum racemo pedales longioresque, flores 8-9 lin. longi, calyx 4 lin. longus tubo lineam lato, legumen 7-8 lin. longum diametro lineam 4 $\frac{1}{4}$ latum rostro lineam longo terminatum. Valdè et forsàn nimium affinis *A. campylosemati* Boiss., sed in hoc bracteæ brevissimæ sunt, calycis tubus brevior ferè duplò latior dentibus tubo æquilongis, corolla atropurpurea nec flavida, alæ apice acutè bidentatæ, carina multò brevior magisque curvata, legumen paulò longius angustiusque.

ASTRAGALUS TIGRIDIS Boiss. (Sect. *Incani*.)

A. acaulis rhizomate indurato, foliis brevibus 2-5 jugis, foliolis magnis ovatis obtusis vei acutiusculis utrinquè adpressissimè sericeis asperis, stipulis lanceolatis brevissimis, racemis ovatis laxiusculis post anthesin elongatis, pedunculis basi ascendentibus folia superantibus, bracteis angustè linearibus calyce triplò brevioribus, floribus subsessilibus patulis demùm deflexis, calyce tubuloso basi gibbo adpressissimè canescenti dentibus linearibus subrecurvis tubo circ. dimidiò brevioribus, corollâ flavidâ calyce sesquilongiori, vexillo oblongo subrecurvo retuso alis paulò longiori, alis margine superiori gibbis carinæ parùm curvatæ æquilongis, leguminibus pendulis oblongo-linearibus subcompressis subfalcatis basi subangustatis calycem vix excedentibus in rostrum longiusculum abruptè attenuatis canescentibus.

Hab. in *Mesopotamiâ* propè *Beschabur* ad trajectum Tigridis, Kotschy N° 297.

Folia 3-4 poll. foliola 5-7 lin. longa 3-5 lata, pedunculi fructiferi cum racemo ferè pedales, flores 9 lin. longi, legumen 7 lin. longum rostro 4 $\frac{1}{2}$ -2 lin. longo terminatum 4 $\frac{1}{2}$ lin. latum. Leguminis formâ affinis *A. clavato* qui longè differt foliolis minoribus multijugis, calycis dentibus brevissimis, fructibus calyce longioribus erectis.

A. rhizanthi Boiss. Diagn. II pag. 83 muta nomen in *A. Cariensem* Boiss. ob antiquiorem *A. rhizanthum* Royle Illustr.

ASTRAGALUS CHLOROCYANEUS Boiss. et Reut. (Sect. *Incani.*)

A. caulibus suffrutescentibus erectis vel ascendentibus elongatis petiolis stipulisque vetustis densè stipatis, foliis 20–25 jugis, foliolis approximatis minutis ovatis obtusis suprà glabris rarissimè canescentibus subtùs adpressè canescentibus, stipulis lanceolatis adpressè hirtis basi nervosà petiolo adnatis, pedunculis folio longioribus, racemis terminalibus laxis oblongis demùm oblongo-cylindricis, bracteis virescentibus margine membranaceis oblongis acutis calyce triplò brevioribus, calycis tubulosi parcè et adpressissimè pilis nigricantibus minutis obsiti albido-rubelli dentibus angustè linearibus acutis tubo dimidio æquilongis vel longioribus, corollà calyce duplò longiori pallidè violaceo-virescenti, vexillo oblongo-attenuato apice retuso alis quartà parte longiori, alis linearibus rectiusculis margine superiori sinuato-gibbis apice integris vel obsoletè et inæqualiter bidentatis carinam superantibus, leguminibus rubellis pilis adpressissimis obsitis demùm glabrescentibus erectis lineari-cylindricis subcompressis sursum arcuato-falcatis calyce 3–4 plò longioribus apice in rostrum tenue abruptiusculè attenuatis.

Hab. in collibus siccis regionis Mediterraneæ australioris occidentalis, Hispanià orientali circà Barcinonem (Reuter), in regno Granatensi (Boiss.) et centrali circà Aranjuez (Reuter), in Mauritanià propè Algeriam.

A. Monspessulanus mult. auct. non L.

Planta inter quam et *A. Monspessulanum* omnia discrimina nondàm novimus sed quæ certè ab eo differt caulibus multò longioribus erectis suffrutescentibus, spicis laxioribus, corollà nunquam saturatè purpureà sed rubello viridi flavidoque quasi suffusà, legumine duplò triplove longiori crassiori 15–18 lin. longo 4 1/2 lato mucrone sæpè 2 lin. terminato. Sata et culta caules erectos elongatos omnesque notas servat.

ASTRAGALUS PINARDI Boiss. (Sect. *Incani.*)

A. subcaulis, caudicibus induratis brevissimis prostratis, foliis 12–15 jugis, foliolis ovatis obtusis pallidè virentibus superne glabris infernè parcè et adpressissimè sub lente pilis albis obsitis, stipulis

triangulārī-lanceolatis acutis, pedunculis ascendētib⁹ rubellis foliis brevioribus vel æquilongis, racemo oblongo laxiusculo fructifero vix elongato, bracteis oblongis acutis membranaceis pedicellos vix superantibus, calycis cylindrici pilis nigris sparsis adpressis hirti dentibus linearibus tubum dimidium æquantibus, corollā purpureo-violaceā calyce pl⁹s duplō longiori, vexillo supernē lineari obtuso vel acutiusculo alas pl⁹s tertiā parte superanti, alis angustē linearibus margine superiori convexiusculis vix gibbis apice integris et bidentatis carinam vix superantibus, leguminibus rubris adpressē hirtulis lineari-cylindricis vix compressis deorsum valdē falcato-recurvis in rostrum tenue breve apice sensim attenuatis calyce quintuplō longioribus.

A. Monspeulanus var. *variegatus* Pinard pl. exs.

Hab. in Cariā (Pinard), in saxosis montis *Solima* Lyciæ (Heldreich), in *Græciā* (herb. Fauché).

Pedunculi cum racemo semipediales longioresque, flores 40-44 lin. longi, legumen 2 poll. longum diametro lineas 4 1/2-2 latum. Species ab *A. Wulfeni* cui legumine deorsum curvato convenit distincta eo insigniter nec vix curvato vix compresso lævi nec ruguloso, vexillo magis elongato acutiusculo vel obtuso sed non retuso. *A. schizopterus* quoque affinis differt foliolis retusis, legumine tantum pollicari compresso longē rostrato ad marginem convexum sulcato.

ASTRAGALUS REFRACTUS C. A. Meyer var. *brachycarpus* B. et Hohen. in Kotsch. pl. Pers. bor. exs. 1846.

Folia eis speciei pro longitudine paulō latiora, legumen 6-7 lin. tantum longum.

Hab. ad radices montis *Demawend* propē *Ask*. Kostchy N° 364.

ASTRAGALUS SINAICUS Boiss. (Sect. *Sesamei*.)

A. annuus totus griseo-hirsutus, caulibus subnullis diffusis, foliis brevibus a basi ferē 8-10 jugis, foliolis ellipticis adpressiusculē hirsutis, stipulis triangulārī-lanceolatis acutis, capitulis axillaribus subsessilibus, calycinis dentibus lineari-cylindricis tubo æquilongis, floribus....., leguminibus stellatim patentibus patulē hispidis lineari-trigonis suprā carinatis subtus sulcatis a basi latiori sensim attenuatis acutis.

Hab. in deserto montis *Sinai* Aucher N° 1309 ex parte.

Caules vix 1-1½ pollicares, folia 1-1½ poll., foliola 1 ½-2 lin. longa 1 lata, legumen 6-7 lin. longum. Valdè affinis *A. tribuloidi* Delile. DC. Prodr. qui in desertis Ægypti, Arabiæ Petreæ, Schimper N° 181, Aucher N° 1309 ex parte, Armeniâ C. Koch in herb. Gen. Mus. Berol. copiosè crescit et differt indumento totius plantæ et præsertim leguminis adpressissimè sericeo, foliolis duplò latioribus, legumine breviori 4-5 lin. longo sæpè subarcuato basi evidenter retuso bigibbo. *A. tribuloides* variat capitulis sessilibus vel breviter pedunculatis, caulibus subnullis vel prostratis subelongatis.

ASTRAGALUS MINUTUS Boiss. (Sect. *Sesamei*.)

A. annuus totus adpressè hirsuto-sericeus, caulibus brevissimis diffuso-procumbentibus, foliis brevibus 4-6 jugis, foliolis minutis ellipticis obtusis vel acutiusculis, stipulis triangulari-lanceolatis acutis, capitulis sessilibus axillaribus paucifloris, floribus minimis, calycis patulè albo-hispidi dentibus subulatis tubo ferè longioribus corollam violaceam æquantibus, vexillo lineari alas paulò superanti, alis carinam valdè superantibus, leguminibus stellatim patentibus brevibus subarcuatis subtriquetris a basi latiori retuso-bigibbâ attenuatis acutiusculis supernè subcarinatis subtilis sulcatis adpressissimè hirsutis.

Hab. in *Persia* propè *Ispahan* Aucher N° 4419, propè *Persepolis* Kotschy N° 837 et *Teheran* N° 44.

Plantula nana ½-1 pollicaris, foliola 2-2 ½ lin. longa, flos 2 lin., legumen 3-4 lin. longum basi ferè 2 lin. latum. Affinis *A. tribuloidi* pro quo eum bucusque habui et a quo differt floribus ferè triplò minoribus, laciniis calycis longioribus, legumine dimidiò minori breviorique.

ASTRAGALUS ERPOCAULOS Boiss. (Sect. *Sesamei*.)

A. annuus, caulibus filiformibus procumbentibus elongatis parcè hirsutis, foliis 6-7 jugis, foliolis adpressè griseo-canescens ovato-oblongis acutiusculis vel obtusis, stipulis minimis lanceolato-linearibus hirsutis, capitulis 4-5 floris axillaribus brevissimè pedunculatis, bracteis setaceis calycinum tubum dimidium æquantibus, calycis adpressiusculè hirsutissimi dentibus setaceis tubo vix brevioribus, corollâ calyce vix longiori pallidè carneâ, vexillo retuso alas carinâ longiores

paululum superanti, leguminibus adpressè pubescentibus ovatis a dorso subcompressis obtusiusculis basi truncatis supernè convexis infernè sulcatis.

Hab. in deserto *Arabiae petraeae*, legi inter *Nuokl* et *Gaza* Aprili ineunte.

Caules 6-10 pollicares tenues, folia pollicem, foliola ferè 2 lin. longa sesquilineam lata, flores 2 lin. longi, legumen 2 $1\frac{1}{2}$ lin. longum sesquilineam latum. Species leguminum et florum magnitudine affinis *A. minuto* Boiss. sed ab eo præter caules elongatos et capitula non omninò sessilia, qui characteres in sectione mutabiles sunt, specificè diversa leguminibus rectis obtusis latioribus a dorso nec a latere compressiusculis.

ASTRAGALUS SESAMOIDES Boiss. (Sect. *Sesamei*.)

A. annuus caulibus elongatis diffusis sulcato-striatis adpressè hirtulis, foliis laxiusculè 5 jugis, foliolis oblongo-linearibus obtusis supra parçè subtùs copiosius et adpressiusculè hirsutis, stipulis minimis a basi lineari tenuissimè setaceis nigro-pilosis, capitulis minutis densis, pedunculo foliis longiori, bracteis lineari-setaceis calycino tubo subæquilongis, calycis pilis albis nigrisque adpressè hirsuti dentibus setaceis alas subæquantibus tubo sublongioribus, vexillo violaceo angusto alas circ. tertià parte superanti, leguminibus erectis strictis in capitulum densum rotundum confertis tomentellis oblongo-linearibus obtusè triquetris subineurvis supra subcarinatis subtùs sulcatis in mucronem brevem tenuem incurvum attenuatis.

Hab. in regno *Cabulico* Griffith N° 1096 in herb. Hooker.

Pedalis, foliola 8-9 lin. longa 1 $1\frac{1}{2}$ -2 lata, flores 3 lin. legumen 7 lin. longum 4 $1\frac{1}{2}$ latum. Quoad capitula fructifera leguminaque similis *A. sesameo* qui differt capitulis sessilibus nec pedunculo 1 $1\frac{1}{2}$ -2 pollices longo suffultis, foliis magis hirsutis 10-12 jugis.

ASTRAGALUS AMMOCRYPTUS Boiss. (Sect. *Sesamei*.)

A. annuus pilis adpressiusculis griseus, caulibus brevissimis prostratis fructiferis induratis sulcatis glabris arenà sepultis cæspitem pulvinarem minimum formantibus, foliis 7-8 jugis, foliolis angustè elliptico-linearibus acutiusculis, stipulis minimis membranaceis teneris triangularibus acutis hirsutissimis, floribus 4-5 in capitulum axillare

brevissimè pedunculatum confertis minimis, calycis angustè tubulosi basi attenuati membranacei glabri dentibus setaceis albo-hispidissimis tubo dimidiò brevioribus, corollà e sicco ochroleucà calyce sesquilingiori, vexillo valdè attenuato acutiusculo recurvo alis carinam superantibus tertià parte longiori, leguminibus glaberrimis a basi latiori bigibbà attenuatis acutiusculis oblongo-triquetris arcuatis suprà subcarinatis subtùs profundè sulcatis tenuiter reticulato-venosis arenà sepultis.

Hab. in deserto *Arabiae petrae* ad fines Palæstinæ ubi legi Aprili 1846.

Pulvinus diametro 1-3 poll. latus, foliola 3-3 $1\frac{1}{2}$ lin. longa lineam aut paulò minùs lata, flores tres lineas longi angustissimi incurvi, legumen 3-4 lin. longum lineam aut paulò ampliùs latum. Planta more *Trigonellæ microcarpæ* caules induratos leguminaque arenà occultans. Ab. *A. cruciata*, *tribuloidi* et *minuto* quibus affinis foliolis angustis, modo crescendi legumineque glaberrimo distinctus.

ASTRAGALUS PERSEPOLITANUS Boiss. (Sect. *Sesamei*.)

A. annuus, caulibus tenuibus prostratis brevissimis, foliis longiusculè petiolatis sexjugis, foliolis oblongis retusis supernè glabriusculis infernè adpressissimè canescentibus, stipulis a basi triangulari linearilanceolatis acutis infimis petiolo adnatis, floribus minimis in capitulum pedunculo brevi suffultum ovatum laxiusculè et subverticillatim dispositis violaceo-rubellis pedicellatis, calycis laciniis setaceis flexuosis tubo æquilongis, vexillo calyce duplò longiori valdè recurvo alas superanti, carinà apice intensè violaceà alis breviori, leguminibus oblongo-subtriquetris acutis facie superiori carinatis inferiori sulcatis transversè nervulosis adpressè et parcè hirtulis.

Hab. in ruinis templi urbis *Persepolis* in *Persia australi* Kotschy N° 226 sub *A. tribuloidi*.

Folia bipollicaria, foliola 2-2 $1\frac{1}{2}$ lin. longa, pedunculi 4-5 lin. longi, flores vix 2 lin. longi, legumina 3 lin. longa. Hæc species quam infaustè olim ad *A. tribuloidem* retuleram ab eo capitulis pedunculatis, foliis longiùs petiolatis laxiùs foliolatis, foliolis supernè glabris, etc., longiùs distat et propè *A. ammophilum* Kar. et Kir. collocanda est qui recedit legumine glaberrimo valdè transversè nervuloso, calycis laciniis corollà dimidiò brevioribus.

ASTRAGALUS TENUIRUGIS Boiss. (Sect. *Annulares.*)

A. annuus sub lente pilis albis adpressis parcè hirtulus, caulibus procumbentibus elongatis sulcato-striatis, foliis 6-7 jugis, foliolis pedicellatis cuneato-oblongis retusis suprà glaberrimis subtùs ad nervum hirtulis, stipulis viridibus albo-marginatis triangulari-lanceolatis ciliatis, floribus 4-5 racemum sub anthesi laxè capitatum dein valdè elongatum pedunculo folium æquanti vel eo longiori suffultum formantibus, bracteis membranaceis linearibus pedicello longioribus, calycis pilis albis nigrisque sparsis adpressè hirsuti dentibus linearibus tubo dimidiò brevioribus, corollà pallidè carneà calyce duplò longiori, vexillo recto lineari alas quartà parte superanti, leguminibus rectis falcato-recurvis calyce multoties longioribus lineari-compressis margine convexo sulcatis concavo planiusculis glaberrimis dorso tenuiter et latere obsoletè reticulato-rugosis in mucronulum brevissimum curvatum abeuntibus.

Hab. in regione *Bestan* Schimper (Nº 420), legi frequenter in arenosis deserti *Palæstinæ* finitimi Aprili 1846.

Caules 1½-4 pedales, foliola circ. 3 lin. longa apice 4 1½-2 lata, flores 3 lin. longi, legumen in circulum dimidium curvatum pollicem et ampliùs longum lineam latum. Valdè affinis *A. corrugato* Bertol. quem quoque sed rarius in Arabià petreà legi et quem e Persià quoque habeo et mihi sat differre videtur legumine ad dorsum elevato-rugoso ad latera manifestè reticulato apice recurvato-uncato. *A. Juvenalis* Delile Ind. monsp. 1836 quem tantùm è specim. culto florifero novi differt foliolis majoribus, stipulis elongatis; ejus legumen prætereà vix compressum subteres dicitur non rugosum.

ASTRAGALUS LARICUS Boiss. et Hohen. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Annulares.*)

A. annuus pilis parcis adpressis hirtulus vel glabrescens, caulibus tenuibus teretibus prostratis, foliis 6-7 jugis, foliolis minutis complicatis elliptico-linearibus truncato-retusis, stipulis triangularibus acutis glabriusculis, floribus paucis laxiusculè capitatis, pedunculo stricto folio vix longiori, bracteis minutis oblongis pedicellum vix superantibus, calycis parcè et adpressè nigro-hirti dentibus triangulari-linearibus tubo quadruplò brevioribus, corollà pallidè violaceà calyce plùs duplò longiori, vexillo oblongo-lineari alas carinamque subæquilongas

superanti, legumine calyce 4-5 plò longiori erecto lineari-compresso subarcuato glaberrimo sub lente tenuiter reticulato-venoso apice in mucronem rectum brevissimum abeunti ad marginem convexum angustè sulcato ad concavum acuto.

Hab. ad radices montis *Demawend* propè *Lar.* Kotsch. N° 628 a.

Caules 3-5 pollic., foliola 2-2 1/2 lin. longa lineam lata, flores 3 1/2 lin. longi, legumen 6 lin. longum lineam latum. Affinis præcedenti et præsertim *A. reticulato* MB. legumine transversè et elevatim rugosissimo facilè dignoscendo.

ASTRAGALUS CALLICHOUS Boiss. (Sect. *Annulares.*)

A. annuus, totus pilis albis sparsis patulis vel adpressiusculis hirtulus plùs minùs griseus, caulibus brevibus numerosis procumbentibus vel erectis, foliis 7-9 jugis, foliolis foliorum inferiorum lineari-capillaceis aliorum plùs minùsve angustè ellipticis vel linearibus obtusiusculis, stipulis minimis triangularibus, floribus 5-8 densiusculè in capitulum pedunculo folio æquilongo suffultum congestis, bracteis linearibus pedicello longioribus, calycis adpressè pilis albis nigrisque copiosioribus vestiti dentibus lineari-setaceis dimidio tubo sublongioribus, corollà intensè violaceo-cæruleà calyce plùs duplò longiori, alis linearibus carinam superantibus, leguminibus longissimis linearibus subcylindricis falcato recurvis acutis pilis brevibus adpressis scabridis ad marginem convexum latè sulcatis ad concavum rotundatis.

Hab. in planitie *Amalecitarum* Arabiæ petreæ conterminà et inter *Jerusalem* et *Jericho*. Legi Apr. et Maio.

Caules 2-5 pollic., foliola 3-6 lin. longa angusta, flores 8-9 lin. longi, legumen sæpè bipollicare et longius diametro lineam latum. Pulchra stirps quoad fructum simillima *A. hispidulo* DC in eisdem regionibus obvio et qui differt foliolis minùs angustis, floribus 5-6 lin. longis flavescentibus, vexillo abbreviato, dentibus calycis tubo quadruplò brevioribus etc.

ASTRAGALUS PEREGRINUS L. var. *rotundifolia* Boiss.

Hab. in deserto inter *Kahiram* et *Suez* ubi legi flor. Martio 1846.

Folia tantum 5-6 juga foliolis ovato-orbiculatis, legumina breviora magisque curvata. — Pro specie proprià primùm habueram sed formas inter hanc et speciem intermedias observavi.

ASTRAGALUS FALCINELLUS Boiss. (Sect. *Bucrates*.)

A. annuus totus adpressiusculè cinereo-tomentellus, caule erecto infernè ramosissimo ramis erecto-patulis abbreviatis, foliis 7-8 jugis foliolis oblongis obtusis petiolulatis subtùs magis canescentibus, stipulis minutis triangularibus acutis, floribus 3-5 in capitulum laxum post anthesin elongatum pedunculo folio sublongiori suffultum dispositis, bracteis linearibus brevissimis, calycis pilis albis adpressiusculè hirsuti dentibus linearibus tubo paulò longioribus, corollà ochroleucà calyce sesquialongiori, vexillo alas carinamque apice violascentem vix superanti, legumine erecto lineari-compresso falcato adpressè puberulo calyce 5-6plò longiori acuto ad marginem convexum sulcato carinis rotundatis, ad marginem concavum carinato.

Hab. in cultis inter *Kahiram* et *Pyramides* legi Martio 1846.

Pedalis, foliola majora 5-6 lin. longa nunquam retusa, flores 4 lin. longi, legumina 8-9 lin. longa lineam aut paulò amplius lata. Species inter *A. hamosum* et *trimestrem* quasi media. Prior differt caulibus sulcato-striatis, floribus in capitulum densum multiflorum dispositis, vexillo apice attenuato alas multò superanti, legumine angustiori et minùs compresso deflexo nec erecto. *A. trimestris* magis affinis differt foliolis emarginatis, calycinis dentibus tubo brevioribus et præsertim carinis marginis convexi acutis nec convexis; planta ægyptiaca *A. trimestri* adnumerata est probabiliter nostra. *A. ægiceras* W. Syst. et herb. qui leguminibus erectis nec falcatis *A. fulcinello* valdè affinis est differt stipulis setaceis, vexillo alas carinamque longè superanti, dentibus calycis tenuioribus.

ASTRAGALUS HAUARENSIS Boiss. (Sect. *Bucrates*.)

A. annuus totus adpressè cinereo-sericeus, caulibus brevibus procumbentibus, foliis longiusculè petiolatis 4-2 jugis, foliolis magnis oblongis retusis terminali paulò majori, stipulis minutis triangularibus acutis membranaceis hirsutis, racemis laxiusculè 3-5-floris pedunculo brevissimo suffultis, bracteolis ovatis minimis, calycis adpressè hirsuti dentibus lanceolatis tubo paulò brevioribus, corollà ochroleucà calyce subduplò longiori, vexillo oblongo alas carinamque paululùm superanti, leguminibus adpressè hirsutis erectis linearibus compressis falcatis acutis calyce multoties longioribus ad marginem convexum sulcato carinis rotundatis, ad concavum carinatis.

Hab. in deserto Sinaitico ad *Hauara* propè *Ras Hammam* Schimper N° 489, legi quoque in Arabià petreà Martio 1847.

Caules 1-3 pollic. foliola 4-6 lin. longa 3-4 lata, flores 4 $\frac{1}{2}$ lin. longi, legumen 12-18 lin. longum 4 $\frac{1}{2}$ -2 latum. Affinis *A. annulari* racemis longè pedunculatis, legumine a dorso nec a latere compresso diversissimo. *A. Mareoticus* Del. quem in Arabià petreà quoque legi differt foliolis 7-8 jugis triplò minoribus, racemis longius pedunculatis. *A. trimorphus* Viv. Lyb. quoque affinis distinguitur foliolis minoribus acutis, pedunculis folio duplò longioribus, legumine subcylindrico etc.

ASTRAGALUS AULACLOBUS Boiss. (Sect. *Bucerates*.)

A. annuus glaber pluricaulis, caulibus erectiusculis humilibus basi ramosis angulato-striatis, foliis 6-7 jugis, foliolis oblongo-cuneatis retusis, stipulis membranaceis triangulari-lanceolatis hirtulis, floribus 3-4 in racemum laxiusculum pedunculo folio æquilongo suffultum approximatis, calycis pilis albis nigrisque adpressiusculis hirsuti dentibus lineari-setaceis nigro-pilosis tubo æquilongis, corollà ochroleucà calyce plus duplò longiori, vexillo oblongo obtuso carinam alis paulò longiorem parùm superanti, legumine glaberrimo fusco-maculato, lineari-subquadrato valdè falcato recurvo patulo basi et apice attenuato ad marginem convexum latè sulcato angulis acutis, ad marginem concavum quoque sed obsoletius sulcato angulis rotundatis.

Hab. in *Syrià* ubi legi loco proprio non notato.

Caules semipedales, foliola 2-3 lin. longa, flores 3 $\frac{1}{2}$ lin. longi legumen ferè pollicem longum sed valdè falcato-recurvum ad marginem convexum sesquilineam latum. Quoad herbam calycem, flores valdè affinis *A. striatello* MB. qui etiam in Mesopotamià Aucher N° 993 et Chesney N° 465 crescit sed differt legumine breviori latiori vix subarcuato margine altero plano-convexo nec sulcato.

ASTRAGALUS POLYBOTRYS Boiss. (Sect. *Ciceroidei* DC.)

A. totus breviter et densè tomentellus flavescenti-griseus, caulibus teretiusculis procumbentibus longissimis filiformibus simplicibus jam infra medium ex axillis alternatim racemos numerosos foliis multò breviores subtrifloros laxos omnes æquilongos edentibus, foliis brevibus sub 15 jugis, foliolis parvis oblongis obtusis approximatis,

stipulis membranaceis hirsutis triangulari-lanceolatis acutis parvis a petiolo et inter se liberis, bracteis linearibus pedicello duplò longioribus, calycis tubulosi tomentelli dentibus lineari-subulatis tubum dimidium ferè superantibus corollam flavam subæquantibus, vexillo alas parùm superanti, leguminibus oblongo-linearibus compressis rectis in mucronem brevem rectum attenuatis ad suturam inferiorem subsulcatis hirtulis.

Hab. in regno *Cabulico* Griffith N° 1075 in herb. Hooker.

Caulis bipedalis procumbens lineam diametro latus, folia pollicem aut paulò ampliùs longa, foliola $1\frac{1}{2}$ -2 lin. longa 1 lata, axis racemi 4-6 lineas longa, flores 7 lin. longi, calyx sesquilineam latus, legumen calyce demùm fisso vix longius 7-9 lin. longum 2 latum planiusculum. Affinis *A. orbiculato* Ledeb. qui differt foliis elongatis stipulisque multò majoribus, corollà elongatà, legumine breviori latiori minùs compresso etc.

ASTRAGALUS COLUTEOCARPUS Boiss. (Sect. *Galegiformes*.)

A. caulis erectis virgatis glabris striato-subangulatis, foliis 5-6 jugis, foliolis majusculis petiolulatis basi rotundatis ovatis obtusis mucronulatis utrinquè sub lente adpressè et sparsim hirtulis pallidè virentibus crassiusculis firmis, stipulis scariosis lanceolatis acutis a petiolo et inter se liberis, pedunculis ex axillis superioribus folia vix superantibus apice hirtulis, floribus in capitulum terminale ovatum laxiusculum fructiferum elongatum dispositis brevissimè pedicellatis patulis, bracteis linearibus scariosis calycem dimidium æquantibus, calycis pilis albis nigrisque patulis sparsim hirtuli dentibus superiori-bus a basi triangulari linearibus sursùm subincurvis inferioribus linearibus paulò longioribus tubum dimidium superantibus, corollà (e sicco albidà vel rubellà) calyce duplò longiori, vexillo recurvo alis paulò longiori, carinà subtùs angulo recto curvatà apice acutiusculà alis paulò breviori, legumine pendulo oblongo inflato subtùs sulcato apice attenuato acuminato basi in stipitem filiformem eo breviorē attenuato.

Hab. in regno *Cabulico* Griffith N° 1064 in herb. Hooker.

Caulis plùs quàm pedalis, folia 5-6 pollicaria, foliola 6-8 lin. longa, 5-6 lata, flores incurvi 6-8 lin. longi, legumen stipite 6-7 lin. longo suffultum cum mucrone ferè pollicare 4-5 lin. latum. Pulchra species fructu *A. podocarpum* Hamilt., habitu et floribus *A. concretum* Benth.

referens ab eis stipulis multò minoribus non concretis foliolis magis rotundatis crassiusculis distincta.

ASTRAGALUS GYMNOPODUS Boiss. (Sect. Galegiformes.)

A. caulis erectis elatis angulato-striatis pilis brevibus adpressis parcissimè hirtulis, petiolis elongatis striatis strictis basi subulis carinatis remotissimè 8-12 jugis, demum foliolis deciduis virgatis persistentibus, foliolis minutis glabrescentibus elliptico-linearibus obtusis, stipulis parvis triangulari-lanceolatis scariosis inter se et a petiolo liberis, pedunculis longissimis ex axillis supremis ortis folia multò superantibus longè laxèque racemosis fructu delapso persistentibus scopariis, bracteis minimis scariosis ovatis, calycis membranacei parçè pilis nigris adpressis hirtuli dentibus linearibus brevissimis, corollà lutea calyce plùs duplò longiori, leguminibus pendulis stipite eis dimidio breviori suffultis glaberrimis lævibus linearibus plano-compressis apice obtusis brevissimè et obliquè mucronulatis.

In regno *Cabulico* Griffith N° 1077 in herb. Hooker.

Planta ex specimine quod vidi verosimiliter 3-4 pedalis, petioli 4-6 pollicares, foliola 3-5 lin. longa 1 1/2-2 lin. lata, peduncules cum racemo sesquipedalis, flores angusti 7 lin. longi, legumen stipite 6 lineas longo suffultum pollicare 2 1/2 lin. circ. latum. Affinis habitu *A. tetragonocarp* a quo legumine planissimo altisque notis differt.

• **ASTRAGALUS MEDULLARIS Boiss. (Sect. Galegiformes.)**

A. glaber, caule crasso tereti striato medullà farcto, foliis 6-8 jugis, foliolis magnis remotiusculis petiolulatis ovatis basi rotundatis vel truncatis apice obtusis mucronulatis, stipulis magnis foliaceis ovatis obtusis obliquè mucronulatis basi utrinquè latè rotundato-auriculatis, pedunculis folia superantibus longè et laxè racemosis, floribus subsessilibus pendulis, bracteis linearibus membranaceis calycino tubo glabro submembranaceo flavescenti paulò brevioribus, calycis dentibus triangularibus acutis tubo quintuplò brevioribus, corollà flavà calyce sesquilongiori, vexillo alas carinamque paulò superanti, leguminibus linearibus plano-compressis utrinquè attenuatis glabris apice acutis basi in stipitem filiformem calyci æquilongum abeuntibus.

Hab. in regno *Cabulico* Griffith N° 1064 in herb. Hooker.

Planta ut videtur elata, stipulæ amplissimæ sesquipollicares pollicem

late, foliola 9-10 lin. longa 7-8 lata, racemi semipedales longioresque, flores 7 lin. longi angusti, legumen stipite 4-5 lin. longo suffultum pollicare 2-2 1/2 lin. latum. Planta stipulis suis insignis propè *A. rotundifolium* Royle et *A. graveolentem* Hamilt. collocanda. Prior differt e descriptione legumine oblongo, posterior foliolis ovato-ellipticis, legumine etiam immaturo sesquipollicari.

ASTRAGALUS SPECIOSUS Boiss. et Hohenack. in Kotsch. Pl. Pers. bor. 4846. (Sect. *Alopecuroides*.)

A. perennis, caule elato simplici striato supernè et versùs basin patulè flavido-tomentoso, foliis 10-13 jugis, petiolis breviter hispidis, foliolis ovatis obtusis supernè glabris vel margine tantùm pilosulis subtùs adpressè villosis cinerascentibus, stipulis lanceolatis glabris extùs hirsutis intùs glabris, capitulis multifloris densis breviter ovatis sessilibus vel pedunculo eis breviori suffultis, bracteis lineari-sabulatis tubo calycino brevioribus, calycis pilis patulis rigidis flavidis densissimè hispidi infernè subventricosi dentibus linearibus dimidiatè tubum subæquantibus, corollà sulphureà calyce vix duplò longiori, vexillo recurvo marginibus reflexo alis carinaque subæquilongis longiori, legumine...

In fauce *Schirdere* montis *Elbrus* propè *Derwend* Kotschy N° 249.

Sesquipedalis, folia inferiora 10-12 poll. longa, foliola majora 9-12 lin. longa 5-8 lata. Capitula numero 5-6 ferè 2 pollic. longa sesquilineam lata, flores incurvi 9-10 lin. longi. Affinis *A. vulpino* qui differt caule sulcato, foliolis pubescentibus, calycis albido villosi-dentibus setaceis tubo æquilongis, corollæ amplioris pallidioris vexillo carinae æquilongo etc.

ASTRAGALUS ISOPETALUS Boiss. (Sect. *Christiani*.)

A. caudice induratà caules erectos breves a basi folia floresque ferentes edenti, foliis caule longioribus laxissimè 4-6 jugis, foliolis orbiculatis obtusissimis basi subcuneatis suprà glaberrimis subtùs densè et breviter hirsutis cinereis, stipulis parvis flavidis triangularibus, racemis subsessilibus axillaribus laxissimè 2-5 floris, bracteis setaceis pedicello brevi 2-3 plò longioribus, calyce densè et breviter cinereo-hirsuto subeyliadrico supernè vix angustato dentibus lanceolato-linearibus tubo quintuplò brevioribus, corollà luteà calyce duplò

longiori, petalis omnibus rectiusculis subæquilongis, vexillo marginibus reflexo oblongo-lineariter obtuso, alis angustè linearibus, carinà vix curvatà apice rotundatà, legumine...

Hab. in regno *Cabulico* Griffith in herb. Hooker N° 1067.

Caulis in specim. quod vidi 6 pollic., folia 6-7 poll. longa, foliola diametro 3 $1\frac{1}{2}$ -4 $1\frac{1}{2}$ lin. lata, flores 13-14 lin. longi, calyx infernè 2 $1\frac{1}{2}$ lin. latus verosimiliter fructifer inflatus. Affinis *A. Kahirino* DC. et præsertim *A. Lehmanniano* Bge. qui eximiè differt foliolis 9-10 lin. latis, racemis cylindricis densè et multifloris, calyce densè sericeo-velutino jam florifero ovato, corollà brevissimà calyce vix sesquilongiori etc.

ASTRAGALUS ORTHOCARPUS Boiss. (Sect. *Christiani*.)

A. Caule erecto tenui firmo subangulato folioso subflexuoso pilis albis brevissimis adpressis sparsis hirtis, foliis 20-25 jugis, foliolis parvis approximatis crassiusculis viridibus ovato-rotundis plicatis obtusissimis petiolulatis subtus ad nervum medium margineque hirtulis cæterum glaberrimis, petiolo basi utrinquè in nervum elevatum secus caulem decurrenti, stipulis parvis triangularibus acutis hirtulis, floribus 1-3 ex axillis superioribus brevissimè pedicellatis, calyce pilis sparsissimis longis albis obsito basi subgibbo dentibus angustè linearibus ciliatis tubo subæquilongis, corollà flavà calyce sesquilongiori, vexillo reflexo alas lineares paulò superantè, carinà extremitate subtus angulo rotundato curvatà alis paulò breviori, legumine erecto oblongo subcompresso calyce sesquilongiori ad suturam anteriorem obsolete sulcato convexulo ad anteriorem concaviusculo carinato in rostrum rectum tenuè longiusculum abeunti pilis rigidis albidis longis hispido.

Hab. in regno *Cabulico* Griffith N° 1060 in herb. Hooker.

Caulis e spec. incompleto probab. 8-10 pollicaris, folia 3-4 poll., foliola 2 $1\frac{1}{2}$ -4 lin. longa, flores 6-7 lin. longi, legumen cum rostro 6 lin. longum sesquilineam vel paulò ampliùs latum. Species in sectione foliolis minutis leguminibusque brevibus distinctissima.

ASTRAGALUS RETAMOCARPUS Boiss. et Hohen. in Kotsch. Pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Christiani*.)

A. caule crasso elato sulcato pilis albis nigrisque patulis hispido ferè a basi densè folioso floriferoque, foliis longis erecto-patulis

15-20 jugis, foliolis approximatis elongato-oblongis plicatis obtusis suprà glabris subtùs petiolisque pilis longis crispulis hispidis pallidè virentibus, stipulis membranaceis longè et angustè lineari-lanceolatis hispidis, racemis 5-7 floris densiusculis brevibus sessilibus axillaribus numerosis, floribus pendulis, bracteis membranaceis setaceis longissimis, calycis eleganter nigro-setosi dentibus lanceolatis acutis tubo dimidiò brevioribus, corollà ochroleucà calyce plùs duplo longiori, vexillo oblongo recurvo alas lineares paulò superanti, carinà abbreviatà subtùs angulo recto rotundato incurvâ alis subæquilongâ, leguminibus parvis ovatis compressis glabris transversè obsoletè rugosis obtusissimis basi rotundatis, suturâ vexillari angustè sulculosâ inferiori crassiori in mucronem tenuem brevem sub apice rotundato productâ.

Hab. ad radices montis *Demawend* suprà *Ask.* Kotschy N° 379.

Caules bipedales, folia 6-8 pollic., foliola 8-10 lin. longa 3-4 lata, flores 9-10 lin. longi, legumen ferè 4 lin. longum 2 1/2 latum. Pulchra species ab *A. Caraganæ* et *A. neurocarpo* quibus affinis est distincta leguminibus compressis ferè triplò minoribus obtusissimis, foliolis amplis, etc.

ASTRAGALUS TEPHROSIODES Boiss. (Sect. *Christiani*.)

A. caule tereti elato striato præter pilos adpressos sparsissimos glabro, foliis 9-11 jugis, foliolis pedicellatis oblongo-lanceolatis acutiusculis utrinquè pilis albis sparsis adpressè hirtulis pallidè virentibus, racemis sessilibus oblongis laxis ex axillis superioribus ortis terminalibusque in paniculam thyrsoidèam aphyllam aggregatis, bracteis membranaceis lineari-setaceis hispidis calycem subæquantibus, floribus patulis brevibus breviter pedicellatis, calyce pilis albis nigrisque patulè longèque barbato laciniis setaceis plumosis corollam æquantibus tubum brevem latum basi latere superiori gibbum superantibus, vexillo ovato angulo recto sursum recurvo alis abbreviatis rhombeis longiori, carinâ alis æquilongâ angulo recto rotundato subtùs curvatâ, leguminibus patulis calycino tubo quadruplò longioribus lineari-compressis subfalcatis in rostrum tenue rectum abeuntibus ad marginem convexum sulcatis ad concavum carinatis ad utrumque pilosulis latere glabris obsoletè reticulato-venosis.

Hab. in regno *Cabulico* Griffith in herb. Hooker N° 4063.

Planta ut videtur plùs quàm pedalis, folia 4-5 pollicaria, foliola inferiora ferè pollicaria 4-5 lin. lata, corolla ob curvationem 6 lin.

vix longa, legumen 7 lin. longum 2 latum mucrone sesquilineam longo terminatum. Pulcherrima species corollā abbreviatissimā, paniculā nudā thyrsoidē insignis.

ASTRAGALUS COLUMNARIS Boiss. (Sect. *Christiani*.)

A. caule glaberrimo crassissimo duro sulcato elato a basi foliis floribusque densè obsito, foliis longis erecto-patulis 20-25 jugis, foliolis parvis ovatis petiolulatis a basi sursum diminutis complicatis margine subtusque ad nervum medium ciliatis cæterum glabris, petiolo angulato rigido, stipulis a basi triangulari linearisetaceis, floribus 3-5 in racemos sessiles brevissimos fasciculiformes axillares numerosissimos dispositis breviter pedicellatis erectis in columnam cylindricam circā caulem approximatis, bracteis setaceis calycinum tubum æquantibus, calycis membranacei dentibus lanceolato-linearibus ciliatis tubo glaberrimo nervoso subæquilongis, corollā albidā vel pallidē ochroleucā calyce duplō longiori, vexillo ovato truncato retuso alas superanti, carinā alis linearibus multō breviori, ovario oblongo-linearī glaberrimo, legumine....

Hab. in *Cariā* vel in *Lyciā* undē retulit Cl. Pinard sub. *A. Christiano*.

Caulis tripedalis infernē pollicem crassus, folia 8-10 pollicaria, foliola inferiora 4-5 lin. longa 3 1/2 lata, superiora multō minora, flores pollicares. Pulchra planta prius a me ipso pro *A. Christiano* habita sed accuratius observata a plantā Armenā quam omnes pro specie Linneanā exclusis synonymis agnoscunt diversissima foliis abbreviatis excepto margine glabris, calycis tubo nervoso glabro, ovario glaberrimo, etc.

ASTRAGALUS PISIDICUS Boiss. et Heldr. (Sect. *Christiani*.)

A. caulibus sulcato-striatis crassis elatis patulē hispidis a basi foliis floribusque densè obsitis, foliis patulis 20-25 jugis, foliolis ovatis oblongisve retusis suprā glabris subtus adpressiusculē et longē hirsutis pallidioribus, stipulis a basi triangulari longē linearisetaceis, floribus 3-5 in racemos laxos sessiles brevissimos axillares numerosos dispositis erectis brevibus pedicellatis, bracteis setaceis dimidium tubum calycinum æquantibus, calycis membranacei dentibus lanceolato-linearibus longē ciliatis tubo glabriusculē dimidiō brevioribus, corollā calyce duplō longiori albā vel pallidē ochroleucā, vexillo ob-

longo apice emarginato alis oblongis aequilongo, carinâ alis multò breviori acutiusculâ, ovario oblongo glaberrimo, legumine.....

Hab. in campis planitiei *Pisidia* propè *Isbarta* et in *Isauriâ* Heldr. pl. Anat. exs. sub *A. Christiano*.

Planta 1 $1\frac{1}{2}$ –2 pedalis, folia semipedalia, foliola 4–5 lin. longa 3–4 lata, flores pollicares. *A. Christiano* magis quàm species præcedens affinis ab eo tamen specificè differt foliolis retusis nec obtusis, vexillo alas non superanti, ovario glaberrimo nec densè hirsuto. *A. Cilicius* quoque affinis differt caule pilis albis copiosis villosus, ovario hirsutissimo.

ASTRAGALUS GILVUS Boiss. (Sect. *Christiani* DC.)

A. totus indumento brevi adpressissimo griseus, caulibus sulcatis a basi densè foliosis, foliis patulis sub 45 jugis, foliolis parvis ovatis retusis suprâ glabris subtus hirsutis remotiusculis versùs apicem folii sensim diminutis, stipulis membranaceis a basi lanceolatâ longè lineari-setaceis, racemis 4–5 floris laxis longiusculis, calycis membranacei parcè hirsuti dentibus lineari-setaceis tubo dimidiò brevioribus, floribus..... legumine (juniori) oblongo subcompresso utrinquè obtuso apice mucrone longiusculo tenui terminato transversè et obsolete ruguloso adpressissimè breviter et densè cinerascenti-puberulo.

Hab. in *Cariâ* (Pinard).

Planta pedalis, folia semipedalia, foliola 3 lineas longa, legumen immaturum pollicare 6 lineas latum. Indumento leguminis affinis *A. Græco* qui differt caule petiolis calycibusque patulè hispidissimis fructu valdè rugoso breviori latiori. *A. Aleppicus* differt præter alias notas legumine patulè hirsuto. *A. macrocarpus* DC. deniquè quem in planitiibus Palestinæ legi et ad quem planta Palæstina à Linnæo sub suo *A. Christiano* citata certè spectat differt caule petiolisque glabriusculis, racemis abbreviatis sessilibus, foliolis magis elongatis, legumine maximo. Grex *A. Christiani* ob leguminum in herbariis deficientiam adhuc imperfectè nota est.

ASTRAGALUS GERENSIS Boiss. (Sect. *Christiani*.)

A. basi frutescens petiolis persistentibus spinescentibus plus minùs horridus, caule humili strigis albis adpressè cano, stipulis virescentibus triangularibus acutis petiolo breviter adnatis, foliis 25–30 jugis,

petiolo adpressè cano demùm indurato persistenti, foliolis ovato-orbiculatis retusis suprà glabris subtùs adpressè hirtis griseis, racemis axillaribus laxis breviter pedunculatis 3-12 floris, floribus pedicellatis erectis, bracteis setaceis brevibus, calycis membranaceo-flavidi breviter et parcè hirti demùm glabrescentis dentibus linearibus tubo triplò brevioribus inferioribus paulò longioribus, corollà luteà calyce plùs sesquiolongiori, vexillo oblongo-lineari obtuso alas apice attenuatas acutiusculas carinà longiores superanti, legumine lineari lateraliter subcompresso subincurvo in rostrum rectum acutum attenuato adpressè et breviter canescenti nervis elevatis longitudinalibus flexuosis anastomosantibus percurso, seminibus oblongis obsoletè scrobiculatis.

Hab. in collibus propè Gere Persiæ australis Kotschy N° 85 sub *A. Sieberi*.

Caules 3-6 pollic., folia 6-9 pollic., foliola diametro 2-2 $\frac{1}{2}$ lin. lata, flores 14-15 lin. longi, legumen cum rostro bipollicare 4 lin. latum. Hanc plantam priùs infaustè conjunxi *A. Sieberi* qui differt foliolis dimidiò minoribus, floribus minoribus subsessilibus, legumine minori tantùm secùs suturam convexam nervoso, seminibus lævibus. Nostra species magis affinis est *A. dactylocarpo* qui tamen legumine brevissimo 2 lin. tantùm lato longiùs et tenuiùs mucronato specificè differt.

ASTRAGALUS ACINACIFERUS Boiss. (Sect. *Christiani*.)

A. subacaulis, radice verticali, foliis ad collum confertis densè sub-20 jugis, petiolo crasso strigis albis adpressis densis cano, foliolis parvis ovatis suprà glabris subtùs canis, stipulis ad basin petiolorum confertis breviter triangularibus, floribus solitariis vel binis pedunculo brevi axillari insidentibus... legumine primùm cano dein glabro longè lineari compresso arcuato in mucronem rectum acutum attenuato rugis longitudinalibus anastomosantibus percurso utrâque suturà convexiusculo.

Hab. in planitie excelsà montium inter *Wadi Scheik* et planitiem *Ramla* sitorum in Arabià petraèa. Legi fructiferum Mart. 1846.

Caules ad rosulam foliorum subelongatam reducti, folia 3-5 pollic., foliola 2-2 $\frac{1}{2}$ lin. longa, legumen cum rostro 2 $\frac{1}{2}$ pollic. 4 lin. latum ferè plano-compressum. Affinis *A. Sieberi* et præsertim *A. Gerensi* differt foliis abbreviatis, petiolo post anthesin non persistenti, legumine longiori magis compresso, caule subnullo.

ASTRAGALUS CHRYSANTHUS Boiss. et Hohen. in pl. Kotschy. Pers. bor. 1846. (Sect. *Caprini*.)

A. acaulis caudice indurato, foliis omnibus radicalibus petiolo patulè puberulo suffultis 15-20 jugis, foliolis inferioribus remotiusculis superioribus approximatis omnibus petiolulatis oblongis obtusis utrinquè adpressè subsericeis, stipulis membranaceis ovato-lanceolatis obtusiusculis breviter petiolo adnatis, pedunculis strictis folia vix superantibus, floribus 8-10 in racemum ovatum laxiusculè congestis pedicellatis erecto-patulis, bracteis linearibus hirsutis pedicello paulò longioribus hispidis, calycis membranacei patulè hispiduli dentibus linearibus tubo triplo brevioribus, corollà aureà calyce plus duplò longiori, vexillo oblongo subrecurvo alas superanti, alis linearibus carinam multò superantibus, legumine juniore ovato compresso subincurvo obliquè et breviter rostrato calycem fissum paulò superanti.

Hab. in monte *Elbrus* propè pagum *Passgala* Kotschy N° 196.

Folia 4-5 pollic., foliola 3-4 lin. longa 2 lata, pedunculi 5-6 poll. longi. Species facie *A. reduncum* fructu diversissimum referens, affinis quoque *A. chrysotricho* et *molli* sed ob calycem nullo modo inflatum et formam leguminis abbreviati et hirtuli nec ut in speciebus citatis hispidissimi rostratique aptius collocanda inter *Caprinos* a quibus ferè omnibus racemis longè pedunculatis discedit.

ANTRAGALUS PYRRHOTRICHUS Boiss. (Sect. *Caprini*.)

A. totus pilis patulis rufis densè hispidus, caule brevi, foliis longis remotiusculè 20-25 jugis, foliolis minutis orbiculatis petiolulatis supra glabris subtùs ad nervum medium marginesque ciliatis, stipulis teneris membranaceis lanceolatis elongatis hispidis, racemis oblongis laxiusculis pedunculo foliis dimidiò breviori suffultis, bracteis linearisetaceis calycem dimidium æquantibus, floribus longissimis, calycis parè hispidi dentibus setaceis tubo æquilongis, corollà calyce sesquilongiori, ovario densè rufescenti-hispido, legumine....

Hab. in regno *Cabulico* Griffith N° 1066 in herb. Hooker.

Caulis in specim. 4 pollic., folia pedalia, foliola diametro 3-3 1/3 lin. lata, pedunculi 5 poll., flores 14 lin. longi. Pulcherrima planta inter *Caprinos* petiolo longissimo foliolis minimis orbiculatis, racemis longè pedunculatis, dentibus calycinis tenuissimis 4-5 lin. longis in alabastro comosis corollas superantibus distinctissima. Plures ex eadem regione

In herb. Cl. Hooker adsunt species novæ ejusdem sectionis sed ob specimina incompleta legumine orbata non describendæ.

ASTRAGALUS ÆGOBROMUS Boiss. et Hohen. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1836. (Sect. *Caprini*.)

A. glaber, rhizomate prostrato suffrutescenti, caulibus nullis, foliis 44-43 jugis, foliolis petiolulatis ovatis obtusis mucronulatis lætè viridibus glaberrimis vel cilio uno alterove margine obsitis a basi ad apicem folii sensim diminutis, petiolis duris ascendentibus tandem nudis persistentibus, stipulis albis membranaceis triangulari-lanceolatis longitudinaliter plicatulis, racemis ovatis densiusculis subsecundis pedunculo eis æquilongo suffultis, bracteis virescenti-membranaceis oblongo-lanceolatis acuminatis calyci æquilongis, calycis flavido-membranacei glaberrimi tubulosi dentibus linearibus acutis sinu lato rotundo separatis tubo triplò brevioribus, corollà calyce sesquilingiori, legumine erecto sessili oblongo-elliptico valdè compresso in mucronem subobliquo abeunti glaberrimo nervis longitudinalibus anastomosantibus rugulosis dorso convexis.

Hab. in prov. *Aderbidjan* Aucher N° 4443, in faucibus montis *Elbrus* ad *Derbend* Kotschy N° 453.

Folia 6-8 pollic., foliola inferiora 6-8 lin. longa 3-4 lata; racemi cum pedunculo bipollicares, calyces 6-7 lin. longi, legumen pollicare 4 1/2 lin. latum mucrone tenui 2 lin. longo terminatum. Affinis *A. ovino* et *A. rugoso* Fisch. qui ambo foliis multò amplioribus, prior iterùm dentibus calycinis setaceis multò longioribus foliolisque lanceolatis, posterior foliolis oblongis acutis amplissimis albo-nervulosis, legumine minùs compresso profundè rugoso differunt.

ASTRAGALUS REMOTIJUGUS Boiss. et Hoh. in pl. Kotsch. Pers. bor. 1846. (Sect. *Caprini*.)

A. glaberrimus subacaulis, caudiculis tenuibus repentibus, foliis remotè 4-5 jugis, foliolis lætè glauco-virentibus carnosulis orbiculatis rotundatis cum mucronulo vel retusis, stipulis albo-membranaceis triangulari-lanceolatis petiolo adnatis, racemis breviter pedunculatis ovatis crassiusculis paucifloris, bracteis albo-membranaceis oblongo-lanceolatis acutis calyce dimidiò brevioribus, calycis glaberrimi flavescentis dentibus triangulari-lanceolatis tubo 3-4 plò brevioribus,

corollâ flavâ calyce sesquolongiori, legumine (juniori) glabrescenti ovato-oblongo sessili obtuso breviter mucronato.

Hab. in schistosis montis *Elbrus* propè *Derbend* Kotschy N° 115.

Folia 6-10 pollic., foliola majora 6 lin. diametro lata, calyces 7-8 lin. longi, legumen maturum videtur pollicare non aut vix compressum. Species a præcedenti et affinibus foliolis paucis remotis magnis orbicularibus facilè distinguenda.

ASTRAGALUS ALEXANDRINUS Boiss. (Sect. *Caprini*.)

A. totus pilis patulis hispidus griseus subacaulis, rhizomate suffrutescenti cæspitoso, foliis 13-15 jugis, foliolis ovatis retusis, stipulis membranaceis hispidis lanceolato-acuminatis, racemis subsessilibus densiusculis, bracteis lineari-setaceis calycem dimidium æquantibus, calycis hispidi flavidi dentibus lineari-subulatis dimidio tubo longioribus, corollâ calyce sesquolongiori, leguminibus calycem fissum non superantibus sessilibus breviter ovatis non compressis longè et parcè hirsutis tandem glabrescentibus tenuiter transversè venulosis suturâ utrâque præsertim superiori elevatis obtusis mucrone brevissimo terminatis.

Hab. in *Ægypto inferiori* propè *Alexandriam* Cl. Cadet de Fontenay.

Habitus flores et characteres *A. lanigeri* qui in *Ægypti* arenosis propè *Aboukir* et in deserto Arabico ad Palæstinæ fines abundè crescit, ab eo specificè distinctum esse credo ob legumina subrotunda piso tantum vix majora nec oblongo-subcompressa.

ASTRAGALUS MODESTUS Boiss. et Hohen. in pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Caprini*.)

A. glaber acaulis, caudiculis tenuibus subterraneis, foliis paucis brevibus humi expansis 16-17 jugis, foliolis parvis oblongis vel ellipticis acutiusculis, stipulis cum bracteis ad basin foliorum congestis albo-membranaceis ovato-oblongis obtusiusculis, floribus paucis subsessilibus, calycis glabri flavidi dentibus breviter triangulari-lanceolatis tubo triplò brevioribus, corollâ calyce subduplò longiori, legumine glabro minimo breviter elliptico compresso basi et apice rotundato mucrone tenui incurvo longiusculo instructo, margine vexillari carinulato ad latera carinæ utrinquè sulculoso.

Hab. ad radices montis *Demawend* propè *Lar*. Kotschy N° 344.

Folia 4-5 poll. longa, foliola 4 lin. longa, flores 7 lin. longi, legumina 5 lin. longa 3 lata lineam densa mucronulo 2 lin. longo instructa. Species fructu compresso minuto notabilis affinis *A. nummulario* qui differt fructu ovato hirsuto, foliolis orbiculatis etc.

ASTRAGALI TRAGACANTHÆ.

Inter species hujus sectionis discrimina quoad fructûs structuram observantur; in omnibus *Tragacanthis sessilifloris* nempe legumen minimum semper uniloculare est et in speciebus pluribus vexillum ad mediam partem utrinquè unguiculo vel denticulo auctum est, in aliis autem tantum subdilatatum vel ab apice ad basin attenuatum. In *Tragacanthis pedunculatis* pariter species plures v. gr. *A. Massiliensis*, *Hermoneus*, *angustifolius*, *bracteolatus* etc. legumina bilocularia habent, aliæ ut *A. lagurus*, *coluteoides*, *tumidus*, legumen omninò uniloculare, aliæ ut *A. fasciculifolius* *A. tumido* cæterum proximè affinis legumen dissepimento rudimentario instructum. Planè igitur contrà naturam esset characteribus illis adeò variantibus genericè disjungere eas plantas quas tamen in sectiunculas magis naturales cum plurium fructus notus erit in florà Orientali ordinare conabor. Donec fiat, divisionem e formà et magnitudine calycis depromptam in difficillimà grege *Tragacantharum sessilium* hic propono. Ex autopsiâ herb. Tournafortiani Parisiensis et Willdenowiani mihi ab amiciss. Dr. Klotsch humanissimè communicati species omnes Candolleanas et Willdenowianas e speciminibus originalibus conferre mihi licuit.

Tragacanthæ sessiles macrocalycini Boiss.

Calyx elongatus dentibus longis sæpè plumosis vel villosissimis sed distinctis nec villo connexis (Grex *A. compacti*, *plumosi*, *aristati* etc.)

ASTRAGALUS DEINACANTHUS Boiss. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. caulibus robustis brevissimis, foliis longissimis remotè 5-6 jugis, petiolo robusto albo glabro tereti in spinam flavidam foliolis multò longiorem abeunti, foliolis magnis rigidis nervosis elliptico-lanceolatis glabris vel sub lente parcè et adpressè pilosulis in spinam flavidam

longiusculam abeuntibus, stipulis cartilagineis flavidis duris triangulari-lanceolatis nervoso-reticulatis foliorum brevioribus latioribus, floribus ad basin foliorum in capitulum maximum densissimum ovatum congestis, bracteis lanceolatis vel linearibus acutis supernè hirsutis calyces subæquantibus, calycis densè albo-hirsutissimi dentibus linearibus subspinulosis tubo ægrè fissili paulò brevioribus, corollà carneà calyce quartà parte longiori, vexilli laminà basi auriculis rotundatis auctà ungui subæquilongà, alis infrà medium carinæ adnatis, legumine ovato obtuso niveo-hirsutissimo.

Hab. in arvis incultis totius *Syriæ* interioris, in plantis ad occidentem *Aleppi*, inter *Damascum* et *Antilibanum*, in omni *Cœlesyriâ*. (Boiss.)

Petiolì 6-12 pollic., foliola sæpè pollicaria 4-5 lin. lata, capitula sæpè ovo majora, calyx 8 lin. longus. Hanc plantam insignem omnibusque qui Syriam peragraverunt benè notam diù pro *A. longifolio* Lam. *A. pugniiformi* L'her. habui donec specimina Tournefortiani itineris me diversas species esse docuerint. *A. longifolius* habet petiolos tenuiores 8jugos, capitula minora, bracteas oblongas obtusiusculas cymbiformiter plicatas, calyces 6 lin. tantùm longos ad basin usquè facilè fissiles et ex Armenià oriundus est.

ASTRAGALUS HASBEYANUS Boiss. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. basi suffrutescens, caulibus brevissimis, foliis 8-11 jugis, petiolis rigidis adpressissimè puberulis teretibus in spinam brevissimam terminalem abeuntibus, foliolis rigidis pallidè virentibus reticulato-nervosis utrinquè adpressissimè puberulis ovatis oblongisve obtusis nervo medio excurrente breviter mucronulatis, stipulis flavidis cartilagineis triangulari-lanceolatis nervosis foliorum floralium latioribus, floribus ad basin foliorum in capitulum magnum densum ovato-rotundum congestis, bracteis lanceolatis linearibusve supernè hirsutis calyces æquantibus, calycis albo-hirsutissimi dentibus linearibus apice spinulosis tubo ægrè fissili triplò brevioribus, corollà carneà calyce tertià parte longiori, vexilli laminà infernè obtusè subauriculatà in unguem brevissimum sensim attenuatà, ovario albo-hispidissimo.

Hab. in *Antilibano* suprà *Hasbeya* ubi legit et mihi comm. cl. D. Pestalozza.

Folia 5-6 poll. longa, foliola 6-7 lin. longa 4 lata, capitula magnitudinis ovi parvi, calyces 6-7 lin. longi. Valdè affinis *A. deinacantho*

sed distinctus foliolorum formâ, petiolis abbreviatis, calycis dentibus multò brevioribus, statione alpinâ. Medius est inter eum et *A. oleaefolium* DC. *A. pugniformem* W. non L'Hér. affinem sed ab utroque dentibus calycinis abbreviatis densissimè tomentosis obtusatis distinctum.

ASTRAGALUS STRICTIFOLIUS Boiss. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. suffruticosus caulibus petiolis vetustis strictis elongatis horridis, foliis 3-4 jugis, petiolo crasso in spinam flavidam foliolis multò brevioribus abeunti, foliolis remotiusculis strictis adpressissimè hirtulis pallidè virentibus elliptico-linearibus longis rigidis supernè reticulato-nervosis in mucronem flavidum longiusculum attenuatis, stipulis flavescens glabris triangulari-acuminatis reticulato-nervulosis, floribus in capitulum oblongum densum ad basin foliorum superiorum dispositis, bracteis angustè cymbiformi-oblongis extùs villosis acutis calyces subæquantibus, calyce densè albo-pilosissimo dentibus lineari-setaceis tubo demùm fissili paulò longioribus, corollâ calyce subsesquilongiori e sicco carneâ, vexilli laminâ basi acutè auriculatâ in unguem eâ paulò breviorē attenuatâ, alarum unguibus basi tantùm carinæ adnatis, ovario albo-hirsutissimo.

Hab. in valle *Talagon* montis *Elbrus* proprè *Gattade* Kotschy Pers. bor. N° 524.

A. arnacantha var. loc. cit. non M B.

Caules semipedales, folia 3-4 pollicaria, foliola 8-14 lin. longa 4 1/2-2 1/2 lata, calyx 6 lin. longus. Hanc plantam ad *A. arnacantham* tunc mihi e descriptione tantùm notam diversissimamque malè retuleram. Hæc species affinis *A. compacto* W. (vero) et *A. pycnocephalo* Fisch. ab utroque differt foliolis magis elongatis glabrescentibus nec canis aliisque notis, inter eos et *A. longifolium* quasi media.

ASTRAGALUS DRUSORUM Boiss. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. basi suffrutescens dumuloso-multicaulis, caulibus erectis abbreviatis, foliis breviter et adpressiusculè hirsutis griseis sub 9 jugis, foliolis ovatis oblongisve obtusiusculis brevissimè mucronulatis, spinâ terminali folii foliolis breviori, stipulis teneris albidis triangularibus acutis ciliatis, floribus axillaribus numerosis spicam cylindricam densam totam caulis longitudinem occupantem formantibus, bracteis omni-

bus lineari-setaceis albo-plumosis calycis dentibus similibus et æquilongis, calycis nivei densè plumosi dentibus setaceis tubo demùm fissili æquilongis, corollà ochroleucâ vel pallidè carneâ calyce sesquilongiori, vexilli alas paulò superantis laminâ ungui æquilongâ basi auriculatâ auriculis oblongis descendantibus obtusis, alarum laminâ ungueque infernè carinæ adnatis, ovario albo-villoso.

Hab. in siccis montis *Gebel Baruck* Libani suprâ *Deir el Kamar*. Legi Julio 1846.

Caules 4-5 pollic., folia bipollicaria, foliola 3-4 lin. longa 1 $\frac{1}{2}$ -2 lata, spica 2 $\frac{1}{2}$ -3 pollic., calyces lin. 6, corolla lin. 9 longi. Species elegans ex affinitate *A. compacti* et *A. Tmolei*, foliis multijugis, capitulo elongato, bracteis omnibus setaceis distincta.

ASTRAGALUS TMOLEUS Boiss. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. caulibus frutescentibus erectis proceris petiolis vetustis erecto-patulis horridis, foliis subsexjugis, foliolis utrinquè adpressiusculè hirsutis sericeo-griseis ovatis oblongisque obtusiusculis mucrone brevi flavido terminatis, petiolo hirsuto in spinam foliolis breviorē abeunti, stipulis tomentellis in cuspidēs lanceolatas acutas attenuatis, floribus ex axillis inferioribus numerosis capitulum oblongo-cylindricum densum sub foliis annotinis formantibus, bracteis supernè sericeis exterioribus latè oblongis acutis interioribus naviculari-plicatis plùs minùs angustè linearibus calycis tubum æquantibus, calycis longè densèque sericeo-lanati dentibus setaceis plumosissimis tubo demùm fissili subduplò longioribus, corollà roseâ calyce sesquilongiori, vexilli laminâ ungue vix longiori basi in auriculas rotundatas dilatatâ, alis medium versùs carinæ adnatis.

Hab. in regione mediâ *Tmoli* suprâ *Philadelphiam* et ad *Bozdagh*. Legi flor. Junio 1842.

A. plumosus var. *tomentosus* Boiss. pl. Anatol. exs. 1842.

Sæpè pedalis, folia 2 $\frac{1}{2}$ poll., foliola cum mucrone 4-5 lin. longa 2 $\frac{1}{2}$ -3 lata, capitulum 2-2 $\frac{1}{2}$ poll., calyx 6 lin. longus. Affinis *A. compacto* W. (vero) et *A. pycnocephalo* Fisch. in pl. Kotsch. Kurd. Prior differt foliolis oblongo-lanceolatis adpressis canescentibus in mucronem longiusculum attenuatis, calycis dentibus brevioribus. Posterior habet foliola majora adpressè canescentia oblonga acutata, capitulum subglobosum, corollam e calyce breviter exsertam. *A. Thracicus* Griseb. affinis quoque differt foliolis glabrescentibus, corollâ ochro-

leucâ calyce vix longiori. *A. plumosus* W. deniquè cui quondam meam plantam retuleram est species diversissima caulibus brevissimis, foliis angustis, capitulo sphærico, corollâ calyci æquilongâ, etc.

ASTRAGALUS PARNASSI Boiss. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. caulibus suffruticosis abbreviatis ramosis glabris, foliis sub 7 jugis, foliolis oblongo-ellipticis acutis brevissimè mucronatis præter pilos nonnullos ad margines sparsissimos glaberrimis, stipulis rubellis in cuspides breviter et acutè lanceolatas ciliatas productis, floribus numerosis axillaribus capitulum globosum densum foliis supremis sæpius superatum formantibus, bracteis tenerè membranaceis exterioribus navicularibus dorso et margine lanatis interioribus setaceis plumosis calyci æquilongis, calycis albo-plumosi dentibus setaceis calycis tubo demùm fissili sesquilongioribus, corollâ roseâ calyce subsesquilongiori, vexilli alas parùm superantis laminâ ungue subbrevisiori basi in aurículas triangulares horizontales acutiusculas abeunti, alarum unguibus usquè ad $\frac{2}{3}$ carinæ adnatis, ovario albo-hispido.

Hab. in Parnasso Spruner sub A. plumoso.

A. aristatus var. australis ex parte Boiss. Voy. Hisp.

Caules 4-6 pollicares, folia sesquipoll., foliola 3-4 lin. longa 4-4 $\frac{1}{2}$ lata, capitulum nuce majus, calyx 6-7 lin., corolla 9 lineas longa. Ab A. aristato cui olim formas plures Orientales conjunxeram differt foliis glabrescentibus, calycis dentibus elongatis, petalorum proportionè, ab A. plumoso W. qui est planta nana longius distat.

ASTRAGALUS MITCHELLIANUS Boiss. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. caulibus brevissimis, foliis 5-8 jugis, petiolo tenui hirtulo in spinam flavidam foliis breviorè abeunti, foliolis glabrescentibus vel adpressiusculè et parcissimè hirtis ellipticis acutiusculis mucronulatis, stipulis triangularibus acutis, floribus in capitula ovata densè ad axillas foliorum superiorum congestis, bracteis omnibus lineari-setaceis densè plumosis, calycis densissimè albo-lanati dentibus linearibus villosissimis tubo demùm quinquepartito dimidiò brevioribus, corollâ roseâ calyci æquilongâ, legumine minimo oblongo-albo hirsutissimo.

Hab. in Phrygiâ inter Arzani et Geduz Mitchell in herb. Hooker. hùc probab. quoque spectat Aucher N° 1257.

Affinis *A. Parnassico* differt calyce multò densius albo-lanato dentibus tubo brevioribus, corollà calycem non superanti.

ASTRAGALUS GLOBIFLORUS Boiss. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. suffrutescens, caulibus brevissimis horridis, foliis sub 4 jugis, petiolis rigidis in spinam foliolis æquilongam vel longiorem abeuntibus, foliolis elliptico-lanceolatis acutis mucronatis adpressè canescenti-sericeis, stipulis triangularibus acutis tomentellis, floribus ad basin foliorum supremorum in globum densum congestis, bracteis oblongo-linearibus plicatis albo-hirsutissimis calyce brevioribus, calyce albo-hirsutissimo demùm ferè ad basin in lacinias lineari-setaceas partito, corollà calyce sesquilongiori, legumine parvo ovato-oblongo cano-hirsutissimo obtuso.

A. arnacantha Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. non MB.

Hab. in monte *Elbrus* propè *Derbend* Kotschy N° 658 et in Persià australi N° 792. Verosimiliter hùc quoque referendum Auch. N° 1268 e Persià, foliolis oblongis tantùm diversum.

Caules 1-3 pollic., folia 1 1/2-2 poll., foliola 4-6 lin. longa, calyx 6 lin. longus. Diversissimus ab *A. arnacanthà* qui inter *Tragacanthas microcalycinos* militat, magis affinis *A. plumoso* qui tamen foliolis angustissimis, petiolis tenuibus etc. distat et *A. Lamarckii* a quo lacinii longioribus, petiolo crassiori longiùs spinoso etc. differt.

ASTRAGALUS PTILODES Boiss. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. suffrutescens prostratus ramosissimus, caulibus brevissimis horridis in dumum erinaceum congestis, foliis brevibus 4-6 jugis, petioli spinà terminali foliolis breviori vel æquilongà, foliolis minimis oblongis mucronulatis plùs minùsve densè canis, stipulis triangularibus acutis brevibus, floribus in capitula terminalia globosa ad basin foliorum supremorum congestis, bracteis exterioribus oblongo-lanceolatis navicularibus dorso villosis intimis linearibus calycino tubo æquilongis, calycis plumosi dentibus tubo demùm fissili longioribus setaceis, corollà violaceà calycem parùm superanti, vexillo infernè acutè auriculato in unguem eo subbreviorem attenuato, alis usquè ad laminam carinæ adnatis, ovario albo-hirsuto.

Hab. in regione alpinà *Sypili* suprà *Magnesiàm* in Lydià (Boiss.), in

montibus *Pisidiæ* suprâ *Bouldour* (Heldr.), in *Cariâ* Pinard sub *A. Cretico*.

Habitus omninò *A. Siculi* a quo differt calyce 6 lin. longo corollam subæquanti nec eâ ferè dimidiò breviori, non densè niveo ut in *A. compacto* et affinis sed tenuiter plumoso ut in *A. Parnassi* et *plumoso*. *A. plumosus* W. verus e *Galatiâ* quoad capitula et flores similis differt foliolis angustissimis ferè acicularibus.

ASTRAGALUS CRUENTIFLORUS Boiss. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. suffruticosus densissimè dumoso-erinaceus, caulibus ramisque petiolis vetustis nigricantibus horridis, foliis terminalibus paucis densè cano-tomentosis, foliolis 6-7 minimis approximatis ovato-oblongis subtùs canaliculatis breviter mucronulatis, petioli crassi spinâ terminali foliolis longiori, stipulis albis tenerrimis triangularibus acutis ciliatis, floribus in capitula globosa densa ad axillas foliorum congestis, bracteis paucis linearibus subplicatis extùs tomentosis calyce dimidiò brevioribus, calycis albo-hispidissimi dentibus lineari-setaceis tubo demùm fissili longioribus, corollâ intensè purpureâ cruentâ calycem vix superanti, vexilli laminâ medium versùs in dentes latè triangulares obsoletè dilatatâ ab ungue vix distinctâ, ovario densè villosa.

A. Creticus DC. herb. non Lam! (Specimen erroneè *Creta* inscriptum ex itinere Orientali Billardieri oriundum!)

Hab. in excelsis montis *Hermonis* suprâ *Rascheya* alt. 7000'-9000' Legi Julio 1846.

Suffrutex dumos hemisphæricos bipedales formans, folia 8-10 lineas foliola sesquilineam tantùm longa, calyx 6 lin. longus. Planta capitulis cruentis numerosis ferè contiguis elegantissima affinis *A. ptilodi* et *plumoso* ab eis diversa tomento densissimo foliorum, foliolis minutissimis, vexillo obsoletè unguiculato etc.

ASTRAGALUS LAMARCKII Boiss. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. suffrutescens cæspitosus humillimus, foliis brevissimis 2-4 jugis spinâ foliolis paulò breviori terminatis, foliolis minutis incanis ellipticis utrinquè attenuatis acutis breviter mucronatis, stipulis breviter semiovatis acutiusculis, floribus axillaribus in capitula globosa densa parva ad basin foliorum congestis, bracteis oblongis vel oblongo-cuneatis supernè tomentosis calyce brevioribus, calyce densissimè et

longè albo-hispidissimo demùm ferè ad basin usquè in lacinas lineari-setaceas conniventes partito, corollà calycem vix superantè, vexilli laminà basi minutè auriculatà sensim in unguem brevissimum attenuatà, alarum ungue ultrà medium usquè carinæ adnato, ovario albo-hirsutissimo.

A. compactus var. β . Lamarck. ! Willd. Sp. et Herb. ! DC. Astragal. tab. 34 fig. 2 ubi foliolorum numerus nimis auctus est. — *A. humilis* Willd. Herb. non MB. ! — *Tragac. orientalis humillima incana flore purpurascente* Tourn. Cor.

Hab. in *Armeniâ* Tournef. ! Gundelsheimer ! in *Cappadociâ* Aucher N° 4264 bis.

Planta 4-4 $\frac{1}{2}$ pollic., folia 8-12 lin. longa, foliola 3 lin., calyces 4 lin., corolla 5 lin. longi. Ab auctoribus antiquioribus ad *A. compactum* relatus sed ab eo longè differt capitulis globosis avellanâ vix majoribus nec amplis oblongis plurimisque aliis notis. *A. arnicantha* MB. — *A. horridus* Willd herb. ! e Tauriâ cui cl. DC. *A. compactum* var. β . refert, ex specimine Biebersteiniano herb. Willd. omninò differt caulibus 2-3 pollicaribus, stipulis tenerrimis acutè lanceolatis plurinerviis, calyce parvo corollâ dimidiâ vix longiori.

ASTRAGALUS OCHROCHLORUS Boiss. et Hohen. in pl. Kotsch. Pers. bor. 1846. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. suffrutescens caulibus glabris totâ longitudine horridis, foliis glabriusculis pallidè virentibus 6-7 jugis in spinam foliolis longiorem abeuntibus, foliolis oblongo-ellipticis brevissimè mucronatis parvis, stipulis triangulari-lanceolatis ciliatulis albidis, floribus ad basin foliorum densè capitato-fasciculatis, bracteis membranaceis lanceolatis acutis albidis glabris vel apice hirsutis calyceinum tubum æquantibus, calycis breviter et adpressiusculè hirsuti dentibus setaceis rubellis tubo non fissili æquilongis, corollâ rubrâ calyce sesquilongiori, vexillo exauriculato sensim in unguem attenuato, alis liberis, ovario adpressè hirsuto.

Hab. ad radices montis *Demawend* propè *Lar*. Kotschy N° 336.

Folia bipollicaria, foliola majora 3 $\frac{1}{2}$ lin. longa 4 $\frac{1}{2}$ lata, capitula nuce minora, calyx 5 lin. longus. Affinis *A. Michauxiano* DC. qui differt dentibus calycis patulè plumosissimis tubo triplò longioribus corollam superantibus, etc.

ASTRAGALUS CHROMOLEPIS Boiss. et Hohen. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. suffrutescens caulibus lignosis ramosissimis, ramis abbreviatis horridis, foliis numerosis subsexjugis, petiolo hispidulo in spinam tenuem foliolis æquilongam abeunti, foliolis adpressiusculè et breviter hirtis griseo-virentibus ellipticis acutiusculis muticis, stipulis triangulari-lanceolatis acuminatis teneris supernè intensè purpureis, floribus in capitula densa subrotunda ad foliorum basin congestis, bracteis oblongo-linearibus cymbiformiter plicatis acutiusculis glabriusculis nitidis calyces subæquantibus apice intensè purpureis, calycis subpatulè albo-plumosi dentibus setaceis erecto-patulis tubo sublongioribus, corollà ochroleucà calyce paulò longiori, vexillo curvato oblongo exauriculato in unguem non attenuato, alis liberis, ovario albo-hirsuto.

Hab. in monte *Totschal* propè *Teheran* Kotschy N° 550.

Folia sesquipollicaria, foliola ferè 3 lin. longa, calyces ferè 2 lin. longi. Affinis *A. ochrochloro* et *A. aureo* W. ab eis præter alias notas bractearum colore et longitudine distinctus.

ASTRAGALUS KURDICUS Boiss. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. suffruticosus ramosissimus totus petiolis vetustis adpressis spinosis obsitus, foliis 4-5 jugis, foliolis pallidè virentibus parçè et adpressissimè hirtis ellipticis utrinquè attenuatis mucronatis, stipulis triangulari-lanceolatis acutis glabrescentibus, floribus axillaribus fasciculatis in spicam laxiusculam approximatis, bracteis oblongis acutis concavis calyci æquilongis, calycis albo-hirsutissimi dentibus lineari-setaceis tubo demùm fissili longioribus, corollà roseà calycem breviter excedenti, vexillo basi obtusè auriculato in unguem vix angustato, ovario albo-hirsutissimo.

Hab. in subalpinis montis *Gara Kurdistanix* Kotschy N° 362.

Frutex tripedalis, folia sesquipollicaria, foliola 3-4 lin. longa vix 1 1/2 lata, calyx 5 lin. longus. Habitu *A. Nevadensi* et *A. plumoso* similis ab eis ut et ab omnibus præcedentibus floribus in capitula densa ovata vel rotunda non congestis sed paucis ad axillas superiores laxè fasciculatis distinctus. *A. barbajovis* ad quem dubitanter cl. Fischer nostram plantam retulit et cujus specim. incompleta in herb. Willden. et Tournef. vidi, est species diversissima foliis multò brevioribus, foliolis adpressè argyreis, floribus ut videtur ad axillas subsolitariis.

ASTRAGALUS BETHLEHEMITICUS Boiss. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. suffrutescens ramosissimus horridus, foliis 5-6 jugis, petiolis crassis rigidis in spinam flavidam foliolis longiorem abeuntibus, foliolis densè et adpressè cano-argenteis parvis oblongis acutis mucronulatis subtùs canaliculatis, stipulis latè triangulari-ovatis acutis flavidis brevissimè tomentellis, floribus in fasciculos parvos axillares 4-6 floros ovatos arcè bracteatos in capitula terminalia aggregatos dispositis, bracteis concavis ovato-subrotundis acutis vel mucronatis membranaeis calycinum tubum superantibus intimis minoribus apice sæpè dentato-laceris, calycis densissimè albo-hispidissimi lacinis setaceis tubo fissili longioribus, corollà purpureà calyce vix longiori, vexilli laminà acutiusculè auriculatà in unguem eà subbreviorem sensim attenuatà, ovario densè albo-hispido.

Hab. in Judæa ad *Herodiam*, *Thecuam*, *Bethlehem* (Sieber!), in monte *Francorum* propè *Bethlehem* Aucher N° 1261, in collibus *Damasci* et in Libano suprà *Deir el Kammar* (Boiss.)

Suffrutex 3-5 pollicaris, petioli 1-4 1½ poll., foliola 2 lin., calyx 5 lin. longus. Planta cum *A. lepidantho* et *diptheriti* Fenzl sectiunculam formans floribus in fasciculos axillares arcè bracteatos in capitula plùs minùs approximatos dispositis insignem.

ASTRAGALUS LEPIDANTHUS Boiss. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. suffrutescens erinaceus humilis totus petiolis vetustis tenuibus horridus, foliis trijugis in spinam foliolis longiorem abeuntibus, foliolis adpressissimè sericeo-canescensibus ellipticis plicatis in spinam flavidam eis dimidiò breviorè attenuatis, stipulis flavescentibus triangularibus acutis glabriusculis, florum fasciculis axillaribus 3-4 floris arcè bracteatis in capitula terminalia irregulariter congestis, bracteis exterioribus calyce parùm brevioribus ovato-subrotundis breviter mucronatis concavis tomentellis intimis paucis angustè oblongis, calycis densissimè albo-hispidissimi dentibus lineari-setaceis tubo demùm fissili æquilongis, corollà calyce sesquilongiori purpurascenti, vexilli laminà infernè acutiusculè biauriculatà in unguem eà ferè longiorem attenuatà.

Hab. in planitie inter *Edlip* et *Aleppum* in incultis, legi Junio 1846.

Suffrutex 1½-1 pedalis, folia pollic., foliola cum spinà 3-3 1½ li-

neas longa, fasciculi florum in alabastro bracteis arcuè involucreat oblongo-compressi acuti fructum simulant, calyx 4 lin. longus. A specie præcedenti egregiè distinctus foliis multò minùs densè canis longè spinulosus, calycis brevioris dentibus brevioribus densius hirsutis, *A. diphtherites* Fenzl affinis quoque differt foliis duplò majoribus nervosis, corollà intense purpureà etc.

ASTRAGALUS ANTABICUS Boiss. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. humilis suffrutescens totus petiolis vetustis horridus, foliis elongatis remotiusculè 6 jugis, foliis viridibus suprà nervulosis utrinquè glabrescentibus vel parcissimè pilosulis oblongo-ellipticis obtusiusculis longiusculè mucronatis, petiolo tenui puberulo in spinam flavidam foliis æquilongam vel breviorē attenuatō, stipulis triangulari-lanceolatis acuminatis hirsutis, floribus paucis axillaribus capitula subrotunda parva ad basin foliorum superiorum formantibus, bracteis exterioribus ovatis concavis breviter mucronatis dorso tomentellis calycinum tubum æquantibus interioribus angustioribus oblongis plicatis, calycis densè et breviter tomentoso-pannosi albi dentibus e basi lanceolatà subulatis tubo æquilongis, corollà calyce sesquilongiori, vexillo basi auriculato in unguem æquilongum sensim attenuatō, ovario hispido.

Hab. in *Syriâ* propè *Antab.* Aucher N° 4257.

Semipedalis, folia 3-4 pollic., foliola cum mucrone 4-5 lin. longa 2 lata. Calyx 5 lin. longus. Species dispositione florum inter species præcedentes binas et eas floribus capitatis donatas, intermedia, inter omnes calyce non plus minùsve longè densèque hirsuto sed brevissimè tomentoso pannoso insignis, foliis longis foliolisque virentibus. *A. andrachnefolium* cæterum diversissimum referens.

ASTRAGALUS PSILODONTIUS Boiss. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. suffruticosus caulibus ramosissimis horridis, foliis adpressiusculè tomentellis griseis 6-7 jugis in spinam foliolis multò longiorē abeuntibus, foliolis minutissimis approximatis strictiusculis ovatis acutiusculis muticis facie superiori plicatis versùs apicem petioli decrescentibus, stipulis tenerrimis albo-hyalinis triangularibus acutis glabriusculis, floribus in fasciculos 2-4 flores axillares sessiles remotos dispositis, bracteis glabris stramineis angustè oblongis naviculari-

plicatis subincurvis acutiusculis calycinum tubum æquantibus, calycis patulè et longè albo-hispidi dentibus plumosis subincurvis patulis corollam subsuperantibus tubo brevi lato non fissili paulò longioribus, vexilli laminà ovatà exauriculatà infernè sensim attenuatà, alis usque ad unguem dimidium carinæ adnatis, ovario adpressè cano.

Hab. in regione inferiori *Libani* vel *Antilibani*, loci proprii non memini. Legi Jul. 1846.

Semipedalis vel pedalis, folia 1 1/2-2 pollicaria, foliola majora sesquilineam longa, calyx 5-6 lin. longus dentibus sursùm subrecurvis. Species floribus paucis in fasciculos remotos dispositis, calycis tubo brevi lato insignis et potiùs characteres *Tragacanthorum pedunculatorum* plurium exhibens.

Tragacanthæ sessiles microcalycini Boiss.

Calyx brevissimus dentibus villo connexis indistinctis. (Sectio *A. Caspii*, *Cretici*, etc.)

ASTRAGALUS TALAGONICUS Boiss. et Hohen. in pl. Kotsch. Pers. bor. 1846. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. suffruticosus caulibus brevissimis horridis, foliis sub 4jugis, foliolis brevissimè tomentello-canescensibus angustè ellipticis infernè angustatis obtusiusculis longiusculè mucronulatis, stipulis flavidis ovato-triangularibus acuminatis glabris nervulosis calyces occultantibus, floribus secùs caulem ad foliorum axillas in capitulum oblongum densum confertis, bracteis oblongo-linearibus naviculari-plicatis valdè incurvis calyce paulò brevioribus, calycis adpressè hirsuti dentibus linearibus tubo demùm fissili subæquilongis, corollà pallidè roseà calyce vix sesquilongiori, vexilli laminà basi obtusè auriculatà in unguem eà breviorè sensim attenuatà, alis parte inferiori unguis carinæ adnatis, ovario hirsutissimo.

Hab. propè *Gattade* in valle *Talagon* montis *Elbrus* Kotschy N° 550 A.

Caules 3-4 pollicares, folia 1-1 1/2 poll., foliola cum mucrone 5-6 lin. longa 1-1 1/2 lata, calyx 4 lin. longus. Valdè affinis *A. strictifolio* pro cuius formà diminutà eum priùs habui sed nunc ab eo mihi diversus videtur propter calyces multò breviores stipulis ferè ad apicem usque occultatos adpressiùs minùsque densè pilosos; folia griseo-to-

mentella nec adpressè hirtula sunt. Medius inter *Macro* et *Microcalycinos*.

ASTRAGALUS PRUSIANUS Boiss. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. ramosissimus breviter caulescens, foliis patentibus 7-9 jugis in spinam brevissimam apice abeuntibus, foliolis ovato-oblongis adpressissimè hirtis griseis in mucronem tenuissimum attenuatis, stipulis albo-tomentosis brevissimis triangularibus, floribus in capitula terminalia compacta rotunda bombycina densè congestis, bracteis lineari-setaceis plumosissimis, calycis bombycini turbinati dentibus linearibus apice subincurvis præter mucronem villo occultatis tubo demùm fissili brevioribus, corollà carneà calyci æquilongà, vexilli laminà basi obtusè auriculatà in unguem breviorē attenuatà, ovario albo-hirsutissimo.

Hab. in collibus inter *Broussa* et *Ghemlek* Bithyniæ ubi legi Junio 1842.

Caules 3-4 pollic., folia 2 poll., foliola cum mucrone 3 lin. longa. Capitula magnitud. nucis. Affinis *A. Mitchelliano* differt petiolis crassioribus, foliolis non glabrescentibus, calyce turbinato 4 lin. tantùm longo compactè lanato, capitulis dimidiò minoribus; accedit quoque ad *A. Meyeri* et *A. amblelepidem* Fisch. in Kotsch. pl. Kurd.

ASTRAGALUS MEYERI Boiss. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. suffruticosus ramosissimus ramis brevissimis spinis patulis nigris horridis, petiolis tomentellis supernè et approximativè 4 jugis in spinam tenuem foliolis breviorē abeuntibus, foliolis ellipticis in mucronem brevem tenuissimum abeuntibus densè et breviter tomentoso-canescens, stipulis triangulari-lanceolatis acutis tomentellis, floribus in capitula parva rotunda compacta ad axillas superiores congestis, bracteis lineari-spathulatis basi glabris supernè albo-tomentosis, calycis turbinati densè albo-lanati dentibus linearibus villo occultatis tubo fissili æquilongis, corollà pallidè carneà calyce sesquilongiori, vexillo exauriculato in unguem sensim attenuato, alis per ungues et basin limbi carinæ adnatis, ovario albo-hirsutissimo.

A. compactus C. A. Meyer Enum. Cauc. Casp. et Ledebour Fl. Rossica non Willd.

Hab. in districtu *Swant* prov. *Talisch*. C. A. Meyer! Hohenacker! Suffrutex ut videtur humilis, petioli 4 1/2 pollic., foliola 4 lin. circit.

longa, capitula magnitudine inter avellanam et nucem media, calyx 3 1/2 lin. longus. Species hucusquē pro *A. compacto* W. habita sed ex autopsiā plantæ Willdenowianæ ab eā omninō diversa calycis brevis turbinati dentibus lanā crassā obtectis. *A. compactus* est species macrocalycina ex affinitate *A. pycnocephali* et *strictifolii*.

ASTRAGALUS FILAGINEUS Boiss. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. suffruticosus ramosissimus ramis erinaceo-intricatis, petiolis brevibus crassis albo-tomentosis 4 jugis in spinam flavidam foliolis longiorem abeuntibus, foliolis minutissimis niveo-tomentosis ovatis mucronulatis paginā superiori canaliculato-plicatis, stipulis breviter triangularibus infernē albo-tomentosis supernē glabris nervulosis lutescentibus, floribus in capitula densa globosa compacta parva congestis, bracteis linearibus cymbiformibus longē albo-plumosis calycem subæquantibus, calycis brevissimi longē et densē albo-plumosi dentibus lineari-setaceis tubo fissili æquilongis, vexilli laminā recurvā exauriculatā in unguem eā longiorem attenuatā, ovario albo-hirsutissimo.

Hab. in Persiā Aucher N° 1267, in collibus aridis montis *Elbrus* propē pagum *Dareke* Kotschy pl. Pers. bor. N° 564 sub *A. compacto*.

Folia 10-12 lin., foliola lineam vel sesquilineam longa, capitula magnitudinis nucis avellanæ omninō bombycina, calyx 3 lin. longus, capitula ea *A. Meyeri* referentia sed densius copiosiusque lanata, bractearum forma diversa, foliola triplō minora canaliculato-plicata nec planissima etc. Affinis quoque *A. gossypino* Fisch. in pl. Kotsch. Kurd. cæterū diversissimo.

ASTRAGALUS ARGYROTHAMNOS Boiss. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. suffruticosus densissimē erinaceo-dumosus, foliis argyreis 4-6 jugis in spinam flavidam foliolis æquilongam abeuntibus, foliolis approximatis parvis ovatis obtusis mucronulatis nervo medio subtus prominulo, stipulis breviter triangularibus hirtulis foliorum floralium obtusiusculis aliorum acutis, floribus in axillis 3-4 capitulum parvum ovato-rotundum ad basin foliorum superiorum formantibus, bracteis stramineis ovatis carinato-concavis obtusissimis dorso tomentellis calyces æquantibus, calycis tomento niveo sub lente tenuiter oblecto densē vestiti brevis dentibus villo occultatis coalitisque tubo demum

fissili æquilongis, corollâ pallidè violaceâ calyce plûs duplò longiori, vexilli laminâ basi acutiusculè auriculatâ ungui subæquilongâ, alis unguis basi carinæ adnatis, ovario albo-hirsutissimo.

Hab. in regione mediâ *Antilibani* inter *Zebdani* et *Zachle*. Legi flor. Maii fine.

Folia sesquipollicem, foliola sesquilineam longa, capitula pauciflora avellanæ magnitudine, calyx 2 $1\frac{1}{2}$ lin., corolla 6 longa. Planta foliolis minimis ovalis argenteis floribus violaceis insignis propè *A. Meyeri* et *A. Creticum* collocanda ab eis cæteris neglectis corollâ elongatâ et formâ bractearum facilè dignoscenda.

ASTRAGALUS CRENOPHILUS Boiss. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. caulibus lignosis glabris læviusculis ramosissimis, ramis nigricantibus horridis, petiolis tenuissimis flavidis sub lente adpressè et parcè hirtulis in spinam foliolis longiorem abeuntibus, foliolis 7-8 jugis minimis angustè ellipticis acutiusculis ferè acicularibus glabriusculis viridibus, stipulis triangularibus hirtulis acutis glabris, floribus in axillis paucis spicas tenues elongatas subcylindricas secus ramos formantibus, bracteis ovatis cymbiformiter plicatis obtusis margine ciliatulis cæterùm glabris stramineis calycis tubum æquantibus, calycis patulè albo-hispidissimi minutissimi ovato-globosi dentibus lanceolatis apice spinulosis tubo non fissili subbrevioribus, vexillo oblongo-lineari exauriculato versus medium subangulato infernè dilatato, alis liberis, legumine minimo oblongo-cylindrico infernè glabriusculo supernè densè albo-tomentoso.

Hab. ad scaturigines montis *Gara* Kurdistanizæ Kotschy N° 382.

Folia ferè poll. longa, foliola 4 $1\frac{1}{2}$ -2 lin. longa $1\frac{1}{2}$ lin. lata, calyx 4 $1\frac{1}{2}$ lin. longus, legumen ferè 2 lin. longum lineæ $3\frac{1}{4}$ latum. Habitu et calyce non fissili affinis *A. leioclado* Boiss. et *brachycalyci* Fisch. ab utroque diversus florum spicis angustè cylindricis nec ovato-globosis, legumine angustiori. *A. erianthus* Willd cui dubitanter nostram plantam retulit Cl. Fischer quoque affinis differt tamen calyce longius albobiumoso ad basin usquè demùm fissili, ejus legumina ovata sunt longè lanata, flores capitati.

A. brachycalyx Fisch. in Kotsch. pl. Kurd. N° 363 quem *A. leiocladi* mei synonymon esse prius credidi ab eo distinctus videtur foliis latioribus mucronulatis, calycis dentibus brevioribus.

ASTRAGALUS MYRIACANTHUS Boiss. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. ramosissimus, ramis erectis brevibus intricatissimis spinis innumeris longis tenuibus petiolorum emortuorum et virescentium horridis, foliis 8-9 jugis parè et adpressiusculè hirtulis pallidè virentibus apice in spinam tenuem flavidam foliolis multò longiorem abeuntibus, foliolis minutissimis ovatis vel ellipticis in mucronem brevem attenuatis plicatis facilè et citò deciduis, stipulis ovato-triangularibus apice glabris flavis basi densè lanatis, floribus in axillis superioribus 4-3 stipulis ferè occultatis capitulum ovatum minutissimum formantibus, bracteis oblongo-linearibus concavo-plicatis obtusis supernè densè lanatis calyce paulò brevioribus, calycis densè albo-lanati minutissimi dentibus linearibus villo omninò conjunctis occultatisque tubo demùm fissili paulò brevioribus, corollà calyce sesquolongiori e sicco carneâ, vexilli laminâ brevissimâ ovatâ exauriculatâ basi strangulatâ, ungue vexillo longiori æquilato, alis liberis, ovario adpressè hirsuto.

Hab. ad latera meridionalia alpis *Kuh Daena* Pers. austr. Kotschy N° 650 sub *A. denudato*.

Suffrutex 3 pedalis, folia 4 1/2 pollicar. foliola 4-2 lin. longa angustissima, calyx 2 lin. longus. Hanc speciem olim adnumeravt *A. denudata* Stev. a quo differt foliolis multò tenuioribus acicularibus pluri-jugis, floribus ad axillas paucissimis vix capitatis dicendis.

A. denudatus Stev. mihi tautùm forma minùs cana videtur *A. pycnophylli* Stev. qui ipsissimus est *A. microcephalus* W. ex Armeniâ oriundus. Inter hunc *A. microcephalum* ex Armeniâ, Georgiâque Caucasica igitur oriundum et *A. Creticum* Lam! Sieb! Willd! non DC. — *A. Siculum* var. *Nebrodensem* Guss. quem e Cretâ, Taygeto, Tymphresto et montibus Siciliæ vidi atque *A. echinum* DC in Libano! jugo Sinaitico crescentem, plantamque regni Granatensis sub eodem nomine in meo itinere Hispanico descriptam, discrimina nulla detegere potui et persuasum habeo eos omnes sub eadem specie militare.

A. Creticus Sibth. Fl. Gr. tab. 737 e collibus Ionix oriunda ex icone est species nova ab *A. Cretico* diversisissima, corollis flavis rubello-striatis insignis.

ASTRAGALUS MESOLEIOS Boiss. et Hohen. in Kotsch. pl. Pers. bor. 4846. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. suffruticosus, caulibus lignosis ramosis, ramis procumbentibus

horridis plus minùsve tomentoso-canis, foliis parèe et brevissimè crispulo-tomentellis viridibus 3-6 jugis in spinam flavam foliolis breviorè abeuntibus, foliolis parvis angustè elliptico-linearibus complicatis in mucronem attenuatis, stipulis basi cano-tomentosis apice glabris flavidis brevissimè triangularibus acutis, floribus in axillà 4-2 spicas laxas tenuissimas breves formantibus, bracteis lineari-cymbiformibus brevibus basi glabris supernè tomentosis calycem subæquantibus, calycis brevissimi turbinati basi nudi supernè albo-vilosissimi dentibus villo omninò occultatis conniventibusque tubo demùm fissili duplò brevioribus, corollà calyce duplò longiori, vexillo ineari-oblongo infernè vix angustato, alis basi carinæ adnatis, ovario albo-hirsutissimo.

Hab. in monte *Totschal* propè *Teheran* Kotschy N° 559.

Planta notis pluribus similis *A. Caspio* qui differt foliolis muticis, stipulis tenuioribus longioribus, calyce ad basin usquè tomentoso.

ASTRAGALUS TOURNEFORTHII Boiss. (Sect. *Tragacanthæ*).

A. dumosus, caulibus erectis ramosis, ramis elongatis laxè foliosis breviter tomentosis canis, stipulis scariosis triangulari-lanceolatis acuminatis glabrescentibus, petiolis tenuibus flavescents glabris spinà foliolis longiori terminatis, foliolis 5-6 jugis glabris elliptico-linearibus mucronulatis, floribus sessilibus in axillis solitariis vel binis in spicam laxam dispositis, bracteis ovatis cymbiformiter plicatis apice sæpè fissis, calyce patulè albo-hispidissimo minuto subgloboso ad basin usquè in lacinias villo occultatas in spinulam tenuem exsertam abeuntes fissili, corollà glabrà calyce duplò longiori, petalis omnibus liberis subæquilongis, legumine minimo ovato densè et longissimè albo-hispido.

Tragacantha Cappadocica erectior foliis Viceæ glabris, ramis tomentosis Tourn. herb. ! Vidi in herb. Mus. Paris.

Hab. in *Cappadocià* Tournef.

Rami 5-6 poll. longi, petioli 2 poll., foliola 4-5 lin. longa 4 1/4 lat. Affinis *A. Caspia* et *A. Caucasico* a quibus foliis glabris, calycibus longè hispidis recedit, ab eis et ab omnibus affinibus insuper differt ramis ut in *A. Leucacantha* laxè foliosis. Floribus ad *A. erianthum* W. accedit sed in hoc petioli tenuissimi vix pollicares, foliola multò minora, flores capitati. — Synonymon Tournefortii hic citatum in-faustè a cl. DC. ad *A. gummiiferum* Lab. et a Willdenowio ad suum

A. leucophyllum Sp. p. 1331. relatum fuit. Hic *A. leucophyllum* ex autopsiâ herb. Willd. nihil est nisi *A. microcephalus* ejusdem auctoris vel *A. Creticus* Lam. et igitur species delenda.

Tragacanthæ pedunculati.

ASTRAGALUS LEUCACANTHUS Boiss.

A. fruticosus, caulibus erectis ramosis elongatis breviter tomentellis laxiusculè foliatis petiolis vetustis erectis longis horridis, foliis 6 jugis, petiolo rigido longo albido hirsuto in spinam foliolis longiorem abeunti, foliolis minutis parcè et adpressiusculè hirsutis griseo-virentibus obtusis breviter petiolulatis, stipulis a basi triangulari flavidâ glabrâ nervulosâ angustè acuminatis ciliatis, floribus in axillis superioribus 2-6 brevissimè pedunculatis patulis, pedicellis basi et medium versùs minutè bracteolatis, calycis parcè et patulè hirsuti flavidi tubulosi dentibus linearibus tubo quadruplò brevioribus, corollâ luteâ calyce duplò longiori, vexillo oblongo-lineari recurvo alas superanti, carinâ valdè recurvatâ alis æquilongâ, leguminibus calyce fisso quadruplò longioribus oblongis lateraliter compressis adpressissimè canescentibus in mucronem rectum pungentem attenuatis suturâ superiori subcarinatâ rectâ inferiori convexâ subsulcatâ.

Hab. in desertis *Ægypti* Olivier in herb. Mus. Par. sub nomine *A. Sieberi*, Montbret, Aucher absque numero.

Specimina quæ vidi 4-4 $4\frac{1}{2}$ pedalia, petioli 2 poll., foliola 4-4 $4\frac{1}{2}$ lin. longa, flores 3 lin. longi, legumen 6-7 lin. longum basi 2 latum rostro spinæformi 2 $4\frac{1}{2}$ lin. longo terminatum læve. Affinis *A. trigono* DC. cujus specimen authenticum Lippii in herb. Mus. Par. contuli, quem quoque in deserto Arabiæ petreæ legi et qui differt ramis brevissimis intricatis, petiolis brevibus, foliolis orbiculatis subtùs incanis, legumine erecto vix compresso subtrigono suturâ superiori concaviusculo breviter mucronato. — *A. radicans* Decaisne in Flor. Sinaica est *A. Sieberi* DC. ipsissimus sed planta Persiæ ab amiciss. auctore hùc citata specificè differre videtur.

ASTRAGALUS MACROSEMIUS Boiss. et Hohen. in pl. Kotsch. Pers. bor. 1846. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. suffruticosus humilis ramis densè intricatis cæspitosis horridis,

foliis adpressè sericeis 5-6 jugis in spinulam flavidam tenuissimam foliolis longiorem abeuntibus, foliolis minimis ellipticis acutiusculis muticis versùs folii apicem decrescentibus, stipulis tenerrimis triangularibus pellucidis albis lucidis partem inferiorem ramorum inter spinas vestientibus, floribus 3-4 in racemos inter folia suprema subsessiles subcapitato-confertos dispositis breviter pedicellatis, bracteis membranaceis ovato-rotundis sæpè laceris pedicellos subæquantibus, calycis pilis albis nigrisque adpressè hirti dentibus lanceolato-linearibus tubo quadruplò brevioribus, corollà albà, vexillo recto lineari acutiusculo carinà brevi valdè incurvâ duplò longiori, alis angustissimè linearibus carinam longè superantibus vexillo brevioribus, ovario adpressissimè albo-hirsuto.

Hab. in Alpihus *Hasartschal* partis occid. montis *Elbrus* Kotschy N° 497.

Folia 4-4 $1\frac{1}{2}$ pollic., foliola majora 2 lin. longa, calix 3 lin., corolla 9 lin. longa. Species affinis *A. angustifolio* Lam. qui egregiè differt indumento multò magis adpresso, stipulis coriaceis, bracteis lanceolatis acuminatis, vexillo alas alisque carinam paulò superantibus, etc.

Ex collatione speciminum multorum *A. angustifolius* Lam., *A. echinoides* L'Hér. et *A. olympicus* Lam. ad eandem speciem valdè variabilem pertinent. *A. angustifolius* ex Armenià est forma pedunculis folia subæquantibus, *A. echinoides* e Cretà forma foliolis angustissimis, pedunculo brevi 4-2 floro quam quoque Schimperus in Cephalonià insulà legit. Innumeri transitus inter omnes occurrunt. *A. retusus* Willd. spec et herb! foliola non retusa sed tantum obtusiuscula habet et omnibus notis *A. angustifolio* ut synonymon quoque adnumerandus est.

ASTRAGALUS HERMONEUS Boiss.

A. suffruticosus humilis densissimè cæspitoso-erinaceus ramis petiolis vetustis strictis horridis, foliis 7-8jugis, petiolis erecto-patulis glabriusculis albidis crassis rigidis basi suprà complanatis vel subcanaliculatis apice in spinam duram vix pungentem foliolis brevioribus abeuntibus, foliolis adpressè hirtulis griseo-virentibus parvis obovatis complicatis obtusissimis vel retusis muticis versùs petioli apicem diminutis, stipulis albis brevibus breviter adnatis triangulari-lanceolatis acutis ciliatis, racemis 3-4 floris in axillis supremis paucis pedunculo foliis paulò breviori suffultis, floribus breviter pedicellatis, bracteis

lanceolatis nigro-pilosis pedicello paulò longioribus, calycis tubulosi pilis nigris albisque rarioribus parçè et adpressè obsiti dentibus nigricantibus breviter linearibus tubo 4-5plò brevioribus, corollà carneà calyce duplò longiori, vexillo oblongo-lineari exauriculato alas vix superanti, alis earinam parum superantibus, leguminibus erectis calyce vix duplò longioribus glabris vel parcissimè et adpressè hirtulis oblongo-cylindricis acutiusculis mucrone brevissimo terminatis ad suturam superiorem elevatis subcarinatis ad inferiorem sulcatis, dissepimento completo.

Hab. in regione superiori montis *Gebel Scheick* (Hermon) Antilibani necnon in monte *Gebel Baruck Libani* inter *Rascheya* et *Deir el Kammar* siti. Legi Jul. 1846.

Caspites circ. $1\frac{1}{2}$ pedem alti lati, petioli 1-1 $1\frac{1}{2}$ pollic. basi lineam et ampliùs lati, foliola sesquilineam longa, calyx 2 $1\frac{1}{2}$ lin. longus, legumen 4-5 lin. longum diametro lineam 1 $1\frac{1}{4}$ latum mucrone vix lineam longo terminatum. Species ab omnibus formis *A. angustifolii* distincta petiolis albis basi crassà complanato-canaliculatis, floribus et præsertim vexillo brevioribus, corollà carneà nec albo-flavidà etc.

A. gummiifer β . *hispidulus* DC. herb. ! est specimen absque floribus *A. Roussæani* mei ab *A. vero* ut et ab *A. gummiifero* longè distantis.

ASTRAGALUS INFESTUS Boiss. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. caulibus fruticosis erectis simplicibus pumilis adpressissimè canescenti-hirtis petiolis patulis rigidis horridis, foliis sub5jugis, petiolo valido adpressissimè hirtò supernè in spinam flavidam longissimam abeunti, foliolis parvis ovatis plicatis obtusis brevissimè mucronulatis adpressissimè canescentibus, stipulis teneris albo-pellucidis vix petiolo adnatis in unam brevem truncatam valdè retusam bilobam concretis, floribus in axillis superioribus subsessilibus solitaris vel binis approximatis capitato-congestis, bracteis minutissimis oblongis, calycis membranacei flavido-tomentelli dentibus setaceis tubo triplò brevioribus, corollà flavidà glabrà calyce vix duplò longiori, vexillo alis carinàque parum longiori, legumine.....

Hab. in regno *Cabulico* Griffith N° 4059 in herb. Hooker.

Caules semipedales videntur, petioli poll. aut paulò ampliùs longi, foliola circ. 2 lin., flores 6-7 lin. longi. Affinis quodam modo *A. lycioidi* Boiss., in sectione stipulis concretis notabilis.

ASTRAGALUS RAPHIODONTUS Boiss. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. glabriusculus, caulibus suffrutescentibus pumilis tenuibus simplicibus flexuosis angulatis, petiolis erectis tenuibus rigidis 5-7 jugis in spinam tenuem acerosam foliolis multò longiorem abeuntibus, foliolis viridibus obovatis complicatis crassiusculis brevissimè mucronulatis, stipulis parvis membranaceis triangularibus acuminatis petiolo adnatis inter se liberis, floribus 4-2 axillaribus brevissimè pedunculatis, bracteis e basi lanceolatà tenuissimè setaceis rigidulis, calycis glabri chartacei flavidi dentibus e basi trinervi subulato-acerosis rigidulis tubo dimidiò brevioribus, corollà glabrà flavidà calyce parùm longiori, legumine coriaceo lævi glabro ovato turgido calyci æquilongo, suturà carinali impressà subsulcatà, vexillari carinatà marginatà nervo crassiusculo apice in rostrum breve deorsum subrecurvum abeunti; septo ferè completo, loculis 5-6 ovulatis.

Hab. in *regno Cabulico* Griffith N° 1058 in herb. Hooker.

Caules semipedales, spinæ sesquipollicares, foliola 3 lin. circ. longa, flores 8-9 lin., legumen 6 lin. longum 4 latum rostro lineam longo terminatum. Species insignis calyce aceroso et quam ex formà leguminis si characterem magis artificialem petioli spinosi negligerem inter *Christianos* propè *A. Sieberi* vel *A. Caraganæ* potiùs collocarem.

ASTRAGALUS LASIOSEMIUS Boiss. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. fruticosus caulibus horridis ramosis, ramis brevibus intricatis brevissimè et parcè tomentellis, petiolis crassis longis virescentibus hirtulis 6-7 jugis suprà planiusculis basi elevato-nervosis secùs ramos decurrentibus in spinas longas flavidas abeuntibus, foliolis pallidè virentibus adpressiusculè hirtellis oblongis obtusis brevissimè mucronulatis, stipulis membranaceis hirsutis rigidulis e basi triangulari setaceo-acuminatis, floribus in axillà 2-3 breviter pedunculatis demùm nutantibus, bracteis setaceis pedunculo æquilongis, calycis membranaceo-flavidi hirsuti dentibus e basi triangulari spinulosis rigidis tubo quadruplò brevioribus, corollà flavà calyce vix sesquilongiori, vexillo extùs densè et adpressiusculè hirsuto alas versùs basin laminæ carinae margine inferiori hirsutas parùm superanti, legumine membranaceo-subcoriaceo adpressè hirtò oblongo-subcompresso calyce inclusò et æquilongo mucrone brevissimo subincurvo instructo.

Hab. in *regno Cabulico* Griffith N° 1049 in herb. Hooker.

Suffrutex ut videtur semipedalis vel longior caulibus rectis apice breviter et densè ramosis, spinæ petiolares ferè bipollicares, foliola 3 lin. longa, flores 8 lin., legumen 6 lin. longum 3 latum. Species leguminibus pendulis inter affines notabilis.

ASTRAGALUS GENISTOIDES Boiss. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. suffrutescens, caulibus brevibus procumbentibus ramosis ramisque brevissimis spinis petiolaribus longis tenuibus horridis, foliis adpressissimè canescentibus flavidis 7-8 jugis in spinam tenuissimam foliolis longiorem abeuntibus, foliolis angustè ellipticis concaviusculis obtusis muticis versus petioli apicem decrescentibus, stipulis minutissimis lanceolatis acutis vix petiolo adnatis, floribus ex axillis supremis 2-3 subfasciculatis breviter pedunculatis, bracteis lineari-lanceolatis pedicello subbrevioribus, calycis membranacei flavidi adpressè hirti dentibus e basi triangulari acuminatis rigidis tubo triplò brevioribus, corollà flavà calyce duplò longiori, vexillo adpressè hirtulo alis carinàque glabris paulò longiori, ovario adpressè hirsuto.

Hab. in regno *Cabulico* Griffith N° 1054 et 1055 in herb. Hooker.

Rami pollicares, petioli 15 lin. ferè longi tenues, foliola 2-3 lin. longa, flores 8 lin. circ. longi. Species a præcedenti petiolis tenuissimis floribus post anthesin non nutantibus distinctissima.

ASTRAGALUS PSILACANTHUS Boiss. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. suffruticosus ramosissimus ramis brevissimis strictis cæspitosis, spinis petiolaribus longis tenuissimis folia novella æquantibus, foliis adpressè canescenti-sericeis 6-7 jugis in spinam brevem tenuissimam abeuntibus, foliolis minutis ellipticis complicatis obtusis muticis, stipulis minutis triangularibus hirsutis, pedunculis axillaribus tenuibus brevibus subbifloris, bracteis oblongo-linearibus pedicellos subæquantibus, calycis membranacei flavescentis adpressè hirtuli tubuloso-elongati dentibus setaceis tubo quintuplò brevioribus, corollà flavà calyce plus duplò longiori, vexillo retuso alas carinamque apice rotundatas superanti, ovario oblongo adpressè hirtulo semibiloculari.

Hab. in regno *Cabulico* Griffith in herb. Hooker N° 1051 et quoque 1050.

Cæspites densi 3 pollices alti, spinæ 2-2 1/2 pollicares, foliola circ. 1 1/2 lin. longa, calyx 7 lin., corolla 14-15 lin. longa. Affinis *A. Gra-*

hamiano Royle Illustr. tab. 36 cui refero specimina N° 4052 coll. Griffithsianæ; ab eo distinguitur cæspitibus humilibus, spinis multò tenuioribus, etc.

ASTRAGALUS VESTITUS Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. caudiculis suffrutescentibus procumbentibus tomentosis sæpè elongatis caules breves erectos flavido-tomentosos latè stipulatos edentibus, foliis tomento adpresso rufescenti vestitis 5-7jugis, foliolis sessilibus ovatis obtusiusculis muticis, petiolo vel in foliolum aliis simile vel in spinam tenuem brevissimam vix pungentem abeunti persistenti, stipulis teneris albo-membranaceis tomentellis pellucidis in unam magnam oppositifoliam amplexicaulem petiolo adnatam obliquè truncatam retusam coalitis, floribus congestis in spicam ovatam densiusculam pedunculo crasso tomentoso foliis dimidiò breviori suffultam, bracteis amplis tomentellis ovatis concavis membranaceis mucronulatis calycinum tubum æquantibus, calycis lanà rufà adpressà densissimè vestiti dentibus lanceolatis dimidio tubo longioribus, corollà calyce tertià parte longiori e sicco flavido-rufescenti, vexilli laminà ovatà obtusissimà supernè densissimè rufo-tomentosà in unguem glabriusculum sensim attenuatà, alis linearibus acutis carinàque oblongo-lineari acutà rectà æquilongis densè rufo-tomentosis vexillo subbrevioribus, ovario lineari pilis rufis longis densè barbato, legumine...

Hab. in saxosis regionis superioris montis *Karadagh Isauricæ* alt. 4500 (Heldreich).

Caules 3-6 pollicares, petioli 2-2 $1\frac{1}{2}$ poll., foliola 5-6 lin. longa 2 $1\frac{1}{2}$ -3 lata, pedunculi 4-4 $1\frac{1}{2}$ pollicares, capitula magnitudinis nucis, calyx 7 lin., corolla 10 lineas longa. Species floribus densissimè rufo-tomentosis insignis, inter *Tragacanthas* ob stipulis latas coalitas oppositifolias anomala, si petiolos spinosos negligas gregi *Lupulinorum* adnumeranda.

ASTRAGALUS SCIUREUS Boiss. et Hohen. in Kotschy. pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. suffruticosus caulibus erectis elongatis supernè breviter foliiferis, foliis 6-7jugis in spinulam tenuissimam foliolis multò brevioribus abeuntibus, foliolis elliptico-lanceolatis acutis in mucronem attenuatis

adpressissimè sericeo-argyris, stipulis teneris pellucidis triangulari-lanceolatis acutis, pedunculo solitario terminali erasso cano folia paulò superanti, spicà cylindricà densà latitudine suà 6-7 plò longiori sericeà, bracteis glumaceis glabris caducissimis lanceolatis acutis calycem æquantibus, calycis rubelli pilis longis adpressiusculis griseis sericei dentibus setaceis tubo paulò brevioribus, corollà e siceo carneà calycis dentes quartà parte superanti, vexillo oblongo-lineari alas lineares acutiusculas non superanti, carinæ alis paulò brevioris laminà brevissimà, ovario adpressissimè cano.

Hab. in declivibus aridis ad *Gattade* vallis *Talagon* montis *Elbrus* Kotschy N° 520.

Caules 6-8 pollic., folia 3 1½ poll., foliola 7-8 lin. longa 4 1½ lata. Spica 5 pollices longa, flores 7-8 lin. longi. Affinis *A. laguro* et *A. chrysostachyo* ab eis spicà longissimà 8-9 lin. tantum diametro latà diversus.

ASTRAGALUS BOUNOPHILUS Boiss. et Hohen. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. subacaulis cæspitosus, rhizomate suffrutescenti squamoso, foliis patulis 6-8 jugis, petiolo subherbaceo in spinulam tenuissimam foliolis breviorē abeunti, foliolis oblongis vel ellipticis acutiusculis brevissimè mucronatis, stipulis lanceolatis acutis, capitulo denso ovato, pedunculo tomentello foliis æquilongo, bracteis ovatis oblongisve rubellis ciliatulis cæterum glabris brevissimè acuminatis calycino tubo brevioribus, calycis supernè præsertim pilis patulis sericeo-griseis hispidi dentibus a basi lanceolatà setaceis tubo dimidiò brevioribus, corollà sulphureà calyce vix longiori, vexillo oblongo-lineari stricto alas oblongo-lineares vix superanti, carinæ laminà longiusculà parum curvatà alis paulò breviori, ovario cano.

Hab. in collibus argillosis loco *Syach Nalas* dicto ad radices montis *Demawend* propè *Lar* Kotschy N° 313.

Folia sesquipollicaria, foliola 3-4 lin. longa 4 1½ lata, pedunculi 2-2 1½ pollic., capitula magnitudine nucis, flores 8 lineas longi. Ab. *A. Persico* differt caule subnullo, petiolis tenuibus non rigidis, foliolis brevissimè mucronatis. Habitu magis accedit ad *A. ebenoidem* foliolis minutissimis muticis calyce demum inflato diversum.

Astr. tæniolepis Boiss. et Hohen. in pl. Kotschy. Pers. bor., est tantum forma *A. Persici* F. et m.

ASTRAGALUS IODOTROPIS Boiss. et Hohen. in Kotschy. pl. Pers. bor., 1846. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. suffrutescens caulibus ramosis infernè petiolis vetustis tenuibus horridis, foliis 9-10 jugis erecto-patulis in spinam tenuem foliolis supremis paulò longiorem abeuntibus, foliolis eleganter argyreis nitentibus minutis approximatis ovatis obtusiusculis muticis versùs folii apicem valdè diminutis, stipulis albis pellucidis teneris margine ciliatulis latè triangularibus obtusiusculis, racemis 2-4 floris paucis in axillis supremis breviter pedunculatis, bracteis oblongis acutis caducis pedicellos æquantibus, calycis tubulosi pilis albis nigrisque breviter tomentelli dentibus lineari-lanceolatis nigricantibus tubo dimidio paulò longioribus, corollà calyce subduplò longiori, vexillo rubenti oblongo-lineari alis linearibus longiori, carinà obtusissimà apice violaceà.

Hab. in parte occid. montis *Elbrus* ad pagum *Asadbar*. alt. 8000 Kotschy N° 474.

Suffrutex ut videtur semipedalis, petioli 1-4 $1\frac{1}{2}$ pollic., foliola majora 2 lin. longa, flores 8 lin. longi. Affinis *A. murino* ab eo differt petiolis multò minis crassis rigidisque, pedunculis brevissimis, dentibus calycis longioribus, etc.

ASTRAGALUS SUBMITIS Boiss. et Hohen. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. suffrutescens caule brevissimo, foliis longissimis 20-25 jugis in spinulam brevissimam vix perspicuam abeuntibus, foliolis minimis alternis adpressè hirtis pallidè virentibus obovatis obtusissimis muticis vel nervo excurrente brevissimè mucronulatis versùs apicem folii valdè diminutis, stipulis rigidis lanceolatis acutis, pedunculo longissimo folia superanti adpressè hirsuto, spicà laxiusculè oblongo-cylindraceà, bracteis parvis ovatis acuminatis pilis nigris ciliatis, calycis tubulosi pilis albis nigrisque adpressiusculis tomentelli dentibus breviter triangularibus tubo multoties brevioribus, calyce fructifero inflato globoso glabrescenti reticulato-nervuloso albedo, corollà calyce duplò longiori e sicco rubellà, vexillo subretuso alas oblongas superanti, carinà apice obtusissimè violaceà alis breviori, ovario oblongo-lineari virescenti adpressè hirtio.

Hab. in monte *Elbrus* suprà pagum *Passgala* Kotschy N° 490.

Folia 7-9 poll. longa, foliola majora 2-3 lin. longa $1\frac{1}{2}$ lata, pe-

duncali pedales, spica fructifera 3-4 poll. longa, flores 9 lin. longi. Pulcherrima species petiolo vix spinoso transitum ad *A. halicacabos* præbens, affinis *A. remotiflora* qui differt petiolis rigidioribus brevioribus, calycis dentibus setaceis, calyce fructifero purpureo-vittato.

A. Damascenus DC. nihil est nisi status florifer *A. coluteoidis* W. etc., ad quem ut synonymon conjungendus est.

ASTRAGALUS TUMIDUS W. — *A. Rauwolfi* Vahl.

Species composita cujus nomen sectiunculæ habitu et characteribus propriis donatæ et species sequentes comprehendenti servandum est.

ASTRAGALUS CLUSII Boiss. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. fruticosus adpressiusculè sericeo-canescens ramis erectis spinis vetustis erecto-patulis horridis, foliis gemmarum axillarium ramorumque juniorum æquilongis similibusque subsexjugis in spinam tenuem foliolis brevioribus, foliolis obovatis ellipticisve obtusis basi attenuatis mucronatis, stipulis tomentosis triangularibus acutis, racemis 2-3 floris axillaribus laxis foliis multò brevioribus, bracteolis binis linearibus ad apicem pedicelli brevissimi sitis eo triplò longioribus, calyce adpressè albo-hirsuto florifero oblongo-cylindrico dentibus setaceis tubo triplò brevioribus fructifero inflato ovato reticulato-venoso, legumine adpressè hirtò oblongo uniloculari stipite ei subæquilongo suffulto apice mucrone tenui eo vix breviori superato.

Poterium fortè Clus. *Hisp. H. p.* 246! — *Astragalus fruticosus* Asso. *Oryct. Arrag. tab.* 2 fig. 2.

Hab: in regione montanà Hispaniæ inferioris in regno Granatensi (Clus.). Arragonensi (Asso) Castellà novà (Rodriguez). Sierra Morena (Prolongo!).

A. Poterium Wild. herb. cui planta Clusii relata fuit nihil est nisi *A. Massiliensis* Lam. *A. poterium*. Pall. *Astr. tab.* I est planta e Tauriâ ex affinitate *A. Siculi* mihi ignota.

ASTRAGALUS FORSKAHLI Boiss. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. fruticosus adpressè tomentellus griseus, ramis erectis spinis erecto-patulis valdè horridis, foliis gemmarum axillarium spinà multò brevioribus confertim foliolatis in spinam minutissimam abeuntibus dentum deciduis, ramorum ænnetiuorum persistentibus elongatis in

spinam duram abeuntibus remotiusculè foliolatis omnibus 5-6jugis, foliolis obovatis obtusis vel retusis, stipulis tomentosis triangularibus minutissimis, floribus e gemmis ad axillas spinarum sitis oriundis solitariis vel binis petiolo calyci æquilongo vel breviori suffultis basi 2 bracteolis ovatis minimis stipatis, calyce breviter tomentoso-canescenti tubuloso dentibus linearibus tubo quadruplò brevioribus, fructifero ovato inflato albo-membranaceo non reticulato, legumine uniloculari adpressè hirsuto oblongo acuto submutico stipite eo breviori suffulto.

Colutea spinosa Forsk.

Hab. in desertis *Yrabia petreæ*. (Forskal. Schimper! Boiss!)

A specie præcedenti diversissimus foliis dimorphis, pedunculis 4-2 floribus, bracteis brevissimis, legumine mutico.

A. armatus Wild. — *Anthyllis tragacanthoides* Desf. Atl. tab. 494 sistit quoque speciem propriam inter affines foliolis linearibus 8jugis etc., distinctam.

ASTRAGALUS RUSSELLII Russell. Aleppo. tab. 43! (Sect. *Tragacanthæ*.)

A fruticosus ramis spinis longis horridis, foliis gemmarum axillarium contractis brevissimis apice spinulosis spinâ axillari multoties brevioribus, ramorum annotinorum elongatis persistentibus, foliolis minutis viridibus glabris vel apice parcissimè hirtulis mucronulatis ovato-ellipticis, floribus in foliorum gemmis solitariis vel binis brevissimè pedicellatis bractea minimâ ovato-rotundâ cucullatâ basi suffultis, calycè florifero cylindrico parcissimè et breviter hirsuto demum glabrescenti rubello dentibus minimis triangularibus tomentellis tubo multoties brevioribus, calyce fructifero glabro inflato reticulato nervoso, legumine juniore cano angustè oblongo stipiti æquilongo.

Hab. ad *Aleppum* (Russell), ad pagum *Gorluk* propè Euphratem Chesney N° 32, inter *Aleppum* et *Mossul* Olivier in DC. herb.

Foliola eis specierum præcedentium minora, ab eis præterea differt calycis dentibus brevissimis, foliis glabrescentibus, calyce fructifero nitido glabro.

ASTRAGALUS BRUGUIERI Boiss. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. suffrutescens, caulibus brevibus teretibus procumbentibus ramo-

sis, ramis abbreviatis totâ longitudine laxè foliosis breviter et densè niveis, stipulis scariosis teneris glabris ovatis acutis, foliis remotè 2-3 jugis, petiolo valido rigido glauco-canescenti in mucronem validum foliolis longiorem abeunti, foliolis carnosulis glabris glaucocæsiis cuneato-subrotundis obtusis vel retusis obsoletè mucronulatis, floribus solitariis ad axillas inferiores ramorum breviter pedunculatis, calyce fructifero glaberrimo pellucido nitido reticulato-nervoso dentibus triangulari-lanceolatis adpressè hirtis conniventibus, legumine...

Hab. inter *Bagdad* et *Kermanchah* Olivier in herb. Mus. Par.

Rami e caule brevi circ. semipedales, petioli 2-2 1/2 pollic., foliola diametro 4-5 lin. lata. Species foliolis magnis orbiculatis carnosulis dissitis inter affines distinctissima.

ASTRAGALUS SCORPIUS Boiss. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. fruticosus ramis breviter canis horridis, foliis gemmarum axillarium ad foliola 6-8 minima adpressè hirta elliptico-linearia obtusissima mutica subsessilibus fasciculata reductis, foliis secùs ramos annotinos nascentibus remotè 5-6 jugis, petiolo rigido persistenti spinæformi elongato albo, foliolis citò deciduis, stipulis tenerè membranaceis triangularibus vix perspicuis, floribus e foliorum gemmis solitariis binisve subsessilibus basi bracteolis oblongis minimis stipatis, calyce adpressissimè sericeo-canescenti florifero tubuloso dentibus minimis triangularibus tubo multoties brevioribus, fructifero inflato ovato, legumine...

Hab. in provinciâ *Laristan* Persiæ australis Aucher N° 4398.

Spinæ petiolares ferè bipollicares, foliola gemmarum sesquilineam longa complicata angustissima, flores 7-8 lin. longi. Affinis dentibus calycis brevibus *A. Russelii* ab eo differt foliolis fasciculatis subsessilibus sericeis muticis, floribus subsessilibus, spinis albis.

ASTRAGALUS ANISACANTHUS Boiss. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. fruticosus, ramis horridis adpressè tomentellis, foliis gemmarum axillarium brevissimis bijugis, petiolo tenui in spinulam brevem abeunti, foliolis obovatis mucronulatis adpressè canescentibus, foliis ad ramos annotinos nascentibus elongatis rigidis erecto-patulis 3-4 jugis, petiolo supernè planiusculo sulcato, pedunculis e gemmis oriundis solitariis brevibus 4-2 floris, bracteolis ad calycis basin oblongis minu-

tissimis, calyce fructifero inflato breviter hirtò valdè reticulato-nervoso dentibus setaceis brevibus, legumine cano oblongo breviter mucronato vix stipitato.

Hab. in *regno Cabulico* Griffith N° 1046 in herb. Hooker.

Spinæ bipollicares, calyces fructiferi piso duplò majores. Species a præcedentibus calycibus fructiferis minoribus, legumine vix stipitato distincta.

ASTRAGALUS JUBATUS Boiss. (Sect. *Tragacanthæ*.)

A. fruticosus, ramis breviter canescentibus horridis, petiolis foliorum super ramos annotinos nascentium longis acerostis erecto-patulis remotiusculè 5jugis, foliolis..., foliis gemmarum axillarium quadruplò brevioribus foliolis approximatis 5jugis canescentibus ellipticis mucronulatis, petiolo tenui in spinam minimam abeunti, stipulis vix perspicuis, floribus minutis in axillis 2-4 pedunculo vix perspicuo suffultis, bracteis oblongo-linearibus pedicello sublongioribus, calycis densè et breviter tomentosi grisei floriferi cylindrici curvati dentibus lineari-setaceis tubo multoties brevioribus...

Hab. in *regno Cabulico* Griffith N° 1047 in herb. Hooker.

Spinæ sesquipollicares, foliola 2 $\frac{1}{2}$ lin. longa lineam lata, flos 3 lin. longus. Ab omnibus præcedentibus sectiunculæ *Inflatorum* calyce ferè dimidiò breviori subcurvato distinctus.

CORONILLA LIBANOTICA Boiss. (Sect. *Eucoronillæ*.)

C. perennis glabriuscula, rhizomate crassiusculo lignoso, caudiculis intricatis aliis in surculos parèe foliosos aliis in caules angulato-striatos flexuosos abeuntibus, foliis sub 5jugis, foliolis sessilibus minutis ovato-obcordatis, stipulis minutissimis scariosis ovato-triangularibus liberis, pedunculis divaricatis folio axillari multoties longioribus umbellas 5-10 floras ferentibus, pedicellis calyce vix longioribus, calycis albidì scabriusculi brevissimi dentibus minutissimis, corollà carneà, vexillo alis oblongo-spathulatis vix longiori, carina alas subsuperanti valdè incurvâ attenuatâ acutâ apice atro-purpureâ, legumine longissimo inter articulos elongatos angustissimos angulatos angustato.

Hab. in *Libano* circà *Eden* ubi eam legi Julio 1846.

Species *C. varicæ* proximè accedens, ab eâ e speciminibus quæ vidi sat diversa videtur foliis 3 nec 4 2jugis, foliolis multò minoribus ob-

cordatis nec ellipticis mucronulatis, pedunculis 3-4 et fructiferis 6-7 pollices longis nec folia vix superantibus, umbellis 5-10 nec 20 floris, pedicellis calycem æquantibus nec eo triplo longioribus, floribus paulò minoribus, carinā magis incurvā, calycis dentibus multò minoribus.

ONOBRYCHIS EXPANSA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Hymenobrychis*.)

O. perennis, caulibus crassis striatis humi expansis ascendentibusque brevissimè tomentellis pilisque longioribus deflexis sparsis hirtulis, foliis sub 4 jugis, foliolis oblongo-lanceolatis acutiusculis subitis adpressè hirtulis suprā glaberrimis, stipulis triangulari-lanceolatis acutis, petiolis hirsutis, pedunculis striatis axillaribus folia multò superantibus ferè a basi laxè racemosis, calycis densè tomentosi hirsutique dentibus a basi triangulari lanceolato-subulatis tubo duplò longioribus, corollā carneā vel flavidā vividè rubro-striatā calyce plus duplò 'longiori', vexillo adpressè hirtō carinæ margine superiori rectæ inferiori angulo recto incurvæ æquilongō, alis oblongo-rhombeis valdè striatis calyce brevioribus, legumine falcato-orbiculari glaberrimo nitido dorso areolato areolis centralibus ob nervos valdè elevatos aculeatos scrobiculatis cristā latā radiato-nervosā margine denticulatā circumdatis.

Hab. in aridis propè urbem *Koniah* Lycaoniæ (Heldreich).

Planta 1 1/2-2 pedalis, foliola poll. vel sesquipollicem longa 5-6. lin. lata; flores circ. 8. lin. longi; legumen diametro 7-9 lin. latum aculeis 4-6 triangularibus validis circā foveolam centalem obsitum; denticuli cristæ marginalis lineæ 1/3 longi. Pulchra species propè *On. Pallasi* et affines collocanda sed ob fructum glaberrimum nitidum præsertim affinis *O. nitida* Boiss. quæ differt glabritie totius plantæ, corollā non striatā, legumine paulò minori centro obtusè aculeato margine crenulato nec dentato etc.

ONOBRYCHIS AURANTIACA Boiss. (Sect. *Hymenobrychis*.)

O. perennis caulibus ascendentibus crassis striatis infernè lanā densā longā patulā barbatis supernè glabris vel pilis sparsis hispidulis, foliis infimis 4-2 jugis superioribus 4-5 jugis foliolis magnis ovatis vel ovato-oblongis obtusis mucronulatis lætè viridibus firmis

suprà glaberrimis subtùs glabris vel breviter et parcissimè hirtulis, stipulis triangularibus acutis glabris, pedunculis striatis axillaribus demum longissimis laxè racemosis, calycis breviter tomentoso-canescens dentibus triangulari-lanceolatis acutis tubo sublongioribus, corollà aurantiacà concolori calyce triplò longiori, vexillo adpressè tomentello, carinà margine superiori convexà inferiori angulo recto rotundato incurvâ, alis ovato-subfalcatis acutiusculis calyce paulò brevioribus, legumine orbiculari-falcato sub lente brevissimè hirtulo nitido areolis interioribus subelavato-nervosis aculeis 4-2 sæpè evanidis obsitis, cristâ latâ radiato-nervosâ denticulis triangularibus minutissimis sæpè ferè obsoletis obsitâ legumen circumdanti.

Hab. in declivibus siccis inter *Antiochiam* et *Darkusch* ad *Orontem* in *Syria* boreali ubi legi Jun. 1846, inter *Aleppum* et *Orfa* Kotschy No. 4.

Caules 1 1/2-2 pedales, foliola 1-2 poll. longa 8-12 lin. lata, flos 7-8 lin. longus, legumen diametro 7-9 lin. latum. Pulchra species ex affinitate *On. nitida* et *galegifoliae* corollà aurantiacà districtissima.

ONOBRYCHIS PANNOSA Boiss. (Sect. *Eubrychis*.)

O. tota tomento densissimo adpresso albo pannosa acaulis, foliis omnibus radicalibus 6-7 jugis foliolis ovatis oblongisve obtusis mucronulatis vel acutis supernè pallidiùs canis, stipulis minutis liberis a basi triangulari-setaceis, racemis elongatis laxiusculis strictis pedunculo crasso folia paulò superanti suffultis, calycis parvi albotomentosi dentibus lineari-subulatis tubo subaequilongis, corollà e sicco carneâ vel lutescenti calyce triplò longiori estriata, vexillo carinâ margine superiori rectâ inferiori angulo recto rotundato curvatâ subbreviori, alis linearibus acutis rectis calyce duplò longioribus, legumine (juniori) ovato-rhombeo compresso stipitato acuto tomento denso albo setis rubris intermixto obsito.

Hab. inter *Suerek* et *Diarbekir* Kotsch. pl. Mesopotam. No 149.

Folia circ. 3 poll. longa, foliola valdè inaequalia 5-10 lin. longa 2 1/2-3 lata. Pedunculi cum racemo 6-8 pollic., flores 5-6 lin. longi. Species cujus legumen maturum adhuc ignotum est *O. oxyptera* Boiss. Diaga. VI proximè affinis quæ differt indumento sericeo, foliis 3-4 jugis, calyce ferè duplò majori, alis subulato-attenuatis, legumine longissimo albo-lanato.

ONOBRYCHIS ARGYREA Boiss. (Sect. *Eubrychis*.)

O. perennis tota adpressissime sericeo-argyrea, radice crassa lignosa caules teretes substriatos pumilos edenti, foliis radicalibus caulisque paucis brevibus 3-4 jugis, foliolis ovato-orbiculatis obtusis mucronulatis utrinque sericeis nitentibus, stipulis lineari-setaceis sericeis, racemis brevibus latiusculis pedunculo folium æquanti vel superanti suffultis, calycis sericei dentibus e basi triangulari setaceis tubo sublongioribus, corollâ e sicco estriatâ roseâ calyce quadruplò longiori, vexillo adpressè hirtò carinam margine superiori rectam inferiori rotundato-incurvam apice brevissimè attenuatam æquanti, alis linearibus apice attenuatis calyce duplò longioribus, legumine stipitato falcato-subsemilunari compresso margine exteriori convexo hemisphærico inferiori breviori convexiusculo totò breviter tomentello pilisque longioribus hirsuto, ad discum areolato parçè et breviter aculeato ad marginem setis aculeiformibus diametrum suum dimidiùm æquantibus radiatim cincto.

Hab. in *Cappadociâ ad Euphratem* Aucher N° 1053.

Pulchra species indumento serieo foliolisque rotundis ab *O. lunata heliocarpâ* et *ornatâ* Willd. diversa. Pro ultimâ plantâ eam habueram donec comparaverim spec. authenticum *O. ornata* herb. Willd. in quo foliola cuspidata sunt utrinque pilis adpressis vix grisea, flores dimidiò majores, caules longiores parçè et patulè hirsuti, fructus longius hirsuti obsolete foveolati.

ONOBRYCHIS PISIDICA Boiss. (Sect. *Eubrychis*.)

O. perennis multicaulis, caulibus elatis crassis teretibus striatis pilis erecto-patulis canescentibus villosissimis, foliis 40-43 jugis, foliolis elliptico-linearibus acutiusculis suprâ adpressè hirtis virescentibus subtus densè canescenti-sericeis, stipulis membranaceis adpressè hirsutis in unam oppositifoliam bidentatam breviter connatis dentibus longè triangulari-subulatis, pedunculis longis folia multò superantibus, spicis longis cylindricis laxiusculis, calycis hispidi dentibus a basi breviter triangulari setaceis plumosis tubo quadruplò longioribus corollâ roseâ vix brevioribus, vexillo carinâque striatis subæquilongis, alis tubo calycino duplò longioribus lineari-oblongis breviter stipitatis, legumine calycis dentibus superato semiorbiculato complanato latere interiori recto exteriori convexo toto hirsuto ad discum foveolato mu-

tico vel aculeis 4-2 brevibus obsito, foveolâ centrali oblongâ aliis duplò majori, cristâ disco angustiori breviter 4-5 denticulatâ.

Hab. in campis arenosis planitie *Isbarta* in Pisidiâ (Heldreich.)

Radix verticalis longa, caules 2-3 pedales, foliola 8-9 lin. longa 1 1/2-2 lata, spicæ 2-3 pollicares, flores circ. 5 lin. longi., legumen 3 lin. longum latumque. Propè *O. lasiostachyam* collocanda ab eâ et toto grege *On. sativæ* distincta caulibus crassis villosissimis, foliis subtùs sericeis.

Planta e monte *Gheidagh* Tauri Isaurici sub *O. montanâ* var. in Heldr. pl. Anat. distributa est forma virescens *O. Cadmeæ* ab omnibus *O. montanæ* formis facilè distinguendæ dentibus tubo calycis triplò brevioribus aculeisque cristæ leguminis longis basi latè triangularibus nec brevibus subulatis. *On. sativa* var. *scardica* Griseb. Spic. ex proportionem dentium calycis ad *O. montanam* rectè spectare videtur.

OMBRYCHIS GÆRTNERIANA Boiss. (Sect. *Eubrychis*.)

O. annua, caulibus prostratis parè et patulè hispidulîs, foliis 8-9 jugis, foliolis parvis oblongo-cuneatis truncatis vel obcordatis suprâ glabris subtùs junioribus præsertim adpressè canescentibus, stipulis ovatis membranaceis hirtulis in unam oppositifoliam apice bifidam coalitis, pedunculis bifloris folio axillari subbrevioribus, calycis adpressiusculè hirsuti dentibus lanceolatis apice longè subulatis tubo 4-5 plò longioribus, corollâ roseâ calycinis dentes paulò superanti, vexillo emarginato carinam paululum superanti, alîs oblongis carinam æquantibus, legumine dentibus calycinis longiori semiorbiculato ad latus interius recto ad exterius convexo, disco areolato scrobiculato adpressissimè et sparsim hirtulo parè aculeato, cristâ planissimâ legumini subæquilatâ ad basin usquè in tres lacinas oblongas obtusas utroque margine 3-4 denticulatas sinibus latis sejunctas divisâ.

Hab. in Palæstinâ circâ *Hierosolumum* et *Nazareth* ubi legi vere 1846.

On. cristagalli Gærtn. 2 tab. 148-DC. Prodr. et herb.† non L.

Corollâ 4-5 lin. longa, legumen cum cristâ 6-7 lin. longum, cristæ lobi tres lineas longi basi sesquilineam lati. Hæc species ab auctoribus citatis aliisque confusa fuit cum *O. cristagalli* L. Fl. Græcâ tab. 724 verâ quæ in Græciâ crescit et quam in Palæstinâ quoque legi; hæc distinguitur foliolis dimidiò angustioribus linearibus retusis, floribus

dimidiò minoribus pallidè carneis 3 lin. longis, corollà dentibus calycis subbrevisiori, petalis omnibus æquilongis, leguminis patulè hirsuti disco crebrè aculeato cristà duplici triplicive in lacinias lanceolatas acutissimas dentatas diametro disci longiores fissà. Phrasis Linnæi hanc laciniarum formam optimè exhibet. *On. Gartnerianæ* varietas subsequens adjungenda.

β. *brachylopha*. — Flores paulò minores Leguminis cristà diametro discidi midio brevior.

Hab. in aridis Persiæ australis propè *Gere* inter *Abuschir* et *Schiraz* Kotschy N° 60 sub. *On. æquidentatà*.

Eam priùs erroneè habui pro *O. æquidentatà* Urv. quæ laciniiis cristæ triangularibus integerrimis ab utrâque differt et quæ eadem est ac *O. Cretica* Desv. Journ. Bot. 3. p. 23 (in Prodr. Cand. per lapsum calami *cristata* dicta).

SARTORIA Boiss. et Heldr.

Calyx brevis obconicus dentibus 5 setaceis tubo sublongioribus. Corolla calyce multò longior. Vexillum retusum infernè attenuatum. Carina obtriangularis elongata margine superiori recta inferiori angulo recto incurva breviter stipitata lobo brevi ad stipitis originem instructa. Alæ breviter stipitatæ lineari-oblongæ obtusissimæ lobo ad apicem stipitis auctæ liberæ dimidià carinà paulò longiores. Stamina diadelphæ stylusque abruptè infracti. Legumen planissimum oblongo-lineare papyraceum breviter attenuato-stipitatum indehiscens non articulatum dispermum uniloculare ad suturas non incrassatum nervulis transversis anastomosantibus tenuiter reticulatum. — Suffruticulus alpinus Anatolicus facie *Hedysari*. — Genus dicatum cl. D. Sartori de florà classicà Græciæ optimè merito qui plures hujus pulchræ regionis partes peragravit et plantas multas Linkio, Zuccarinio pluribusque aliis communicavit. Inter *Onobrychidem* et *Hedysarum* exactè intermedium ab eis caractere carpologico tantum discedens id est legumine nec ut in priori monospermo subrotundo vel orbiculariter falcato facie plus minus scrobiculato suturâ superiori incrassato nec ut in *Hedysaro* articulado sinuato-strangulato. *Eversmannia* eodem fructus caractere gaudet sed differt facie diversissimâ legumineque apodo flexuoso tandem suturis persistentibus vel valvatim vel in articulos transversos irregulariter secedenti.

SARTORIA HEDYSABOIDES Boiss et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.

S. perennis tota setulis adpressissimis canescens griseo-virens,

rhizomate lignoso caespitoso, caulibus brevissimis rectis angulato-sulcatis, pedunculis 1-2 ex axillis supremis foliis et caule ipso longioribus, foliis radicalibus caulinisque bijugis foliolis orbiculatis ovatisve obtusissimis crassiusculis supra concaviusculis pallidioribus, stipulis membranaceis rufescentibus in unam oppositifoliam triangularem apice bidentatam coalitis, racemis ovato-oblongis 12-16 floris terminalibus, pedicellis calyce subbrevioribus bracteolâ setaceâ suffultis, calycis adpressè hirti dentibus a basi breviter triangulari angustè setaceis inferiori demum patulo-subrecurvo, corollâ roseâ estriatâ calyce triplò longiori, legumine adpressissimè et parcè setuloso latitudine suâ triplò longiori apice rotundato mucronulato.

Hab. in pascuis siccis montium ad orientem jugi *Gheidagh* sitorum in *Tauro Isaurico* alt. circ. 5000' (Heldreich).

Caulis cum pedunculo et racemo 3-6 pollic., foliola majora 3-4 lin. longa, flos 5 lin. longus, legumen cum stipite lineari calycem excedenti 10 lin. longum 3 latum.

HEDYSARIUM KOTSCHY Boiss. (Sect. *Echinolobium*.)

H. totum pilis adpressissimis canescens, caulibus elatis striatis flexuosis jam e parte mediâ pedunculos axillares subdivaricatos folio duplò longiores edentibus, foliis remotiusculè 5-7 jugis, foliolis ellipticis obtusis pedicellatis utrinquè adpressè hirtis, stipulis membranaceis setaceis minimis infimis inter se basi membranâ semicirculari connatis, racemis oblongis densis tandem elongatis laxis, pedicellis calyci æquilongis basi bracteolâ caducâ obsitis, calycis adpressè canescentis dentibus e basi triangulari setaceis tubo vix longioribus, corollâ luteâ calyce quadruplò longiori, vexillò glaberrimo carinâ angulo obtuso infractâ quintâ parte breviori, alis angustè linearibus calyce subtriplò longioribus vexillo brevioribus, legumine biarticulato vel sæpiùs articuli alterius abortione uniarticulato articulo compresso oblongo subobliquo basi attenuato acutiusculo areolato rugoso tomento albo denso brevi cano setisque longis flavidis hirtis obsito.

Hab. in *Assyriâ* circa *Diarbêkir* Kotschy N° 260.

Caulis 1 1/2-2 pedalis, foliola majora 7-8 lin. longa 3-3 1/2 lin. lata,

flores circ. 6 lin. longi. Articuli leguminis 6-8 lin. longi. Affine *H. pogonocarp* et *Aucheri* quorum prius indumento tomentello, floribus minoribus, carinā angulo acuto incurvā, alis calyce non longioribus, posterius vexillo hirtō alisque carinæ æquilongis differunt.

HEDYSARUM ATOMARIUM Boiss. (Sect. *Echinolobium*.)

H. caulibus ascendentibus rubellis teretibus sub lente pilis sparsis adpressissimis hirtulis in dumos amplos aggregatis, foliis 5-6 jugis, foliolis amplis ovatis vel oblongis obtusissimis vel retusis snprā glabriusculis sub lente crebrè et minutissimè punctulatis subtus sparsim et adpressissimè setulosis lætè virentibus, stipulis fuscis in unam triangularem longè bidentatam oppositifoliam coalitis, pedunculis ex axillis superioribus paucis foliis æquilongis, racemis densis ovatis dein oblongis, pedicellis calyce dimidiò brevioribus bracteolatis, calycis adpressè hirti dentibus lanceolato-subulatis tubo sesquilongioribus, corollā roseā calyce triplò longiori, vexillo glabro carinam angulo recto rotundato subtus incurvam vix superanti, alis angustè linearibus subincurvis carinā paulò brevioribus, legumine triarticulato breviter hirtō, articulis planis ovato-rotundis disco tenuiter reticulato-venosis sæpè parcè tuberculato-echinulatis margine ob nervos prominentiores rugulosis.

Hab. in declivibus siccis planitiei elevatae ad meridiem et orientem *Antiochiæ* inter hanc urbem et *Darkusch* sitæ, legi Jun. 1846.

Caules 1-2 pedales, foliola 9-11 lin. longa 5-6 lata, flores 6-9 lin. longi, legumen deflexum suturā superiori crassiori rectiusculum inferiori inter articulos sinuatum 10-12 lin. longum 3 latum. Ab affnibus *H. Lydio* et *callichroo* differt foliolis duplò majoribus obtusissimis glabrescentibus, spicis densioribus. Forsan tamen illas species inter se nimis affines esse formæ novæ intermediæ detectæ demonstrabunt.

HEDYSARUM DUMETORUM Boiss. et Heldr. (Sect. *Echinolobium*.)

H. pilis albis adpressissimis canescens, caulibus virgatis angulato-striatis ascendentibus, foliis 7-8 jugis, foliolis utrinquè parcè et adpressissimè hirtis pallidè virentibus subsessilibus ellipticis acutis crassiusculis, stipulis rufescentibus in unam oppositifoliam longiusculè bidentatam brevem coalitis, pedunculis 2-3 ex axillis superioribus folio longioribus, racemis oblongis laxiusculis, floribus pedicello calyce

sublongiori suffultis, calycis adpressè hirti dentibus triangulari-setaceis tubo subæquilongis, corollâ calyce quintuplò longiori, vexillo purpureo retuso carinam subtùs angulo recto rotundato infractam flavescensem margine purpurascentem subsuperanti, alis purpureis carinâ paulò brevioribus, ovario triarticulato adpressè cano lævi, legumine...

Hab. in dumosis inter *Ghelindost* et *Karagatch Pisidiæ* (Heldreich).

H. Lydium var. *versicolor* Heldr. pl. Anat. exs.

Caules pedales, foliola 6-7 lin. longa 2 lata, flores 7-8 lin. longi. Species elegans habitu *H. Lydii*, *callichroi* et sp. præcedentis, ab eis omnibus statim dignoscenda calycis dentibus tubo æquilongis nec eo 2-3plò longioribus, floribus longiùs pedicellatis. *H. Syriacum* quod eodem calycis caractere gaudet habet folia trijuga, foliola obtusa, ovarium glabrum vel margine obsolete et brevissimè hirtulum.

HEDYSARUM PESTALOTZÆ Boiss. (Sect. *Echinolobium*.)

Hab. basi suffrutescens totum pilis brevissimis lente tantùm perpicuis adpressissimis obsitum, caulibus procumbentibus ascendentibusve tenuibus teretibus duris, foliis 7-8 jugis, foliolis minimis èlliptico-linearibus obtusis crassis suprâ ob marginem subrevolutum concaviusculis lætiùs infrâ obscuriùs virentibus, stipulis in unam oppositifoliam bipartitam brevissimam coalitis, pedunculis ex axillis superioribus folio longioribus, racemis oblongis laxiusculis, pedicellis rectis post anthesin non deflexis calycino tubo æquilongis, calycis adpressè hirti dentibus triangulari-lanceolatis tubo æquilongis, corollâ roseâ calyce quadruplò longiori, vexillo glabro carinâ angulo rotundato obtuso incurvâ vix longiori, alis oblongo-linearibus carinâ paulò brevioribus, ovario parcè et adpressè hirtulo, legumine...

Hab. in *Lyciâ* propè *Elmalu* (Pestaloza).

Caules 6-8 pollic., foliola 2-3 lin. longa 4-4 1/2 lata, flores 6 lin. longi. Planta ab affnibus *H. vario*, *Syriaco* et *dumetorum* distincta floribus foliolisque multò minoribus, etc.

HEDYSARUM LEUCOCLADUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Echinolobium*.)

H. basi suffrutescens totum adpressissimè canum, caulibus pumillis, foliis 10 jugis, foliolis oblongo-èllipticis utrinquè canis obtusis crassiusculis suprâ concaviusculis, stipulis canis in unam brevem opposi-

tifoliam profundè bipartitam coactis, pedunculis folio 2-3 plò longioribus divaricatis, racemis tenuibus strictis oblongis laxiusculis, pedicellis tubo calycis brevioribus, calycis cani dentibus triangularibus acutis tubo brevioribus, corollà purpureà calyce quadruplò longiori, vexillo parcè hirtulo carinà angulo recto rotundato incurdà subbreviori, alis oblongis vexillo subbrevioribus, ovario adpressè canescenti, legumine.....

Hab. in collibus *Pisidiæ* propè *Bouldour* (Heldreich) fl. Maio.

Planta semipedalis, caulibus imà basi ramosis divaricatis, foliola 2-2 1/2 lin. longa, flores 6 lin. longi. Valdè affine *H. Pestalozzæ* a quo differt indumento cano, foliis plurijugis, spicis laxioribus, dentibus calycinis brevioribus.

TAVERNIERA ÆGYPTIACA Boiss.

T. caulibus basi suffruticosis strictè et subdichotomè ramosissimis ramisque striatis virgatis subnudis scopariis glabrescentibus, foliis unifoliolatis breviter petiolatis, foliolo sparsim et adpressissimè setoso subtùs griseo supernè pallidè virenti obovato vel retuso basi subcuneato, pedunculis axillaribus brevissimis petiolum vix superantibus 4-2 floris, pedicello calyce breviori, calycis adpressè hirti obconici dentibus lanceolatis acutis tubo sublongioribus, corollà..... legumine (an semper?) unarticulato articulo ovato hirtulo tenuiter et crebrè echinulato.

Hab. in *Ægypto superiori* ad mare *Rubrum* cl. Prof. Husson.

Pedalis, foliola 5-6 lin. longa apice 3 lata. Legumen stipitatum 3 lin. longum 2 latum. Planta e specimine valdè imperfecto descripta approximanda *T. nummulariæ* quæ differt foliis orbiculatis, pedicellis gracilibus elongatis.

ALHAGI TURCORUM Boiss.

A. caulibus herbaceis ramosissimis, ramis spinisque junioribus pilis sparsis adpressiusculis hirtulis tandem glabris, foliis ellipticis obtusis in petiolum brevissimum attenuatis primùm utrinquè adpressè hirtis demùm glabris, spinis inferioribus nudis brevibus folio axillari brevioribus superioribus tenuissimis longè acerosis folia axillaria multò superantibus, floribus secus spinas superiores 3-8 laxè racemosis, calycis sub lente parcè et breviter hirti dentibus brevibus triangularibus

acutis, floribus purpureis, vexillo carinā obovatā subtus rotundatā sublongiori, alis oblongo-linearibus carinā subbrevioribus, ovario angustē lineari recto glaberrimo, legumine...

Hab. in *Asiā minori* ad *Koniah* (Heldreich), *Syriā ad Beyrout* (Boiss.), *Mesopotamiā* Kotschy N° 406.

Habitus *A. camelorum* quod quoque ovario glaberrimo gaudet sed differt ramulis spinulisque tenuioribus, calycis dentibus obtusissimis ferē obsoletis. *A. maurorum* L. ex *Ægypto* cui probabiliter planta ex *Arabia petrea* Schimper N° 563 adnumeranda est sic definiendum.

ALHAGI MAURORUM L.

A. caulibus ramosissimis spinosissimis ramis spinisque sub lente breviter et densiusculē puberulis, foliis oblongis obtusis parvis puberulis in petiolulum attenuatis, spinis crassis basi substriatis longē attenuato-acerosis folio axillari multō longioribus, floribus in parte inferiori spinæ solitariis rariis binis, calycis adpressē hirtuli dentibus breviter triangulari-ovatis obtusis, corollā...; ovario adpressē sericeo, legumine tomentello lineari-cylindrico subincurvo 3-5 spermo inter semina irregulariter substrangulato.

Halhagi Desv. Journ. bot. 3 tab. 4 fig. 4. — *Alhagi* Tournef. tab. 489 ex iconis imperfectione et loco non indicato inter omnes species dubium.

ALHAGI GRÆCORUM Boiss.

A. caulibus herbaceis ramosissimis spinosissimis, ramis spinisque præsertim junioribus patulē et densē tomentellis canescentibus, foliis oblongis obtusis in petiolulum attenuatis junioribus utrinquē argyreosericeis tandem canescentibus, spinis crassis longē attenuato-acerosis folio axillari multō longioribus, floribus in parte inferiori spinæ solitariis vel binis, calycis adpressē hirsuti dentibus breviter triangularibus acutiusculis, corollā purpureā, vexillo carinā obovatā subtus rotundatā paulō longiori, alis oblongo-linearibus carinā subbrevioribus, ovario sericeo lineari, legumine (ex Sibth) glabrescenti lineari-cylindrico 6-7 spermo in articulos 5-7 suturā inferiori inter semina strangulato.

Hab. in *Atticis* ad *Suntium* promontorium et *Phalerum* (Spruner! Heldreich!), insulā *Syra* (Boiss. Heldr.) *Samo* (Sibth.)

Hedysarum Alhagi Sibth. pl. Græc. tab. 720.

Ab *Alhagi Maurorum* egregiè diversum ramis crassioribus, indumento copioso tomentello nec raro lenteque tantùm conspicuo, dentibus calycis acutioribus, legumine paulò tenuiori magis strangulato.

ERVUM BIEBERSTEINII Guss. var. *Hymettia* Boiss. et Heldr. — Humilior, pedunculi 1-2 nec 4-6 flori, legumen 4 nec 5-6 spermum.

Hab. in monte *Hymatto* Atticæ (Spruner! Boiss.!) montibus ad *Smyrnam* (Boiss.!).

Legumen 5-6 lin. longum sesquilineam latum. Primum ab *E. Biebersteinii* hanc plantam specificè differre credidi sed specimina a cl. Heldreich in Cretæ prov. *Sphakia* lecta et inter ambo intermedia meam tantùm varietatem esse docuerunt.

ERVUM CYANEUM Boiss. et Hohen. in pl. Kotsch. Pers. bor. 1846. (Sect. *Lens*.)

E. annuum totum patulè hirtum canescens, caulibus pumilis angulatis, foliis brevibus approximatis 3-4 jugis, foliolis ellipticis obtusis, petiolo planiusculo aut foliolo impari aut rariùs mucronulo brevissimo terminato, stipulis oblongo-lanceolatis acutiusculis integerrimis, pedunculis bifloris folio vix longioribus aristatis, pedicello calyci subæquilongo, calycis hirsuti laciniis lanceolatis tubo duplò longioribus corollà intensè cæruleâ brevioribus, stylo apice dilatato latere superiori pilosulo, legumine subrhombeo glabro 1-2 spermo.

Hab. in glaucosis montis *Elbrus* propè *Derwend* Kotschy N° 93.

Specimina mea tripollicaria, folia 5-6 lin. longa, flores et legumina magnitudinis eorum *E. nigricantis* cui nostra species accedit sed quod differt stipulis basi dentatis calycis laciniis setaceis corollæ æquilongis.

ERVUM ORIENTALE Boiss. (Sect. *Lens*.)

E. annuum adpressiusculè hirtulum, caulibus pumilis angulatis, foliis brevibus approximatis 3-4 jugis, foliolis ovatis ellipticisve obtusis, petiolo in mucronulum vel foliolum impar abeunti, stipulis ovato-oblongis integerrimis acutiusculis, pedunculis 1 rariùs bifloris aristatis flore longioribus, pedicello calyce paulò breviori, calycis adpressiusculè hirti dentibus lanceolato-subulatis tubo triplò longioribus corol-

lam cæruleam subsuperantibus, stylo apice dilatato latere superiori pilosulo, legumine subrhombeo glabro dispermo.

Hab. in montanis lapidosis totius Orientis, *Cadmi* suprâ *Colossam* in *Anatoliâ* (Boiss.) *Antilibani* circâ *Rascheya* (Boiss.), *Persie australis* propè *Gere* inter *Abouchir* et *Schiraz* Kotschy N° 59 sub. *E. nigricanti*.

Simillimum *E. cyaneo* et *E. nigricanti* pro quo diù habui et inter ea intermedium. Species prior differt indumento densiori, corollâ majori, calyce manifestè longiori; posterior distinguitur stipulis basi denticulatis.

VICIA DURANDI Boiss.

V. perennis?, parçissimè et adpressè pilosula, caulibus tenuibus angulatis scandentibus, foliis brevibus 4jugis, foliolis ellipticis basi et apice rotundatis mucronulatis, petiolo in cirrhum simplicem vel ramosum abeunti, stipulâ semisagittatâ laciniis nervulosis lanceolatis cuspidatis alterâ denticulo basilari sæpe auctâ valdè divaricatis stipulam indivisam horizontalem rectam transversè linearem simulantibus, pedunculis 1-2 ex axillis supremis ortis folio paulò longioribus 2-3 floris, pedicellis calycis tubo æquilongis, floribus magnis, calycis patulè hirtuli campanulati basi gibbi obsoletè labiati dentibus triangulari-lanceolatis subæquilongis tubo subbrevioribus superioribus sursùm subcurvatis, corollâ e sicco flavidâ calyce plùs triplò longiori, vexilli laminâ ovatâ retusâ sursùm angulo recto curvatâ ungue longiori alas superanti, carinâ brevi valdè et rotundatim subtus curvatâ alis breviori, stylo angulo subacuto infracto apice undiquè sed latere superiori longiùs hirsuto, legumine (juniori) lineari recto 11-14 ovulato.

Hab. in *Mauritaniâ* ad *Tingidem* Durand in herb. Pavon nunc meo.

Caulis in specim. meo pedalis, folia cum cirrho 1½-2 pollic., foliola 6 lin. longa ferè 2 lata, stipulæ 3-3 ½ lin. longæ angustæ, flores valdè curvati *Lathyri* vel *Orobi*, vexillum 7 lin. longum. Pulchra et distincta species nulli propiùs affinis propè *V. glaucam* collocanda.

VICIA PALÆSTINA Boiss.

V. annua parçissimè sub lente hirtula, caulibus teneris tenuibus angulatis, foliis 5-9 jugis petiolo simplici vel ramoso-terminatis, foliolis viridibus linearibus acutis vel apice rotundatis mucronulatis sæpiùs

alternis, stipulis minutissimis infimis semisagittatis integris superioribus oblongis acutis integris vel lobulo laterali auctis, pedunculis axillaribus tenuibus folio 2-3 plò brevioribus 2-4 floris muticis, pedicellis calyci æquilongis, floribus minutis tandem deflexis, calyce parcè et adpressè hirtulo bilabiato, labii superioris dentibus triangularibus brevibus latis sursùm subrecurvis, labii inferioris paulò longioris dentibus triangularibus lanceolatis tubo calycis æquilongis, corollà cæruleà calyce triplò longiori, vexillo glabro apice truncato retuso carinam superanti, stylo apice circumcercà æqualiter piloso, leguminibus glabris lineari-subrhombeis stipitatis obliquè mucronatis dispermis, seminibus subcompressis nigricanti velutiniformibus, hilo peripheriæ extam partem occupanti.

Hab. in rupestribus umbrosis *Palæstinæ* circà *Kuriet el Enab*, *Hierosolymam*, montem *Ithaburem* etc. (Boiss.)

Caulis 4-4 1/2 pedales, foliola 7-40 lin. longa 4 lata, legumen 8-40 lin. longum 3 aut paulò ampliùs latum, flores magnitudinis eorum *V. dispermæ* quæ ut et *V. Bivonæ* affines statim a nostrâ specie dignoscuntur dentibus calycinis lanceolato-setaceis tubo duplò longioribus.

VICIA MICROPHYLLA d'Urv. Enum. DC. Prodr.

V. annua tota breviter et patulè puberula, caulibus angulatis filiformibus tenuissimis debilibus abbreviatis inter suffrutices intricatis basi ramosissimis, foliis brevibus 4-5 jugis, foliolis minutis ovatis oblongisve brevissimè petiolulatis obtusis mucronulatis petiolo planiusculo in cirrhum brevem ramosum abeunti, stipulis minimis semisagittatis bifidis integris acutis superioribus substipitatis, pedunculis gracilibus incurvis folio axillari subduplò longioribus laxè et secundè 4-6 floris, pedicellis brevissimis, calyce basi gibbo breviter tubuloso parcè et adpressè hirtulo bilabiato labio superiori bidentato dentibus triangularibus acutis, inferiori longiori tridentato dentibus lanceolato-subulatis tubo æquilongis, corollà intensè violaceà concolori calyce triplò longiori, vexilli sublinearis supernè subdilata alis paulò longioris laminà ab ungue indistinctà, carinà apice atro-purpureà vix incurvâ margine inferiori rotundatâ alis breviori, stylo angulo obtuso infracto apice latere interiori tantùm barbato, legumine compresso oblongo-rhombeo sub 4 spermo, seminibus atris velutiniformibus compressiusculis, hilo peripheriâ seminis decuplò breviori.

calycis hirtuli nervosi campanulati basi gibbi labio superiori brevissimo dentibus 2 brevibus latis triangularibus ascendentibus, labio inferiori in dentes e basi triangulari subulatos tubo æquilongos divisio, corollâ calyce plus triplò longiori atro-violaceâ, vexilli alas multò superantis laminâ subrecurvâ ungue paulò breviori, alis vexillo subpallidioribus carinam subtùs acutè angulatam valdè superantibus, stylo angulo recto incurvo apice circumcìrcà piloso, leguminibus lineari-rhombeis 3-4 spermis basi attenuatis apice rostrato-attenuatis, semine fusciscenti velutiniformi, hilo peripheriâ octuplò breviori.

Hab. in sylvaticis regionis inferioris montis *Cassii* in Syriâ boreali. Legi Jun. 1846.

Planta 3-4 pedalis, foliola 5-6 lin. longa 4 $\frac{1}{2}$ -2 $\frac{1}{2}$ lin. lata, flores 9 lin. longi, legumen 12-15 lin. longum 3 $\frac{1}{2}$ latum.

VICIA PINARDI Boiss.

V. annua sub lente parcè adpressè et breviter hirtula vel glabrescens, caulibus tenuibus elatis angulatis scandentibus, foliis 4-5 jugis, foliolis alternis linearibus 3-5 nerviis apice in mucronulum brevissimè attenuatis, petiolo in cirrhum ramosum abeunti, stipulis inferioribus parvis semisagittatis cuspidibus valdè divaricatis superioribus magnis ovatis vel oblongis in stipitem basi attenuatis acutis nervulosis alterâ dente laterali sursùm auctâ, pedunculis laxè 5-6 floris folio paulò longioribus, pedicello filiformi calyci æquilongo erecto-patulo, calycis parcissimè hirti basi valdè gibbi labio superiori brevissimo dentibus binis brevibus latè triangularibus ascendentibus, inferiori in dentes a basi triangulari subulatos tubo breviores divisio, corollâ calyce quadruplò longiori, vexillo cæruleo alis multò longiori laminâ subreflexâ ungue paulò longiori, alis pallidis carinam subtùs angulo obtuso manifestè angulatam superantibus, stylo angulo acuto infracto apice circumcìrcà piloso, legumine (juniori) oblongo-rhombeo utrinquè longè attenuato.

Hab. in *Cariâ* vel in *Lyciâ* (Pinard).

Species cum præcedenti multis congruens notis et a me pro hujus varietate priùs habita differt tamen foliolis non retusis sed apice attenuatis, stipulis supremis duplò majoribus, pedicellis tenuioribus calyci æquilongis, florum colore diverso, carinâ subtùs magis angulatâ. *V. Cassia* et *V. Pinardi* inter *V. onobrychioidem* et *V. calcaratam* ferè intermediæ sunt quarum prior pedunculis longissimis, pedicellis

brevissimis, stipulis dentatis, hilo longissimo, posterior pedunculis paucifloris aristatis, corollâ lineari, carinâ elongatâ vix curvatâ etc. differunt.

VICIA GREGARIA Boiss. et Heldr.

V. perennis multicaulis tota pilis erecto-patulis villosa flavescenti-grisea, caulibus rectis acutè angulatis striatisque, foliis approximativè 8-10 jugis, foliolis linearibus infimorum obtusiusculis superiorum acuminatis acutissimis, petiolo suprâ plano subtus angulato-carinato in cirrhum brevem simplicem abeunti, stipulis magnis oblongis semisagittatis cuspidatis laciniâ exteriori lanceolatâ acutâ brevi, pedunculis et axillis superioribus folio paulò brevioribus racemos secundos densiusculos 8-10 flores ferentibus, pedicellis tubo calycis subæquilongis, calycis villosi campanulati dentibus subæquilongis triangulari-lanceolatis tubo paulò brevioribus, corollâ violaceâ rarius albâ, vexilli emarginati alas superantis laminâ subreflexâ ungue breviori, carinâ alis breviori subtus angulo recto rotundato curvatâ apice acutiusculâ, stylo circumcinctâ sed extus copiosius barbato, legumine oblongo subrhombico longè stipitato utrâque facie vel sæpius tantum margine piloso 1-2 spermo, seminis hilo sextam ejus peripheriam occupanti.

Hab. in regione superiori montis *Gheidagh Tauri Isaurici* alt. 5000'-7000' gregariè crescens totumque jugum e longinquo tapete violaceo obtegens (Heldreich).

V. canescens Labill. var. *angustifolia* B. et H. in Heldr. pl. Anat. exs.

Caules pedales, foliola 10-12 lin. longa 2 lata, flores 10-12 lin. longi, legumen stipite ferè 3 lin. longo suffultum pollicare 4 lin. latum infernè angustatum. Hanc speciem prius pro varietate *V. canescens* habueram quam in Libano vivam postea observavi et quæ longè differt indumento sericeo densissimo, foliis ecirrhosis foliolo impari donatis. Nostra species magis affinis est *V. Persicæ* a quâ tamen benè dignoscitur foliolis non oblongo-ellipticis longioribus angustioribus acutius acuminatis, stipulis amplioribus, carinâ subtus rotundatâ nec angulatâ.

Viciæ sp. ex monte *Demawend* in Kotschy pl. Pers. bor. sub N° 343 ut var. *albiflora* V. *Aucheri* edita accuratiori examini subjecta ab hac specie in eadem collectione sub N° 386 occurrenti differt stylo supernè undiquè nec lateribus et margine inferiori tantum barbato, legumineque ciliato facie glabro nec undiquè piloso et ad *V. Persicam* Boiss. ut forma carinâ concolori donata adnumeranda est.

VICIA CILICIA Boiss.

V. perennis tota tomento denso adpressiusculo subsericeo flavido-canescens, caulibus angulatis erectis, foliis approximativè 6-7 jugis cum impari, foliolis lato-linearibus apice obtusis vel retusis, stipulis magnis acutis inferioribus oblongo-semisagittatis laciniâ inferiori triangulari brevi superioribus oblongis integris, pedunculis villosis folio æquilongis racemum secundum densum 8-10 florum ferentibus, pedicellis tubo calycis brevioribus, calycis villosio-flavidi campanulati dentibus subulatis tubo paulò brevioribus, corollâ calyce triplò longiori e sicco pallidè violaceâ, vexilli laminâ ungue paulò breviori subreflexâ alis paulò longiori, carinâ apice atro-violaceâ subtus angulato-recurvâ alis paulò breviori, stylo angulo recto infracto supernè undiquè sed extus longius hirsuto, ovario densè rufescenti-piloso sericeo.

Hab. in *Tauro Cilicio* Kotschy N° 150.

Foliola pollicaria 2 lin. lata, flores magnitudinis *V. canescentis* cui accedit foliis foliolo impari donatis sed a quâ eximiè differt foliolis truncatis vel retusis nec acutiusculis, dentibus calycis subulatis nec triangulari-lanceolatis.

VICIA SIBTHORPI Boiss.

V. perennis tota densè et adpressiusculè villosio-canescens, caulibus prostratis angulatis ramosis, foliis approximativè 8-10 jugis, foliolis utrinquè villosis ellipticis parvis infimorum obtusis mucronulatis cæterorum acutis, petiolo in cirrhum simplicem brevem abeunti, stipulis parvis acutissimis infimis angustè lanceolato-semisagittatis laciniâ basilari minimâ cæteris angustissimè lineari-subulatis integris, pedunculis crassis folio 3-5 plò longioribus racemum longum secundum tandem laxiusculum ferentibus, pedicellis calycis tubo brevioribus, calycis villosi breviter campanulati cærulescentis labio superiori brevissimo inferiori longiori dentibus omnibus triangularibus vel triangulari-lanceolatis tubo brevioribus acutis, corollâ lineari violaceâ calyce quadruplò longiori, vexilli laminâ emarginatâ alis vix longiori subreflexâ ungue ferè dimidiò breviori, carinâ rectiusculâ extremitate rotundatâ atro-violaceâ alis multò breviori, stylo angulo obtuso infracto apice circumcircuità barbato, leguminibus 6-8 spermis lineari-rhombeis apice basique attenuatis stipitatis.

Vicia polyphylla Fl. Græc. tab. 699 non Desf.

Hab. in dumosis et agris derelictis totius Græciæ, in Atticâ, Argolide (Spruner) et probabiliter quoque in Asiâ minori.

Caules pedales longioresque, foliola 4-6 lin. longa 2 lata, flores 6 lin. longi; habitus *V. villosæ* a quâ longè differt radice perenni aliisque notis. *V. Gerardi* et *V. polyphylla* quoque perennes differunt indumento adpressissimo, foliolis multò majoribus longioribus, calycis dentibus apice attenuato-subulatis, laminâ vexilli ungui æquilongâ etc.

VICIA VENULOSA Boiss. et Hohen. in Kotsch. pl. Pers. bor. exs. 1846.

V. perennis viridis lucida sub lente minutè et adpressissimè puberula, caulibus acutè angulatis flexuosis scandentibus, foliis remotè 3-4jugis, foliolis pedicellatis amplis ovatis basi rotundatis acutiusculis mucronulatis venulis crebris subtùs elevatis percursis, petiolo in cirrhum validum ramosum abeunti, stipulis semisagittatis transversis inferioribus basi 3-4 denticulatis, pedunculis petiolo subæquilongis apice racemum brevem subsecundum 5-7 florum ferentibus, pedicellis cernuis crassiusculis calycis tubo plùs duplò brevioribus, calycis tubo-losò-campanulati adpressiusculè hirsuti dentibus triangulari-lanceolatis tubo triplò brevioribus, corollâ carneo-flavidâ cæsiâ calyce 3-4plò longiori, vexilli alis sublongioris laminâ reflexâ ungue breviori, carinâ apice atro-violaceâ rotundato-incurvâ alis breviori, stylo angulo incurvo infracto apice circumciscâ hirtulo, legumine oblongo-lineari glabro apice rotundato mucronulato basi attenuato-stipitato 2-3 spermo.

Hab. in rupestribus propè *Kolachtschal* montis Elbrus propè *Derwend* Kotschy N° 233.

Caules 1 1/2-2 pedales, foliola majora 10-11 lin. longa 4-5 lata, flores circ. 7 lin. longi, legumen pollicare 3 lin. latum. Species pulchra affinis *V. dumetorum* et *V. pallidæ* Turcz.

VICIA SATIVA L. var. *albiflora* Boiss. — Folia inferiora elliptica superiora linearia omnia apice retusa vel truncata mucronulata latitudine varia, corolla alba e sicco ochroleuca, legumina breviter puberula.

Hab. in cultis *Ægypti* et *Palæstinæ* frequens (Boiss.)

Hæc planta nullâ notâ graviore differt a *V. sativâ* cujus calyces multistriatos dentibus lanceolatis rectis tubo æquilongis habet.

VICIA ASSYRIACA Boiss.

V. annua tota pilis adpressiusculis hirtula viridi-cinerascens, cauli-

bus erectis angulatis infernè ramosis, foliis 4-5 jugis, foliolis lineari-cuneatis apice truncatis vel retusis breviter mucronatis, petiolo in cirrhum simplicem abeunti, stipulis minutissimis oblongo-triangularibus acutis integris, pedunculis brevissimis 2-3 floris, pedicellis cernuis calycis tubo brevioribus, calycis campanulati tomentelli dentibus e basi triangulari subulatis superioribus brevibus inferioribus tubi $3\frac{1}{4}$ æquantibus, corollà flavidà calyce triplò longiori, vexilli laminà ovatà retusà subreflexà alis vix longiori facie interiori sub lente punctatà glauconitenti, carinà alis multò breviori curvatissimà galeatà, stylo angulo acuto infracto apice circumcercà sed ad latus exterius longiùs hirsutissimo, legumine 2-3 spermo glabro oblongo stipite calyce breviori suffulto apice rostrato, seminibus ovatis compressis nigris velutiniformibus, hilo peripherià seminis decuplò breviori.

Hab. in *Assyrià* circà *Diarbekir* et in monte *Karadja Dagħ* Kotschy N° 213.

Caules pedales, foliola 4-5 lin. longa apice 4-4 $1\frac{1}{2}$ lata, flores 7-8 poll. longi, legumina 8-9 lin. longa 3 $1\frac{1}{2}$ lata. Valdè affinis *V. galeatæ* meæ quæ præter caulem valdè elatum, foliola latiora flores ampliores egregiè differt hilo seminis ejus peripheriam dimidiam ferè æquant. — *V. galeata* in humidis Galilææ et Syriæ littoralis v. gr. in planitie *Esdraelon* ad rivulos copiosissimè crescit suprà arbores et dumos scandens; in ejus descriptione Diagn. 44, p. 403 lapsu calami dentes calycini inferiores pro superioribus et vice versà descripti fuerunt quod corrigendum est.

LATHYRUS STENOLOBUS Boiss.

L. annuus glabrescens vel pilis sparsissimis adpressis sub lente ob-situs, caulibus procumbentibus infernè ramosis, petiolis aphyllis filiformibus in cirrhum simplicem abeuntibus, stipulis filiformibus strictis lanceolato-sagittatis acutis auriculis basilaribus vix divergentibus triangulari-lanceolatis brevibus acutis, pedunculis axillaribus filiformibus rectis stipulas multò superantibus, calycis glabri obconici dentibus lanceolatis acutis subtrinerviis tubo æquilongis, corollà luteà calyce subtriplo longiori, vexilli oblongi parte superiori reflexà inferiori æquilongà, alis vexillo brevioribus carinæ subæquilongis, carinà brevi subtus angulo recto subrotundato incurvâ apice in mucronem brevem incurvum attenuatâ, stylo in angulum obtusum infracto apice longè dilatato latere superiori barbato, legumine angustè et longè

lineari recto compresso glaberrimo lævi 5-6 spermo, seminibus oblongis compressis hilo oblongo.

Hab. in sylvaticis montis *Cassii* Syriæ borealis. Legi Jun. 1846.

Caules $1\frac{1}{2}$ -1 pedales, stipulæ majores 9-10 lineas longæ basi tres latæ, pedunculi 1 $1\frac{1}{2}$ -2 pollicares, legumen sæpè pollicare sesquilineam latum, flores dimidiò minores illis *L. Aphacæ* a quo ut et a *L. pseudo-aphacæ* Boiss. differt stipularum formà, pedunculis longissimis, calycis laciniis brevibus, legumine recto angustissimo etc.

LATHYRUS NEUROLOBUS Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1847.

L. biennis vel perennis glaber viridis, radice fibrosà caudiculos filiformes nudos breves ramosos edenti, caulibus pluribus procumbentibus tenuissimis plano-bialatis angustè linearibus aliis sterilibus abbreviatis aliis floriferis omnibus simplicissimis, alis ex petiolo decurrenti oriundis ad foliorum insertionem sensim angustatis, foliis unijugis, petiolo brevissimo plano trinervi foliorum inferiorum in aristam brevissimam superiorum in cirrhum simplicem capillarem longum abeunti, foliolis subsessilibus foliorum inferiorum ovatis oblongisve acutis vel obtusiusculis mucronulatis, superiorum angustè lineari-lanceolatis acutis omnibus quinquenerviis, stipulis infimis minimis obtriangularibus cuspidibus subæquilongis divaricatis, superioribus triplò majoribus lanceolato-semisagittatis cuspe inferiori brevissimà, pedunculis 1 rariùs 2 floris stipulà axillari brevioribus, pedicello calyci subæquilongo, floribus horizontalibus purpureo-violaceis, calycis basi obliquè truncati dentibus triangularibus rectis tubo paulò brevioribus inferiori aliis paulò longiori, corollà abbreviatà valdè curvatà calyce subtriplò longiori, vexilli ovati valdè reflexi laminà retusà striatà ungue sublongiori alas paulò superanti, alis sursum curvatis carinam paulò superantibus, carinà subtus angulo recto curvatà apice truncatà valdè abbreviatà, stylo angulo ferè acuto infracto apice valdè dilatato latere interiori hirtulo, leguminibus rectis angustè linearibus infernè angustatis apice rostro subincurvo brevi instructis subcompressis 6-9 spermis, valvis nervis 5-6 longitudinalibus subparallelis elevatis percursis, seminibus lævibus minimis globosis viridibus violaceo-maculatis, hilo sextam partem peripheriæ seminis ambiens.

Hab. ad rivulos scaturigines et in pratis paludosis castanetorum loco

Enneachoria dicto Eparchiæ *Kissamos* Cretæ alt. 1000'–1500'. (Heldreich).

Caules 1½–1 pedales lineæ 3¼–1 lati, petiolus sesquilineam longus, foliola inferiora 2'1½ lin. longa ferè 2 lata, superiora 4–5 lin. longa 1 lata, flores illis *Lath. tuberosi* ferè minores, legumen pollicare 1–1½ lin. latum. Species distinctissima nulli affinis habitu potius *Orobum* quàm *Lathyrum* referens.

LATHYRUS STENOPHYLLUS. Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.

L. annuus glaberrimus basi multicaulis ramosissimus, caulibus filiformibus angulatis procumbentibus, foliis unijugis, foliolis parvis angustè linearibus acutis cuspidatis sub lente margine serrulato–scabris foliorum superiorum–lineari–setaceis elongatis, petiolo plano brevissimo foliorum inferiorum in mucronem linearem brevem superiorum in cirrhum simplicem vel ramosum abeunti, stipulis semisagittatis laciniâ superiori lanceolatâ vel lineari petiolum æquanti vel superanti inferiori multò minori utrâque acutissimis, pedunculis unifloris folio longioribus supernè articulatis ferè ebracteolatis, pedicello calycem subæquanti, calycis glabri basi nervosi laciniis lanceolatis acutis tubo paulò longioribus, vexillo violaceo calyce subtriplo longiori ovato carinam alasque pallidiores superanti, carinâ subtùs angulo recto curvatâ apice obtusâ alis paulò breviori, legumine (juniori) glabro 3–4 spermo oblongo–lineari basi apiceque in rostrum rectum longiusculè attenuato, margine utroque convexo superiori biangulato, seminibus lævibus.

Hab. in herbis *Pamphyliæ* ad promont. *Alaya* Heldreich.

Caules numerosissimi 1–1 ½ pedales, folia inferiora 5–6 lineas, superiora pollicem et ampliùs longa, omnia lineæ 1½–1¼ lata, flores magnit. *L. sativi*. Habitu et characteribus *L. setifolio*, *ciceræ* et sativo affinis a priori cui foliatione magis accedit facillè distinguitur foliolis multò brevioribus, seminibus lævibus nec tuberculatis, a posterioribus differt foliolis multò minoribus, stipulis 2–4 lin. longis lineam dimidiam latis, pedunculisque folio longioribus.

LATHYRUS BLEPHARICARPOS Boiss.

L. annuus basi ramosissimus, caulibus tenuibus procumbentibus patulè hirtulis angustissimè alato–angulatis, foliis unijugis, foliolis

infirmorum ovato-ellipticis obtusis superiorum longè lanceolato-linearibus acutis omnibus sub 5-9 nerviis supernè glaberrimis subtùs ad nervos et margines ciliatis, petiolo hirtulo angulato foliolis breviori foliorum inferiorum in mucronem linearem brevem supremorum in cirrhum simplicem abeunti, stipulis hirtulis semisagittatis lacinià superiori majori lanceolatà curvatà acutà, pedunculis unifloris hirtis floriferis stipulà duplò longioribus fructiferis folio axillari subæquilongis suprà medium obsoletè bracteolatis, calycis cæterum glabri laciniis lanceolatis acutis subincurvis tubo duplò longioribus ciliatis, corollà purpureà calyce duplò longiori, vexillo striato ovato retuso alis paulò longiori, alis margine superiori rectis inferiori rotundato-curvatis, carinà albidà alis paulò breviori margine superiori rectà hirtulà inferiori rotundato-curvatà, leguminibus oblongis margine utroque ciliatis superiori curvato foliaceo bialatis inferiori angusto cæterum glabris reticulato-venosis compressis subtrispermis in mucronem brevem incurvum apice abruptè attenuatis, seminibus subangulatis fuscis lævibus, hilo brevi oblongo.

Hab. circà *Hierosolymam* in herbis rupestribus frequens. Legi flor. Maio.

Habitus *L. ciceræ* vel *sativi* quibus affinis est, foliola inferiora 5 lineas superiora 12-15 lin. longa, 1 1/2-2 lin. lata, flores magnitudinis eorum *L. ciceræ*, legumen 9-10 lin. longum 4 latum, alæ lineam latæ. Species characteribus datis et indumento leguminis distinctissima.

LATHYRUS HIEROSOLYMITANUS Boiss.

L. annuus glaber basi ramosus, caulibus ascendentibus brevibus angustè bialatis, foliis unijugis, foliolis lanceolato-linearibus acutis 5-7 nerviis, petiolo angustè bialato foliorum inferiorum in aristam brevissimam superiorum in cirrhum simplicem abeunti, stipulis semisagittatis laciniis lineari-setaceis acuminatis inferiori 2-4 plò breviori, pedunculis 2-3 rariùs unifloris folio axillari brevioribus, pedicellis basi minutè bracteolatis calyci subæquilongis, calycis laciniis triangulari-lanceolatis cuspidatis tubo æquilongis, floribus roseis, vexillo breviter ovato retuso striato calyce plùs duplò longiori alas superanti, carinà subtùs valdè et subangulatim incurvā apice truncatà alis paulò breviori, legumine glabro lineari-compresso subreticulato-venoso recto apice brevissimè attenuato margine superiori crassiusculo biangulato convexiusculo inferiori recto hexaspermo, seminibus tuberculato-scabris.

Hab. circà *Hierosolymam*. ubi legi vere 1846.

Semipedalis, foliola 1-1 1/2 pollicaria 2-2 1/2 lin. lata, flores illis *L. ciceris* paululum minores, legumen 18 lin. longum 3 latum. Species affinis *L. annuo* et *hirsuto*, a priori corollâ roseâ, legumine duplò angustiori brevissimè attenuato a posteriori glabritie etc. distincto.

LATHYRUS CASSIUS Boiss.

L. annuus glaber, caulibus elatis scandentibus augustè angulato-alatis, foliis unijugis, foliolis elliptico-lanceolatis acutis 7-9 nerviis, petiolo foliolis breviori angulato inferiorum in mucronem superiorum in cirrhum ramosum abeunti, stipulis minutissimis semisagittatis laciniis setaceis superiori longiori, pedunculis 1-2 floris folio axillari 2-3 plò longioribus, pedicello calyci subæquilongo basi minutissimè bracteolato, calycis laciniis triangulari-elongatis acutis tubo basi 10 nervi æquilongis, corollâ calyce subtriplò longiori, vexillo lætè roseo retuso alis carinâque pallidis multò longiori, carinâ subtùs angulo acuto rotundato incurvâ apice obtusâ alis subæquilongâ, legumine glabro obsoletè reticulato-venoso lineari incurvo compresso 6-7 spermo margine superiori concavo inferiori convexo apice in rostrum breve ascendens attenuato, seminibus cubicis valdè tuberculato-scabris.

Hab. in dumosis jugi *Cassii* inter *Cassab* et *Suadieh*. Legi jun. 1846.

Caules 2-3 pedales, foliola majora sesquipollicaria 4-5 lin. lata, pedunculi 1 1/2-3 poll. longi, flores magnitudinis *L. hirsuti*, legumen 12-15 lin. longum 2 1/2 latum. Affinis *L. Hierosolymitano* a quo differt caulibus elatis angustius alatis, foliolis latioribus minus acutis, pedunculis folio longioribus, dentibus calycis non cuspidatis, legumine recurvo margine superiori concavo nec convexo. Habitus *L. hirsuti* indumento, leguminibus abbreviatis etc. diversissimi.

LATHYRUS LYCIUS Boiss. et Heldr. in pl. Anatol. exs. 1836.

L. annuus totus sub lente pills sparsis brevissimis patulis hirtulus, caulibus angulato-subalatis elatis scandentibus flexuosis, foliis unijugis, foliolis amplis oblongis obtusis mucronulatis basi subatenuatis nervis lateralibus anastomosantibus reticulatis, petiolo crasso angulato foliolis subæquilongo in cirrhum ramosum abeunti, stipulis minimis semisagittatis laciniis lanceolatis cuspidatis inferiori breviori, pedunculis rigidis folio multoties longioribus 3-6 floris, pedi-

cellis calyce paulò longioribus, calycis breviter hirti laciniis triangulari-elongatis acutis tubo æquilongis, vexillo amœnè roseo subrotundo calyce subtriplo longiori, alis violaceis carinam paulò superantibus, carinâ subtus angulo recto curvatâ apice obtusâ, legumine (juniori) compresso lineari-subcurvato brevissimè rostrato hexaspermo pilis brevibus tuberculatis densè puberulo margine superiori convexo inferiori concavo.

Hab. in fruticetis ad portum *Tchinova Lyciæ* (Heldreich) fl. Maio.

Caulis 2-3 pedales, foliola majora sesquipollicaria 8 lin. lata, pedunculi semipedales, flores dimidiò minores illis *L. odorati* qui differt stipulis triplò majoribus legumine longiori recto glanduloso-piloso etc. *L. hirsutus* diversissimus est foliolis angustis acutis, floribus dimidiò minoribus, legumine recto tuberculato-hispido etc.

CICER OXYODON Boiss. et Hohen. in Kotschy pl. Pers. bor. 7846. (Sect. *Spiroceras*).

C. perenne totum pilis minimis sparsis glandulosis viscidulis obsitum viride, caulibus erectis subflexuosis, foliis 4-5 jugis, foliolis eximie venosis subrotundis supernè subtruncatis basi cuneatis utrinquè argutè 4-8 dentatis dentibus triangularibus acutissimis terminali breviori, petiolo supernè canaliculato in cirrhum simplicem vel ramosum abeunti, stipulis parvis semiovatis acutè et profundè 4 dentatis, pedunculis folio brevioribus 4-2 floris in aristam pedicellis longiorem abeuntibus, pedicellis tomentello-viscidis calyci æquilongis, calycis pubescentis viscidis basi gibbi laciniis a basi lanceolatâ in cuspidem setaceos apice incurvos cirrhiformes corollam subæquantes attenuatis tubo multoties longioribus, vexillo ovato lilacino alas carinamque pallidiores superanti, alis obovato-spathulatis carinæ apice valdè attenuatæ æquilongis, legumine densè puberulo viscido oblongo turgido, seminibus valdè tuberculato-scabris rostellatis.

Hab. in rupestribus propè *Astonbag* montis *Elbrus* propè pagum *Pasgala* Kotschy N° 287.

Caulis pedales vel longiores, foliola 4-5 lin. longa, flores 6-7 lin. longi. Affine *C. spirocerati* quod differt caulibus rigidis infractoflexuosis, petiolis rigidis remotè foliosis, foliolis cuneato-flabellatis utrinquè 2-3 dentatis dente medio longiori, stipulis triangularibus indivisis infimis tantum denticulo auctis, laciniis calycis brevioribus, seminibus reticulato-rugosis etc.

CICER MINUTUM Boiss. et Hohen. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846.
(Sect. *Arietaria*).

C. perenne totum patulè glanduloso-pubescens griseum, radicibus crassiusculis caules nanos filiformes basi serpentes nudos dein foliosos procumbentes edentibus, foliis brevissimis ambitu ovatis imparipinnatis bijugis, foliolis cuneato-ovatis complicatis apice obtusiusculè 5-7 dentatis, stipulis minimis petiolo dimidiò brevioribus inferioribus trifidis lacinià medià triangulari-lanceolatà lateralibus multò brevioribus, superioribus semisagittatis, pedunculis unifloris ad mediam partem articulatis ebracteatis folio æquilongis, calycis hirsuto-viscidi basi subgibbi laciniis lanceolatis acutiusculis trinerviis tubo duplò longioribus corollà paulò brevioribus, vexillo violaceo vel sanguineo alis carinàque apice attenuatà paulò longiori, legumine ovato-oblongo inflato pubescenti-viscido, seminibus oblongis breviter et acutiusculè rostellatis sub rostellò foveolà rotundà excavatis obsoletè et sparsim tuberculato-punctatis.

Hab. in schistosis propè *Meidan Abdallah* in vall. *Loura* montis *Elbrus* Kotschy N° 542.

Caules 2-3 pollicares, foliola 4 1½-2 lin. longa, flos tres lineas longus; florum et foliorum magnitudine affine *C. ervoidi* Fenzl Illustr. pl. Tauri pag. 8. — *Ononidi ervoidi* Sieb. Reis. Cret. 11. Ic. — *C. pimpinelloidi* Jaub. et Spach. III. tab. 42. B. in montibus Cretæ, Anatoliæ et Libani crescenti et quod differt foliolis angustè cuneatis, stipulis duplò majoribus oblongis latere exteriori tridentatis petiolos æquantibus, seminibus eximie et densè tuberculato-scabris etc.

CICER JUDAICUM Boiss. (Sect. *Arietaria*.)

C. annuum parcè et patulè glanduloso-hirtulum, caulibus tenuissimis erectis, foliis imparipinnatis 11-13 foliolatis, foliolis ovatis basi integrè subcuneatis ad mediam partem usquè utrinquè in 3-4 dentes argutè subpinnato-dentatis dentibus superioribus trifidis, stipulis ovatis minimis crebrè denticulatis, pedunculis unifloris folio multò brevioribus ad medium articulatis aristulatisque, calyce glanduloso-hirto ferè ad basin usquè in lacinias lanceolato-lineares acutas corollam subæquantes subtrinerves partito, floribus pallidè violaceis, vexillo ovato rotundo alas carinamque paululùm superanti, legumine oblongo subcompresso hirto, seminibus...

Hab. circa *Hierosolymam* ubi Aprili 1846 specimina pauca reperi.

Caulis 6-8 pollicaris, folia pollicem, foliola 2-2 $1\frac{1}{2}$ lin. longa, flor. 3 lin. longus, legumen 5 lin. longum 3 latum. Species pulchella a *C. arietino* minutie omnium partium, foliolis multò profundius dentatis non mucronatis, stipularum formà, legumine compresso etc. distinctissima. *C. cuneato* Hochst. quoque diversissimo magis affinis.



DIAGNOSES

PLANTARUM ORIENTALIVM NOVARVM.

**PARISIIS. — TYPIS MARCI DUCLOUX ET CONS.,
VIA ÉCOLE-DE-MÉDECINE, 80.**

DIAGNOSES

PLANTARUM ORIENTALIU NOVARUM

N° 10.

AUCTORE

E. BOISSIER,

SOC. PHYS. GENEV. SODALI.



PARISIIS.

TYPIS MARCI DUCLOUX ET CONS.

VIA ÉCOLE-DE-MÉDECINE, 80.

1849.

DIAGNOSES

PLANTARUM ORIENTALIVM NOVARVM.

ROSACEÆ.

AMYGDALUS AGRESTIS Boiss. (Sect. *Spartioides*.)

A. humilis basi suffruticosus parcè ramosus, ramis teretibus glabris striatulis strictis rigidis elongatis simplicibus foliosis apice nudis subspinescentibus, gemmulis axillaribus minimis glabris rufescentibus, foliis glabris coriaceis utrinquè pallidè virentibus lanceolatis basi in petiolum brevissimum apice in mucronem subincurvum attenuatis crenato-serrulatis crenis parvis ascendentibus glanduliferis, floribus..... drupis secùs ramos hornotinos aphyllis solitariis pedunculo crasso brevissimo insidentibus breviter puberulis ovato-subglobosis apiculatis, putamine acuminulato lævigato carinulato suturâ dorsali non canaliculato.

Hab. in agris derelictis *Cœlesyriæ* inter *Balbeck* et *Zachle*. Legi fructiferam Julio 1846.

Suffrutex 1-2 pedalis, folia 1-1 1/2 poll. longa 2-2 1/2 lin. lata, drupæ *P. spinosæ* major. Ab affinibus *A. spartioidi* Spach et *A. Arabicæ* Olivier diversissima ramis non angulatis, foliis angustioribus acuminatis; a priori iterum drupâ minùs oblongâ pubescenti nec glabrâ, putamine non canaliculato; ab *A. Arabicæ* fructu majori non obtuso nec canescenti, putamine carinulato.

PYRUS SYRIACA Boiss.

P. arborea 20-25 pedalis comâ rotundatâ ramis etiam junioribus gla-

herrimis cortice rubellâ glaucescenti vestitis ramulis inferioribus ramorum sæpè spinosis crassis abbreviatis, foliis in fasciculos sessiles polyphyllos gemmulam foventes secus ramos dispositis ad ramorum apicem solitariis dissitis glaberrimis pallidè virentibus suprâ nitidis subtus pallidioribus tenuissimè venulosus subcoriaceis oblongis vel oblongo-lanceolatis basi rotundatis vel breviter cuneatis acutis margine eximè et minutè crenato-serrulatis denticulis ascendentibus eglandulosis, petiolo folii dimidiam longitudinem subsuperanti, floribus..... pomis 3-5 in corymbos super ramulos hornotinos terminales dispositis folia basilaria æquantibus glaberrimis nigricanti-rubellis coriaceis subglobosis in pedunculum crassum apice clavatum eis duplò longiorem basi attenuatis dentibus calycinis triangulari-lanceolatis erecto-patulis coronatis, loculis propter septa incompleta in unum centrale pericarpium diametro angustius parvum confluentibus.

Hab. in sylvaticis regionis inferioris montis *Cassii* suprâ *Cassab*, in Antilibano inter *Zebdani* et *Zachle*. (Boiss.)

Folia 1 1/2-2 1/2 poll. longa 6-12 lin. lata petiolo 1-1 1/2 pollic. suffulta, poma diametro 6-7 lin. lata pedunculo ferè sesquipollicari suffulta. Species a *P. salicifolia* distinctissima foliis glaberrimis, fructu quadruplò majori. *P. Sinai* a nostrâ specie differt ramis pubescentibus, foliis subtus velutinis ovato-oblongis subintegrissimis, fructu majori sphaerico, pedunculo non clavato. *P. glabra* Boiss. Diagn. VII. cortice ramorum albicanti, foliis breviter petiolatis integris angustioribus eximè distinguitur. An nostra species eadem cum *P. angustifolia* Decaisne in Bovè pl. Syr. Ann. Nat. 1835 cujus tamen character « folia lineari-oblonga » minus benè convenit? Si eadem, nomen specificum speciei in genere certè non *angustifoliae* improprium mutandum erit.

CERASUS PROSTRATA Labill. var. *concolor* Boiss. et Heldr. in pl. Tayg. exs. 1844. — Folia etiam juniora utrinquè glaberrima viridia, cæterum omnes characteres formæ genuinæ quacumque crescit.

Hab. in *Taygeto* loco *Choupata* dicto. (Heldr.)

Ad speciem formis intermediis in quibus folia subtus hirta sunt transit.

AMELANCHIER PISIDICA Boiss. et Heldr.

A. ramosissima, ramis cortice rubellâ lævi nitidulâ vestitis, foliis integerrimis ovatis obtusis vel retusis muticis vel minutissimè mucronu-

latis basi rotundatis breviter pedunculatis suprâ glabris pallidè virentibus subtùs tomento persistenti canis, floribus in racemos breves ovatos ad ramulorum apicem sitis folia basilaria vix superantibus, pedicellis tomentosis calyce sesquolongioribus, bracteis linearibus rubellis deciduis, calycis albo-tomentosi hemisphærici dentibus triangularibus acutis apice tomento demùm deterili nudis rubellis, petalis albis calyce duplò longioribus basi attenuatis oblongo-spathulatis obtusis medio dorso brevissimè tomentellis margine ciliatulis, stylis 5 tomento denso immersis, drupâ...

Amelanchier parviflora pl. Anat. Heldr. exs. 1846 non Boiss. Diagn. Hab. in *Pisidiâ*. (Heldr.)

Suffrutex *Cot. nummularium* F. et M. florum magnitudine habituque omninò referens sed hic qui forsân ulteriùs generi *Amelanchier* conjungendus erit differt foliis acutiusculis et præsertim floribus subsessilibus in racemos densos fasciculiformes confertis, petalis suborbiculatis basi intùs hirtulis extùs glaberrimis, toro vix hispidulo nec lanato. *A. parviflora* pro quo primùm hanc habueramus specificè differt nervis secundariis foliorum valdè prominulis, dentibus calycinis longioribus, floribus ferè duplò majoribus, petalis obovato-rotundatis extùs valdè tomentosis. *A. integrifolia* Boiss. et Hohen. deniquè, quem fructiferum tantùm novi habet folia deterilia longiusculè mucronata, pedunculos elongatos simplices vel bifidos, dentes calycinis longissimos apice subulatos.

ROSA KOTSCHYANA Boiss. (Sect. *Cinnamomeæ*.)

R. ramis glabris glaucescenti-rubellis, aculeis stipularibus subæquantibus flavidis patenti-subrecurvis compressis, foliolis 7-9 ovatis simpliciter et acutè serratis utrinquè densè tomentosis subtùs pallidioribus, stipulis ramorum florentium sublatis, floribus in ramulorum apice 2-4 rariùs solitariis bracteis, laciniis calycinis tomentellis e basi triangulari-lanceolatâ longè acuminatis integerrimis corollam subæquantibus, tubo calycis glaberrimo, stylis brevibus liberis in discum approximatis, fructu ovato glabro laciniis calycinis deflexis eo longioribus coronato, carpellis sessilibus.

Hab. in virgultis montis *Kuh Dažna* Persiæ austr. Kotschy N° 637.

R. Orientalis var. ? Boiss. in Sched. loc. cit. non Dupont.

Hæc planta quam dubitanter ad *R. Orientalem* (quæ inter plantas Kotschyanas e monte *Gara* Kurdistanæ N° 543 quoque occurrit) retu-

leram, accuratiori examini subjecta certè differt 1° ramis glaberrimis nec annotinis puberulis, 2° ovario glaberrimo nec densè aculeato-hispido, 3° calycis laciniis reflexis nec arrectis semper integerrimis nec plùs minùs pinnatifidis, 4° aculeis crassioribus compressis nec conico-cylindricis.

ROSA LIBANOTICA Boiss. (Sect. *Caninae*.)

R. pumila ramis junioribus plùs minùsve glanduloso-pubescentibus adultis glabris rubellis, aculeis sparsis compressis patulo-subrecurvis, stipulis foliorum floralium multò latioribus semiovatis, foliolis 7-9 ovatis argutè duplicato-serratis serraturis patulis utrinquè breviter subtùs copiosius puberulis glandulosisque glandulis marginalibus breviter stipitatis cæteris sessilibus, floribus ad ramulorum apicem solitariis subsessilibus bracteatis, pedunculis parcè setosis, calycino tubo brevi obconico præter setas nonnullas apice glandulosas sæpè evanidas glabro, laciniis corollam æquantibus suprà medium angustatis superne spatulato-dilatatis denticulatis, stylis brevibus liberis, fructu...

Hab. in *Libano* superiori suprà Cedros. (Boiss.)

Suffrutex humilis *R. glutinosam* Sibth. valdè referens, ei affinis sed distinctus aculeis tenuioribus minùs aduncis, stipulis foliorum floralium latioribus, inprimis tubo calycino obconico nec infrà lacinias ut in *R. rubiginosâ*, *caninâ*, etc. strangulato. Species quoad fructus ignota ex paucis speciminibus tantùm descripta et ulterius observanda.

ROSA PHOENICIA Boiss. (Sect. *Nobiles*.)

R. ramis sarmentosis elongatis, aculeis sparsis subcompressis brevibus valdè aduncis, stipulis omnibus subconformibus angustè linearibus apice subulato-acuminatis, foliolis quinis foliorum supremorum ternis ovatis ellipticisve obtusis argutè et simpliciter serrato-dentatis dentibus acuminatis subascendentibus suprà glabriusculis non nitidis subtùs pallidioribus breviter pubescentibus eglandulosis, floribus in paniculas terminales multifloras compositè corymbosas dispositis parvis, bracteis pubescentibus oblongo-lanceolatis acuminatis persistentibus, pedunculis glabris vel glanduloso-hirtis, tubo calycis glaberrimo cæcio angustè elliptico basi et apice attenuato, laciniis oblongo-lanceolatis longè caudato-acuminatis suprà medium sæpè strangulatis post anthesin deflexis tubo longioribus integris vel utrinquè 2-4 lobulis sub-

linearibus auctis pinnatifidis, petalis niveis laciniis calycis superantibus, stylis in unum connatis, fructu...

Hab. in sepibus humidis Phoeniciæ littoralis calidioris circà *Beyrout*, *Tripoli*, etc., vulgaris (Boiss.), in *Ciliciâ* Kotschy N° 185. F. Julio.

Pulchra et distincta species more *R. sempervirentis* sepes excelsas paniculis innumeris multiflorisque adornans, florum dispositione et tomento foliorum *Rubum tomentosum* quodam modo referens. Affinis *R. sempervirenti* et *R. moschatæ* ab utrâque distincta aculeis validioribus magis aduncis, foliolis non acuminatis profundius et acutius dentatis suprâ obscuris subtus pubescentibus, bracteis magnis persistentibus.

POTENTILLA XYLORRHIZA Boiss. et Hohen. in Pl. Kotsch. Pers. bor. 1846. (Sect. *Fragariastrum*.)

P. suffruticosa, rhizomate lignoso duro crasso, cortice in pelliculas tenues innumeras secedente vestito apice ramosissimo ramis brevissimis squamosis in cæspitem congestis, foliis ad ramulorum apicem paucis basi stipulis numerosis squamæformibus rufescentibus pubescentibus suffultis parvis breviter petiolatis pinnatim 5 foliolatis, foliolis supernè adpressè hirtulis subtus sericeis oblongis basi attenuatis apice rotundatis integris vel obsoletè tridentatis duobus inferioribus remotiusculis tribus superioribus palmatim dispositis, pedunculis e centro foliorum 1 vel 2 unifloris folia vix superantibus ebracteatis, floribus albis, calycis adpressè sericei laciniis exterioribus lineari-oblongis obtusis vel acutiusculis interioribus duplò longioribus latioribusque triangulari-lanceolatis breviter acuminatis, petalis.... toro pilosissimo, carpellis...

Hab. in rupibus septentrionalibus vallis *Loura* montis *Elbrus*. (Kotschy, N° 537.)

Truncus tortuosus cortice eo Pini sylvestris simili vestitus digitum et ampliùs crassus, sæpè saxorum fissuris compressus complanatusque, folia cum petiolo 5-6 lin. longa, foliola 2-3 lin. longa 4-1 1/2 lata, calyces eis aliarum specierum sectionis minores. Species rhizomate et habitu *P. tignosæ* Willd. herb. — *Trichothalamo tignoso* Lehm. Act. Nov. Nat. Cur. X, tab. 49, pag. 585, e montibus Persiæ quoque oriundæ mirè accedens, sed hæc ex icone et descriptione egregiè differt foliis sensu stricto palmatim 3-5 foliolatis, foliolis petiolulatis

cuneatis apice truncatis argutèque denticulatis flabellatis, dentibus calycinis longioribus angustioribus minùs inæqualibus.

POTENTILLA ARGYROLOMA Boiss. et Hohen. in Kostch. pl. Pers. bor. 4846. (Sect. *Potentillastrum*.)

P. perennis herbacea, radicis collo fibroso, caulibus pluribus ascendentibus simpliciusculis crispè hirsutis parèe foliosis, foliis radicalibus petiolo longo patulè hirsuto suffultis quinato-palmatisectis, foliolis oblongo-cuneatis in lobos oblongos obtusiusculos profundè pinnatisectis inferioribus duobus subsessilibus intermediis breviter superiori longè petiolulato omnibus adpressè hirsutis margine argyreo-sericeis, foliis caulinis breviter petiolatis 3-5 sectis foliolis angustioribus profundius dentatis æqualiter et breviter pedicellatis, stipulis oblongo-ellipticis acutiusculis integris, floribus paucis terminalibus laxiusculè corymbosis, pedunculo calyce adpressè hirsuto longiori, laciniis calycinis ellipticis exterioribus paulò brevioribus angustioribusque obtusiusculis interioribus acutis, petalis aureis obcordatis calyce duplò longioribus, toro inter stamina albopilosissimo, carpellis...

Hab. in jugo *Naserou* montis *Demavend* alt. 7500'. Kotschy, N° 346.

Pulchra species ex affinitate *P. Nevadensis* Boiss. et præsertim *P. petreæ* Lehm Pot. tab. 44, quæ egregiè a nostrâ differt foliolis omnibus sessilibus elongatioribus, stipulis radicalibus longissimis, sepalis subæqualibus acutiusculis, corollâ parvâ.

POTENTILLA POLYSCHISTA Boiss. et Hohen. in pl. Pers. bor. Kotsch. 4846. (Sect. *Potentillastrum*.)

P. perennis densè cæspitosa, collo vaginis fuscis vestito, caulibus humi expansis brevibus tenuibus subsimplicibus rubellis adpressiusculè hirtis, foliis utrinquè adpressè sericeis subtùs argyreo-nitentibus ambitu ovatis subpalmato-bipinnatisectis lobis oblongo-linearibus margine non revolutis, radicalibus breviter petiolatis, caulinis sessilibus paucilobis, stipulis oblongis acutis denticulatis, floribus paucis terminalibus densiusculè corymbosis, calycis nigricantis adpressè hirsuti laciniis exterioribus oblongis obtusis interioribus paulò longioribus latioribusque triangularibus acutis, petalis aureis obcordatis calyce sesquilateralibus, toro piloso, carpellis...

Hab. in alpinis *Hasartschal* in parte occidentali montis *Elbrus* Kotschy, N° 489.

Affinis *P. multifida* et forsàn adhuc huic speciei polymorphæ ulterius conjungenda, ex speciminibus quæ vidi tamen ab eâ diversâ foliis utrinquè sericeis nec dichrois, lobis abbreviatis minùs linearibus *margin*e non revolutis, calycis laciniis exterioribus obtusioribus.

POTERIUM COMPACTUM Boiss.

P. rhizomate lignoso cæspites pulvinares densissimè compactos edenti, foliis ferè omnibus radicalibus 5-6 jugis, foliolis præter setulas sparsas glabris ovatis obtusiusculè et profundiusculè dentatis dentibus lineari-oblongis, foliorum caulinarum sublinearibus apice tantùm dentatis, caulibus prostratis vel ascendentibus infernè tantùm et parcè ramosis tenuibus striatis, pedunculis gracilibus longissimis, capitulis globosis paucifloris minimis, floribus inferioribus masculis superioribus fæmineis, fructu (juniori) elliptico læviusculo angulato utrinquè acuto.

Hab. in herbidis siccis jugi Libanotici inter *Zachle* et *Beyrout* in regione *Rhododendri Pontici*.

Cæspites diametro 2-4 pollices lati densi duri, foliola eis *P. sanguisorbæ* ferè dimidiò minora, capitula piso dimidiò minora. Species quoad fructum maturum imperfectè nota capitulis minutis et radice lignosâ cæspitosâ a *P. sanguisorbâ* et affinis distincta. *P. ancistroides* quoque suffruticosum longè differt caule simplici, foliolis duplò majoribus ovato-rotundis, etc.

CUCURBITACEÆ.

BRYONIA MICRANTHA Boiss.

B. dioica caulibus pilis papillosis crispis obsitis, foliis utrinquè papilloso-asperis cordatis inferioribus subrotundis obsolete et obtusè repando-dentatis supremis ovatis 5-7 lobis lobis inferioribus brevissimis superiori multò majori elongato, cirrhis simplicibus, floribus masculis... fæmineis subsessilibus minutissimis, calycis laciniis valdè papilloso-hirtis corollam papilloso-hirtam æquantibus, stigmatibus aspe-

ris, baccis axillaribus solitariis rubellis pedicello eis æquilongo vel longiori suffultis.

Hab. in dumosis Antilibani circa *Rascheya* ubi legi Maio 1846.

Species adhuc imperfectè nota a *Br. dioica* distincta foliis rotundioribus multò minùs profundè lobatis, pedunculis solitariis, floribus fæmineis minimis aciculæ caput vix superantibus, laciniis calycis elongatis.

BRYONIA MULTIFLORA Boiss. et Heldreich.

B. dioica caulibus valdè angulosis parçissimè et breviter papilloso-asperulis, foliis obscurè virentibus brevissimè et sparsim subtus asperulis supernè lævibus ultrà medium in 5-7 lobos triangulares acutos sæpiùs iterùm basi obtusè lobatos palmatisectis, cirrhis simplicibus, floribus masculis... fæmineis in racemos multifloros elongatos oblongos pedunculatos sæpè basi ramosos ex eadem axillâ sæpiùs plures dispositis, axi racemi flexuosâ pedicellisque glabris eis baccâ brevioribus fructiferis recurvis, laciniis calycinis glabris lineari-setaceis acutis corollæ laciniis papillari-ciliatulis ferè dimidiò brevioribus, stylo corollam excedenti, stigmatibus patenti-recurvis elongatis asperis.

Hab. in rupestribus umbrosis Pisidiæ in montibus propè *Tcheltickchi* ad meridiem urbis *Bouldour* (Heldreich).

Species a *B. dioica* eximie distincta foliis profundius et acutius lobatis, floribus fæmineis non in corymbos paucifloros sed in racemos 1-4 1/2 pollicares 15-20 flores dispositis, stylo e corollâ exserto.

TAMARISCINÆ.

TAMARIX HAMPEANA Boiss. et Heldr. (Sect. *Oligadenia*.)

T. glabra glaucescens, ramis erectis, foliis densiusculè imbricatis subæqualibus e basi latiori rotundatâ subangustatis oblongo-lanceolatis crassiusculis acutiusculis, racemis secus ramos hornotinos numerosis patulis brevibus crassis densiusculis paniculam spiciformem longam formantibus, bracteis oblongo-linearibus obtusis pedicello longioribus, pedicello calycem æquanti, floribus tetrasepalis tetrapetalis octa-

deniis, sepalis oblongis acutis, petalis oblongis calyce duplò longioribus, staminibus 6-8 breviter exsertis, stylis 4, capsulâ...

Hab. in maritimis Atticæ ad *Phalerum* (Spruner, Heldreich), Argolidis ad *Astros* (Boiss.) Fl. Aprili.

Habitus *T. Africanæ* a quâ floribus tetrameris statim dignoscitur. Cum *T. tetrandrâ* quâcum crescit, *T. laxâ* et aliis speciebus sectionis ob spicas crassas abbreviatas, flores duplò majores, stamina 6-8 nec quaterna non confundi potest. Cl. Hampe in Florâ 1841 huic speciei absque diagnosi nomen *T. hexandræ* proposuit quod ex variatione numeri staminum non servare potui.

TAMARIX MEYERI Boiss. (Sect. *Oligadenia*.)

S. glabra glauca ramis erectis, foliis crassiusculis e basi latiori subtruncatâ sensim angustatis lanceolatis acutis paginâ inferiori angulato-subcarinatis, eis ramorum ad basin cujusve ramuli triplò majoribus patulo-subrecurvis, ramulis tenuibus laxiusculè foliosis, racemis secus ramos hornotinos lateralibus numerosis longis densis crassiusculis, bracteis linearibus latiusculis pedicello brevi duplò longioribus deflexis, floribus tetrasepalis tetrapetalis tetrandris octadeniis, sepalis ovato-rotundis margine membranaceis dorso carinatis obtusis, petalis oblongo-spathulatis calyce sesquolongioribus, filamentis corollâ brevioribus, stylis quaternis, ovario pyramidato depresso.

T. tetragyna C. A. M. En. Cauc. Casp. N° 4460 non Ehrenb.

Hab. in insulis maris *Caspîi*. (C. A. Meyer.)

Folia ramealia 2 1/2-3 lin. longa 1 lata, ramulorum sesquilineam circiter longa, racemi tripollicares crassitie eorum *T. Africanæ*. Habitu et ramorum longitudine, florum magnitudine *T. Hampeanæ* similis sed distincta foliis laxioribus longioribus eis ramorum multò majoribus nec omnibus subæqualibus, racemis densioribus, bracteis latioribus longioribus, pedicello brevissimo nec calycem subæquanti, sepalis obtusis nec acutissimis, petalis calyce sesqui nec duplò longioribus, staminibus brevioribus 4 nec 6-7. *T. tetragyna* cui cl. Meyer hanc retulerat est planta Ægyptiaca 5 sepala 5 petala decadenia. Omnes cæteræ species tetrameræ a nostrâ foliis longè minoribus densè imbricatis, spicis tenuibus, floribus saltem dimidiò minoribus dignoscuntur.

TAMARIX DESERTI Boiss. (Sect. *Oligadenia*.)

T. glabra plùs minùs glaucescens, ramis erectis, foliis lanceolato-

linearibus acutiusculis crassiusculis subtus vix angulatis basi semiamplexicaulibus truncatis, eis ramorum ad basin cujusque ramuli 2-3 plò majoribus, ramulis tenuibus laxiusculè foliosis, racemis secus ramos hornotinos numerosis paniculam longam formantibus longis densiusculis, bracteis linearibus obtusis flores æquantibus vel superantibus, pedicellis calyce paulò brevioribus, sepalis 4 ovato-subrotundis obtusis latè marginatis dorso subcarinatis, petalis 4 ovato-spathulatis calyce sesquolongioribus, staminibus 4 corollæ æquilongis, stylis 4, capsulâ quadrivalvi glaucâ pyramidatâ 2 lineas longâ.

Hab. in salsuginosis deserti *Arabico-Ægyptiaci* (Husson) in descensu septentrionali jugi *Tih* Arabiæ petreæ ad fontem salsuginosum. (Boiss.)

Habitus *T. Hampeana* vel *T. Meyeri*, a priori bracteis longissimis, floribus minoribus staminibus quaternis statim dignoscenda; posteriori magis affinis sed ab eâ egregiè differt bracteis elongatis, floribus non subsessilibus, racemis minùs densis, staminibus exsertis.

REAUMURIAEÆ.

REAUMURIA PALÆSTINA Boiss.

R. basi suffrutescens multicaulis, caulibus erectis albidis brevissimè tomentellis rigidulis foliosis simplicibus vel patulè ramosis, foliis semiteretibus carnosis angustè linearibus obtusis glaucis glabris sparsis basi non dilatatâ subretusis facilè deciduis axillaribus brevissimis in fasciculum brevem imbricatis, floribus pedunculo basi nudo patulo eis plerumque breviori suffultis paniculas paucifloras formantibus, bracteis numerosis angustè lineari-semiteretibus obtusis squarrosè patentibus calyci æquilongis, calycis laciniis triangulari-lanceolatis apice attenuatis acutiusculis, petalis calyce sesquolongioribus elliptico-linearibus integris vix obliquis appendice interiori ovatâ longè fimbriatâ apice fissâ, filamentis parte dilatatâ edentulis, seminibus...

Hab. in argillosis calidissimis Judææ inter *St. Saba* et mare *Mortuum*, legi floriferam Maio. 1846.

Folia majora lineam lata 10-12 lin. longa. Flores eis *R. hirtellæ* J. et Sp. paulò majores, bracteæ foliis similes 4-5 lineas longæ. Affinis *R. hirtellæ* et *mucronatæ* ab utrâque distincta foliis elongatis, brac-

teis longis squarroso-patentibus, petalis calyce sesquilongioribus nec subæquilongis angustioribus, appendicibus in unam connatis, etc...

PORTULACÆ.

GLINUS MICRANTHUS Boiss.

G. annuus herbaceus totus tomento stellato sparsio subdetersili canescens virens, caulibus brevibus humi prostratis in orbem expansis, foliis parvis radicalibus obovato-spathulatis caulinis 5-7 pseudoveriticillos formantibus petiolo eis subæquilongo suffultis ovato-orbiculatis inter se inæqualibus, floribus 3-5 axillaribus minimis pedicello eis vix æquilongo vel longiori suffultis, sepalis tomento stellato densè et sordidè canescentibus oblongis acutis cucullatis, parastemonibus nullis, staminibus ferè 10, stigmatibus tribus, capsulâ...

Hab. in ruderalibus Antilibani circà *Rascheya*, legi flor. initio. Maii.

Caulis 2-4 pollicares, folia diametro 2-3 lineas tantum lata, calyx 1-1½-2 lin. longus. Cl. et amiciss. Fenzl. in Ann. Wien. Mus. plures *Glini* species sub *G. lotoidi* combinavit et suo sensu hæc species quod speciei polymorphæ adnumeranda esset; collata tamen cum *G. lotoidi* quem in Hispaniâ, Græciâ et Ægypto pluries observavi ab eo adeo dissimilis videtur ut donec manifestos transitus viderim eam specificè differre persuasum habeam. *G. lotoides* est planta multo major foliis oblongis sæpè acutiusculis, floribus triplo majoribus, parastemonibus bifidis, staminibus ferè 12, stigmatibus 5.

PARONYCHIEÆ.

TELEPHIUM ORIENTALE Boiss.

T. perenne glabrum glaucum multicaule, caulibus procumbentibus filiformibus simplicissimis densè foliosis, foliis alternis secundis oblongis vel elliptico-linearibus acutiusculis rariùs obtusis in petiolum brevissimum attenuatis, floribus in cymam densè capitato-corymbosam e ramis 5-6 constantem terminalem densè congestis, sepalis oblongo-

linearibus obtusissimis valdè carinatis albomarginatis intus concavis, petalis calyci æquilongis, capsulâ apice trigonâ sensim in rostrum attenuatâ calyce tertiâ parte longiori 15–20 spermâ, seminibus reniformibus subcompressis lente punctatis maturis ecarinatis.

Hab. in toto Oriente, *Cretâ* in montibus *Sphacioticis* (Heldr.), *Anatoliâ* in collibus *Smyrnæ*, *Sypilo* (Boiss.), *Cariâ* (Pinard), *Pamphylia* (Heldr.), *Libano* ad *Cedros* (Boiss.), montibus *Persiæ australis* (Kotschy N° 543) prov. *Talysch*. (Hohen.)

Species certè *T. Imperati* valdè affinis et forsân hujus forma orientalis, tamen ab eo facilè distinguenda, foliis minoribus angustioribus acutioribus, corymbis florum multò densioribus, floribus paulò minoribus, sepalis evidentius carinatis et paulò latius marginatis; capsula imprimis attenuatim nec abruptiusculè rostrata est, calyce tertiâ parte longior nec eam vix superans, semina matura non ut in *T. Imperati* evidenter carinata.

TELEPHIUM SPHEROSPERMUM Boiss.

T. annuum vel bienne glabrum glaucescens multicaule, caulibus filiformibus procumbentibus abbreviatis simplicibus foliosis, foliis oblongo-ellipticis acutiusculis basi attenuatis radicalibus majoribus breviter petiolatis, caulinis alternis subsecundis subsessilibus, floribus in cymam parvam corymboso-subcapitatam e ramis 2–4 constantem aggregatis parvis, sepalis oblongo-linearibus obtusis carinatis viridibus angustissimè albo-marginatis, petalis oblongis calyci subæquilongis, capsulâ breviter ovatâ supernè trigonâ acutiusculâ erostri 25–30 spermâ, seminibus minimis globosis nigris.

Var. β . *racemosa*. — Forma forsân submonstrosa, cymæ ramis elongatis laxifloris sæpè 2–3 pollicaribus.

Hab. in desertis Ægyptiaco-Arabicis (Husson, Figari), deserto Sinaico ad *Wadi Scheick* (Boiss.), *Wadi Hebran* Schimp. Un. Itin. N° 346.

Caulès 2–4 pollicares, folia caulina 3–4 lin. longa 4 $\frac{1}{2}$ –2 lata, flores illis *T. Imperati* minores. Ab eo et a specie præcedenti differt radice annuâ vel bienni, seminibus dimidiò minoribus globosis nec reniformi-compressis. Varietas habitu diversissima est forma verosimiliter submonstrosa intermediis in speciem transiens. Tertia species orientalis hujus generis est *T. oligospermum* Steud. in Kotsch. pl. Kurd. distinctum caulibus rectis virgatis elatis, foliis elongatis lineari-lanceolatis

acutis, capsulâ acutissimè trigonâ sub 10 spermâ, seminibus magnis reniformibus dorso rotundatis.

POLYCARPON ARABICUM Boiss.

P. annuum glabriusculum, caulibus abbreviatis prostratis dichotomis densiflorè cymosis, foliis minimis oppositis lineari-oblongis obtusis carnosulis, stipulis bracteisque omninò albo-scariosis triangulari-ovatis acutis hisce ad florum basin confertis calycis basin occultantibus, sepalis oblongis obtusis latè albo-marginatis, petalis oblongo-linearibus obtusiusculis calyci æquilongis, staminibus quinis, capsulâ polyspermâ, seminibus...

Hab. in arenosis *Arabix petreæ* ubi legi Marte 1846.

Affine *P. alsinefolio* DC. differt foliis angustioribus minimis lineari-oblongis nec ovatis circiter 2 lin. longis lineam latis, stipulis bracteisque majoribus, floribus paulò minoribus, sepalis latius scariosis, petalis calyces æquantibus.

PARONYCHIA KOCHIANA Boiss.

P. peremis, caulibus procumbentibus densè cæspitosis nunquam surculosis, capitulo minuto inter suprema folia sessili terminali, foliis utrinquè vel margine tantum hirsutis oblongis vel elliptico-linearibus obtusiusculis sessilibus subtus subcarinatis, stipulis scariosis oblongo-linearibus acutis folia subæquantibus, bracteis latis rotundatis orbicularibus apiculatis vel acutis flores superantibus, calycis abbreviati adpressè hirsuti laciniis æquilongis oblongis obtusis angustè albo-marginatis.

P. capitata Koch. Syn. Fl. germ. p. 280 non Lam.

Hab. in *Illyriâ* (Koch), *Apennino Neapolitano*, Asiâ minori in monte *Cadmo*. (Boiss.)

Species hucusquè confusa cum *P. serpyllifoliâ* DC. e Pyrenæis et Alpibus occidentalibus oriundâ quæ huic habitu et bractearum magnitudine affinis specificè tamen differre videtur caulibus surculos elongatos filiformes foliosos edentibus, foliis breviter ovatis, floribus minoribus. *P. chionæa* Boiss. quoque affinis differt bracteis floribusque fere duplò majoribus illos *P. niveæ* æquantibus acutis. *P. capitata* Lam. ut in Voy. bot. Hisp. demonstravi est eadem ac *P. nivea* DC. species diversissima. An tamen *P. chionæa*, *serpyllifolia* et *Kochiana* in

locis natalibus accuratè examinatæ speciei polymorphæ varietates non erint?

Loco *P. Sinaicæ* Fresen in. pl. Pinard. exs. pone *P. desertorum* Boiss. Diagn.

PARONYCHIA FLAVESCENS Boiss.

P. perennis tota pilis adpressiusculis brevibus densis canescens cæspitosa, caulibus brevibus a basi floriferis, foliis minimis oblongo-lanceolatis obtusiusculis, stipulis albo-scariosis lanceolatis acutis folia æquantibus, floribus densè aggregatis, bracteis ochroleucis magnis reniformi-rotundatis muticis calyces totamque ferè plantam occultantibus, sepalis adpressè hirsutis angustè linearibus obtusis valdè inæqualibus obscurè trinerviis immarginatis.

Hab. in deserto *Arabie petreæ* ad fines Palæstinæ. (Boiss.)

Species habitu *P. chionæam* et *Sinaicam* Fres. referens ab eis et omnibus aliis bracteis flavidis rotundatis omninò muticis, calycis laciniis linearibus obtusis inæqualibus distinctissima.

CRASSULACEÆ.

UMBILICUS LINEATA Boiss. (Sect. *Rosularia*.)

U. perennis, foliis radicalibus rosulatis elongatis lingulatis lineari-spathulatis obtusissimis facie sparsim papillois margine ciliatis, scapis extrarosularibus ascendentibus densiusculè foliosis foliisque angustè linearibus strictis valdè papilloso-hirsutis, floribus in cymam semel vel bis bifidam unilateraliter dispositis laxiusculis, pedunculis calyce brevioribus infrà ortum bractea lineari suffultis, cymæ ramis flexuosis valdè papillois viscidulis, calyce valdè papilloso viscidulo ferè ad basin usquè in lacinias triangulari-lanceolatas longitudinaliter lineatas partito, corollæ roseæ extus longè papilloso-hirsutæ laciniis lanceolatis acuminatis calyce tertiâ parte longioribus longitudinaliter purpureo-lineatis, filamentis basi dilatatâ corollæ ad hujus tertiam partem usquè adnatis, carpellis parçè puberulis ovatis contiguïs in mucronem brevem rectum abeuntibus.

Hab. ad rupes præruptas ad mare Galilæum juxtâ *Tiberiadem* alt. circ. 400 pedes infrà mare. Legi flor. Maio.

Folia radicalia 1-4 1½ poll. longa 2-2 1½ lin. lata, caules 3-4 pollicares, cymæ rami 1-4 1½ pollicares, flores eis *U. Libanoticæ* ferè majores; ab eâ præter indumentum copiosius viscidius totius inflorescentiæ distinctissima est floribus non paniculatis sed in cymam bifidam dispositis. Hæc notâ accedit ad *U. Persicam* Boiss. quæ differt glabritie totius inflorescentiæ, floribus angustioribus et præsertim calyce corollâ triplò nec tertiâ parte breviori.

UMBILICUS CHRYSANTHA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Rosularia*.)

U. perennis tota papilloso-hirta viscidula, foliis radicalibus rosulatis abbreviatis oblongo-spathulatis planis utrâque facie et margine dense papilloso-hirtis, scapis floriferis e centro rosulæ ortis foliosis rectis supernè breviter paniculatis, foliis caulinis strictis ovato-oblongis obtusiusculis, pedicellis calyci subæquilongis infrâ ortum bractea oblonga eis breviori suffultis, calyce papilloso ferè ad basin usquè in laciniis triangulares acutas partito, corollæ luteæ calyce duplò longioris laciniis lanceolatis acutis lineâ rubrâ dorsali purpureâ papillosâ percursis cæterùm glabriusculis, filamentis basi dilatatis ad tertiam partem usquè corollæ adnatis, carpellis oblongo-linearibus rectis contiguis supernè in rostrum acutum papillosum stylo terminatum longè attenuatis.

Hab. in summitate occidentali montis *Gheidagh* Tauri Isaurici suprâ *Maria* alt. 6000'.

Folia 4-5 lin. longa, 2-3 lata, scapi 2-3 pollicares, panicula ovata contracta, flores eis *U. Libanoticæ* ferè majores, corollâ 5-6 lin. longa. Pulchra stirps ab *U. aizooni* Fenzl. quoque flaviflora foliis abbreviatis, scapis non extrarosularibus, paniculâ multiflorâ etc. distinctissima. Ab *U. pubescenti* Ledeb. cui propius accedit diversa floribus 2-3 plò majoribus, sepalis acutioribus, carpellis contiguis nec stellatim divergentibus.

SEDUM RADICOSUM Boiss. et Hohen. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846.

S. glabrum, radice perenni a collo valdè tuberoso-incrassatâ brevi napiformi rosulam solitariam foliorum edenti, foliis planis oblongo-lingulatis obtusis, scapo extrarosulari elato foliolis paucis squamæformibus demùm deciduis obsito apice in paniculam ramosam confertifloram oblongam abeunti, paniculæ ramis flexuosis pedicellisque flori

subæquilongis glaberrimis, calycis carnosuli glabri laciniis ovato-oblongis obtusiusculis, petalis calyce quadruplò longioribus lanceolatis acutis pallidè carneis lineà purpureà percursis, carpellis glabris oblongo-linearibus rectis contiguis in cuspidem longiusculam abruptè attenuatis.

Hab. in monte *Demawend* propè pagum *Ask* Kotschy N° 606.

Rosula omninò *Sempervivi* foliis 8-10 lin. longis 3 latis constans, scapi semipedales, panicula multiflora 1 1/2-2 poll. longa, flores 2 1/2 lin. longi. Species distinctissima propè *S. sempervivum* collocanda.

SEDUM CRETICUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1847.

S. annuum vel *bienne*, radice fibris paucis longis cylindricis constanti, caule basi incrassato rosulam subelongatam densamque foliorum edenti, foliis planis oblongo-spathulatis obtusissimis glabris, ramis brevibus unilateralibus patenti-subscorpioideis secùs caulem alternis paniculam suprarosularem densiusculam multifloram subspiciformem formantibus, inflorescentià totà glanduloso-puberulà, bracteis ad ramorum basin ovato-rotundis ad pedicellos minimis oblongo-linearibus, pedicellis brevissimis, calycis glanduloso-puberuli laciniis ovatis obtusis, corollà glandulosà obscurè rubellà calyce duplò longiori, petalis elliptico-lanceolatis acutis, carpellis glabris oblongis dorso gibboso-incurvis inter se contiguis apice breviter cuspidatis.

Hab. in saxosis faucis *Korduliotiko* Eparchiæ *Hagiovasily* Cretæ (Heldreich). Fl. Jun.

Affine *S. cepeæ* et *S. tetraphyllo* ab eis distinctissimum foliis omnibus ad basin caulis in rosulam elongatam congestis, paniculæ subradicalis densæ ramis cymiformibus, floribus subglobosis nec patentibus, sepalis obtusis, carpellorum formà. Folia circ. 6 lin. longa 2 1/2 lata, panicula 2-4 pollicaris pollicem lata.

SEDUM TRISTRIATUM Boiss. et Heldr. in plant. Cret. exs. 1847.

S. perenne totum pilis papillaribus brevissimis puberulum, foliis rosulatis planis oblongo-spathulatis rotundatis basi attenuatis, caulibus floriferis humilibus extrarosularibus ascendentibus foliosis, foliis caulinis minoribus ovato-oblongis, floribus paucissimis terminalibus laxiusculè corymbosis, pedicellis calyce longioribus basi bracteolà stipatis, calycis valdè papilloso-hirti laciniis triangulari-lanceolatis acutis,

petalis lanceolatis longè setaceo-acuminatis calyce triplò longioribus pallidè carneis tristriatis, carpellis...

Hab. in saxosis montis *Volakia* suprà *Omalo* in montibus *Sphacioticis* occid. alt. 6000'. (Heldr.)

Affine *S. hirsuto* a quo differt foliis magis planis e sicco tenerioribus majoribus 4-5 lin. longis 1 1/2 latis, petalis longè setaceo-acuminatis, cymis paucifloris. *S. glanduliferum* Guss. ob folia teretia minora sepala petalaeque obtusa longius distat.

SEDUM BITHYNICUM Boiss.

S. perenne pumilum, caulibus procumbentibus fibrilliferis ramosè dense foliosos alios floriferos alios steriles edentibus, foliis semiteretibus linearibus glabris obtusis basi æqualibus ramorum steriliùm paulò brevioribus, floribus pentameris in cymas terminales breviter ramosas laxiusculè dispositis, pedicellis calyce brevioribus cymæque ramis pubescenti-glandulosis, calycis parvi visciduli laciniis oblongis obtusis corollà quadruplò brevioribus, petalis pallidè roseis viscidulis lanceolatis longè attenuato-subulatis lineà purpureà percursis, antheris 10 nigricantibus, carpellis pubescentibus ovatis erecto-patulis in cuspidem longiusculum abruptè attenuatis.

Hab. in regione medià *Olympi Bithyni* ubi legi floriferum Jul. 1842.

Simillimum habitu *S. pallido* MB. et *S. Hispanico* ab eis egregiè distinctum radice nec annuà nec bienni sed perenni stolones foliosos edenti. Collocandum juxtà *S. tenellum* MB. affine sed quod differt floribus confertioribus, petalis obtusiusculis calycem parùm superantibus etc.

SEDUM ORIENTALE Boiss.

S. annuum vel bienne pumilum multicaule, caulibus inflorescentiæque plus minùs breviter puberulis, foliis primùm rosulatis dein secùs caules floriferos sparsis semiteretibus linearibus obtusis glabris vel sparsim puberulis, cymis terminalibus 3-5 fidis ramis abbreviatis, floribus 6-7 sessilibus densiusculis, calycis laciniis triangulari-ovatis acutis, petalis calyce quintuplò longioribus carneis lineà purpureà percursis lanceolatis longè setaceo-acuminatis, staminibus 10-12, antheris nigricantibus, carpellis erecto-patentibus rectis oblongis acutis viscido-puberulis stylo longiusculè rostratis.

Hab. in montanis totius Orientis, Græciæ in *Hymetto* (Heldr.) *Taygeto* (Heldr.). Anatoliâ in montibus *Smyrnæ* et *Tmolo* (Boiss.), rupibus *Antiochiæ* in Syria (Boiss.), *Macedoniâ* (Griseb.).

S. Hispanicum β . *Buxbaumii* Gris. Spic. — *S. Hispanicum* var. *glandulosa* Boiss. et Heldr. pl. exs.

Species a *S. Hispanicum* cui affinis distincta foliis crassioribus densioribus, cymis confertioribus, floribus ferè duplò majoribus intensius roseis, petalis longè acuminatis, carpellis vix divergentibus nec stellatim patentibus puberulis nec glabris. *S. pallidum* MB. differt quoque floribus pallidis, carpellis stellatim patentibus. *S. eriocarpum* ex icone et descriptione longè differt glabritie, floribus pentameris, sepalis ovatis obtusis brevissimis. Icon Buxbaumii cent. 2 tab. 45 fig. 4 ob folia majora carpellaque patentim stellata non hùc mihi spectare videtur.

SEDUM PALÆSTINUM Boiss,

S. annuum præter inflorescentiam glandulis minimis paucis conspersam glabrum, caulibus nanis basi ramosis apice in cymas breves 2-3 fidas unilaterales divisus, foliis citò deciduis semiteretibus linearibus obtusis basi æquali sessilibus, floribus sessilibus sectis cymæ ramos approximatis pentameris decandris, calycis glaberrimi minimi laciniis breviter ovato-triangularibus acutiusculis margine pallidioribus, petalis calyce sextuplò longioribus e sicco pallidissimè lutescentibus glabris lanceolatis breviter attenuato-cuspidatis dorso carinato-nervosis rubellis, antheris nigricantibus, carpellis angustè oblongo-cylindricis rectis vix divergentibus in rostrum breve attenuatis sub lente punctatis glabris.

Hab. in siccis montis *Carmeli*, in *Libano* suprâ *Cedros* legi 1846.

Plantula bipollicaris, cymæ rami primùm 6-7 lineas dein post anthesin pollicem ferè longi, flores illis *S. Hispanici* paulò minores. Affine *S. pallido* MB. quod differt foliis longioribus, calycis laciniis minùs abbreviatis acutioribus, petalis pallidè carneis longè acuminatis sæpiùs hirtis, carpellis puberulis in rostrum eis æquilongum abruptè attenuatis. *S. littoreum* quoque affine differt foliis multò latioribus, floribus duplò majoribus, sepalis saltem corollam mediam æquantibus. *S. annuum* distinguitur calyce corollam subæquanti etc.

GROSSULARIACEÆ.

RIBES MELANANTHUM Boiss. et Hoh. in Kotsch. pl. Pers. bor. 4846.
(Sect. *Ribesia*.)

R. inerme, ramis abbreviatis tortuosis, foliis ad ramulorum apicem confertis parvis petiolo patulè pubescenti suffultis utrinquè puberulis eglandulosi viridibus suborbiculatis ad medium usquè trilobis lobis breviter et obtusè 3-5 dentatis, racemis ad apicem ramulorum solitariis folia superantibus tenuibus laxiusculis, axi tomentosa, pedicellis eglandulosi hirsuti calyce paulò brevioribus basi bractea oblonga acuminatà albidà pellucidà glanduloso-ciliatà florem æquanti suffultis, floribus parvis, calycis atropurpurei pilis albis hispidi tubo ovato apice subconstricto, limbi erecto-patuli laciniis ovatis obtusis, petalis orbiculatis atro-purpureis minimis, stylo summo apice bifido, baccâ...

Hab. in saxosis jugi *Nasseron* montis *Demawend* Kotschy N° 349.

Suffrutex ut videtur humilis, folia diametro 4-5 lin. lata, racemi pollicares vel paulò longiores, flores e minimis generis. Affinis *R. Orientali* foliis majoribus minùs incisis glandulosis, bracteis linearibus flores superantibus, floribus flavovirentibus diverso.

SAXIFRAGACEÆ.

SAXIFRAGA TAYGETEA Boiss. et Heldr. (Sect. *Hydaticea*.)

S. perennis caespitosa rhizomate tenui rufescenti, foliis ferè omnibus radicalibus petiolo longo tenui longè et crispè hirsuto suffultis parvis margine sub lente hirtulis cæterum glabris herbaceis firmis immarginatis reniformi-cordatis subrotundis vel transversè latioribus 5-9 crenato-lobatis lobis rotundatis obtusissimis muticis, scapis nudis vel foliolum unum alterumve lineare vel trifidum ferentibus infernè crispè hirtis supernè breviter glandulosi, floribus pedicello eis longiori suffultis paniculam paucifloram subcorymbosam formantibus, bracteis lineari-setaceis minimis; calycis glabriusculi laciniis oblongis obtusiusculis, petalis albis rubro-punctatis ellipticis obtusis calyce triplò

longioribus, capsulâ oblongâ apice emarginatâ stylis divergentibus superatâ, seminibus brevissimis oblongis angulato-costatis.

Sax. Olympica var. *microphylla* pl. Tayg. exs. 1845.

Hab. in rupestribus muscosis umbrosis humidis *Taygeti* superioris infrâ rives loco *Koupata* dicto. (Heldr.)

Species a nobis diù pro *S. Olympica* var. habita nunc ab eâ characteribus firmis etsi lævibus ut videtur diversa; folia duriora firmiora nunquam diametro 6-7 lin. excedentia et sæpius minora crenis 7-9 nec 15-20 rotundatis nec attenuato-apiculatis donata, panicula ob pedicellos longiores laxior, semina costulata.

UMBELLIFERÆ.

ERYNGIUM HELDREICHII Boiss.

E. perenne glaberrimum pallidè virens, collo longè densèque fibrilifero, foliis radicalibus longè petiolatis petiolo canaliculato, limbo parvo orbiculato bis tripartito partitionibus iterum profundè lobatis inter divisiones spinoso-dentatis laciniis lanceolatis in spinam brevem flavidam abeuntibus, foliis caulinis petiolo brevissimo dilatato suffultis minùs multifidis, caulibus erectis simplicibus apice 4-5 capitula subumbellata hemisphærica ferentibus, involucri phyllis capitulo triplò longioribus lanceolatis dorso carinatis plurinerviis pungentibus integris vel rariùs dente uno alterutrove medium versùs auctis, paleis subulatis spinosis calyces paulò superantibus, calycis tubo papilloso laciniis a basi oblongâ nervo crasso percursâ subulatis corollam paulò superantibus.

Hab. in monte *Boudroun* Pisidiæ alt. 5000' (Heldr.), monte *Gebel Scheick* Antilibani alt. 7000-9000'. (Boiss.)

E. Billardieri in pl. Anat. Heldr. non Delar.

Planta 1-1 1/2 pedalis, folia radicalia ambitu sesquipollicaria, petiolus 4-5 poll. longus, involucri phylla 1-1 1/2 poll. longa basi 2 lineas lata; habitus omninò *E. Bourgati* quod differt foliis minùs multifidis laciniis margine semper integerrimis, capitulis conicis, paleis calyces duplò superantibus, tubo calycino minùs densè et ad angulos tantùm papilloso. Hanc speciem priùs retuleram ad *E. Billardieri* quod ipse postea ad radices Antilibani propè *Rascheya* legi et quod a nostrâ

specie eximiè differt foliis multò amplioribus sæpè ambitu semipedalibus laciniis lobisque latis, caule 3-4 pedali apice paniculato-ramoso, involucri phyllis angustioribus cum spinis subulatis brevibus alternantibus.

In plantis Heldr. in Taygeto anno 1844 lectis pro *E. amethystino* var. *tenuifolio* Boiss. et Heldr. pone *E. multifidum* Fl. Græc. tab. 259 quod foliis tenuius dissectis et præsertim involucri phyllis profundè pinnatifidis ab. *E. amethystino* specificè distinctum videtur.

ERYNGIUM PALMITO Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.

E. perenne glaberrimum pallidè virens, collo radicis nigræ densè fibrilloso, foliis radicalibus inferioribusque ad apicem petioli canaliculati palmatim 5-7 partitis partitionibus gramineis angustè linearibus longissimis planis parallelè multinerviis integris rarius hinc indè denticulo uno alterove obsitis, caulinis tripartitis petiolo dilatato vaginanti suffultis laciniis abbreviatis, summis ad capitulorum basin sitis ad vaginam e basi oblongà denticulatà longissimè acuminatam pungentem reductis, caule simplici foliorum radicalium laciniis subbreuiori apice 5-9 capitula subrotunda præter supremum pedunculatum ad vaginæ supramas subsessilia solitaria vel bina ternave ferenti, involucri phyllis lanceolatis subcarinatis albo-nervosis acuminatis pungentibus utrinquè versùs basin 4-2 denticulatis capitulo subduplò longioribus, paleis lanceolato-linearibus pungentibus nervo valido instructis calyces æquantibus, calycino tubo densissimè albo-papilloso laciniis oblongis nervo medio crasso in mucronem brevem pungentem producto.

Hab. in aridis pinetorum umbrosorum in faucibus montis *Anemas* Lycæoniæ, Aug. fine vix florere incipiebat. (Heldreich.)

Caulis sesquipedalis, foliorum radicalium petioli 4-6 pollicares, laciniæ $1\frac{1}{2}$ -4 $1\frac{1}{2}$ pedes longæ! vix 2 lineas latæ, capitula magnit. avelanæ. Species memorabilis, laciniis longissimis foliorum species quædam Americanas ejusdem generis referens, *E. ternato* Poir. Cretico hucusquè malè noto probabiliter affinis.

SISON EXALTATUM Boiss.

S. bienne vel perenne glaberrimum caule tereti elatissimo ramosissimo, ramis pluries dichotomis tenuiter virgatis, foliis petiolo dilatato suffultis radicalibus sub anthesi exsiccatis bipinnatisectis partitionibus

subsessilibus oblongo-lanceolatis laciniis ovatis mucronatis, foliis caulinis inferioribus angustissimis pinnatisectis segmentis setaceo-filiformibus paucis remotis abbreviatis, foliis supremis ad vaginulam apice 4-3 lobos lineares breves ferentem reductis, umbellis terminalibus parvis longiusculè pedunculatis sexradiatis radiis inæqualibus, involucri quinquephylli foliolis linearibus acutis brevibus, involucelli phyllis lanceolatis acutis minutissimis, pedicellis inæqualibus longioribus florem vix duplò superantibus, petalis albis vittà latà rubrà totà longitudine percursis emarginatis cum lacinulà inflexâ, fructu (juniori) ovato a latere compresso vittis latis rubris totam valliculam occupantibus percurso, stylis stylopodio conico-depressissimo incumbentibus eoque æquilongis.

Hab. inter frutices regionis montanæ calidioris Libani ubi legi juxtà palatium principis Drusorum ad *Beteddein* propè *Deir el Khamar* et non procul a pago *Abeih*. Planta serotina fine Julii tantum florens.

Caules 5-8 pedales, folia radicalia quantum e fragmentis exsiccatis judicare possum illis *Sis. amomi* minora, laciniae caulinarum magis setaceæ, umbellarum radii 5-6 lin. longi. Flores et fructus juniores omninò *S. amomi* sed styli depressi stylopodium æquantes nec erecti brevissimi, vittæ fructu æquilongæ nec abbreviatæ. Quamvis character vittarum paulò differat omninò *Sisoni* adnumerandum videtur.

CARUM FERULÆFOLIUM Boiss. (Sect. *Pachypus*.)

C. radice bulbosâ, foliis radicalibus tripinnatisectis partitionibus longè petiolulatis laciniis linearibus elongatis acutiusculis, caule a basi parçè et divaricatum dichotomo flexuoso, umbellis 8-12 radiis, involucellis oligophyllis, umbellæ fructiferæ stellato-patentis pedicellis incrassatis fructu prismatico-cylindrico subæquilatis æquilongisque, mericarpis linearibus margine per totam longitudinem contiguis, carpophoro tenui, dentibus calycinis sub marginis subundulati ferè obsoleti formâ fructum terminantibus, stylopodio cupulari depressissimo fructus apice paulò angustiori, stylis stylopodioque æquilongis.

C. divaricatum Koch. Syn. — *Bumium ferulæfolium* Desf. Coroll. t. 43.

Hab. in agris *Dalmatiæ*! insularum *Græciæ*! *Cretæ*!

Specimina Cretica ab amic. Heldreich lata me docuervnt plantas Græcas et Dalmaticas eandem speciem esse et nomen Fontanesianum

antiquius ideò servandum esse. Diagnosem dedi ob comparisonem cum spec. sequentibus.

CARUM BRACHYCARPUM Boiss. (Sect. *Pachypus*.)

C. radice bulbosâ, foliis radicalibus tripartitis partitionibus pinnatipartitis laciniis paucis angustè linearibus obtusis, caule a basi parçè et divaricatim dichotomo flexuoso, umbellis 6-8 radiatis, involucellis oligophyllis, umbellæ fructiferæ stellato-patentis pedicellis parùm incrassatis fructu prismatico-cylindrico angustioribus paulòque longioribus, carpophoro tenui, mericarpiis linearibus margine per totam longitudinem contiguis, dentibus calycis sub formâ calli circularis ad apicem fructûs persistentibus, stylopodio cupulari depressissimo bipartito fructu angustiori, stylis stylopodio æquilongis.

Hab. in cultis regionis montanæ Anatoliæ occidentalis, Mesogi propè Derwend, Cadmo supra Geyra. (Boiss.)

Affine *C. ferulæfolio* tamen certè distinctum foliis radicalibus multò minùs amplis minùsque divisis, pedicellis fructiferis vix incrassatis, mericarpiis ferè dimidiò brevioribus lineam $1\frac{1}{4}$ tantùm longis, stylopodio bipartito.

CARUM CYLINDRICUM. Boiss. et Hohen. in Kotschy. pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Pachypus*.)

C. radice bulbosâ, foliis radicalibus tripartito-pinnatipartitis partitionibus breviter petiolatis segmentis oblongis subpinnatipartitis lobulis 2-3 fidis sublinearibus abbreviatis, caule humili flexuoso simplici vel parçè dichotomo, umbellis 5-6 radiatis, involucelli phyllis paucis lanceolatis angustè marginatis, umbellæ fructiferæ stellato-patentis pedicellis parùm incrassatis fructu elongato cylindrico prismatico brevioribus angustioribusque, carpophoro tenui, mericarpiis linearibus margine per totam longitudinem inter sè contiguis, dentibus calycinis omninò obsoletis, stylopodio conico-obtuso fructu angustiori stylis circinnato-recurvis eo longioribus coronato.

Hab. in monte Elbrus propè Derbent Kotsch. N° 448.

A. duobus præcedentibus diversum foliorum laciniis abbreviatis lobuliformibus, fructu 3 lineas longo, stylopodio mamillæformi depresso-conico nec cupulari, stylis elongatis.

BUNIUM CASSIUM Boiss.

B. glaberrimum, radice bulbosâ globosâ, foliis radicalibus..., caulinis tripartitis partitionibus pinnatipartitis laciniis linearibus elongatis, caule tenui elato junceo angulato-striato dichotomè ramoso ramis erectis supernè flexuosis, umbellis subæqualiter et longè 5 radiatis, involucri phyllis 2-5 linearibus acutis brevissimis, umbellulis etiam fructiferis parvis contractis, pedicellis involucelli phylla lineari-setacea vix superantibus fructu oblongo a latere compresso æquilongis, petalis albis profundè bilobis, calycinis dentibus obsoletis, mericarporum jugis parùm prominulis, valleculis 2-3 vittatis, stylopodio depressissimo ferè obsoleto, stylis deflexis fructûs dimidiam longitudinem æquantibus.

Hab. in regione montanâ sylvaticâ montis *Cassii* Syriæ borealis ubi legi Jun. 4846.

Bipedale tenue, radii umbellæ ferè pollicares, umbellulæ piso vix majores fructiferæ non auctæ, fructus vix sesquilineam longus. Affine *B. macuca* et *B. montano* quæ ambo cæteris neglectis differunt stylopodio bipartito mamillari, stylis stylopodium vix superantibus. Petala in hac specie ferè ut in *C. eleganti* profundè biloba, pedicelli fructiferi tenuissimi.

BUNIUM PESTALOZZÆ Boiss.

B. glabrum radice bulbosâ caulibus tenuissimis tenuiter striatis teretibus junceis dichotomè et parcè ramosis corymbosè umbellatis, foliis radicalibus..... caulinis paucis in lacinias paucas angustè lineares divisis, umbellis pedunculis gracilibus longiusculis suffultis subæqualiter 5-8 radiatis, involucelli phyllis nullis vel 4-2 minutissimis, involucelli phyllis lanceolatis acutis albo-marginatis pedicellos subæquantibus, umbellulis fructiferis contractis, pedicellis angulosis fructum oblongo-linearem brevem subæquantibus, mericarpiis linearibus subincurvis jugis albidis prominulis, valleculis trivittatis, coronulâ dentium calycinorum subnullâ, stylopodio bilobo mamillari conico-depresso fructu subangustiori stylis deflexis eo æquilongis superato.

Hab. in montanis *Lyciæ* propè *Elmalu*, legit et mihi comm. clar. Pestalozza.

Affine *B. Cassio* sed minùs vix pedale, caules ramique tenuissimi rigiduli striati nec subangulati, petala non profundè biloba, pedicelli

fructiferi angulati, mericarpiæ linearia stylopodio manifesto styloque brevi superata. *B. macuca* Boiss. valdè affine tamen sat differre videtur involucri phyllis numerosioribus longioribus, stylis longioribus. *B. montanum* Koch eisdem ferè notis radicis pedicellisque crassioribus differt.

BUNIUM GLAUCOCARPUM Boiss.

B. glabrum, radice ovatâ bulbosâ basi densè fibrilliferâ, caule pumilo parte subterraneâ valdè tortuoso divaricatim et parcè ramoso, foliis radicalibus..., caulinis pinnatipartitis laciniis paucis linearibus elongatis, umbellis subæqualiter 6-7 radiatis, involucri phyllis paucis brevissimis demùm evanidis, involucelli phyllis lanceolatis albo-marginatis pedicello triplò brevioribus, umbellæ fructiferæ pedicellis rigidiusculis inæqualibus exterioribus longioribus fructu ovato a latere compresso subduplò longioribus, mericarpis subincurvis, jugis subangulosis albidis, pericarpio nigro glaucescenti ruguloso, valleculis trivittatis, dentibus calycinis coronulam subobsoletam formantibus, stylopodio bipartito breviter et obtusè mamillæformi fructu dimidiò angustiori, stylis deflexis stylopodio duplò longioribus.

Hab. inter lapides circà Cedros *Libani* ubi legi fructif. Jul. 1846.

Affine *B. nivali* quod differt foliorum teneriorum laciniis uninerviis nec enerviis, involucelli phyllis pedicellos æquantibus, fructu magis elongato. Mericarpiæ in hac specie crassiuscula lineam vix superantia.

PIMPINELLA APIIFOLIA Boiss. (Sect. *Tragium*.)

P. perennis tota sub lente brevissimè cinescenti-velutina, caule crasso acutè striato ad ramorum et foliorum insertionem nodoso infernè valdè folioso suprâ basin corymboso-ramoso ramis foliosis elongatis, foliis caulinis petiolo plano basi dilatatâ secùs caulem decurrenti suffultis bipinnatipartitis partitionibus duabus inferioribus petiolatis segmentis oblongis cuneatis plus minùs profundè 3-5 fidis lobis ovatis acutiusculis, rameis pinnatipartitis segmentis cuneato-linearibus, involucri involucellique phyllis 5 linearibus tomentellis hisce flores subæquantibus, umbellis 10-13 radiatis, pedicellis floriferis hirsutis flore paulò longioribus, ovariis densè niveo-villosis, petalis parvis albis dorso puberulis...

Hab. in monte *Karadja Dag*h Assyriæ Kotschy, N° 193.

Pedalis, folia formâ segmentorum ea *Apii graveolentis* referencia sed minora 2-3 pollic. longa, segmenta 3-4 lin. longa 2-3 lata, radii umbellæ pollicem aut paulò amplius longi. Affinis *P. Kotschyanae* et *P. crinitæ*, a priori distinguitur involucellis 5 nec 3 phyllis flores æquantibus, ovario juniore multò longius albo-villoso, a posteriori cui ovario accedit differt foliis minus incis, involucelli phyllis non membranaceis.

PIMPINELLA REUTERIANA Boiss. (Sect. *Tragium*.)

P. perennis tota sub lente parcesimè pilis brevibus adpressis puberula vel glabrescens, caule elato erecto striato jam imò basi dichotomo ramoso ad dichotomias nodoso, ramis erectis elongatis, foliis inferioribus petiolo basi in vaginam amplexicaulem nervosam dilatato suffultis pinnatisectis 3-4jugis segmentis præter terminale sessilibus ovatis basi obliquis circumcincta crenato-dentatis, foliis superioribus vaginâ basi suffultis pinnatisectis segmentis angustatis in lacinias oblongas vel lineares profundè fissis, foliis summis in lacinias paucas angustè lineares divis, umbellis ad apicem dichotomiarum tenuiter 12-13 radiatis fructiferis patulis nec contractis pedicellisque hirtulis, involucris involucellisque nullis, petalis albis dorso hirtulis parvis vix radiantibus ad tertiam partem bilobis cum lacinulâ inflexâ, fructu rufescenti pilis albis brevibus patulis hirsuto ovato a latere compresso apice sub stylopodio attenuato, stylopodiis duobus a basi distinctis conicis mericarpiorum apice latioribus in stylos eis paulò longiores attenuatis, mericarpiis facie commissurali subincurvis bivittatis jugis obsoletis, valleculis tenuissimè 3-4 vittatis.

Hab. in monte *Elbrus* Persiæ borealis propè *Derbent* (Kotschy).

P. peregrina Kotsch. pl. Pers. bor. N° 405 non L.

Hanc plantam e specimine imperfecto prius pro *P. peregrinâ* habueram donec specimina meliora e seminibus Persicis oriunda et ab amic. Reuter communicata me docuerint illam speciem diversissimam sistere *P. peregrina* est planta biennis nec perennis parè et corymbosè nec dichotomè elongatim et copiosissimè umbellifera; ejus umbellæ sunt ampliores multiradiatæ et fructiferæ contractæ nec ut in meâ specie patulæ, flores paulò majores, fructus deniquè subsphæricus longè hispidus minimè apice in collum attenuatus stylopodiis tenuissimis fructu multò angustioribus coronatus.

PIMPINELLA TRIRADIATA Boiss. (Sèct. *Tragium*.)

P. perennis, foliis omnibus radicalibus adpressè puberulis humi expansis petiolo rigido patulo basi vaginanti suffultis pinnatim 2-3jugis, segmentis coriaceis ovatis obliquè cuneatis argutè crenatis lateralibus sessilibus indivisis terminali pedicellato plus minus profundè trisecto, caulibus præter vaginas petiolares inferiores folium minimum in lacinias lineari-cuneatas trifidas pinnatisectum ferentes nudis infernè puberulis cæterum glabris teretibus jam a basi rigidè et dichotomè ramossissimis ramis subdivaricatis rigidis, umbellis terminalibus parvis tri-radiatis umbellulis 6-10 floris, pedicellis pubescentibus exterioribus florem vix æquantibus, petalis albis dorso puberulis emarginato-bilobis cum lacinulâ inflexâ, fructu (juniori) ovato breviter tomentoso stylopodio depresso subbilobo stylisque divaricatis longis superato.

Hab. in lapidosis Libani in Cœlesyriâ inter *Ainete* et *Deir el Achmar*. Julio (Boiss.)

Folia radicalia cum petiolo 2-3 poll., segmenta 3-4 lin. longa, caules ferè pedales, rami tenues, umbellarum majorum radii 6 lin. longi. Affinis *P. tragio* a quâ differt caulibus a basi rigidè et divaricatis ramosis, foliis expansis, umbellis semper 3 radiatis nec 5-7 radiatis multoque minoribus, stylopodio subbilobo.

BUPLEVRUM PULCHELLUM. Boiss. et Heldr. in pl. Anat. 1846.

B. annuum, caule erecto gracili angulato-striato a basi ramoso, foliis linearibus 5 nerviis marginè angustè membranaceis acutis infimis basi attenuatis superioribus basi non latiori caulem cingentibus, ramis tenuibus erectis pluries dichotomis, umbellis terminalibus irregularibus inæqualiter triradiatis, involucellis oblongo-linearibus acuminatis subtrinerviis, involucelli flore subsesquilongioris phyllis quinque ovatis mucronatis quinquenerviis hyalinis nervis omnibus ramulosis apice anastomosantibus.

Hab. in rupestribus Pamphyliaë propè *Kourmalu* ubi cl. Heldr. legit fructiferum fine Aprilis 1845.

Planta 1½-1 pedalis, folia inferiora 3-4 pollices longa 2 lin. lata, involucelli phylla vix 2 lin. longa lineam lata. Valdè affine *B. Aleppico* Boiss. quod satis differre videtur involucri phyllis ellipticis duplò majoribus flores plus duplò superantibus nervis ad apicem usquè perductis nec tantum ramulis lateralibus inter se anastomosantibus.

BUPLEVRUM SUBUNIFLORUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.

B. annuum glaberrimum, caule striato tereti a basi irregulariter dichotomo ramosissimo infracto-flexuoso ramis tenuissimis pluriès et dichotomè ramulosis flexuosis ramulis capillaribus flexuoso-recurvis foliolosis paniculam effusissimam formantibus, foliis linearibus quinqueriviis margine sub lente obsoletè denticulato-scabridis apice sensim acuminatis inferioribus basi attenuatis, ramulorum minimis lineari-subulatis ramulo adpressis, umbellis ad umbellulas solitarias minutissimas 1-3 floras ramulos terminantes radio capillari suffultas reductis, involucelli phyllis 3-4 setaceis acutis flores paulò superantibus, petalis pallidè luteis, pedicellis ovario oblongo acutè jugato dimidiò brevioribus.

Hab. in *Tauro Pamphylico* inter *Marla* et *Adalia*. Alt. circ. 3000' in saxosis inter frutices. (Heldr.)

Planta curiosissima ferè pedalis, folia inferiora 1-1 1/2 poll. longa sesquilineam lata, ramuli superiores abortu plurium dichotomiarum infracto-flexuosi foliolis setaceis 1/2-1 lin. tantum longis obsiti paniculam nebulosam effusam formantes apice tantum vel propè apicem umbellulas pedunculatas sæpiùs 1-2 floras cum involucello vix lineam longas ferentes.

BUPLEVRUM DICHOTOMUM Boiss.

B. annuum caule pumilo tenui a basi dichotomè ramosissimo, ramis tenuissimis rigidulis, foliis radicalibus linearibus brevibus, caulinis basi æquali caulem cingentibus margine subrevolutis, omnibus rigidulis pallidè virentibus acutis 6-7 nerviis, umbellæ radiis ternis capillaribus subæqualibus, involucri phyllis ternis setaceis brevibus, involucellis 3-4 nis oblongo-lanceolatis acutis flore fructuque brevioribus, floribus luteis, fructu lineari lævi acutè jugato pedicello duplò longiori, valleculis evittatis.

Hab. in regione montanà jugi *Cassii* Syriæ. Legi Jun. 1846.

Affine *B. trichopodo* cui primùm ut variet. retuleram, ab eo differt caule multò magis dichotomo ramosiorique 5-6 pollic. tantum alto, umbellis 3 nec 4-5 radiatis radiis æqualibus, umbellulis 1-3 floris, involucelli phyllis non setaceo-acuminatis, pedicello fructum non æquantibus.

BUPLEVRUM KOTSCHYANUM Boiss.

B. perenne glaberrimum basi suffruticosum multicaule glaucum, caulibus virgatis erectis ramosissimis subangulatis, foliis opacis glaucis rigidis lanceolato-linearibus quinquenerviis basi attenuatis subttis subcarinatis acutis superioribus brevissimis lineari-setaceis, umbellis lateralibus et terminalibus inæqualiter 3-4 radiatis, involucri involu-cellique phyllis minutissimis lanceolatis acutis, floribus luteis, pedicellis fructiferis patentibus filiformibus... fructu prismatico sæpè subin-curvo sesquolongioribus, jugis filiformibus vix prominulis, valleculis angustè trivittatis.

Hab. in regione inferiori montium *Elbrus* et *Demawend* Persiæ borealis Kotschy N° 627 et 649 sub *B. Sibthorpiano*.

Hæc species valdè affinis est *B. Schimperi* Boiss. in quo folia quoque glauca quinquenerviaque sunt sed quod differt ramis patentibus, pedicellis floriferis flore brevioribus nec eo duplò longioribus, fructiferis contractis fructum æquantibus, mericarpiis glauco-cæsiis, valleculis exterioribus 5 vittatis. — *B. Sibthorpianum* Sm. est species affinis *B. Baldensi*, diversissima foliis elongatis trinerviis, umbellis 5 radiatis, umbellulis plurifloris et inprimis fructu elliptico-oblongo. *B. Sibthorpianum* DC. Prodr. e Persiâ boreali est *B. exaltatum* var. foliis linearibus a *B. Kotschyano* cui accedit fructu acutè jugato pedicello eo breviori suffulto statim dignoscendum.

SESELI CORYMBOSUM Boiss. et Heldr. (Sect. *Hippomarathroides*.)

S. bienne vel perenne glaucum totum brevissimè tomentellum, foliis tripinnatisectis laciniis linearibus acutis radicalibus petiolo plano suffultis ambitu elongato-oblongis caulinis e vaginâ brevi ovato-oblongâ subinflatâ multinervi pinnatim vel bipinnatisectis laciniis abbreviatis, caule striato simplici umbellam amplam centralem subsessilem multi-radiatam lateralesque longè pedunculatas corymbosas edenti, involucri nullis vel oligophyllis, umbellulis hemisphæricis densis, involucelli phyllis oblongo-lanceolatis albomarginatis umbellulâ brevioribus basi in discum expansum concretis, fructibus prismaticis breviter tomentellis.

Hab. in fissuris rupium regionis piniferæ montis *Anemas* Lycaoniæ suprâ *Tourtchalar* alt. 4000'. Aug. (Heldr.)

S. gummiferum pl. Anatol. exs. non Sm.

Planta speciosa pedalis vel sesquipedalis, folia ea *S. gummiferi* vel *rigidi* referencia sed magis elongata, umbella centralis vaginis summis pinnatisectis sæpè involuata 40-60 radiata, umbellulæ piso duplò majores. Hanc plantam habueramus pro *S. gummifero* quod differt involucri phyllis angustè linearibus acuminatis umbellulà longioribus. *S. rigidum* differt foliis glabris, caule paniculato-corymboso, umbellis triplò minoribus etc.

SESELI RADICOSUM Boiss. et Hohen. in pl. Kotsch. Pers. bor. 1846.

S. perenne, rhizomate crasso lignoso abbreviato ramoſo, caulibus duris virgatis erectis elatis subtiliter striatis teretibus remotè foliosis simpliciusculis, foliis radicalibus petiolo longo basi planiusculo superne subcanaliculato suffultis pinnatisectis 1 rariùs 2 jugis segmentis sessilibus coriaceis nitidis pallidè virentibus ovatis basi breviter cuneatis profundè tripartitis partitionibus acutè 2-3 lobis segmento terminati petiolato basi truncato, foliorum caulinarum sessilium partitionibus indivisis, foliis summis ad foliolum 2-3 partitum reductis, caule præter umbellam terminalem superne ramos brevissimos 4-5 umbellatos edenti, umbellis lateralibus 5-6 radiatis terminali 8-14 radiatà radiis omnibus sub lente brevissimè et parcè tomentellis, involucri phyllis 5-8 lineari-lanceolatis brevibus involucelli linearibus pedicellos subæquantibus, petalis minimis tomentellis albidis apice inflexis dorso subcanaliculatis, fructu pedicello æquilongo ovato a latere subcompresso tomentello, jugis vix distinctis, valleculis latè univittatis, commissurà bivittatà, dentibus calycinis triangularibus minimis stylopodio breviter conico apice bilobo in stylos deflexos eo duplò longiores abeunt.

Hab. in rupibus ad cataractas *Ser Abi Scher* dictas propè *Passgala* Kotsch. N° 448.

Caules bipedales, folia radicalia cum petiolo semipedalia segmentis tribus 5-7 lineas longis, umbellæ terminalis radii tantum 6-9 lin. longi. Valdè affine *S. Olivieri* Boiss. quod antè oculos non amplius habeo et quod e descriptione differt foliorum segmentis basi petiolulatis truncatisque, umbellis pauciradiis, stylopodio depresso stylis rectis coronato.

CRENOSCIADIUM Boiss. et Heldr.

Calycis dentes obsoleti. Petala æqualia alba oblonga dorso rufescenti-

vittata apice emarginata cum lacinulâ inflexâ obtusâ canaliculatâ. Fructus ellipticus a dorso subcompressus. Stylopodium breviter conicum apice fructûs angustius bipartitum in stylos deflexos attenuatum. Pericarpium tenuissimum. Mericarpiâ dorso subconvexa latere interiori plana jugis quinque æquidistantibus spongiosis obtusis lateralibus marginantibus crassioribus, valleculis 3-4 vittatis, commissurâ 6-8 vittatâ vittis magnis. Carpophorum filiforme ad basin tripartitum. Albumen anticè planum. — Herba Anatolica alpina habitu *Heraclei pumili*.

Genus inter *Seselineas* et *Peucedaneas* subdubium; fructus juniores teretes sunt, maturi autem a dorso potiùs compressi videntur. *Peucedaneis* quoque meliùs ob fructum multivittatum jugaque lateralialia paulò crassiora adnumerandum est.

CRENOSCIADIUM SHIFOLIUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.

C. glabrum perenne, radice subfusiformi simplici, caulibus ascendentibus angulato-sulcatis infernè foliosis parèque ramosis, foliis inferioribus petiolo plano brevi basi in vaginam membranaceam amplexicaulem dilatato suffultis pinnatisectis 1-2 jugis segmentis sessilibus vel petiolulatis oblongis cuneatis supernè acutè crenato-dentatis superiori sæpè trifido, foliis dichotomiarum ad vaginam angustam linearem acuminatam reductis, umbellis paucis terminalibus longè pedunculatis inæqualibus exinvolucratis quinquerradiatis fructiferis contractis, involucelli phyllis 1-2 pedicellos inæquales subæquantibus, fructu pedicellum erectum strictum æquanti, stylis deflexis stylopodio longioribus.

Hab. in herbidis humidis ad scaturigines montis *Anemas* Lycaoniæ alt. 5000-6000' ubi floriferum fructiferumque medio Aug. legit cl. Heldr.

Folia cum petiolo vix 2 poll. longa, segmenta 5-6 lin. longa 3-4 lata, caules 1½-4 pedales infernè bis vel semel dichotomi, umbellæ pedunculo 2-3 pollicari suffultæ diametro vix pollicares, flores magnitudinis *P. saxifragæ*, mericarpiâ circiter 3 lin. longa 4 lineam lata.

KUNDMANNIA? SYRIACA Boiss.

K. perennis glaberrima pallidè virens, foliis teneris radicalibus numerosis petiolo basi in squamam ovatam subfungosam dilatato suffultis ambitu triangularibus subternato-bipinnatisectis segmentis sessilibus ovatis basi sæpè cuneatis circumcircuità crebrè et obtusè serratis indi-

visis vel irregulariter 2 vel 3 fidis partitisve summo sæpius tripartito, caule erecto striato a basi ramosissimo subflexuoso ramis ramulisque patulis, foliis caulinis inferioribus breviter petiolatis minùs divisis segmentis angustioribus cuneatis acutis acutiùs serratis, superioribus ad vaginam oblongo-linearem apice in lacinias paucas angustè lineares canaliculatas multifidam reductis, umbellis subinæqualiter 15-25 radiatis breviter pedunculatis, involucri phyllis setaceis umbellà triplò brevioribus involucelli triangularibus acutis brevissimis, pedicellis flori subæquilongis, petalis flavo-virentibus, fructu...

Hab. in fissuris rupium calcareorum ponè urbem *Antiochiam* sitorum medio Junio vix florere incipiens. (Boiss.)

Bipedalis, caulis illo *K. Sicula* multò ramosior ramis patentibus, folia non ut in illà firma sed tenera segmentis minoribus 7-10 lin. longis 3-6 latis, umbellæ minores diametro sesquipollicares, flores subminores flavo-virentes nec aurantiaci, involucella breviter triangularia nec longè linearia. Quamvis fructum non viderim, de genere ob petalorum, ovarii junioris habitùs, et foliorum similitudinem vix dubito.

ANETHUM CHRYSEUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.

A. glabrum, caule nudiusculo crasso sulcato acutè angulato supernè strictè ramosissimo ramis elongatis subangulatis tenuibus junceis, foliis inferioribus... caulinis petiolo longo complanato convoluto suffultis brevibus bipinnatisectis laciniis linearibus elongatis crassiusculis acutis apice aculeolato-scabris, foliis summis ad vaginam linearem 3-4 fidam vel integram reductis, umbellis multiradiatis radiis tenuibus flavescentibus fructiferis non incrassatis nodo in discum subincrassato, involucro nullo involucelli phyllis 5 lineari-lanceolatis acutis pedicello setaceo paulò brevioribus, petalis intensè luteis, stylis recurvo-deflexis stylopodio depresso fructu angustiori multò longioribus, fructu pedicello paulò breviori, mericarpiis ellipticis, jugis dorsalibus ferè obsoletis lateralibus in marginem album diametro seminis dimidiò angustiore abeuntibus, vittis in valleculis solitariis latis commissuralibus binis.

Hab. in humilioribus *Tauri Pamphylici* inter *Marla* et *Adalia* alt. 4000'. Flor. Julio. (Heldr.)

Herba perennis? 4-5 pedalis, umbellæ fructiferae diametro 2-3 pollicares; quamvis fructus non planè maturos viderim de genere hujus

plantæ non dubito; ab *Anethi* speciebus hucusquè notis distinctissima est caule elatissimo acutè sulcato, involucello non nullo, foliorum fere eodem modo dissectorum laciniis duplò latioribus aculeolatis. Fructus eo *A. graveolentis* paulò minor est minùs graveolens.

JOHRENIA DICHOTOMA DC. non. Boiss. Ann. sc. Nat.

J. foliis inferioribus bipinnatisectis segmentis distantibus subbijugis in lacinias latè lineari-lanceolatas planas basi confluentes partitis, umbellis breviter radiatis fructiferis non contractis, mericarpiis ovatis areà centrali a margine fungoso albo distinctà, commissuræ planiusculæ pericarpio non fungoso lineà tenuissimà elevatà ad mediam partem percurso.

Hab. in Libano Labill. in herb. DC., Antilibani radices ad *Rascheya* et *Cassio*. Legi flor. et fruct. æst. 1846.

JOHRENIA FUNGOSA Boiss.

J. foliis inferioribus bipinnatisectis segmentis remotiusculis in lacinias angustè lineares margine subrevolutas basi vix confluentes partitis, umbellis longiusculè radiatis fructiferis contractis, mericarpiis oblongis latere exteriori convexis fungosis areà centrali indistinctà, commissuræ concavæ pericarpio fungoso lineà elevatà sulcatà ad mediam partem percurso, canali inani inter albumen et commissuram mediam sito.

J. dichotoma Boiss. Ann. sc. Nat. non DC.

Hab. in montibus Lydiæ. (Boiss.)

Ambas species valdè affines pro unà eademque priùs habueram sed eùm prioris specimina fructifera in loco natali legissem eam a specie Anatolicà diversam esse statim comperi.

JOHRENIA[?] JUNCEA Boiss.

J. foliis radicalibus antheseos tempore pænè destructis, caulibus nudis valdè elatis virgatis duris viridibus teretibus striatis supernè alternè ramosissimis ramis strictis erecto-patulis, vaginis caulium et ramorum linearibus acuminatis demùm deciduis, umbellis longè pedunculatis valdè inæqualiter 7-8 radiatis, involucro nullo, involucelli phyllis 5-7 linearibus acuminatis submembranaceis pedicellos subæquantibus, pe-

talīs luteis latè et indistinctè vittatis, stylopodio depressè conico margine lobulato stylis deciduis, fructu...

Hab. ad margines agrorum steriliū in Antilibano inter *Rascheya* et radices *Hermonis*. Fine Julii vix florere incipiebat. (Boiss.)

Caules 4-6 pedales, umbellæ radii sæpè bipollicares, habitus quodammodo *Faniculi piperiti* sed elatior et ramosior. Affinis *J. scoparius* Boiss. Diagn. 7 cui quoque caules virgati aphylli sed quæ habet umbellas parciùs breviusque radiatas, stylos persistentes, etc.

ORMOSOLENIA PIDIDICA Boiss. et Heldr.

O. perennis radice cylindricâ subunicipiti, foliis omnibus radicalibus glaucescentibus carnosulis petiolo longo suffultis ambitu oblongis trisectis vel pinnatisectis bijugis segmentis cuneatis profundè et obtusè lineari-lobatis lateralibus sessilibus terminali petiolato, caulibus præter vaginas 4-2 nudis basi incurvis ascendentibus parcè et dichotomè ramosis folia multò superantibus, umbellis terminalibus inæqualiter 3-4 radiatis, involucris invollucellisque nullis, petalis luteis glabris, pedicellis fructiferis tenuissimis fructu æquilongis, stylopodio conico-depresso margine lobulato stylis deflexis ei æquilongis superato, mericarpis ellipticis glabris, jugis tribus interioribus, filiformibus vix prominulis lateralibus in marginem albidum valleculæ æquilatum confluentibus, valleculis trivittatis, commissurâ sexvittatâ vittis subflexuosis.

Hab. inter lapides in regione alpinâ montis *Stavros* Pisidiæ propè *Isbarta* alt. 6500' (Heldreich).

Valdè affinis *O. Creticæ* et ei quoad folia simillima satis tamen specificè differre videtur caulibus procerioribus, pedicellis nullo modo incrassatis fructu æquilongis; fructûs omninò maturi adhuc non noti *O. Creticæ* alia forsân præbebunt discrimina. — Characterem reformatum *Ormosoleniæ* dabo in florulâ Creticâ a me et amicis. Heldreich mox edendâ.

PEUCEDANUM MEIFOLIUM Boiss.

P. caule crasso striato simplici elato folioso supernè subverticillatim elongato-paniculato, foliis amplis ambitu oblongis quinques pinnatisectis suprâ decompositis laciniis angustè lineari-subulatis abbreviatis confertissimis, costis omnium ordinum basi nudis secundariis petioulisque densè muricatis, radicalibus petiolo longo suffultis, caulinis

multò minoribus ad apicem vaginæ amplæ ovatæ flavescantis inflatæ coriaceæ ob margines inter se longè coalitos urceolatæ sessilibus, umbellis ad ramorum apicem 3-4 nis centrali subsessili, involucro nullo, involucelli phyllis ad callos triangulares oculo armato tantum perspicuos reductis, dentibus calycinis subobsoletis, petalis flavis dorso latè nervosis apice subemarginatis cum lacinulâ inflexâ complicatâ lineari-lanceolatâ, stylopodio cupulari, stylis deflexis stylopodio triplò longioribus, fructu maturo...

Hab. in totâ regione intermediâ et superiori montis *Cassii* usquè ad cacumen ubi floriferum legi Junio 1846.

Dorema meifolium Fenzl. Pugill. — *Elæochytris meifolia* Fenzl. in Russ. Reisen App. pag. 958.

Planta pulcherrima 4-5 pedalis, folia radicalia pedem et ampliùs longa $1\frac{1}{2}$ ped. lata, vaginæ caulinae sæpè 3-4 poll. longæ diametro sesquipollicares, panicula pedem et ampliùs longa. Affinis *P. Orientali* Boiss. Ann. quod differt caule parcè ramoso, foliorum lacinulis longioribus, involucelli phyllis longioribus, stylis stylopodio paulò longioribus etc.

PEUCEDANUM PASTINACÆFOLIUM Boiss. et Hohen. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846.

P. glaberrimum, caule crasso tereti striato duro medullâ farcto elato supernè longè laxèque paniculato, foliis radicalibus petiolo crasso rigido sulcato-striato supernè canaliculato suffultis ambitu lanceolatis pinnatisectis 6-7 jugis, segmentis oblongis inferioribus pedicellatis 2-3 partitis partitione inferiori multò minori costæ mediæ contiguâ segmentis superioribus basi truncatis sessilibus supremis basi angustè decurrenti subconfluentibus omnibus grossè et acutè dentato-lobatis, foliis caulinis 1-2 sessilibus pinnatis multò minoribus, umbellis secus ramos paniculæ elongatos alternatim dispositis 6-7 radiatis terminali majori longiùs pedunculatâ, involucri involucellique phyllis 6-7 oblongis acutis albo-membranaceis hisce flores subæquantibus, umbellis parvis, floribus sessilibus parvis, petalis sordidè albidis æqualibus oblongis nervo medio virescenti percursis apice angustè emarginatis cum lacinulâ inflexâ plicatâ, pedicellis vix incrassatis rigidulis majoribus fructu oblongo-cinerascenti æquilongis, stylopodio breviter conico margine lobulato stylis deflexis eo duplò longioribus coronato, mericarpiis dorso convexis, jugis 5 filiformibus albidis parum promi-

nulis lateralibus margini non incrassato valleculis æquilato contiguïs, valleculis latè univittatis, commissurâ concaviusculâ bivittatâ papillosâ sub lineâ elevatâ mediâ canali inani percursâ.

Hab. in monte *Elbrus* propè *Derbend* Kotschy N° 447.

Caulis 3-4 pedalis basi digito minore vix tenuior, folia cum petiolo sæpè pedalia 2-3 poll. lata ea *Pastinacœ* vel *Malabailœ* sp. referentia; segmenta 4 $1\frac{1}{2}$ poll. longa 9-12 lin. lata, radii umbellæ majoris pollicares, mericarpia 2 $1\frac{1}{4}$ lin. longa 4 $1\frac{1}{4}$ lata. Fructu et involucellis membranaceis *P. Aucheri* et *membranaceo* affinis, ab eis foliis et staturâ diversissimum.

OPOPANAX PERSICUM Boiss. et Heldr. in Kotsch. pl. Pers. exs. 1846.

O. foliis radicalibus bipinnatisectis segmentis ovato-oblongis angustè albomarginatis acutè crenulatis alternis vel oppositis basi obliquis sessilibus lafere exteriori decurrentibus glabris, petiolis petiolulisque pilis papillaribus apice stellatis obsitis caulinis ad vaginas breves apice 2-4 foliola oblonga acutè dentata basi attenuata ferentes reductis, caule elato striato ramoso ramis longissimis, petalis aurantiacis, involucelli phyllis lanceolatis acutis albo-membranaceis, stylopodio depresso fructu latiori margine crenulato stylis rectis eo dimidiò brevioribus superato, fructu...

Hab. in monte *Elbrus* propè pagum *Passgala* Kotsch. N° 305.

O. *Orientali* valdè affine sed foliorum limbus glaberrimus, planta ut videtur multò amplior, rami umbelliferi in meo specimine pedales et ultrâ, involucella albomembranacea nec herbacea, styli breves erecti nec deflexi stylopodio longiores. Fructus forsân alia suppedabit discrimina.

FERULAGO GENICULATA Guss. Syn. Pl. Sic. excl. synonym. non Boiss. Ann. sc. Nat.

F. glaberrima, foliis radicalibus amplissimis circumscriptione triangularibus suprâdecompositis lacinis decussatis planis acutis longè mucronulatis, foliis caulinis superioribus ad vaginas reductis, caule tereti ad ramificationes ovato-inflato, involucri involucellique phyllis ovato-lanceolatis brevibus, petalis pallidè flavis, pedunculis fructiferis non incrassatis erecto-patulis fructu oblongo-elliptico. paulò brevioribus, stylis divergentibus stylopodio cupulari paulò longioribus, jugis

omnibus corticosis alatis fungosis tribus interioribus acutis inter se approximatis exterioribus in marginem corticosum jugis interioribus subduplò latiore abeuntibus.

Hab. in *Siciliâ et Italiâ meridionali*. (Guss. Ten.)

Fructus maturi hujus speciei ab amic. Leresche nuper communicati demonstraverunt hanc a plantâ Orientali quam ei cum pluribus auctoribus consociaveram diversissimam esse. Hæc habet folia minora multò magis glauca, flores aurantiacos, pedicellos fructiferos stellatim patentes fructu ovato longiores, juga dorsalia angustè et tenuissimè alata et sic nuncupanda est.

FERULAGO NODOSA Boiss.

Hab. in *Atticâ* (Sprun. Boiss.), radicibus *Olympi Thessali* (Aucher), *Cretâ*. (Tourn. Heldr.)

F. geniculata Boiss. Ann. Sc. Nat. non Guss. — *Peucedanum nodosum* L. — *P. Creticum* DC. — Bauh. Hist. III. p. 58 Ic. ! Verosimilimè hùc spectat quoque *Hammatocaulis Cretica* Tausch in Flor. 1834 I. p. 347 quamvis in descriptione valleculæ 4 vittatæ commissuraque bivittata erroneè dicantur.

Confer diagnosin in Ann. sc. Nat. loc. cit.

FERULAGO PAUCIRADIATA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.

F. glaberrima glaucescens, caule tereti lævi elato paulò suprâ basin subdichotomè ramosissimo ad dichotomias præsertim inferiores subincrassato foliis radicalibus ambitu ovatis supradecompositis petiolo patulo costisque longè denudatis divaricatis laciniis subdecussatis oblongo-linearibus planis rigidulis mucronulatis parùm confertis, caulinis præter infima ad vaginam linearem reductis, umbellis longè pedunculatis 3-5 radiatis, involucri involucellique phyllis oblongis acuminatis brevissimis, petalis luteis, pedicellis fructiferis contractis non incrassatis, fructu (juniori) ovato ecostato stylopodio patellari crenulato stylisque longis rectis superato.

Hab. in rupestribus calidis progè *Bounarbachî* prov. *Karaman* in *Lycaoniâ*. (Heldr.)

Habitu et foliis affinis *F. geniculatæ*, *Aucheri* et *lophopteræ* quæ omnes differunt radiis umbellarum numerosioribus, prior insuper cau-

libus geniculatis, secunda et tertia fructu etiam juniore evidentè marginato; radii umbellæ sæpè 2-2 $1\frac{1}{2}$ pollicares.

FERULAGO SYRIACA Boiss.

F. glabra caule elato tereti duro tenuissimè striato recto nudo infernè simplici supernè corymbosè paniculato foliis omnibus radicalibus pallidis tripinnatisectis ambitu oblongis petiolo supernè plano suffultis laciniis linearibus vel oblongo-linearibus mucronulatis subtus margine subrevolutis nervo elevato percursis rigidulis sub lente facie superiori eximie punctulatis et marginem versùs scabrido-denticulatis, caulinis ad vaginam brevissimam triangularem-herbaceam reductis, umbellis 9-11 radiatis, involucri phyllis circ. 5 triangulari-acuminatis brevissimis angustissimè albomarginatis involucelli lanceolatis acuminatis, petalis intensè luteis, pedicellis erectis non incrassatis fructu ovato duplò longioribus, stylopodio patellari margine lobulato stylis deflexis eo longioribus superato, jugis lateralibus in marginem album alatum crassiusculum valleculis sublatiorem abeuntibus interioribus tribus corticosis obtusis angustioribus vitis utrinquè copiosissimis.

Hab. in fissuris rupium montium ponè *Antiochiam* sitorum, propè *Suadie* ad ostium *Orontis* et in Antilibano inter *Damascum* et *Berythum*. Legi Jun.

Planta 3-4 pedalis, folia omninò *F. Aucheri* vel *lophopterae*; a priori et ab omnibus affnibus distincta jugis fructùs interioribus non filiformibus vel obsoletis sed ut in *F. oxyptera* et *sulcata* etsi minùs manifestè tamen alatis corticosis.

FERULAGO CASSIA Boiss.

F. caule nudo tereti tenuiter striato supernè ramoso-corymboso, foliis radicalibus ambitu ovato-oblongis tripinnatisectis petiolo supernè plano suffultis laciniis lineari-setaceis brevissimis mucronatis subverticillatim secus costas tertii ordinis confertis, foliis caulinis ad vaginam cucullatam lanceolatam reductis, umbellis 5-7 radiis, involucri involucellique phyllis 5-6 triangulari-lanceolatis brevissimis, pedicellis fructiferis subincrassatis fructo oblongo æquilongis, stylopodio patellari depresso stylis eo longioribus superato, jugis lateralibus in marginem planum valleculis subæquilatum abeuntibus interioribus filiformibus subalatis, valleculis utrinquè copiosissimis.

Hab. in umbrosis ad radices montis *Cassii* in latere meridionali *Lao-diceam* versus Junio ineunte fructifera. (Boiss.)

Planta circ. bipedalis; caule in genere humili, laciniis angustissimis foliorum, pedicellis brevissimis incrassatis formæque fructûs valdè affinis *F. pumilæ*. Hæc tamen a *F. Cassii* longè differt foliis ambitu lanceolatis divisionibus lateralibus brevissimis sessilibus nec longè pedunculatis, involucri involucellique phyllis linearibus. *F. asparagifolia* differt foliis amplissimis valdè decompositis laciniis quoque tenuissimis sed elongatis et caule elato umbellisque multiradiatis.

FERULAGO FRIGIDA Boiss.

F. caule erecto subangulato striato asperulo supernè ramos paucos valdè elongatos rectos apice 4–3 umbellas gerentes edenti, foliis radicalibus ambitu ovatis suprâdecompositis, petiolis costisque asperulis medullâ farctis, laciniis ultimi ordinis brevissimè papillari-puberulis rigidis crassiusculis sulcatis in lobos brevissimos mammillares mucronulatos confertissimos inter se contiguos fissis, foliis caulinis superioribus ad petiolum basi vaginantem rigidum pinnatim 3 vel paucidentatum reductis, involucri involucellique phyllis 5–6 triangulari-lanceolatis acuminatis albomarginatis, pedicellis radiisque tomentellis, petalis luteis tomentellis, fructu...

Hab. in regionibus summis *Libani* et montis *Gebel el Scheik* (*Hermón*) Antilibani alt. 8000–9000'. Legi medio Julio petalis vix explicatis.

F. trachycarpa β. *Libanotica* Boiss. Ann. Sc. Nat.

A. *Fer. trachycarpa* pro quâ e specimine valdè incompleto Aucheriano olim habueram egregiè differt caule parcissimè et elongatim ramoso nec verticillatim corymboso, foliorum laciniis abbreviatissimis, statione multò elatiori etc.

FERULA SANCTA Boiss.

F. caule elato glauco tereti tenuiter striato supernè paniculato-ramoso ramis apice ex eodem puncto umbellam fertilem duasque umbellas masculas paulò longiùs pedunculatas edentibus, foliis omnibus radicalibus glaucescentibus petiolo longo in vaginam longè dilatato suffultis amplis ambitu triangulari-ovatis ternatim suprâdecompositis, segmentis parvis oblongis in lobulos oblongos minutissimos margine sub-

revolutos apice rotundatos mucronulatos pinnatisectis, vaginis caulinis teneris albidis cymbiformibus oblongo-acuminatis supremis ad trichotomias summas binis in unam biacuminatam concretis, involucris involucellisque nullis, umbellis breviusculè 15-20 radiatis, petalis intensè luteis, pedunculis non incrassatis fructu cæsio elliptico dimidiò brevioribus, stylis deflexis stylopodio plano paulò longioribus, jugis interioribus filiformibus tenuibus exterioribus in marginem albidum valleculis æquilatum abeuntibus, valleculis trivittatis, commissurà 4 vittatà.

Hab. in regione calidà maritimà *Palæstinæ* et *Phœnicix*. Legi ad margines planitie Esdraëlon versus *Kaifa*, suprà urbem *Tripoli* loco *la Dervicherie* dicto ad muros. Fl. Maio. Fruct. Junii fine.

Pulchra species foliis cum petiolo sæpè bipedalibus laciniarum formà *Anthrisci* speciem referentibus. Caulis 4-5 pedalis illo *F. communis* multò tenuior, radii umbellæ fertilis pollicem tantùm longi, mericarpia 5 lin. circ. longa 2 $\frac{1}{2}$ lata. Affinis formà foliorum soli *F. Tingitanæ* quæ longè differt foliis viridibus lucidis, lacinulis majoribus, mericarpis duplò majoribus, stylopodio breviter conico, etc.

FERULA SINAICA Boiss.

F. caule elato crasso tereti rubello tenuiter striato supernè paniculato-ramoso ramis apice sæpius umbellam fertilem ampliorem duasque masculas brevius pedunculatas subglobosas ferentibus, foliis albido-glauculentibus glabris, radicalibus petiolo longo longè in vaginam canaliculatam basi dilatato suffultis ambitu ovatis ternatim supràdecompositis, laciniiis planis linearibus indivisis vel decussatim 3-5 fidis obtusis mucronulatis a costis ultimi ordinis non distinguendis, foliis caulinis superioribus vaginà lanceolatà longissimà canaliculatà suffultis parvis decompositis, vaginis floralibus ad umbellarum basin parvis lanceolato linearibus acuminatis vix imà basi connatis, involucris involucellisque nullis, umbellis breviusculè 15-20 radiatis, petalis intensè luteis fructu...

Hab. ad latus boreale montis *Sæ.* *Catharinæ* Arabiæ petreæ in præruptis fine Maii florifera Schimper N° 149.

Species quoad fructum nondùm sat nota sed formà foliorum ab omnibus mihi notis distincta ad *F. erubescens* accedens quæ differt lacinulis multò minoribus aliisque notis.

HERACLEUM GLABRESCENS Boiss. et Hoh. in Kot. pl. Pers. bor. 1846.

H. foliis teneris suprâ glaberrimis subtus glaucescentibus sub lente tenuissimè puberulis ad nervos et margines minutè asperis pinnatisectis bijugis, segmentis lateralibus inferioribus petiolatis profundè tripartitis intermediis sessilibus terminali petiolulato profundè tripartito partitionibus omnibus oblongis elongatis in lacinias grossas triangulari—elongatas acuminato—lobatas divisis, umbellis amplissimis, radiis glabris, pedunculis glabris vel asperulis, petalis exterioribus albis amplissimè radiantibus bipartitis laciniis oblongo—linearibus, mericarpis obovato—ellipticis ad discum setis papillaribus elongatis sparsis obsitis margine apicem versùs aculeolatis, vittis dorsalibus $3\frac{1}{4}$ pericarpium æquantibus subæquilongis supernè tenuissimis basi latè saccato-clavatis, commissuralibus binis pericarpium dimidiam longitudinem vix æquantibus divergentibus.

Hab. in humidis faucibus montis *Elbrus* Kotsch. N° 304. Incolæ caulibus juniores comedunt et seminibus ut condimento utuntur.

Radii umbellæ 6–8 pollicares, petala radiantia 4 lin. longa, mericarpia $5\frac{1}{2}$ lin. longa $3\frac{1}{4}$ lata, vittæ eis sp. affinium multò latius saccatæ basi dimidiam lineam latæ. Affine *H. trachylomati* F. et M. quod e descriptione differt foliis utrinquè scabriusculis, fructu suborbiculato setoso et piloso nec aspero. *H. pubescens* MB. discedit caulibus petiolisque hirsutis, foliorum lobis minùs acuminatis etc. *H. Persicum* tandem e descriptione inter alios characteres differt vittis commissuræ subparallelis.

HERACLEUM ANISACTIS Boiss. et Hoh. in Kots. pl. Pers. bor. exs. 1846.

H. caule tenui striato—sulcato erecto parcè et subdichotomè ramoso glabro, radice collo densè fibroso, foliis sub lente parcè papilloso—puberulis radicalibus petiolo elongato caulinis petiolo brevi basi vaginanti suffultis ambitu lanceolatis pinnatisectis 3–4 jugis, jugis præsertim inferioribus inter se valdè remotis, segmentis ovatis profundè 2–3 partitis summis indivisis omnibus circumcîrâ inciso—dentatis dentibus obtusis inferioribus petiolulatis cæteris sessilibus, foliis summis ad vaginam oblongam apice 3 segmenta subsessilia gerentem reductis, umbellis valdè inæqualiter 9–11 radiatis, involucelli phyllis lanceolatis deflexis membranaceis minimis demùm deciduis, pedicellis hirsutis, petalis albis exterioribus parùm radiantibus, fructu elliptico glabrius—

culo pedicello paulò longiori, vittis dorsalibus quatuor pericarpium tertiam partem vix excedentibus clavatis, commissurà evittatà.

Hab. ad radices montis *Demawend* juxtà pagum *Ask* et in jugo *Besmitschal* Kotsch. N° 377.

Planta sesquipedalis, segmenta foliorum 4-4 1/2 poll. longa lin. 3/4-1 lata, radii umbellarum sæpè semipedales, mericarpiæ 3 1/2 lin. longa 2 lata. Species e sect. *Wendtia* ab *H. humili* et *H. Austriaco* cui magis affinis distincta fructu elliptico, umbellæ fructiferæ radiis longissimis inæqualibus.

MALABAILA KOTSCHYI Boiss.

M. tota brevissimè sub lente puberula, caule erecto ramoso subangulato-striato, foliis ambitu lanceolato-linearibus pinnatisectis, segmentis sessilibus oppositis oblongis iterùm pinnatisectis laciniis acutè obatis, umbellis umbellulisque amplis multiradiatis, involucri involu-celloque nullis, petalis glabris, radiis pedicellisque parcè setuloso-scabridis hisce fructu elliptico basi subangustato sesquilongioribus, mericarpiis dorso parcè papilloso-puberulis, stylopodio cupulari emarginaturam æquanti stylis elongatis superato, alæ utrinquè diametro seminis paulò angustioris parte exteriori incrassatà albà internæ pellucidæ æquilatà, vittis non abbreviatis internis dorsalibus angustioribus, commissurà parcè araneoso-puberulà.

M. pimpinellifolia in Kotsch. pl. Pers. Austr. N° 292 non Boiss. Diagn.

Hab. inter segetes in Persià Australi propè *Schiraz*.

Eam speciem erroneè habui pro *M. pimpinellifolià* a quâ differt foliis multò minùs dissectis, fructu duplò majori non orbiculato etc. Juxtà *M. Aucheri* collocanda.

Loco *M. platypteræ* Boiss. Ann. Sc. Nat. pone *M. SEKAKUL* Boiss. — *Pastinaca Sekakul* Russ. Alep. 11 p. 249. — *P. dissecta* Vent. Cels. tab. 78. E speciminibus Syriacis et Palæstinis a me lectis comperi plantam Anatolicam Syriacà eandem esse et nomen antiquius Russellianum igitur seligendum.

In *M. involucratà* Boiss. Ann. Sc. Nat. dele synonym. *Peucedanum obtusifolium* Fl. Græc. quæ est planta glabra diversissima, foliis aliter divisis etc.

ZOZIMIA RADIANIS Boiss. et Hohen. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846.

Z. caule sulcato hirtulo recto in umbellam terminalem amplam longè pedunculatam sub 20 radiatam abeunti medium versùs sæpè 2 umbellis parvis oppositis breviter pedunculatis aucto, foliis radicalibus numerosis expansis ambitu ovatis suprâdecompositis laciniis linearibus obtusis inter se villo denso griseo cohærentibus, radiis pedunculisque hispidis, involucri involucellique phyllis lineari-subulatis, petalis albis exterioribus valdè radiantibus bipartitis laciniis oblongo-spathulatis longitudinaliter 2-3 nervis rufescentibus percursis, umbellis fructiferis contractis, fructu elliptico pedunculo æquilongo præsertim ad discum longè papillari-hirsuto apice angustè emarginato, vittis latis contiguis totam seminis peripheriam occupantibus, alæ utrinquè semini æquilatæ margine valdè inflato parti internæ pellucidæ æquilato.

Hab. in schistosis montis *Elbrus* propè pagum *Passgala* Kotschy N° 246.

Habitus *Z. absynthifoliæ* sed caulis ferè simplex, foliorum laciniæ elongatæ densè et longè villosæ, petala exteriora valdè radiantia 2 lin. et ampliùs longa, fructus paulò major magis elongatus et margine præsertim valdè inflatus.

AINSWORTHIA TRACHYCARPA Boiss.

A. annua, caulibus pluribus angulosis simplicibus vel a basi parçè ramosis ramisque aculeolis brevissimis subdeflexis asperis, foliis breviter pubescentibus infimis aliquandò indivisis ovato-cordatis cæteris trisectis vel pinnatisectis segmentis lateralibus ovatis sessilibus terminali ovato-cordato omnibus obtusè crenato-dentatis, foliorum supremorum petiolis brevissimis in vaginam dilatatis segmentis angustioribus acutè dentatis, umbellis longè pedunculatis, involucri involucellique phyllis numerosis tenuiter setaceis asperrimis illis deflexis hisce flores marginales superantibus, petalis valdè radiantibus oblongo-spathulatis cum corniculo basilari laterali, fructibus pedicello setaceo eis longiori suffultis, mericarpiis parvis ovatis ad discum et marginem sub lente tuberculis albis stipitatis densè obsitis apice nec basi angustè emarginatis, margine albo inflato seminis diametro dimidiò angustiori; jugis tenuissimè filiformibus, vittis tenuibus dorsalibus interioribus rectis exterioribus arcuatis margini contiguis, commissuralibus binis secùs lineam mediam sitis, facie commissurali concavà.

Hab. in collibus et cultis Judææ, propè *Hierosolymam*, *S. Saba* et in descensu ad *mare Mortuum* Aprili 1846. (Boiss.)

Simillima omnibus notis *A. cordatæ* differt tantum caulibus et ramis aculeolis brevibus nec setaceis obsitis, foliis non omnibus indivisis rarius trilobis sed præter unum alterumve indivisum tri vel pinnatisectis, involucellis flores etiam marginales superantibus, mericarpiis paulò minoribus latere commissurali magis concavis margine non glabris sed tuberculis parvis albis obsitis.

AINSWORTHIA CARMELI Boiss.

A. annua, caule erecto sulcato simplici vel a basi remotè ramoso ramis elongatis strictis petiolisque patulè hispido-scabris, foliis petiolatis vel omnibus indivisis ovato-rotundis profundè cordatis vel superioribus tripartitis vel trisectis vel omnibus trisectis segmentis lateralibus ovatis sessilibus terminali petiolulato ovato-cordato omnibus utrinquè pubescentibus circumcercà rotundatim crenato-lobatis, umbellis longè pedunculatis terminalibus, radiis patulè setosis, involucri phyllis numerosis setaceis deflexis scaberrimis, involucelli setosis setaceis inæqualibus longioribus flores æquantibus, petalis valdè radiantibus obovatis cum corniculo basilari, fructu pedicello eo paulò longiori suffulto, mericarpiis orbiculatis latè marginatis basi et apice angustè emarginatis, marginis utrinquè semini parcè tuberculato-punctato æquilati parte interiori rufescenti pellucidà exteriori opacà albidà paulò angustiori subinflatà, jugis tenuiter filiformibus intrà marginem pellucidum usquè ad stylopodium productis, vittis dorsalibus interioribus rectis exterioribus arcuatis, commissuralibus ad 2 latera lineæ elevatæ sitis omnibus tenuibus, fructibus internis umbellæ sæpè urceolatis.

Hab. copiosissima inter frutices in latere septentrionali *Carmeli* propè cænobium. Legi fl. et fr. Aprili 1846.

A. cordata Pinard pl. Syr. exs. non Boiss. in Ann. Sc. Nat.

Simillima *A. cordatæ*. — *Tordyllo cordato* L. fil. et florifera ab eà agrè dignoscenda sed fructifera distinctissima margine non ut in eà semine dimidiò angustiori inflato et opaco sed seminis diametro utrinquè sublatori ad partem interiorem pellucido rufo ad exteriorem albo subinflato. Hanc speciem in notà operis citati pro variet. monstrosà *A. cordatæ* habui sed in centenis exemplaribus loco natali observatis hæc fructus forma semper eadem fuit.

TORDYLIUM PESTALOZZÆ Boiss.

T. annum basi presertim pilis albis deflexis hirsutum, caulibus nanis imâ basi parcè ramosis 2-4 umbellas longiusculè pedunculatas edentibus, foliis radicalibus breviter petiolatis ovato-cordatis, caulinis paucis triangulari-lanceolatis acutis basi tripartitis trisectisve lobis lateralibus parvis rotundatis omnibus obtusè crenato-dentatis, umbellæ radiis brevissimis fructiferis incrassatis parcè setosis, involucri involucellique phyllis lanceolato-linearibus albomarginatis valdè setosis illis deflexis hisce petalis multò brevioribus, petalis pallidè ochroleucis exterioribus valdè radiantibus obovato-spathulatis basin versùs lobo rotundato minimo corniculoque brevissimo auctis, pedicellis fructu brevioribus, mericarpiis ovato-rotundis apice angustissimè emarginatis disco ovato-triangulari papillis albis elongatis sparsis obsito, margine albo glabro inflatissimo disco angustiori transversè rugosissimo, jugis filiformibus, vittis dorsalibus nullis, facie commissurali planâ albobruinosâ, vittis commissuralibus duabus subdivergentibus.

Hab. propè *Elmalu* Lyciæ ubi legit cl. Pestalozza.

Planta e meis speciminibus (an semper?) 3-4 pollicaris, caule brevissimo umbellis pedunculatis ferè radicalibus, mericarpia 2 lin. tantum longa. Affine *T. macropetalo* quod longè differt radiis petalisque exterioribus multò longioribus, mericarpiis majoribus margine hirtulo cinctis, vittis dorsalibus 4, commissuralibus parallelis subcontiguïs.

TORDYLIUM BRACHYTÆNIUM Boiss. et Heldr.

T. annum totum setulis deflexis asperulum, caule tenui basi hispido sulcato-striato a basi parcè ramoso, foliis petiolo hirsuto suffultis subsericeo-puberulis trisectis segmentis lateralibus sessilibus ovato-rotundis terminali pedunculato ovato-cordato foliorum superiorum oblongo acuto omnibus obtusè dentato-crenatis, involucri involucellique phyllis lanceolato-linearibus adpressè setosis illis deflexis hisce petala exteriora non æquantibus, petalis albis exterioribus amplè radiantibus obovato-spathulatis basin versùs lobo rotundato minimo corniculoque brevissimo auctis, pedicellis scaberrimis fructu brevioribus, mericarpiis ovatis apice emarginatis, disco breviter et parcè papillari, margine albo glabro seminis diametro dimidiò angustiori obsolete et tantum supernè rugoso, jugis filiformibus, vittis dorsalibus interioribus

duabus brevissimis exterioribus sub margine inflato sitis, facie commissurali planâ albo-puberulâ.

T. officinale pl. Anat. Heldr. exs. non L.

Hab. in rupestribus collium propè *Kourmalu* ad occasum urbis *Adalia* in Pamphylîâ. (Heldr.)

Herba et flores *T. officinalis* pro quo primùm erroneè habuimus sed quod differt involucellis longissimè setaceis flores ochroleucos superantibus, mericarpiis triplò minoribus lineam nec 2 lineas longis valdè rugosis aliter vittatis. Nostra species a *T. Cappadocico* et *T. Hasselquistiæ* dignoscitur petalis majoribus radiantibus, fructus minoris margine minùs inflato et minùs rugoso, vittarum formâ.

LASERPITIUM PETROPHILUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.

L. glabrum, foliis radicalibus numerosis tripinnatisectis ambitu ovatis, petiolis basi dilatatis costisque secundariis longè denudatis, segmentis abbreviatis in lacinias oblongo-lineares acutas margine subrevolutas rigidulas parvas profundè partitis, caulibus teretibus virgatis ferè a basi dichotomè ramosis, foliis caulinis superioribus ad vaginam linearem elongatam apice in lacinulas brevissimas lineares pinnatisectam vel indivisam reductis, umbellis terminalibus subæqualiter 5-11 radiatis, involucri phyllis 5 minutis lanceolatis longè acuminatis submembranaceis, umbellulis subglobosis parvis, involucelli phyllis 5 lanceolatis membranaceis acuminatis pedicellos æquantibus, petalis luteolis æqualibus parvis apice emarginatis cum lacinulâ inflexâ, fructus oblongi a latere subcompressi mericarpiis prismaticis, jugis primariis filiformibus secundariis in alas integras earum intervallo vix latiores expansis, stylopodio depresso stylis deflexis eo paulò longioribus superato.

Hab. in fissuris rupium montis *Boudroun* Pisidiæ (Heldr.), in montibus Lyciæ suprâ *Elmalu* cl. Pestalozza alt. circ. 5000'.

Pedale vel sesquipedale, folia illis ferè omnium specierum generis tenuius dissecta, illa *Ferulaginis Aucheri* vel *geniculatæ* quodam modo referentia, umbellulæ floriferæ magnit. pisi, fructus vix tres lineas longus, alæ lineam dimidiam latæ; species distinctissima.

ORLAYA ? ANISOPODA Boiss.

O. annua radice verticali longâ gracili, caule ferè a basi diviso striato

glabrescenti ramis patulis, foliis radicalibus et ad dichotomias sitis ambitu oblongo-triangularibus bipinnatisectis segmentis ovatis in lacinias lineares breves ad basin usque partitis sub lente parce setulosis, petiolo glabro basi in vaginulam brevem amplexicaulem longè barbata dilatato, umbellis oppositifoliis infimâ sessilibus vel pedunculo brevissimo recurvo subincrassato suffultâ superioribus longè pedunculatis omnibus inæqualiter pauciradiatis, involucri involucellique phyllis lineari-lanceolatis angustissimè albomarginatis hisce flores superantibus, umbellulis parvis, petalis albis exterioribus modicè radiantibus roseis subæqualiter bipartitis lobis rotundato-cuneatis, ovario ovato papillis albis hirsutissimo.

Hab. in vallibus Palæstinæ in provinciâ *Samariâ* ubi floriferum Maio ineunte legi.

Rami plantæ floriferæ semipedales, folia eis *Dauci carotæ* minora minusque dissecta, umbella inferior sessilis aut pedunculo vix pollicari suffulta, umbellulæ 5-6 aliæ sessiles aliæ pedunculo 3-5 lineam longo suffultæ, flores marginales eis *O. maritimæ* vix majores. Species distinctissima de cujus genere etsi fructum non viderim vix dubito.

DAUCUS MICROSCIADIUS Boiss.

D. annuus caule gracili elato dichotomè et remotè ramoso pilis patulis sparsis longis hispido, foliis bipinnatisectis ambitu oblongo-lanceolatis laciniiis remotis angustè linearibus subconvolutis acutis adpressè scabridis, umbellis parvis longiusculè pedunculatis subæqualiter radiatis, involucri phyllis scabris patulis umbellâ paulò brevioribus trifidis laciniiis setaceis, involucelli phyllis lineari-setaceis basi albomarginatis flores æquantibus, floribus albis centrali umbellæ centralis sterili, petalis marginalibus vix radiantibus, fructus oblongi jugis secundariis in aculeos albos tenuissimos apice glochidiatos basi triangulari dilatata in cristam angustam coalitos mericarpii diametro sesquilingiores dilatatis, facie commissurali setulosâ.

Hab. in planitie elatâ inter *Aleppum* et *Antiochiam* sitâ ubi Junio flor. et fructif. legi.

Pedalis vel sesquipedalis, umbella florifera diametro 6-9 lineas lata fructifera pollicaris. Affinis *D. pubescenti* Koch et *setuloso* Guss.; prior differt indumento brevissimo asperulo, caule procumbenti, lobulis foliorum abbreviatissimis, involucri involucellisque brevissimis; *D. setulosus* habet umbellas longè radiatas multò ampliores, involucelli phylla

flores superantia, jugorum secundariorum aculeos longiores magis dilatatos.

LISÆA SYRIACA Boiss. Ann. sc. Nat.

Hanc speciem inter segetes *Samariæ* propè *Sanour*, *Cœlesyriæ* et planitie elatæ ad meridiem *Antiochiæ* sitæ abundè legi. In meâ descriptione e specimine juniore factâ loco citato, fructus indehiscentes dixi qui contrâ in speciminibus maturissimis carpophoro filiformi bifido donati sunt et in duo mericarpia facillimè secedunt. Mericarpia variant vel lævia tricristata jugis primariis exterioribus obsoletis secundariis ad aculeolos minimos in valleculis sparsos reductis vel tuberculata jugis secundariis plûs minûsve in cristas quoque expansis.

TORILIS TRIRADIATA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.

T. annua, caule erecto flexuoso a basi dichotomè ramoso tereti setis sparsis adpressis minutis striguloso, petiolo foliorum inferiorum elongato superiorum in vaginam linearem canaliculatam dilatato, foliis viridibus sub lente strigulosis ambitu oblongis bipinnatisectis segmentis in lacinias breves oblongo-lineares acutas ad basin usquè partitis, umbellis axillaribus triradiatis radiis subæqualibus patentibus, involucro nullo, umbellulis minimis, involucelli phyllis lineari-setaceis ovaria æquantibus, floribus sessilibus densè congestis marginalibus roseis subradiantibus ovario æquilongis, fructu ovato undiquè tuberculis flavidis brevissimè aculeolatis obsito, stylopodio obsoleto, stylis rectis subdivergentibus.

Hab. in saxosis Pamphyliæ propè *Adalia*. (Heldr.)

Radii umbellæ 3 lin. circ. longi fructiferi incrassati angulo recto a pedunculo divergentes, umbellulæ floriferæ diametro 2 lin. latæ, petala magnit. *T. helveticæ*. Species insignis floribus sessilibus, fructu non setoso sed brevissimè aculeato-tuberculato.

CYCLOTAXIS Boiss.

Calycis dentes obsoleti. Petala minima æqualia alba oblongo-lanceolata acuta apice intus inflexa evittata. Flores omnes hermaphroditi centralis sessilis ovario aliis duplò majori donatus marginales pedicellati circâ centralem circulariter dispositi. Ovarium lineare stylopodio eo

latiori discoideo bipartito stylisque rectis superatum. Fructus omnes fertiles longè rostrati; centralis indehiscens pericarpio spongioso-incrassato donatus periphericis multò crassior conico-attenuatus teres; fructus peripherici a latere compressi in duo mericarpiâ dorso convexa ab apice rostri secedentes pericarpio tenuissimo donati jugis quinque filiformibus ferè obsoletis vittis 2-3 parùm perspicuis inter se valdè approximatis in intervallis jugorum sitis. Commissura canaliculata. Albumen in omnibus fructibus corneum sulcatum marginibus involutum. Carpophorum apice bifidum. — Herba Palæstina facie *Scandicis*.

Genus fructus dimorphiâ ad *Echinophoreas* accedens sed magis affinis *Scandici* quæ ab eo differt petalis radiantibus fructibusque homomorphis.

CYCLOTAXIS PALÆSTINA Boiss.

C. annua herbacea a collo ramosa, caulibus brevibus expansis dichotomè ramosis foliosis teretibus, foliis ambitu oblongis tripinnatisectis lobulis tenuibus breviter et angustè linearibus acutis, petiolis brevibus basi in vaginam linearem strictam caulem amplectentem dilatatis, umbellis breviter pedunculatis 6-12 radiatis, pedunculis radiis pedicellis-que post anthesin spongioso-incrassatis apicem versùs dilatatis, involucro nullo, involuelli phyllis linearibus florum pedicellos æquantibus ciliatulis apice breviter bifidis, fructibus periphericis ad latus externum secùs semen et rostrum breviter aculeolato-scabris, semine pedicello sublongiori rostro suo dimidiò breviori, fructu centrali lævi.

u. *glabriuscula*. — Caules et folia glabriuscula, fructu centralis glaber.

β. *papillaris*. — Caules supernè et folia breviter tomentella asperula, fructus centralis papillis albis longis mollibus crispulis obsitus.

Hab. in pinguibus hyeme inundatis planitierum Galilææ, ad margines planitiei *Esdraëlön* inter *Jenin* et *Caifa*, in planitie *Hittin* inter *Nazareth* et *Tiberiadem*. Legi fructif. Maio ineunte, floruit culta e seminebus Palæstinis.

Caules semipedales, flores minutissimi, radii umbellæ 9-10 lin. longi, fructus peripherici cum rostro 6-7 lin. longi, centralis non longior sed diametro infernè ferè sesquilineam latus.

SCANDIX PISIDICA Boiss. et Heldr.

S. annua, caulibus pilis patulis albo-hirsutis, foliis breviter et parcè

hirsutis lacinulis incurvis elongatis angustè lineari-setaceis, umbellæ radiis glabris, involucelli phyllis deflexis brevibus oblongo-linearibus crispo-lanatis bifidis, petalis parùm radiantibus exterioribus bilobis cum lacinulâ inflexâ cæteris indivisis in lacinulam inflexam attenuatis, fructibus breviter pedicellatis longis rectis subteretibus totâ superficie sparsissimè aculeolatis, rostro complanato semine triplò longiori marginibus tantùm aculeolato-scabro, stylopodio cupulari stylis longis subparallelis superato.

Hab. inter segetes Pisidiæ ad *Egirdir*. (Heldr.)

Sc. Iberica pl. Anat. Heldr. exs. non MB.

Hæc species quoad herbam, lacinias angustissimas foliorum valdè refert *Sc. Ibericam* pro quâ eam primùm habuimus, ab eâ tamen specificè differre videtur. *Sc. Iberica* habet caulem subunifariam pilosum, involucelli phylla obtusa indivisa, petala externa valdè radiantia omnia biloba in lacinulam coarctata, fructus ejus præterea à latere compressus dicitur. Semen *Sc. Pisidicæ* 4 lineas longum est, rostrum pollicare et ampliùs lineam ferè latum. Cum *S. pectine* ob folia tenuissimè dissecta non confundi potest.

BUTINIA CRETICA Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1847.

B. perennis præter vaginas foliorum ciliatas glaberrima, radice globosâ, caulibus pumilis teretibus infernè nudis paulò suprâ basin parcè dichotomis ramis divaricatis, foliis radicalibus petiolo longo tenero suffultis ternatis, partitionibus petiolulatis ambitu ovatis bipinnatisectis, segmentorum laciniis abbreviatis oblongis mucronulatis, foliis caulinis in vaginâ oblongâ subsessilibus pinnatim vel bipinnatim sectis laciniis paucis, umbellis 2-4 radiatis, involucri nullo, involucelli phyllis circ. quinque oblongis acutis albomarginatis pedicellos subæquantibus, fructibus pedicello æquilongis oblongo-linearibus, stylopodiis conicis in stylos subdivergentes eis longiores attenuatis.

Hab. in lapidosis montium *Lassiti* Cretæ ad nivem deliquescentem alt. 5000-6000'. (Heldr.)

Planta 3-4 pollicaris habitu et formâ foliorum etsi lacinia minores minùsque laxæ sint *B. bunioide* referens sed ab eâ diversa fructu oblongo-lineari 2 lineas et ampliùs longo et appropinquanda *B. stylosæ* quæ distinguitur foliis in lacinias longas linearisetaceas dissectis. Fructus planè maturos non vidi et ideò hæc planta inter *Butiniam* et *Conopodium* subdubia sed habitus omninò *Butiniæ*.

B. glaucescens, *nodosa* et *Libanotica* a me in Ann. Sc. Nat. descriptæ sunt species generis *Elæostictæ* Fenzl. Flora 1843. Hoc genus characteribus *Butiniæ* equidem valdè affine est sed habet fructus breviter ovatos subturgidos nec ut in *Butiniâ* apice attenuatos, juga nunquam prominula; canales oleiferi in eo etsi tenuissimi et irregulares tamen adsunt nec ut in *Butiniâ* omninò desunt. Habitus præterea diversissimus nam *Butiniæ* herbæ tenerrimæ sunt, *Elæosticta* autem habet caules elatos paniculato-ramosos *Triniæ*. Species citatæ sic igitur nominandæ.

Butinia glaucescens Boiss. loc. cit. — *ELÆOSTICTA GLAUDESCENS* Boiss.

Butinia nodosa Boiss. — *ELÆOSTICTA NODOSA* Boiss.

Butinia Libanotica Boiss. et Heldr. — *ELÆOSTICTA MEIFOLIA* Fenzl. loc. cit.

CHÆROPHYLLUM CRÆTICUM Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1847.

C. perenne vel bienne, caule tereti subtiliter striato glabro folioso supernè corymboso-paniculato, foliis ad petiolos et costas pilis patulis vel deflexis hispidis petiolo in vaginam internè dilatato suffultis ambitu oblongis tripinnatisectis segmentis tomentèllis in lacinias minutas breves oblongo-lineares acutas partitis, foliis superioribus minoribus in vaginâ sessilibus subsessilibusve, umbellis multiradiatis lateralibus minoribus omninò vel ferè omninò sterilibus, involucri involucellicque polyphylli foliolis oblongis acuminatis membranaceis albidis patulis hisce pedunculos æquantibus, petalis luteolis glabris, pedicello vix incrassato fructu quadruplò breviori, fructu longè lineari-cylindrico flavido eximiè costato apice vix attenuato, stylopodio depresso patellari ei æquilato stylisque divergentibus tenuibus stylopodio parùm longioribus coronato, carpophoro apice tantùm bifido.

Hab. in planitie *Omalò* montium *Sphacioticorum* alt. 3500'. (Heldr.)

Bipedalis, folia inferiora cum petiolo pedem et ampliùs longa, umbellæ majoris radii sesquipollicares, mericarpiæ 40 lin. longa. Pulchra species affinis *Ch. colorato* a quo egregiè differt umbellâ involucratâ, fructu duplò longiori, etc.

SMYRNIOPSIS SYRIACA Boiss.

S. caule elatissimo glabro verticillatim et longè ramoso ramis dis-

tanter et verticillatim ramulosas paniculas elongatas thyrsoides formantibus, foliis amplissimis ambitu latè ovatis tripinnatisectis segmentis sessilibus ovato-cuneatis latere exteriori sæpè breviter decurrentibus circumcincta grossè serratis, petiolis petiolulisque papillis sparsis brevibus conicis duris asperulis, foliis ramealibus ad dichotomias ternis quaternis subverticillatis subsessilibus pinnatisectis vel trisectis segmentis oblongo-spathulatis basi longè cuneatis apice acutè serratis, foliis summis ad foliola 2-4 oblonga basi attenuata integerrima flavida reductis, umbellis ad ramulorum apicem subternis intermediâ longius pedunculatâ, involucri involucellique phyllis 3-5 lanceolato-acuminatis flavidis abbreviatis, stylopodio depresso-conico apice bifido margine lobulato circumcincto stylis deflexis eo longioribus superato, fructu....

Hab. in umbrosissimis rupium Antilibani inter *Zebdani* et *Zachle* et quantum memini in regione superiori montis *Cassii*. Legi flor. Maio.

Planta 6-7 pedalis, folia inferiora sæpè sesquipedalia pedem lata, segmenta 7-11 lin. longa 4-6 lata. A. *Sm. Aucheri* differt foliis tene-rioribus alio modo et magis divis, segmentis minoribus, ramis floriferis thyrsoides nec subcorymboso-paniculatis, stylopodio conico nec depressissimo, fructus maturi alios suppeditarent characteres.

In Ann. Sc. Nat. loc. cit. pro *Scaligeria Tournefortii* Boiss. pone.

SCALIGERIA CRETICA Boiss.

Ex speciminibus a me in Syriâ lectis *Sc. microcarpa* DC. et *Sc. Tournefortii* Boiss. specificè non differunt, cl. Candolleus folia inferiora plantæ non noverat indè descriptionum discrimina. Huic speciei nomen specificum antiquius et notissimum *Tournefortii* et *Urvillæi* restituendum.

MELIOCARPUS PEDUNCULARIS Boiss.

M. foliis primordialibus oblongis basi cordatis indivisis vel ternatis lobis ovatis sessilibus terminali majori radicalibus petiolo complanato plicato valdè striato margine denticulato suffultis bipinnatisectis, segmentis oblongis obtusis sessilibus vel basi breviter attenuatis omnibus obtusissimè crenatis angustèque albo-marginatis, foliis caulinis inferioribus simpliciter pinnatisectis summis ad vaginas reductis, umbellis longissimè radiatis, involucri involucellique phyllis breviter lanceolatis acuminatis viridibus, pedunculis fructiferis contractis fructu elliptico.

tico 2-3 plò longioribus, jugis tenuibus alatis alis dorsalibus angustioribus in utroque mericarpio numero dissimilibus 1-2-3 nis versùs basin fructùs attenuatis, marginalibus latis ad basin fructùs subretusis, albumine pericarpio dimidiò breviori.

Hab. in dumosis regionis montanæ montium inter *Laodiceam* et *Suadieh* sitorum in Syria boreali, ad radices orientales montis *Cassii* copiosus. (Boiss.)

Radii umbellæ sæpè 4-5 pollicares, pedicelli fructiferi 1-1 1/2 pollicares, mericarpia 7-8 lin. longa. Ab affinis *M. alato* et *M. anisoptero* differt foliorum segmentis latoribus, mericarporum alis lateralibus manifestè latoribus infernè angustatis et ideò fructu non ut in eis basi attenuato, pedicello fructum non paulò sed 2-3 plòve superanti. *M. anisopterus* in omni Galilæa vulgatus est et ut suspicaveram folia nullo modo lineari-supràdecomposita sed eis aliarum specierum similia habet. Notam e mericarpis ejusdem fructùs æquali alarum numero donatis variabilem esse observavi et ideò *M. Syriacus* cum *M. anisoptero* forsàn in unicam speciem ulteriùs colligendi erunt.

MELIOCARPUS MICROCARPUS Boiss.

M. foliis inferioribus bipinnatisectis 4-5 jugis, petiolo brevi vaginanti costisque margine lævibus, divisionibus infimis petiolulatis, segmentis oblongo-lanceolatis acutiusculè crenulatis, foliis caulinis minoribus pinnatisectis, involucri involucellique phyllis oblongis acutis, fructu pedicello eo sesquiloniori suffulto parvo oblongo, alis dorsalibus crassiusculis angustioribus in utroque mericarpio sæpiùs numero dissimilibus solitariis vel binis, lateralibus latoribus ad basin retusam fructùs minimè angustatis, albumine usquè ad 3/4 pericarpis producto.

Hab. in *Syria*, loci proprii non memini.

Foliorum segmenta angustata ca *M. Anatolici* referentia, mericarpia 4-5 lin. tantum longa, quà notà, alis dorsalibus crassiusculis et albumine vix pericarpio breviori a præcedenti specie distinguitur. Hoc genus quoad specierum distinctionem propter polymorphiam alarum et pericarpis spongiosi difficile in locis natalibus ulteriùs observandum, vereor me specierum numerum forsàn nimis auxisse.

CACHRYS GONIOCARPA Boiss.

C. glaberrima, caule elato tereti striato strictè ramosissimo ramis

corymbosè subtrichotomis, umbellâ centrali brevius lateralibus longius pedunculatis, foliis amplis suprâdecompositis petiolo plano suffultis, laciniis tenuiter et longissimè linearibus flexuosis plicatis, umbellis 8-14 radiatis, involucri involucellique phyllis lineari-setaceis elongatis, fructu ovato-rotundo a latere subcompresso obtusissimo apice depresso, stylis stylopodio depressissimo triplò longioribus, mericarpiis valdè spongiosis hæmisphærico-pentagonis, jugis acutis apteris valleculis planiusculis.

Hab. in arvis fertilibus Palæstinæ littoralis circà *Asdod* et *Ramla* ubi Aprilis initio jam fructiferam legi.

Fructus 8-9 lin. longi, pericarpium spongiosum albumine quadruplò latius, facies commissuralis planissima, facies dorsalis acutè pentagona, carpophorum bipartitum totum planum, pedicelli fructiferi fructu 1 1/2-2 plò longiores. A. speciebus omnibus sectionis *Eucachrydis* optimè distinguitur mericarpiis non ejugatis convexis sed acutè pentagonis. *C. prangoides* Boiss. Ann. sc. Nat. ei affinis differt foliorum laciniis brevioribus tenuioribus, mericarpiis oblongis, jugis rotundatis obtusis, valleculis sulco notatis.

PRANGOS ASPERULA Boiss.

Pr. caule glabro elato strictè ramosissimo, ramis elongatis oppositè subverticillatim corymbosis, umbellâ centrali majori feraciori brevius pedunculatâ, foliis amplissimè suprâdecompositis papillis brevibus albis pellucidis undiquè asperulis, petiolis costisque striato-subangulatis laciniis angustè linearibus acutè planiusculis rigidulis, umbellis 10-12 radiis, involucri involucellique phyllis parvis lineari-setaceis tortilibus, petalis aureis hispidulis, pedicellis fructiferis acutè angulatis vix incrassatis fructu paulò brevioribus, fructu oblongo stylopodio cupulari depresso stylisque stylopodio duplò longioribus coronato, mericarpiis quinque alatis alis grossè et valdè undulatis rubellis seminis diametro sesquilongioribus.

Hab. in collibus circà *Rascheya* Antilibani ubi flor. Maio et circà *Eden* Libani ubi fructiferam Julio legi.

Mericarpiâ circ. 9-10 lin. longa, alæ 2 1/2 lin. latæ, pericarpium spongiosum albumine non crassius. Species foliis et habitu *P. paniculaceam* referens sed lacinia foliorum latiores, affinis quoque *P. pseudanifoliae*. Species foliis papillaribus, alis fructûs valdè undulatis,

sinubus grossis in unâquâque alâ 2-3 nec ut in *P. lophopterâ* et *ulopterâ* crebris distinctissima.

PRANGOS PESTALOZZÆ Boiss.

Pr. collo radice densè fibroso, caule nano 2-4 umbellas pedunculatas edenti præsertim infernè pilis crispulis albis lanato, foliis petiolo brevi canaliculato dilatato suffultis ambitu ovatis bipinnatisectis, costis pilis sparsis crispis obsitis, segmentis minimis glabris subrotundis secus costas secundarias sessilibus oppositis inter se subdistantibus in lacinulas lineares abbreviatas teretiusculas acutas confertissimas minimas multifidis, foliis caulinis ad vaginam canaliculatam brevem hirsutam apice lacinulatam reductis, umbellis 5-8 radiatis, involucri involucellique phyllis lanceolato-linearibus ciliatis demùm deciduis, petalis..., fructu ovato pedicello sublongiori stylopodio cupulari depresso stylisque stylopodio triplò longioribus superato, mericarpiis a basi ad apicem alis 5 subundulatis margine denticulatis obsitis.

Hab. in montibus circâ *Elmalu* Lyciæ. Legit et comm. amic. D. Pestalozza.

Planta semipedalis, foliorum segmenta vix 2 lin. longa lataque multifida, fructus quem maturum non vidi circ. 4 lineas longus alis demùm 1 1/2-2 lin. longis. Pulchra species tenuitate foliorum insignis affinis *Pr. odontopteræ* a quâ hoc caractere aliisque notis longè differt.

PRANGOS PAUCIRADIATA Boiss. et Hohen. in pl. Kotsch. Pers. bor. 1846.

P. glabra, radice tenui verticali, collo petiolis vetustis vestito, caule tenui erecto supernè in 2-3 ramos strictos totidem umbellas gerentes diviso, foliis radicalibus glaucescentibus petiolo longiusculo basi dilatato suffultis ambitu parvis breviter oblongis pinnatisectis segmentis 5-7 sessilibus oblongis inferioribus remotiusculis omnibus iterùm subbipinnatipartitis, laciniis oblongo-lanceolatis acutis, vaginis ad dichotomias brevibus in lacinulas paucas pinnatisectis, umbellis 4-5 radiatis, involucri involucellique phyllis linearibus acuminatis ferè omninò membranaceis hisce pedicellis paulò brevioribus, petalis flavis glabris apice involutis, fructibus (junioribus) ovatis stylopodio cupulari stylis deflexis eo longioribus coronato superatis, mericarpiis 5 alatis, valliculis inter alas papillis albis cylindricis crebris obsitis.

Hab. in monte *Dudere* jugi *Elbrus* Kotschy N° 788.

Caulis in specimine meo pedalis, folia petiolo 3-4 pollicari suffulta vix 2 poll. longa, radii umbellæ 6-7 lin. tantum longi. Species ex unico specimine mihi nota sed caule tenui vix ramoso foliis ambitu parvis ab omnibus aliis diversa; fructus quos juniores tantum novi et quorum ideò alarum proportionem non describere possum valleculis papillois notabiles et hæc notâ propè diversissimas *P. pabulariam* et *lophopteram* collocanda.

HIPPOMARATHRUM CRASSILOBUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.

H. glabrum caulibus crassis striatis ramosissimis, ramis subangulatis, foliis radicalibus amplissimis petiolo angulato crasso basi canaliculato suffultis triternatisectis costis laciniisque duris hisce longissimis lanceolatis rigidis acutis subpungentibus planis facie superiori margine subrevolutis inferiori acutiusculè 2-3 costatis, foliorum caulinarum breviorum laciniis paucioribus, foliis supremis sessilibus indivisis lanceolato-linearibus pungentibus, umbellis multis subæqualiter 3-5 radiatis radiis rigidis, involucri phyllis 5 brevibus lanceolatis acutis, involucelli sessilibus pedicellis brevioribus, petalis pallidè luteis dorso puberulis, ovario sphaerico papillis albis basi latioribus elongatis densè obsito, dentibus calycis triangularibus obtusis, stylopodio lato patellari margine undulato stylis brevibus superato.

Hab. in campis *Pamphyliæ* propè ruinas urbis *Perge* (Heldreich).

Folia radicalia 1 1/2 pedem ferè longa pedem lata, laciniæ 2-3 poll. longæ 1 1/2-2 lin. latæ. A cæteris speciebus generis foliolis latis longissimis subtus parallelè costatis distinctissimum, propè *H. pterochlænum* collocandum.

ECHINOPHORA ANATOLICA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.

E. tota sub lente indumento brevissimo velutino subpulverulento obsita, caule sulcato obtusangulo tortuoso supernè ramosissimo in paniculam rotundato-corymbosam abeunti, foliis bipinnatisectis petiolo plano basi in vaginam amplexicaulem dilatato suffultis, laciniis linearibus canaliculatis in spinam abeuntibus, involucri involucellique phyllis lanceolatis spinosè-acuminatis facie superiori planis inferiori carinatis

hisce flores superantibus, petalis albis parùm radiantibus dorso brevissimè pulverulento-velutinis, fructu...

Hab. in collibus arenosis Anatoliæ interioris in Pisidiâ ad *Isbarta* (Heldr.) fl. Augusto.

Valdè affinis characteribus et formâ foliorum *E. spinosæ* sed gracilior et ramosior, lacinia foliorum breviores, involucella flores superantia nec ut in *E. spinosâ* ciliata, petala pulverulenta nec hispidula, indumentum totius plantæ pulverulentum nec hispidulum, statio nullo modo maritima.

RUBIACEÆ.

RUBIA BRACHYPODA Boiss.

R. caulibus fruticosis sarmentosis scandentibus obsoletè angulatis cortice tenui lucidâ albicante vestitis, ramis hexagonis pube brevissimâ patulâ pubescentibus lævibus, foliis senis elliptico-linearibus utrinquè attenuatis acutis mucronulatis margine subtùs subincrassato albido retrorsùm scabridis secùs nervum et ad faciem glabris lævibus lucidis infimis deflexis, cymis oppositis axillaribus subsessilibus foliorum verticillo subbrevioribus, bracteolis binis setaceis ad cymæ divisionem sitis, pedicellis pubescentibus divaricatis flore vix longioribus basi nudis, corollâ albâ glabrâ subrotatâ magnâ laciniiis oblongo-lanceolatis in mucronem brevissimum attenuatis, fructo magno carnosulo globoso pedicello incurvo suffulto.

Hab. ad muros sepes et rupestria Palæstinæ circâ *Hierosolymam*, *Bethlehem*, in *Carmelo*. Legi Maio 1846.

Var. *β. stenophylla*. Glabrescens, folia angustiora elliptico-linearia 6-7 lin. longa lineam vel sesquilineam lata.

Hab. in Antilibano propè *Rascheya* et *Zebdani*.

Folia formæ genuinæ 8-11 lin. longa 2 1/2-3 lata, varietatis multò angustiora, flores e maximis generis, fructus magnitudinis pisi; species ab omnibus Europæis distincta caulibus fruticosis sarmentosis, floribus magnis, ramis pubescentibus. Affinis *R. Olivieri* Rich. quæ tamen e descriptione caulè retrorsùm scabro, foliis obovatis margine hispidis corollâ subcampanulatâ differt. *R. lucida* Fl. Græca non L., e Cypro oriunda, probab. ad nostram speciem referenda est, icon in-

florescentiam nostræ omninò refert sed corollæ in eâ minores longius-
que acuminatæ.

CRUCIANELLA SYRIACA Boiss.

C. annua tota minutè scabrida glaucescens, caulibus quadrangulis
ascendentibus patulè et subdichotomè ramosis, foliis infimis sub anthesi
jam deciduis minimis obovatis cæteris senis angustè linearibus valdè
revolutis rigidis mucronulatis scabris, spicis axillaribus terminalibus-
que pedunculo rigido eis non longiori sæpè breviori suffultis linearibus
subtetrastrichis densis, rachide hirsutâ, spiculis unifloris tribracteatis,
bracteis strictè imbricatis oblongis concavis in mucronem brevem at-
tenuatis dorso nervo rotundato crasso instructis infernè latè albomargi-
natis margine ciliatulis cæterùm lævibus, corollæ flavidæ tubo bracteis
duplò longiori, limbi pentameri lobis ovatis in appendicem linearem
eis æquilongam circinnatam abeuntibus, stylo incluso.

Hab. in rupestribus Syriæ propè *Antiochiam*, legi florif. Jun. 1846.

Semipedalis vel elatior, folia caulina 6-9 lin. longa lineæ $1\frac{1}{3}$ lata,
spicæ 1-1 $\frac{1}{2}$ poll. longæ, bracteæ 2 lin. longæ. Cr. *Græcæ* affinis ab
eâ distinguitur scabritie majori, foliis arctius involutis angustioribus,
spicâ breviter pedunculatâ, bracteis dimidiò minoribus mucronatis nec
longè setaceo-aristatis, tubo corollæ longius exserto.

CRUCIANELLA BITHYNICA Boiss.

Cr. annua tota minutè scabrida glaucescens, caulibus quadrangulis
ascendentibus dichotomè ramosis, foliis quaternis omnibus angustè
linearibus valdè revolutis mucronatis scabridis rigidis, spicis axillari-
bus terminalibusque pedunculo eis longiori suffultis linearibus subte-
trastrichis densis, rachide glabrâ, spiculis bifloris tribracteatis, bracteis
arctiusculè imbricatis ovato-oblongis carinatis in mucronem brevem at-
tenuatis dorso viridè et crassè nervosis margine latè albo-membranaceis
ciliatis cæterùm lævibus, corollæ flavidæ tubo bracteis sesquilongiori
scabridulo, limbi pentameri lobis ovatis in appendicem linearem apice
subclavatam eis longiorem intus reflexam abeuntibus. Styli profundè
bifidi ramo altero cum stigmate e corollâ exserto.

Hab. in Bithyniâ propè *Bolu* cl. *Pestalozza*.

Quoad faciem, spicas, bractearum longitudinem precedenti similitis,
differt foliis 4 nec 6 nis omnibus linearibus, spicis longius pedunca-

latis, bracteis arctius carinatis sublatioribus, rachide glabrâ, corollæ tubo bractearum proportionem breviori scabrido, stigmatē altero exserto; a *Cr. Græcâ* differt ut et species præcedens bracteis dimidiò minoribus, foliis angustis, stylo non incluso.

CRUCIANELLA IMBRICATA Boiss.

Cr. annua caulibus erectis strictè ramosis quadrangulis lævibus, foliis infimis quaternis ellipticis cæteris senis valdè revolutis linearibus breviter mucronatis scabriusculis, spicis lineari-cylindricis pedunculo eis æquilongo suffultis densis, rachide glabrâ, spiculis unifloris tribracteatis imbricatis, bracteâ exteriori longiori multòque latiori ovato-oblongâ vix carinatâ breviter attenuato-acuminatâ margine latè albo-membraceâ scabridulâ, lateralibus carinato-plicatis angustè linearibus, corollæ rubellæ tenuissimæ vix apice subexsertæ tubo capillari in limbum vix ampliato lobis ovatis in mucronem reflexum eis æquilongum attenuatis.

Hab. in *Syriâ*, loci proprii non memini. (Boiss.)

Folia caulina 6-9 lin. longa semilineam lata, spicæ formæ et magnit. *Cr. angustifoliæ* quæ differt bracteis æqualibus omnibus carinatis, corollâ exsertâ. *Cr. latifolia* differt foliis caulinis vix revolutis, spicis longioribus laxioribus tenuibus, bracteâ quoque e bracteis exsertâ.

Cr. Egyptiaca L. vera. — *Cr. herbacea* Forsk. quæ mihi nunc e speciminibus circâ Alexandriam ab amic. Cadet de Fontenay lectis innotuit, ut jam suspicaveram a *Cr. Græcâ* diversissima est et affinis *Cr. chlorostachydi*.

ASPERULA LIBANOTICA Boiss. (Sect. *Cynanchicæ*.)

A. perennis multicaulis, caulibus teneris filiformibus ascendentibus parçè ramosis simplicibusque quadrangulis ad angulos retrorsum scabridulis, foliis quaternis remotis ovatis subtrinerviis acutiusculis margine scabris cæterum glabris lævibus pallidè virentibus, pedunculis paucis axillaribus terminalibusque subternis cymas in capitulum densè contractas paucifloras ferentibus, bracteis involucrantis elliptico-lanceolatis acutis flores non æquantibus, corollæ lacteæ glabræ tubo a basi angustiori in limbum eo dimidiò breviorē sensim ampliato, laciniis amplis ovatis trinerviis acutiusculis, antheris lineari-setaceis ni-

grescentibus, stylo apice longè bipartito exserto, stigmatibus globosis, ovario glabro lævi.

Hab. in humidis regionis alpinæ et subalpinæ Libani, suprâ *Khan Hussein* in viâ inter *Berythum* et *Damascum* in consortio *Galii Pestalozzæ*, ad fontem suprâ pagum *Eden* situm, in monte *Cassio*.

Pedalis vel elatior, folia majora 5 lin. longa 3 aut paulò amplius lata. Corolla circ. 4 lin. longa. Pulchra et distincta species inter *A. involucratam* et *Taurinam* media; prior differt glabritie, lævitie, foliis elliptico-linearibus obtusis uninerviis, posterior caule pubescenti, foliis triplò majoribus margine ciliatis, tubo corollæ longissimo, lobis linearibus, etc.

ASPERULA TAYGETEA Boiss. et Heldr. (Sect. *Cynanchicæ*.)

A. perennis rhizomate suffrutescenti multicauli, tota villo hirsuto-tomentosa mollis canescens, caulibus ascendentibus ramosis obsolete angulatis fragilibus, foliis senis patulis linearibus acutiusculis margine convolutis, floribus in capitula rotunda densa ex axillis superioribus breviter pedunculata terminaliaque sæpè 2-3 approximata congestis, bracteis convolutis patulo-subreflexis flores subæquantibus, corollæ in vivo lacteæ densè velutinæ tubo limbo duplò longiori laciniis oblongis acutis submuticis antheris oblongo-linearibus nigricantibus, stylo parte exsertâ longiusculè bifido, ovario hirtulo.

A. incana Bory et Chaub. Fl. Pelop. non Sibth.

Hab. ad rupes umbrosas faucium propè *Androuvista* in Taygeto. Fl. Junio. (Heldr.)

Pedalis vel elatior, folia majora circ. 4 lin. longa 1½ lin. lata, capitula piso subduplò majora 15-25 flora. Corolla circ. 2 lin. longa. Affinis *A. hirsutæ*, *A. tomentosæ* Ten. et præsertim *A. incanæ* Sibth. pro quâ cum cl. Bory et Chaubard hanc quoque habuimus donec specimina Cretica nos docuerint *A. incanam* indumento brevissimè velutino, floribus duplò majoribus, corollæ scabridulæ laciniis obtusis a nostrâ longè differre.

ASPERULA FASCICULATA Boiss. (Sect. *Cynanchicæ*.)

A. perennis basi suffruticosa multicaulis caulibus ascendentibus vel erectis elatis simplicibus vel supernè parcè ramosis quadrangulis glabris vel asperulis, foliis quaternis tenuissimè linearibus valdè revolu-

tis in mucronem brevem attenuatis internodio pluriès brevioribus plùs minùs scabridis, floribus oppositis fasciculos capitulliformes subsessiles oppositos secùs ramos distantes formantibus, bracteis lanceolatis ovaria parùm superantibus, corollæ albidae tuberculatæ tubo in limbum sensim ampliato, laciniis tubo multò brevioribus oblongis crassiusculis obtusis, antheris linearibus nigricantibus, stylo incluso ultrà medium bipartito stigmatibus globosis nigricantibus, ovario glabro.

Hab. in rupestribus siccis circà *Eden* Libani; legi floriferam Jul. 1846.

Pedalis vel sesquipedalis, folia erecto-patula tenuissima 6-8 lin. longa, corolla circ. 3 lin. longa. Ex. affinitate *A. strictæ* a quâ facile dignoscitur foliis longioribus tenuioribus superioribus bracteisque non ut in eâ setaceo-mucronatis, floribus longioribus densius fasciculatis.

ASPERULA MUNGIERII Boiss. et Heldr. (Sect. *Cynanchicæ*.)

A. basi suffrutescens multicaulis, caulibus tenuibus virgatis erectis quadrangulis elatis infernè brevissimè puberulis densè foliosis supernè remotè foliosis parcè ramosis, foliis quaternis inter se æqualibus angustè linearibus brevissimis nervo medio valido secùs caulem decurrenti instructis mucronatis basi connatis inferioribus secùs caulem densè imbricatis cæteris sparsissimis internodio multò brevioribus, floribus 2-4 in fasciculos oppositos breviter pedunculatos sessilesque secùs caules ramorumque partem superiorem laxè dispositis, bracteis ellipticis acuminatis ovaria paulò superantibus, corollæ glabræ albæ tubo in limbum eo quadruplò breviorē vix ampliato, laciniis oblongis apice subcucullatis acutiusculis muticis, antheris nigricantibus, stylo incluso ad medium usquè bifido, fructu valdè tuberculato.

A. tenuifolia pl. Tayg. Heldr. exs. non Boiss. Diagn.

Hab. in monte *Taygeto*. (Heldreich.)

Pedalis, folia inferiora 2-3 lin. cætera 4-5 longa, flores in racemos longos tenues dispositi, corolla tenuis vix 3 lin. longa. Primùm erroneè retuli ad *A. tenuifoliam* meam quæ foliis longioribus strictis corollæ violascentis subscabridæ tubo brevi laciniisque mucronatis differt. Ab omnibus præcedentibus et ab *A. luteâ* fasciculis paucifloris dignoscenda. *A. aristata* egregiè differt paniculâ divaricatim ramosâ, colore florum, corollæ tuberculatæ lobis mucronatis.

ASPERULA SETULOSA Boiss. (Sect. *Cynanchicæ*.)

A. perennis rhizomate suffrutescenti, caulibus pluribus erectis vali-

diusculis rigidis quadrangulis infernè scabridis supernè parcè ramosis, foliis quaternis angustè linearibus mucronatis valdè revolutis margineque scabridis internodio multò brevioribus, floribus in fasciculos paucifloros breviter pedunculatos dispositis subcorymbosis, bracteis oblongis acuminatis ovaria subsuperantibus, corollæ (e sicco albidæ vel carneæ) aculeolato-scabridæ tubo in limbum subæquilongum sensim ampliato, laciniis oblongo-lanceolatis muticis, stylo brevi ad basin usquè bipartito, ovario setulis adpressis densè obsito.

Hab. in arenosis Rossia australis ad *Peresyp* et ad ostia *Tyræ*, Lang. et Szowits herb. Ruth. No 408 sub *A. littorali*. Smith.

Planta 6-9 pollicaris, folia intermedia 5-6 lin. longa tenuia, corolla vix 2 lin. longa. Affinis habitu *A. montanæ* W. K. ab eà et affinibus ovario papillari-setuloso distinctissima. *A. littoralis* Fl. Græc. tab 122 e littoribus Ponti Euxini est planta diversissima foliis latioribus brevioribus densè imbricatis, corollis majoribus ovariisque patulè hispidis.

ASPERULA NITIDA Sibth. var. *puberula* Boiss. — Tota papillis brevissimis puberula.

Hab. in monte *Kronion* Laconia (Heldr.), *Sipylo* Lydia (Boiss.).

Veluti species quæ in Olympo et montibus Græciæ sept. crescit, variat floribus in cæspite subsessilibus et caulescens caulibus diffusis subelongatis. Hæc species dignoscitur semper foliis in mucronem longum setaceum abeuntibus et corollæ laciniis in mucronem brevem callosum brevem attenuatis (nec ut in Fl. Græcâ falsò exhibentur retusis).

ASPERULA ATHOA Boiss. (Sect. *Cynanchicæ*.)

A. basi suffrutescens multicaulis densè cæspitosa nana tota setulis patulis brevissimis canescens scabrida, caulibus brevissimis quadrangulis basi præsertim densè foliosis, foliis quaternis parvis angustissimè linearibus rigidulis strictis brevissimè mucronulatis subtus inter margines revolutos nervumque medium crassum angustè bisulcatis inferioribus abbreviatis oblongis internodia æquantibus, floribus 3-4 terminalibus et ex axillis supremis binis oppositis, bracteis minimis ovaria vix superantibus oblongo-lanceolatis acuminatis scabridis, corollæ e sicco roseæ tubo capillari limbo setuloso ferè quadruplò longiori, laciniis linearibus obtusiusculis, antheris linearibus nigris, stylo incluso ad medium bipartito, ovario breviter albo-setuloso.

Hab. in monte *Atto* *Aucher* N° 683.

Planta caespites 2-3 pollicares formans, folia longiora vix 3 lin. longa lineæ 1/3 lata, corolla 4 lin. longa. Habitu affinis *A. suberosæ* Fl. Græc. ejus locus natalis proprius adhuc ignotus est et pro quâ eam primum habui sed hæc ex descriptione et icone differt indumento canescenti nec scabrido, corollæ glabræ tubo minus tenui laciniis ovato-ellipticis duplò nec quadruplò longiori.

ASPERULA GUSSONII Boiss. (Sect. *Cynanchicæ*.)

A. rhizomate suffruticoso crasso caules plurimos filiformes diffusos nanos densè caespitosos edenti, foliis quaternis glaucescentibus densè imbricatis subtùs latè nervosis margineque subincrassatis infimis ovato-oblongis obtusis cæteris elliptico-linearibus linearibusve obtusis vel acutiusculis, floribus paucis terminalibus capitatis subsessilibus foliis supremis basi stipatis, corollæ glabræ carneæ tubo in limbum eo dimidiò breviorè sensim ampliato, laciniis ovatis apice cucullatis obtusiusculis, antheris ferrugineis, ovario glabro lævi.

Hab. in rupibus excelsioribus *Nebrodim* Siciliæ.

A. suberosa Guss. Syn. Fl. Sic. non Fl. Græc.

Species pulchella nana foliis latiusculis brevibus obtusis densè imbricatis floribusque magnis insignis a plantâ *Sibthorpiana* notis sequentibus certè distincta. *A. suberosa* habet caules pubescentes, folia plùs minùs incana acuta, flores in apice caulium ob pseudoverticillos plures spicatos, tubum corollinum tandem pubescentem supernè vix ampliatus ovariumque subincrassatum.

ASPERULA BREVIFLORA Boiss. (Sect. *Cynanchicæ*.)

A. perennis pallidè virens, rhizomate suffruticoso tortuoso cortice suberosâ albidâ vestito multicauli, caulibus quadrangulis glabris lævibus vel ad angulos subscabridis erectis tenuibus a basi alternatim ramosissimis flexuosis, foliis senis brevibus internodio multoties brevioribus linearibus basi subattenuatis margine scabridis subtùs subrevolutis acutiusculis sub lente punctulatis, floribus secùs ramulos in fasciculos remotiusculos sessiles vel subsessiles 3-7 floros sæpiùs oppositos paniculam effusam formantes dispositis parvis, bracteis oblongo-linearibus ciliatulis ovario brevioribus, corollæ albidæ breviter

puberulæ tubo brevi a basi campanulato ampliato laciniis brevibus ovatis muticis vix duplò longiori, stylo brevissimo incluso ad medium usquè bipartito, ovario glabro lævi.

Hab. in rupestribus siccis circà *Eden* Libani ubi legi floriferam Julio 1846.

Planta pedalis vel elatior ramosissima ramis erecto-patulis, folia 4-5 lin. longa lineæ $1\frac{1}{2}$ lata, corolla lineam lata. Species distinctissima ex affinitate *A. brachyanthæ* Boiss. floribus in capitella latè bracteata dispositis ovario cano foliisque binis longioribus distinctæ et *A. rigidæ* Sibth. quæ caulibus pumilis, floribus solitariis vel binis duplò longioribus longiùs distat. *Galium suberosum* Sibth. e Cretà quod ex icone tantum novi nostram speciem habitu suo refert sed præter corollam *Galii* et omninò glabram differt foliis latioribus brevioribus, floribus ternatis etc.

ASPERULA PYCNANTHA Boiss. (Sect. *Galioidæ.*)

A. perennis, caulibus crassis valdè elongatis inclinatis vel ascendentibus subsarmentosis quadrangulis papillis albis crispis plùs minùsve hirsutis supernè oppositè ramosis elongatim et strictè paniculatis, foliis senis octonisve deflexis oblongo vel elliptico-linearibus acutiusculis mucronatis facie superiori sub lente punctatis subtùs concavis margine scabridis revolutisque ad nervos et rariùs facie plùs minùsve albosetosis, floribus in pseudovorticillos capitato-globosos densissimos remotos valdè albohirsutos secùs ramos congestis breviter pedicellatis, bracteis oblongis mucronulatis flores subæquantibus, corollæ luteæ brevis campanulatæ extùs sparsim et longè albosetosæ laciniis oblongis inflexo-mucronulatis tubo longioribus, stylo subexserto apice brevissimè bifido, fructu parvo.

Var. *α. lasiocarpa.* — Fructùs albo-setosi.

Hab. in planitie *Damascenæ* Aucher N° 742.

Var. *β. leiocarpa.* — Fructùs glabri.

Hab. in vallibus ad septentrionem urbis *Latakieh* ad *Aleppum* eundo. (Boiss.) Fl. fine Junii.

Caules tripedales longioresve, folia caulina 5-6 lineas longa $1\frac{1}{2}$ -2 lineas lata, corolla 3-4 lin. longa. Habitu et characteribus affinis *A. humifusæ* Besser quæ tamen longè differt foliis angustioribus, corollæ albæ lobis ovatis, floribus in racemos laxiores spiciformes dispositis.

GALIUM PESTALOZZÆ Boiss.

G. perenne multicaule lævissimum glaberrimum siccitate nigrescens, caulibus teneris filiformibus quadrangulis foliosis simplicibus erectis cæspitosis, foliis senis elliptico-lanceolatis acutis margine subrevolutis lucidis ferè pellucidis, pedunculis terminalibus folia paulò superantibus subtrichotomè corymbosis, corymbis paucifloris, pedicellis strictis corollà paulò longioribus, corollæ magnæ albæ patulæ lobis oblongis acutiusculis muticis, antheris roseis, stylo apice tantùm bifido, fructibus glabris.

Hab. in regione subalpinâ Libani in viâ inter *Berythum* et *Damascum* suprâ *Khan Hussein* in herbis humidis, legi Maio 1846.

Caulis semipedales tenues erecti numerosi teneri simplices, cymæ more *G. alpestris* terminales densiusculæ, folia majora 6 lin. longa vix sesquilineam lata, flores lactei magnitudinis *Asperulæ odoratæ*. Species distinctissima propè *G. mite* et *Oriente* collocanda, facie *Asperulam odoratam* vel *Libanoticam* quâcum crescit referens.

G. Orientalis Boiss. forma incana est *G. incanum* Flora Græca, tab. 130, sed cùm formæ vix pilosulæ imò glaberrimæ lucidæ virides hujus speciei multò frequentius occurrant quàm formæ incanæ in calidiorebus tantùm obviæ, nomem specificum nostrum speciei in totius Orientis alpinis a Græciâ ad Cappadociam frequenti aptissimum omni jure servandum est.

GALIUM DELICATULUM Boiss. et Hohen. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Eugalia*.)

G. perenne caulibus e rhizomate sæpè crassiusculo numerosis ascendentibus pumilis infracto-flexuosis filiformibus tenerrimis hispidulis parcè ramosis, foliis senis teneris pellucidis hispidulis basi et apice attenuatis mucronulatis, cymis terminalibus brevissimis paucifloris bi vel trichotomè valdè divaricatis, pedicellis capillaribus glabris florè subduplò longioribus, floribus albis mediocribus glabris, corollæ planæ laciniis oblongis in mucronem tenuem eis quadruplò breviorē abeuntibus, antheris nigrescentibus, stylo ad medium usquè bipartito, fructu glabro lævi.

Hab. in rupestribus montis *Demawend* Aucher N° 4662, Kotschy N° 362.

Planta tenerrima 3-4 pollicaris, folia intermedia 5-6 lin. longa ses-

quilineam lata, flores magnit. *G. sylvestris*. Affine *G. Kurdico* et *Hyr-canico*, prius differt foliis majoribus ovatis, pedicellis elongatis, corollæ lobis muticis. *G. Hyrcanicum* habet caules rigidulos multò crassiores, folia mutica, cymas confertifloras, pedicellos brevissimos, etc.

GALIUM CRETICUM Boiss. et Heldr. in pl. Cret. e s. 1847. (Sect. *Eugalia*.)

G. perenne glabrum caulibus brevissimis lucidis obsolete tetragonis tenuissimis teneris erectis supernè parcè ramosis, foliis 4-5 nis brevibus erectis oblongo-linearibus obtusis supernè margine scabrido sub-revolutis, ramis floralibus trichotomis ramulis divaricato-patentibus, floribus ad ramulorum apicem in umbellulas 4-5 floras congestis, pedicellis flore subduplò longioribus etiam fructiferis strictis contractis nec divaricatis, corollà albà glabrà medioeri lobis oblongis acutiusculis muticis trinerviis, fructu didymo lævi.

Hab. in pratis paludosis montanis Cretæ loco *Enneachoria* dicto propè *Elos* Eparchiæ *Kissamos* alt. 4000'. (Heldr.)

G. junceum in pl. Cret. Heldr. exs. non Sibth.

Caules filiformes ferè pedales, folia inter se remota 3-5 lin. longa lineæ 3/4-1 lata, flores paulò minores eis *G. palustris* cui nostra species valdè affinis est et quod differt foliis deflexis majoribus siccitate nigricantibus et præsertim pedicellis paulò longioribus post anthesin divaricato-patentibus nec contractis. *G. junceum* nunc mihi ex icone floræ Græcæ notum est *G. fruticosum* Willd. species distinctissima.

GALIUM DIPLOPRION Boiss. et Hohen. in pl. Kotsch. Pers. bor. 1846. (Sect. *Eugalia*.)

G. perenne siccitate nigricans, caulibus herbaceis prostratis basi filiformibus nudis lucidis dein parcè ramosis incrassatis obsolete angulatis ad angulos sparsim retrorsum aculeolatis, foliis subsemitis opacis carnosulis oblongis breviter acuminatis margine retrorsum et subbifariè uncinato-aculeatis facie lævissimis, floribus in cymas axillares et terminales breviter pedunculatas paucifloras subcapitatas congestis, pedicellis ovario æquilongis, corollæ albæ planiusculæ laciniis oblongis acutiusculis muticis, stylo brevissimo bipartito, ovario glabro.

Hab. in glareosis propè *Schah Neschin* montis *Totschal* propè *Teheran* alt. 7000'. (Kotschy.)

Caules in meis speciminibus semipedales, folia 4 lin. ionga sesquilineam lata, flores magnit. eorum. *G. palustris*. Species foliis veluti serræ dentes subbifariam retrorsum uncinulatis insignis propè *G. Aucherii* collocanda inter *Eugalia* et *Aparinem* intermedia.

GALIMUM MONACHINII Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1847. (Sect. *Euaparine*.)

G. annuum glabrum, caulibus pluribus brevibus tenuiter filiformibus decumbentibus ad articulos remotiusculos infractis rubellis obsoletè angulatis lævibus, foliis senis minutis oblongo-ellipticis utrinquè attenuatis acutis mucronulatis margine vix revolutis scabridis cæterum lævibus, pedunculis ex axillis supremis terminalibusque paucis foliis 2-4 plò longioribus trifloris, pedicellis glabris bractea oblongo-lineari flores æquanti suffultis flori æquilongis fructiferis erectis fructu vix longioribus, floribus minutissimis hermaphroditis, corollæ glabræ rosæ ovario albo-hispido angustioris laciniis oblongis obtusiusculis, antheris luteis, stylo supernè bifido, stigmatibus globosis albis, fructus didymi mericarpis globosis pilis albis brevibus apice subuncinatis densè hispidis.

Hab. in lapidosis montium *Lassiti* Cretæ in monte *Lazzaro* alt. 4000-5000' rarum. (Heldr.)

Caules e radice tenuissimà plures 3-6 pollicares, folia majora ferè 3 lineas longa lineam aut paulò ampliùs lata, pedunculi 6-10 lin. longi, flores e minutissimis generis, fructus magn. eorum *G. Vaillantii*.

GALIMUM PISIFERUM Boiss. (Sect. *Aparine*.)

G. annuum viride glabrum, caulibus longis flaccidis ascendentibus quadrangulis retrorsum aculeolatis, foliis 6-7 nis inferioribus oblongo-spathulatis basi in petiolum brevem attenuatis apice rotundatis mucronulatis superioribus angustatis elliptico-lanceolatis acutis omnibus uninerviis margine et subtus ad nervum medium retrorsum valdè aculeolatis, pedunculis ex axillis superioribus terminalibusque breviter corymboso-paniculatis, ramulis pedicellisque setaceis flore sesquilon- gioribus divaricatis retrorsum aculeolatis fructiferis incrassatis recurvis, bracteis minimis lineari-setaceis acutis, floribus polygamis, centrali trichotomiarum hermaphrodito lateralibus masculis, corollæ glabræ lacteæ lobis oblongo-lanceolatis acutis muticis, antheris luteis, stylis

a basi bipartitis, fructu ob pedicellum recurvum pendulo, mericarpio altero semper abortivo altero glaberrimo laevi globoso magno, pericarpio albido membranaceo subinflato a semine soluto, semine sub lente tuberculato-punctato.

Hab. in umbrosis rupestribus Palæstinæ, legi in monte *Carmelo* et circa *Rascheya* ad radices Antilibani.

Caules 1-3 pedales, folia inferiora ferè pollicem longa 3-3 1/2 lin. lata, flores terminales magn. eorum *G. palustris*, fructus magnit. pisi. Species inter *Aparines* floribus albis magnis, fructus magni glabri pericarpio inflato notabilis.

GALIUM CASSIUM Boiss. (Sect. *Leiaparine*.)

G. annuum glabrum, caule obsoletissimè tetragono filiformi ferè a basi dichotomè et divaricatum ramosissimo, ramis rigidis capillaribus elongatis intricatis, foliis 5-6 nis elliptico-linearibus angustèque linearibus margine scabrido revolutis obtusiusculis muticis patulis vel deflexis supremis setaceis oppositis brevibus inæqualibus, pedunculis setaceis folia axillaria superantibus umbellulas densifloras parvas contractas ferentibus, bracteis setaceis flores non superantibus, pedicellis flori subæquilongis, corollæ pallidè ochroleucæ lobis oblongis obtusiusculis muticis, fructus minimi mericarpiis subglobosis.

α. *lasiocarpum*. — Fructus pilis longis albis subuncinatis densè hispidus.

β. *calvescens*. — Fructus adpressè et parcè strigosus.

Hab. ambo formæ mixtæ in umbrosis regionis inferioris montis *Cassii* inter *Laodiceam* et *Suadieh*; legi quoque ad pedem rupium in promontorio *Ras Beyrout* ad meridiem urbis *Berythi*.

Affine facie et florum magnitudine *G. setaceo* quod egregiè a nostro differt foliis tenuioribus, bracteis flores longè superantibus, pedunculis paucifloris, pedicellis flore longioribus, corollâ rubellâ, etc.

G. Mungierii Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. est tantum *G. divaricatum* DC. var. floribus albis et præter colorem florum pedicellosque subbreiores a formâ geminâ non differt.

GALIUM PENICILLATUM Boiss. (Sect. *Leiaparine*.)

G. annuum siccitate nigrescens, caule filiformi erecto pumilo a basi patulè ramoso obsoletè quadrangulo scabridoque glabro, foliis glabris

6-8 nis angustè linearibus margine valdè revolutis scabridis breviter albo-mucronatis, pedunculis brevibus pedicellisque numerosis subumbellatis flore sesquolongioribus glabris capillaribus, bracteis folisque supremis puberulis longè setaceo-acuminatis, corollæ albæ laciniis oblongis apice penicillato-pilosis in setam eis dimidiò breviorè abeuntibus, fructu glabro lævi pedicello recto dimidiò breviori.

Hab. in *Mesopotamiâ* inter *Orfa* et *Suerek* Kotschy N° 94.

Planta 3-4 pollicaris, folia 4-5 lin. longa 1½ lin. vix lata, flores magnit. *G. sylvestris*. Valdè affine *G. Aleppico* et præsertim *G. nigricanti*. Ambo a nostrâ specie sat differre videntur caulibus valdè quadrangulis foliisque latius albonervosis, corollæ segmentis setâ eis æquilongâ terminatis, prius insuper scabritie totius plantæ et indumento pedunculorum et fructûs, posterius corollâ glabrâ pedicellisque basi hispidulis.

GALIUM PAMPHYLICUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Xanthaparine*.)

G. annuum glabrum, caulibus tenuissimis erectis quadrangulis obsolete scabridis rubellis supernè ramosis paniculam corymbosam nebulosam tenuissimam edentibus, foliis inferioribus quinis subinæquilatis oblongis basi attenuatis acutiusculis superioribus subseptenis angustè linearibus omnibus uninerviis margine subrevolutis scabridis cæterùm lævibus, pedunculis divaricatis pedicellisque flore 2-4plò longioribus setaceis glabris, corollæ glabræ flavovirentis lobis oblongis mucrone eis triplò breviori terminatis, fructu glabro vel pilis brevibus albis uncinulatis tomentello.

Hab. in collibus saxosis apricis ad *Kourmalu* Pamphyliæ. (Heldr.)

Species facie, characteribus florum magnit. affinis *G. intricato* Reuter et Margot, ab eo distincta foliis caulibus pedunculisque glabris nec hispidis, foliis muticis nec longè acuminatis, floribus fusciscentibus nec albidis, ovario cum pilosum est pilis brevioribus multò densioribus obsito. *G. nebulosum* Boiss. quod est tantùm varietas lobis corollæ longissimè setosis. *G. floribundi* Sibth. a *G. Pamphylico* dignoscitur floribus duplò majoribus pedicellisque elongatis.

GALIUM JUDAICUM Boiss. (Sect. *Xanthaparine*.)

G. annuum multicaule totum densè et breviter hispidulum, caulibus

ascendentibus ferè a basi dichotomè ramosissimis ad dichotomias infractis quadrangulis, foliis quinis elliptico-linearibus obtusiusculis basi attenuatis margine subrevolutis hispidulis muticis, pedunculis folia axillaria vix superantibus patulo-divaricatis sæpè deflexis crassiusculis divaricatis 5-9 floris, pedicellis hispidulis divergentibus capillaribus flore 2-4 plò longioribus, corollæ luteæ valdè hispidæ lobis oblongis mucrone albedo brevissimo terminatis, fructu didymo setis albis longis apice subuncinatis densè hispido, mericarpiis oblongis subincurvis.

Hab. in rupestribus Palæstinæ, propè *Hierosolymam* frequens, propè *Banias* in Galilæa. (Boiss.)

Semipedalis, caules intricati, folia 3-4 lin. longa sesquilineam lata, flores magnit. *G. intricati* a quo ut et a *G. Pamphylico* egregiè differt pedunculis brevibus pedicellisque minùs tenuibus rigidioribus valdè divaricatis, fructu longissimè et densè hispido, corollis vix mucronulatis.

GALIUM VULCANICUM Boiss. et Hohen. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Xanthaparine*.)

G. annuum, caule nano erecto paulò suprà basin ramoso breviter et effusè paniculato rubello quadrangulo lævi glabro, foliis subsenis angustè linearibus valdè revolutis supernè et margine parcè scabridis glabris albo-mucronulatis, pedunculis foliis axillaribus paulò longioribus multifloris pedicellisque divaricatis flore triplò longioribus setaceis rigidulis valdè hispidulis, corollæ purpurascentis vel sordidè flavæ minimæ extùs hispidæ laciniis oblongo-lanceolatis in cuspidem setaceam æquilongam intùs reflexam abeuntibus, fructu pilis brevibus subuncinatis hispidulo mericarpiis breviter ovatis.

Hab. in glareosis vulcanicis montis *Elbrus* propè *Derwend* Kotsch. No 252.

Plantula bipollicaris, habitus, florum magnitudo speciminum minorum *G. intricati* a quo præter folia angustiora valdè revoluta brevissimè nec longè mucronata mucrone longissimo laciniarum corollæ statim dignoscitur. *G. Aleppicum* quoque affine differt caule crassiori valdè quadrangulo, foliis nervo albo valido percursis, corollà albâ ferè duplò majori.

GALIUM PHILISTÆUM Boiss. (Sect. *Xanthoparine*.)

G. annuum totum viride glabrum valdè scabridum, caule ascendenti a basi ramoso ramisque quadrangulis retrorsum aculeolatis densè foliosis, foliis 6–8 nis internodia æquantibus inferioribus oblongo-ellipticis superioribus linearibus omnibus acutis planis vix revolutis scaberrimis teneris, floribus in umbellulas densas breviter pedunculatas bracteis flores ferè superantibus suffultas dispositis, pedicellis florum longitudine, corollæ luteolæ extus hirsutæ lobis oblongis mucrone brevissimo terminatis, ovario albo-hispidissimo.

Hab. in Palæstinâ propè *Gaza*. (Boiss.)

A. G. Pamphylico, intricato et Judaico facillè dignoscitur scabritie, floribus brevissimè pedicellatis densè umbellatis, his notis affine est *G. capitato* B. et Ch. et præsertim *G. trachyantho* Boiss. quod paniculæ multò ramosioris pedunculis elongatis, capitulis florum bracteis binis eis brevioribus suffultis, cuspidè lobis corollinis vix breviori differt.

GALIUM LYCIUM Boiss. (Sect. *Trichogalia*.)

G. perenne basi suffruticosum caulibus numerosis intricatis erectiusculis cortice albidâ vestitis sub lente tenuissimè puberulis quadrangulis fragilibus, foliis senis ellipticis tenuibus planis vix subrevolutis lucidis glabris margine et facie parcè et minutè scabridis superioribus diminutis oblongo-linearibus, ramis patulè et breviter hispidulis, floribus secus ramulos subverticillatis pedicellis setaceis hispidulis eis duplò longioribus divaricatis suffultis numerosis minimis paniculam effusam formantibus, corollæ purpurascantis extus hispidulæ lobis oblongis in mucronem setaceum lobo triplò breviorē attenuatis, ovario albo-hispidissimo.

Hab. in rupibus propè *Elmalu* Lyciæ ubi legit et mihi comm. cl. Pestalozza.

Ex affinitate *G. cani* et *musciiformis* ab eis diversum foliis glabris tantum scabridis, caulibus glabrescentibus, ramulis breviter et tantum sub lente hispidulis.

GALIUM SEROTINUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Erythrogalia*.)

G. perenne glaberrimum basi suffrutescens, caulibus numerosis as-

cendentibus elongatis rigidulis quadrangulis lævibus lucidis tenuissimis paulò suprà basin strictè ramosissimis, foliis jam sub anthesi exscatis angustissimè linearibus marginè lævibus revolutis infimis 4-6 nis ramealibus floralibusque binis valdè abbreviatis, floribus minutissimis secùs ramulos tenuissimos vel in glomerulos trifloros oppositos sessiles aut brevissimè pedicellatos vel solitariis vel oppositis sessilibus, bracteis minimis glaberrimis oblongo-linearibus, ovario glaberrimo oblongo, corollæ purpureæ subclausæ lobis ovatis in mucronem inflexum crassiusculum eis dimidiò breviorè attenuatis, stylo brevissimo ad basin usquè bipartito, stigmatibus globosis nigris.

Hab. in rupibus *Tauri Pamphylici* inter *Marla* et *Adalia* alt. circ. 4000'. fl. Julio. (Heldreich.)

Caules sesquipedales ramosissimi, ramuli floriferi strictiusculi tenuissimè filiformes 1-2 pollicares numerosi paniculam effusam multifloram formantes, flores illis *G. purpurei* dimidiò minores. Ab eo præterea differt foliis raris deciduis, floribus subsessilibus, etc. Naturaliùs collocandum propè *G. rupestre* Vis. et *G. suberosum*. Fl. Græc. quæ quoque pedunculis trifloris gaudent sed longè differunt floribus majoribus, corollæ segmentis muticis, stylo apice tantùm bifido, etc., etc.

Gal. incurvum Fl. Græc. tab. 132 est forma pumila brevifolia paniculà effusà, foliis falcato-subincurvis *G. melanantheri* mei, in Cretæ montibus occurrens et quam cl. Heldreich quoque retulit, *G. melanantherum* var. *incurva* dicenda.

PRO VALANTIA ARISTATA Boiss. et Heldr. Diag. VI pone VAILLANTIA APRICA Boiss. et Heldr. nam ex icone et descriptione hæc planta est ipsissimum *Galium apricum* Fl. Græca tab. 126.

VALERIANEÆ.

VALERIANA OLIGANTHA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.

V. perennis glabriuscula, radice surculos tenues nudos apice foliosos sæpè edenti, foliis teneris ad collum congestis infimis paucis parvis ovato-rotundis integris longè petiolatis cæteris pinnatipartitis segmentis lateralibus 2 rariùs 4 ovatis subpetiolatis terminali triplò majori petiolulato ovato-rotundo, caulibus scapiformibus tenuibus supernè

parcè et subdichotomè ramosis medium versùs ferentibus folia opposita minima indivisa vel pinnatipartita lacinis linearibus, cymis valdè paucifloris bifidis corymboso-capitatis terminalibus, bracteis oblongo-linearibus margine sub lente ciliatulis, floribus roseis.

Hab. in regione alpinà montis *Stavros* Pisidiæ in umbrosis ad saxa alt. 6000–7000'. (Heldreich.)

Folia cum petiolo 4–4 1/2 pollicaria segmentis lateralibus 4 1/2–2 lineas terminali 3–4 lineas diametro latis, scapi 6–8 pollicares supernè semel vel bis ramosi ramis strictis filiformibus, cymæ minimæ 5–7 floræ. Species distinctissima propè *V. saxatilem* collocanda.

CENTRANTHUS ELATUS Boiss. et Heldr.

C. perennis glaberrimus caulibus numerosis elatis sæpè glaucocæsiis crassis teneris valdè fistulosis foliosis infernè ramosis simplicibusve, foliis latis oblongis acutis infimis in petiolum attenuatis cæteris sessilibus supremis ad basin ramorum floralium a basi latiori oblongolanceolatis attenuato-subacuminatis, ramis oppositis dissitis abbreviatis dichotomis cymiferis paniculam longissimam angustam laxam formantibus, cymis densiusculis, bracteis linearibus puberulis, calcare tubo subbreiori ovario triplò longiori, genitalibus limbo duplò longioribus.

C. longiflorus var. *latifolia* pl. Heldr. Anat. exs. 4846.

Hab. in declivibus lapideis Anatoliæ in Pisidià ad lacum *Egirdir* (Heldr.), in *Tauro Ciliciæ* Kotschy N° 245, in totà regione inferiori Antilibani. (Boiss.)

Planta 4–5 pedalis, folia inferiora 2–3 pollicaria 9–10 lin. lata. Panicula sæpè plus quam pedalis. Quoad characteres florum valdè affinis *C. longifloro* Stev. ab eo tamen sat specificè differre videtur foliis brevioribus multò latioribus oblongis nec lineari-lanceolatis, paniculæ multò longioris ramis omnibus dissitis nec confluentibus.

CENTRANTHUS JUNCEUS Boiss. et Heldreich.

C. perennis, rhizomate suffrutescenti multicauli, caulibus tenuibus virgatis rigidis juncæis infernè divaricatim ramosis oligophyllis, foliis intimis lineari-spathulatis obtusis cæteris deflexis angustissimè linearibus acutiusculis, floribus in cymas paucifloras fasciculiformes ad apicem ramorum tenuium nudorum sitis, bracteis oblongo-linearibus

brevissimis, calcare tubo corollæ subæquilongò ovario quadruplò longiori, genitalibus limbo duplò longioribus.

C. longiflorus var. *angustifolia* pl. Tayg. exs. 1845.

Hab. ad rupes *Kakochoni* dictas in regione summâ *Taygeti*. (Heldr.)

Caules sesquipedales infernè divaricatim longè et rigidè ramosi tennes, folia sparsa intermedia pollicaria lineam lata superiora minora breviora, corolla cum calcare ferè pollicaris. Facies *C. angustifolii* a quo calcaris proportionè statim dignoscitur. Affinis *C. longifloro* a quo differt caule tenui rigido, foliis angustissimis deflexis, floribus in cymas paucissimas terminales dispositis; corolla *C. longiflori* insuper ad calcaris insertionem sessilis est, in *C. junceo* autem insertiones calcaris et ovarii tubulo brevissimo separantur.

VALERIANELLA SOYERI Buchinger in litt. (Sect. *Psilocalæ*.)

V. annua glabra a basi ramosissima, foliis inferioribus oblongo-spathulatis in petiolum attenuatis, superioribus sessilibus oblongo-lanceolatis infernè lobulatis, ramis fructiferis subincrassatis fistulosis, floribus in fasciculos corymbosos capituliformes minutos densè congestis, bracteis oblongo-linearibus integris, fructibus dichotomiarum persistentibus abortu unilocularibus angustissimè lineari-cylindricis dente subulato recto apice subuncinato denticulisque binis calliformibus coronatis, fructibus capitulorum maturis deciduis ovato-oblongis subinflatis subincurvis dorso irregulariter sulculosis trilocularibus loculo fertili angusto sterilium altero loculo fertili æquilato altero duplò latiori, dentibus terminalibus ternis 2 minimis calliformibus sæpè ferè obsoletis tertio subulato brevi fructûs curvaturam spectanti subincurvo.

Hab. in montosis totiùs Græciæ, in *Hymetto* et *Pentelico* (Spruner, Boiss.), montibus Peloponnesi, Cretâ in montibus *Lassiti*. (Heldr.)

Species habitu, fructûs formâ *V. echinatham* pro cuius varietate eam diù habui valdè referens egregiè tamen diversa ramis fructiferis tenuioribus minùs incrassatis, capitulis minoribus, fructu seorsim nec cum capitulo deciduo minori cum dentibus vix 2 lin. longo inflato nec fungoso duro, dentibus formæ diversæ, loculis sterilibus inæquilatis nec æquilatis angustissimis.

VALERIANELLA DIPLUSODON Boiss. (Sect. *Psilocalæ*.)

V. annua scabriuscula nana ferè a basi ramosa, ramis brevissimis,

cymis confertis, foliis oblongis linearibusque obtusis integris, bracteis linearibus, fructu glaucescenti parçè glanduloso-puberulo lineari dorso convexo uninervi facie sulcato, loculis binis sterilibus filiformibus angustissimis basi in alas binas rotundatas dilatatis, coronâ campanulatâ obliquâ fructu duplò latiori tridentatâ dente intermedio brevissimo transversè latiori reticulato-nervoso argutè denticulato, lateralibus horizontaliter subrecurvis altero fructu longiori lineari a medio acutè denticulato, altero dimidiò breviori.

Hab. ad radices orientales Antilibani inter *Rascheya* et *Damascum* in siccis, legi Malo ineunte.

Valdè affinis *V. diodonti* Boiss. Diag. differt caulibus 1-2 pollicaribus confertifloris, fructûs paulò majoris coronâ dilatâ, dentibus paulò latioribus pectinatis nec integris. An tamen hujus varietas?

Val. remota Boiss. et Hohen. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846 mihi nunc tantùm status junior *V. sclerocarpæ* F. et M. esse videtur.

VALERIANELLA DACTYLOPHYLLA Boiss. et Hohen. in pl. Kotsch. Pers. bor. (Sect. *Psiloœlæ*.)

V. annua glabra, caule plûs minûs elato supernè pluries dichotomè ramis divaricatis, ramulis fructiferis non incrassatis, floribus in capitulos terminales parvos congestis, foliis radicalibus integris oblongo-linearibus obtusis, caulinis subdigitatis laciniis integris linearibus lateralibus angustis intermediâ 2-3 plò longiori latiorique, bracteis lineari-subulatis hispidulis carinatis, fructu pyramidato-ovato puberulo-anticè profundè sulcato dorso convexo, coronâ regulariter 6-7 dentatâ erecto-patulâ dentibus triangularibus reticulato-nervosis in aristas patulas uncinatas attenuatis, loculis sterilibus cylindricis, loculo fertili complanato duplò latiori sectione transversâ elliptico-lineari.

Hab. in lapidosis montis *Elbrus* Kotschy Nos 91 A et 193, ad radices *Antilibani*. (Boiss.)

Caules 1½-4 pedales, fructus absque coronâ lineam tantùm longus, corona cum dentibus tubo ferè brevior. *V. uncinatæ* forsân nimis affinis et eadem fructûs structurâ gaudens, hæc tamen a nostrâ specie differt foliis inciso-pinnatifidis, superiorum laciniis dentatis, fructu longiori, loculis sterilibus fertili quadruplò angustioribus.

DIPSACEÆ.

CEPHALARIA KOTSCHYI Boiss. et Hohen. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Lepicephalus*.)

C. caule modicè elato valdè striato sub lente brevissimè et densè pilis patulis puberulo supernè parcè ramoso, foliis puberulis lyrato-pinnatipartitis infimis petiolo plano suffultis cæteris sessilibus, segmentis lateralibus utrinquè 2-4 parvis oblongo-linearibus a superiori ad inferius sensim decrescentibus denticulatis integrisve superiori multoties majori oblongo argutè denticulato, omnibus acutis subacuminatis basi angustè secùs costam decurrentibus, capitulis paucis terminalibus longiusculè pedunculatis mediocribus globosis, involucri phyllis paleisque corollas subæquantibus ovatis brevissimè attenuato-acuminatis adpressè hirsutis apice nigro-sphacelatis, corollis flavis æqualibus, involucelli dentibus 8 subulatis subæqualibus, fructu...

Hab. in declivibus septentrionalibus faucis *Dudera* montis *Elbrus* Kotschy N° 422 A.

Bipedalis, folia inferiora cum petiolo semipedalia, segmentum superius 4 poll. longum 1 1/2-2 poll. latum. Affinis *C. alpinae* quæ differt segmentis foliorum lanceolatis subæqualibus, caule elato, paleis lanceolatis longè attenuatis. *C. centauroides* foliis coriaceis aliter divisis, paleis duris ovatis glabris vel breviter puberulis longius distat.

CEPHALARIA STELLIPILIS Boiss. (Sect. *Lepicephalus*.)

C. perennis basi suffrutescens tota tomento brevi denso lutescenti pilis lepidoto-stellatis constanti pannosa, caulibus erectis teretiusculis, foliis ad extremitatem caulium sterilium brevium aggregatis et secùs partem inferiorem caulium fertilium oblongis in petiolum longè attenuatis obtusis vel acutiusculis integris vel supernè obsoletissimè denticulatis, superioribus ad pedunculorum basin angustè linearibus glabris, pedunculis monocephalis longis oppositis glabrescentibus scabridis, capitulis globosis mediocribus, involucri phyllis paleisque scariosis pallidis tenuissimè tomentellis ovatis breviter acuminatis, corollis luteis æqualibus, involucelli dentibus 8 subulatis ciliatis quatuor ex angulis

ortis fructu paulò brevioribus calycem interiorē superantibus, quatuor intermediis triplò minoribus.

Hab. in siccis calidis dumosis ad radices montis *Gebel Scheik* (*Hermón*) Antilibani suprà *Rascheya*. Legi flor. Jul. 1846.

Planta 3-4 pedalis, folia inferiora cum petiolo 1½ pedem longa 8-40 lin. lata, pedunculi e caule 3-40, capitula ferè magn. *C. leucanthæ*. Pulchra species ab omnibus formis *C. centauroidis* distinctissima foliis integerrimis, involucelli dentibus inæqualibus, etc.

PTEROCEPHALUS CARAMANICUS Boiss. et Heldr.

P. annuus vel biennis, caule tereti tenuissimè pubescenti-viscido prætereaque pilis sparsis patulis hispidulo infernè folioso supernè pluries subdichotomè ramoso, foliis eodem duplici indumento obsitis omnibus pinnatipartito-lyratis segmentis oblongo-lanceolatis in petiolulum attenuatis acutè dentatis terminali majori, foliorum superiorum segmentis lanceolato-linearibus acutissimis integris, capitulis longissimè pedunculatis, involucri phyllis floribus dimidiò brevioribus tomentellis albidis oblongo-linearibus in cuspidem viridem squarroso-recurvam attenuatis, corollis cæruleis adpressè velutinis non radiantibus, involucello oblongo apice subattenuato supernè ad costas ciliato-glanduloso denticulis linearibus brevissimis calycis stîpite brevioribus coronato, calycis setis 12 plumosis involucello subduplò longioribus.

Pt. plumosus pl. Anat. Heldr. exs. 1846 non Coult.

Hab. in rupestribus apricis Tauri inferioris inter *Karaman* et *Ermeneke* alt. 3000'. Fl. Junio. (Heldr.)

Pulchra species a me priùs confusa cum *Pt. plumoso* cujus faciem habet et qui differt foliis inferioribus indivisis, involucri phyllis rectis flores æquantibus vel superantibus, involucello apice non attenuato ciliato sed vix glanduloso.

PTEROCEPHALUS COULTERI Boiss.

P. annuus vel biennis totus pube brevissimà densà aliàque longiori patulà tomentellus viscidulus, caule tereti ferè a basi subdichotomè ramosissimo, foliis omnibus sessilibus oblongis pinnatisectis laciniis linearibus iterùm acutè dentatis vel pinnatifidis acutis super costam mediam latam confluentibus, capitulis numerosis pedunculis longis rigidis patulè pilosis suffultis, involucri adpressè hirsuti phyllis lanceo-

latis in mucronem attenuatis corollas æquantibus, corollis adpressè hirtis flavidis exterioribus subradiantibus limbo atropurpureo, involucello cylindrico apice truncato ad angulos breviter ciliato in coronam brevem integram membranaceam abeunti in centro areolæ terminalis vaginulâ cylindricâ truncatâ membranaceâ calycis stipitem includenti aucto, calycis setis circ. 12 plumosis.

P. brevis Coult. Dips. (specimina minima submonocephala.)

Hab. in deserto *Arabiae petrae* Palæstinæ finitimo, monte *Carmelo* (Boiss.), *Persia australi* Aucher N° 4705, Kotschy N° 854.

Planta pedalis elatiorque rariùs et in sterilissimis nana monocephalæque, capitula magnit. *Pt. plumosi* a quo egregie differt foliis inferioribus profundè dissectis, corollis marginalibus atro-purpureis nec cæruleis, involucelli coronâ membranâ edentulâ nec denticulis minimis constanti. Nomen Coulterianum e formâ abnormi ortum mutandum erat.

PTEROCEPHALUS ARABICUS Boiss.

Pt. perennis basi suffrutescens densè cæspitosus nanus cinerascens sub lente pube brevissimâ crispulâ densè obsitus, foliis radicalibus caulisque angustè oblongo-linearibus basi attenuatis obtusiusculis vel integris vel dentatis vel sæpiùs ad medium usquè pectinato-pinna-tifidis lobis oblongo-linearibus, caulibus teretibus pumilis rigidis a basi oppositè ramosis 4-3 cephalis, pedunculis rigidis, involucri tomentello-cinerascentis phyllis 5-7 oblongo-lanceolatis acutis flores æquantibus superantibusve, corollis adpressè hirtis luteis, involucello (juniori) adpressè hirtio apice non angustato in coronam integram brevissimam abeunti, calycis setis 16 plumosis.

Hab. in lapidosis lateris septentrionalis jugi *Tih* infrâ *El Rakineh* alt. circ. 4000'. Legi florere incipientem Maii 1846 initio.

Folia 10-15 lin. longa 2-3 lata, caules cum pedunculis 2-4 pollicares, capitula minuta illis *Pt. cani* dimidio minora. Affinis *Pt. stricto* Boiss. et Hoh. quod differt indumento viscido, caulibus multò ramosioribus, foliis oblongis, corollis longissimis.

SCABIOSA LEPTOPODA Boiss. (Sect. *Cyrtostemma*.)

Sc. annua tota parcè et brevissimè sub lente puberulo-scabrida caule tenui tereti a basi dichotomè ramosissimo, foliis ambitu oblongis pin-natipartitis basi in petiolum ciliatum attenuatis laciniis lineari-bus elon-

gatis subintegrîs foliorum inferiorum latoribus obtusis superiorum tenuiter filiformibus acutis, capitulis minutis longè pedunculatis laxissimè corymbosis, involucri phyllis 6-7 e basi latiori densè albo-hirsutà linearibus hirtulis viridibus flores marginales non æquantibus post anthesin deflexis, corollis extus hirtulis albidis vel pallidè lutescentibus exterioribus radiantibus lobis oblongis subintegrîs, capitulis fructiferis ovatis, fructu turbinato parvo, involucelli basi minimà subrotundà tereti 8 striatà ad strias ciliatà, coronà tubo longiori latorique hemisphæricà 8 nervis validis arcuatim confluentibus totidemque foveolis intermediis exaratà margine brevi membranaceo plicato-crispo ciliatulo terminatà, calycis interioris stipite basi vaginà membranaceà cincto e coronà non exserto, setis 3 coronà duplò longioribus.

Hab. in arenosis *Arabie petree* Palæstinæ conterminæ et regionis *Amalecitarum*, legi Aprili 1846.

Planta 8-10 pollicaris, folia majora sesquipollicaria laciniis 6-8 lin. longis 1-1½ lin. latis, pedunculi sæpè semipedales, capitula illis *Sc. maritimæ* dimidiò minora, fructus cum coronà vix ultrà lineam longus. A. *Sc. semipapposà* cui habitu affinis ut et a *Sc. maritimà* differt fructu brevissimè turbinato, coronà tubo longiori valdè patulà hemisphæricà ciliatà nec campanulatà. *Sc. arenaria* Forsk. — *Asterocephalus arenarius* Vis. *Æg.* tab I huc forsàn spectat sed valdè dubitanter nam capitula fructifera a cl. Visiani hemisphærica dicuntur calycisque tubus ut oblongo-cylindricus coronà brevior exhibetur. Planta Forskahlei insuper planè ignota est nam solis verbis « *flore albo calyce longiori* » insignita. An quoque *Ast. pectinatus* Lag. ex patriâ Arabiâ huc spectat?

SCABIOSA EREMOPHILA Boiss. (Sect. *Cyrtostemma*.)

Sc. annua breviter hirtello-scabrida virescens nana, caulibus brevibus procumbentibus filiformibus a basi alternè floriferis flexuoso-infractis sæpè brevissimis, foliis radicalibus oblongo-linearibus obtusis integris vel basi pinnatifidis laciniis oblongo-linearibus terminali multò majori, caulinis angustè linearibus elongatis integerrimis, capitulis minimis paucifloris pedunculo filiformi erecto-patulo eis pluriès longiori suffultis, involucri phyllis 6-7 linearibus acutis infernè præsertim hirtis capitulo longioribus, corollis minimis carneis non radiantibus, capitulo fructifero sphærico, fructu turbinato parvo, involucelli tubo parvo subrotundo tereti puberulo 8 striato, coronà tubo paulò

longiori duplòque latiori brevissimè obconicà 8 nervis arcuatim confluentibus totidemque foveolis intermediis exaratà margine brevi membranaceo plicato-crispo extis hirtulo terminatà, calycis interioris stipite coronæ æquilongò ad apicem usquè vaginà membranacèa tubulosà cincto, setis 2-4 coronæ æquilongis sæpè brevioribus tenuissimis.

Hab. in arenosis deserti Arabici loco *Ramla* dicto inter jugum Sinaiticum et radices jugi *Tih* sito. Legi April. 1846.

Sæpè acaulis capitulis in centro rosulæ sessilibus vel 3-4 pollicaris, folia 1-1 1/2 pollicaria 1/2-1 lin lata, capitula florifera magn. pisi, fructifera duplò majora, fructus cum coronâ sesquilineam longus. Affinis præcedenti a quâ distinctissima minutie, foliis integris, capitulis minimis non radiantibus fructiferis sphæricis, setis calycis brevissimis, etc.

SCABIOSA PALÆSTINA L.

Sub hoc nomine plures species ab auctoribus et a me ipso confusæ fuerunt quas hic exponam. En veræ *Sc. Palæstinæ* diagnosis.

Sc. annua pilis minutissimis ciliisque sparsis hirsuta, caule elato ramoso ramis pedunculisque strictis longissimis, foliis inferioribus oblongis basi attenuatis dentibus sæpè sublyratis, superioribus trifidis laciniis lineari-lanceolatis acutis integris intermediâ majori, involucri phyllis basi hirsutissimis lanceolatis acutis corollas marginales æquantibus vel eis subbrevioribus, corollis albido-lutescentibus radiantibus laciniis trifidis oblongo-linearibus intermediâ subquadrifidâ, involucelli tubi densè albo-pilosi basi tereti foveolis æquilongâ, coronâ tubo subduplò longiori 32-35 nervi, calycis limbo longè stipitato setis quinque scabris coronâ brevioribus.

Hab. in *Palæstinâ* ubique Boiss., circà Aleppum Kotschy N° 487, in *Persia australi* Kotschy N° 439 (forma pinguis laciniis foliorum latioribus capitulis corollisque majoribus).

Hæc est sola affinium a me in *Palæstinâ* observata et omninò conveniens descriptioni Linnæi qui folia inferiora incisa corollas albas calyci æquilongas laciniis trifidis dicit. Icon Jacq. Vind. I tab. 96 quamvis mala et corollas nimis dentatas exhibens hanc speciem potiùs quàm sequentem refert.

SCABIOSA CALOCEPHALA Boiss. (Sect. *Asterocephalus*.)

Sc. annua brevissimè asperula ad foliorum basin parcè setosa, caule

erecto oppositè ramoso, ramis pedunculisque longissimis erectis, foliis inferioribus oblongo-spathulatis crenato-dentatis basi breviter attenuatis superioribus lyrato-pinnatipartitis laciniis integerrimis lateralibus utrinquè 2-3 oblongo-linearibus intermedià multò majori oblongo-lanceolatà, involucri phyllis adpressiusculè hirsutis oblongo-lanceolatis acutiusculis corollis marginis dimidiò brevioribus, corollis amænè cæruleis exterioribus valdè radiantibus laciniis usquè ad basin palmatim lateralibus 3-4 intermedià 4-6 partitis, tubi involucelli densè albopilosi basi tereti foveolis breviori, coronà tubo subduplò longiori 20-24 nervià, calycis limbo longiusculè stipitato setis 5 breviter exsertis.

Hab. in *Cilicià* Kotschy N° 255, *Syrià* Aucher N° 770, in monte *Torbol* propè Tripoli. (Boiss.)

A. *Sc. Palæstinà* distinctissima corollis cæruleis multò magis multifidis involucrum longè superantibus.

Sc. Aleppica Coult. cujus propè *Hierosolymam* pauca legi specimina a duabus præcedentibus differt staturà 2-4 pollicari, coronà 20-26 nervi, foliis vel indivisis longè linearibus vel præsertim intermediis tripartitis laciniis longè linearibus, ejus corollæ ut in *Sc. Palæstinà* radiantes sunt.

SCABIOSA PERSICA Boiss. (Sect. *Asterocephalus* Coult.)

Sc. annua tota tenuissimè et densè puberula canescens, caule erecto tenui filiformi ramoso, ramis pedunculisque tenuibus longissimis erectis, foliis omnibus pinnatipartitis, radicalium laciniis abbreviatis oblongo-linearibus lobulatis æquilongis, superiorum linearibus integris intermedià longiori, involucri adpressè hirti phyllis elliptico-linearibus acutis flores externos non æquantibus, corollis e sicco carneis exterioribus modicè radiantibus laciniis ad medium trifidis, involucelli tubi pilis albis densè hirsuti basi tereti foveolis breviori, coronà tubo longiori 24-26 nervi, calycis limbo breviter stipitato setis e coronà longè exsertis.

Hab. in Persià australi ad ruinas *Persepolis* Kotschy N° 844, Persià boreali in monte *Elbrus* propè *Derwend* Kotschy N° 247, in provincià Taltusch C. A. Meyer sub *Sc. rotatà* MB.

Planta facie *Sc. Uckranicam* referens a binis præcedentibus distincta indumento, caulibus tenuioribus, foliis omnibus pinnatipartitis, capitulis parvis. *Sc. rotatà* MB. e descriptione et specimenibus cl. Hohe-

nacker differt corollis æqualibus, foliis inferioribus indivisis, caulibus tripartitis lobis lanceolatis integerrimis.

SCABIOSA ANATOLICA Boiss. (Sect. *Asterocephalus*.)

Sc. annua densè et brevissimè puberula ad basin foliorum ciliata, caule a basi ramosissimo ramisque albidis valdè patenti-divaricatis, foliis omnibus pinnatipartitis laciniis integerrimis lateralibus 2-3 linearibus intermediâ foliorum inferiorum oblongo-lineari superiorum multò majori lineari, pedunculis longis rigidis, involucri basi hirsuti phyllis virescentibus scabridis lanceolatis acutis flores marginis superantibus fructiferis reflexis, corollis cæruleis marginalibus breviter radiantibus laciniis ad medium usquè in lobos 2-3 oblongo-lineares fassis, capitulis fructiferis hemisphæricis, involucri tubi densè albopilosi basi tereti foveolis subæquilongâ, coronâ tubo paulò longiori 32-36 nerviâ, calycis limbo stipitato setis 5 e coronâ breviter exsertis.

Hab. in Carizæ et Lydiæ montanis, in monte Mesogi propè pagum *Derwent* et in planitie *ybiensi* (Boiss.) ad agrorum margines ad *Bouldour* Pisidiæ. (Heldr.)

A nobis diù formis *Sc. Palæstinæ* adnumerata a quâ ut et a *Sc. calocephalâ* differt foliis omnibus pinnatipartitis, ramis valdè divaricatis patentibus, involucri phyllis corollas marginis vix radiantes superantibus. *Sc. rotata* et *Sc. Persica* ramis erectis tenuibus, capitulis dimidiò minoribus longiùs differunt.

Sc. Aucheri Boiss. quam quoque in collibus ad *Damascum* legi variat limbo calycis sessili vel breviter stipitato sed a *Sc. Palæstinâ* et *Aleppicâ* capitulis subradicalibus, corollis æqualibus, foliis indivisis egregiè dignoscitur.

COMPOSITÆ.

TR. CYNARÆÆ.

CALENDULA CARIENSIS Boiss.

C. annua? minute glandulosa cæterum glabrescens, caulibus elatis strictè ramosis acutè striatis, foliis oblongo-lanceolatis obtusis mucro-

malatis basi subattenuatâ rotundatâ breviter decurrentibus, rameis angustè linearibus setaceo-acuminatis, capitulis magnis, involucri brevissimè puberuli phyllis angustissimè elliptico-lanceolatis acuminatis, ligulis pallidè citrinis involucri 2 $\frac{1}{2}$ plò longioribus, disco concolori; acheniis omnibus cymbiformiter curvatis exterioribus membranâ tenerâ integrâ planâ semine latiori utrinquè marginatis dorso tuberculatis intus carinatis apice in cornu non productis, interioribus cylindricis semicircularibus dorso tuberculatis intus lævibus.

Hab. in *Carid* (Pinard).

Magnitudine capitulorum et habitu affinis *C. officinali* quæ a nostra specie differt membranâ acheniorum marginalium durâ intus revolutâ, acheniis interioribus crassioribus non semicirculariter sed arctissimè involutis latere interiori sulcatis nec teretibus.

CALENDULA LUSITANICA Boiss.

C. perennis? supernè parcè glanduloso-viscidula cæterum glabra, ramis abbreviatis foliosis parcè ramosis, foliis ovatis rotundatis obtusissimis integris vel denticulis punctiformibus parcè obsitis inferioribus in petiolum brevem basi contractis superioribus sessilibus auriculato-amplexicaulibus, capitulis magnis, involucri breviter papilloso phyllis lanceolatis acutis, ligulis citrinis involucri plùs duplò longioribus, disco concolori, acheniis...

Hab. in petrosis propè *Cintra* Lusitariæ ubi legit cl. et am. Guthnick.

Foliis rotundatis obtusissimis ab omnibus speciebus mihi notis distincta sed quoad radicis indolem et achenia adhuc ignota et rursus observanda.

CALENDULA PALÆSTINA Boiss.

C. annua scabrido-viscidula a basi ramosissima ramis erectis, foliis lanceolatis vel oblongo-lanceolatis acutis margine obsolete undulatis inferioribus basi subattenuatis cæteris basi subauriculatis sæpè brevissimè decurrentibus, capitulis minutis, ligulis sulphureis involucri papilloso viscidulo duplò longioribus, acheniis marginalibus dorso spinulosis membranâ rectâ profundè cristato-dentatâ utrinquè marginatis ovatis rostro recto eis duplò longiori superatis, intermediis cymbiformibus inflatis subrotundis dorso parcè spinulosis intus carinâ alaeformi

auctis, intimis annularibus dorso subbiseriater spinulosis cæteram lævibus.

Hab. in declivibus inter *Jerusalem et Jericho*, in monte *Carmelo*.
Legi vere 1846.

Caules $1\frac{1}{2}$ –2 pedales, capitula ea *C. arvensis* vix æquantia, achenia marginalia 6–8 cum rostro 10–11 lin. longa, interiora omnia plus minus membranacea. Affinis *C. stellata* Cav. quæ differt capitulis duplò majoribus, acheniis exterioribus cymbiformibus, intermediis lanceolatis dentatis etc. *C. sancta* L. cui ex patriâ meam plantam primùm tribueram e descriptione seminibus obovatis urceolatis lævibus aliena est. *C. asterias* F. et M. differt acheniis exterioribus 4–1 $1\frac{1}{2}$ pollicaribus gracilibus subulatis non alatis interioribus latissimè membranaceis dorso sublævibus.

ECHINOPS SYRIACUS Boiss.

E. caule sulcato simplici 4 rariùs 2–3 cephalo folioso densè glanduloso setuloso, foliis suprâ densè et breviter glanduloso-stipitatis subtus ad nervos glandulosis inter eos adpressè canis lanceolatis pinnatipartitis laciniis lanceolatis plus minus lobatis lobisque in spinas elongatas flavidas attenuatis, superioribus sensim diminutis, capitulis magnis, setis albis basilaribus involucrum dimidiam æquantibus, squamis ab inferioribus ad intimas sensim elongatis infimis apice parcè viscidulis spathulato-deltaideis breviter acuminatis denticulatis, intimis ad medium usquè concretis inæqualibus aliis margine serrulatis subulatis aliis apice fimbriatis, pappi setis in cupulam usquè ad apicem concretis.

Hab. in Syriâ ad rupes suprâ pagum *Darkusch* propè *Orontem* fluvium situm.

Planta 2–3 pedalis, folia utrinquè ad nervos viscida inter nervos subtus cana. Hæc indumenti naturâ refert *E. viscosum* et *E. Creticum* (infra descriptum), ab eis cæteris neglectis pappi setis ad apicem usquè concretis statim distinguitur.

ECHINOPS HELDREICHII Boiss. in pl. Anat. exs. 1846.

E. caule humili adpressè canescenti eglanduloso 4–3 cephalo, foliis lanceolatis radicalibus numerosis petiolo brevi basi in vaginam densè et longè spinoso-pectinatam dilatato suffultis, caulinis brevioribus basi auriculatis omnibus suprâ parcè araneosis glandulosisque virentibus

subtùs densè araneoso-canis pinnatipartitis, rachide alata, partitionibus lanceolatis foliorum inferiorum inter se remotis lobatis flavido-spinosis, capitulis magnis albidis pedunculo non glanduloso suffultis, setis involucrum dimidium subæquantibus, squamis glabris exterioribus setas non superantibus apice spathulato-subdeltoideis breviter pectinatis carinatis in spinulam abeuntibus, intimis liberis sensim acuminatis teneris a basi fimbriatis fimbriis strictis, pappi setis ferè ad medium usquè connatis.

Hab. in aridis submontosis *Lycaoniae* inter *Beychehr* et *Koniah*. Fl. Aug. (Heldr.)

Foliorum formà et habitu *E. Persico* mihi affine videtur sed hic habet partitiones foliorum longiores profundius lobatas, setas involucro triplò breviores, squamas exteriores longè pectinato-ciliatas etc.

ECHINOPS MACROCHÆTUS Boiss.

E. caule sulcato rubello breviter rubro-setoso prætereaque glanduloso-hirto parè ramoso, foliis indumento setuloso-crispo glandulifero densè hirtis viscidis utrinquè sordidè griseis bipinnatipartitis laciniis tenuissimis lineari-subulatis ad costas spinasque flavidas tenues ferè reductis, capitulo solitario magno, setis involucri squamas intimas superantibus, squamis exterioribus setas non æquantibus apice deltoideo-spathulatis breviter pectinato-ciliatis abruptè acuminatis apice viscidulis, intermediis omnium florum vel superiorum in cornua valida canaliculata alba capitulo duplò longiora abeuntibus, squamis intimis liberis linearibus obtusiusculis apice fimbriatim fissis, pappi setis...

Hab. in declivibus calidis Judææ inter *San. Saba* et mare *Mortuum*.

Foliis tenuiter laciniatis cauleque glanduloso-setoso affinis *E. adenocaulo* a quo egregiè differt foliis glanduloso-hirtis, squamis exterioribus abruptè nec attenuatim cuspidatis ciliatis nec denticulatis, intimis obtusis liberis.

ECHINOPS POLY CERAS Boiss.

E. caule tenui teretiusculo araneoso-cano eglanduloso internè folioso supernè 4 rariùs 2 cephalo, foliis suprà collum congestis utrinquè canis lanceolatis subbipinnatipartitis myriacanthis laciniis angustè lanceolato-subulatis ad spinas flavidas tenues ferè reductis confertis a folio medio ad hujus basin decrescentibus; foliis caulinis superioribus

parvis ad spinam infernè pinnatam reductis, capitalis mediocribus, setis paucis involucro multò brevioribus, squamis externis setas superantibus apice subspathulatis longiusculè acuminatis ciliatulis, intermediis florum ferè omnium in cornua canaliculata subulata numerosissima floribus triplo longiora productis, interioribus liberis integerrimis e basi lanceolatà aceroso-subulatis, pappi setis...

Hab. in Syrià circà *Damascum* et *Tiberiadem* copiosè. (Boiss.)

Sesquipedalis, folia brevìa 3-4 pollicaria in parte inferiori plantæ conferta partitionibus confertis, capitula spinis numerosissimis albis horrida. Hæc species quam juniorem tantum vidi ab omnibus foliis tenuiter dissectis donatis et hic descriptis differt squamis intimis apice subulatis integerrimis nec fimbriato-laceris.

ECHINOPS HUSSONI Boiss.

E. caule sulcato simplici glabriusculo remotiusculè folioso monocephalo, foliis teneris lanceolatis basi attenuatis suprà glabrescentibus subtus araneoso-canescens subintegris vel obsoletè et irregulariter repando-lobatis acuminatis acumine lobisque brevibus in spinas flavidas tenues plus minus elongatas abeuntibus inferioribus basi auriculatis superioribus parvis ovato-triangularibus, capitalis majusculis albidovirentibus pedunculo parçè et minutè glanduloso suffultis, involucri setis paucis involucro dimidiò brevioribus, squamis exterioribus setas paulò superantibus apice nigricantibus spathulato-deltoides in spinulam abeuntibus scabridis margine brevissimè pectinatis, intermediarum alterà sæpè in cornu canaliculatum flores æquans attenuatà, intimis ultrà $3\frac{1}{4}$ longitudinis concretis apice obtusiusculis breviter fissis, pappi setis ad basin ferè usquè liberis.

Hab. in desertis *Arabicis* *Ægypti* superioris undè clar. prof. Husson semina retulit et plantam a me visam in horto Kahirino coluit.

Planta 3-4 pedalis, folia inferiora sæpè 6-8 pollices longa sesquipollicem lata subintegra, superiora breviter lobata, flosculi albi. Species ob folia herbacea minimè rigida vix lobata insignis et distinctissima.

ECHINOPS CANDIDUS Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846.

E. caule densè folioso simplici monocephalo adpressè cano eglanduloso, foliis sessilibus auriculato-amplexicaudibus oblongo-lanceolatis

utrinque suprà pallidius subtùs intensius densè araneoso-canis pinnatilobatis facie inferiori prominulè nervosis, lobis triangularibus in spinas 4-2 flavidas eis paulò breviores abeuntibus, capitulis albidis breviter pedunculatis, involucri setis involucri triplo brevioribus, squamis exterioribus setas æquantibus a basi tenui glaberrimâ sensim dilatatis apice spathulatis muticis vel spinusolis parcè lanatis, intermediarum unâ alterâve in spinam subulatam interioribus longiorem flosculos æquantem sæpè attenuatâ, intimis ultrâ medium concretis linearibus acutis glaberrimis, pappi setis ferè ad basin usquè liberis fimbriatis.

Hab. in monte *Elbrus* propè *Derbend* Kotsch. N° 419.

Folia inferiora 3-4 poll. longa sesquipollicem lata ad medium usquè lobata, capitula mediocria, flosculi albi. Pulchra species indumento cano foliorum et foliis tantum lobatis *E. albidum* referens a quo florum characteribus differt.

ECHINOPS CRETICUS Boiss. et Heldr.

E. caule sulcato a basi ramoso totâ longitudine folioso parcè et brevissimè setuloso viscido, foliis suprà glabris setuloso-viscidis subtùs ad nervos viscidis cæterum adpressè canis lanceolatis pinnatipartitis, rachide latâ, partitionibus lanceolatis profundè pinnatilobatis lobis in spinas breves abeuntibus, capitulis magnis, setis involucri triplo brevioribus, squamis glabris ab inferioribus ad intimas sensim elongatis externis spathulato-deltaideis acuminatis denticulatis intimis ad medium usquè concretis inæqualibus lanceolato-subulatis vel apice fimbriatis, setis pappi a basi liberis.

Hab. in saxosis maritimis Cretæ ad *Mavromolo* propè *Kissamos* Heldr. pl. exs.

E. viscosus. pl. Cret. exs. 1847 non DC.

Planta foliis suprà glabrescentibus viscidis subtùs ad nervos glabrescentibus viscidis inter eos canis insignis, setis involucri squalidis, involucri 12-14 lin. longo, flosculis albidis. Eam primùm pro *E. viscoso* habueram sed hic pro cuius typo plantam siculam a cl. DC. descriptam habeo differt capitulis spinis elongatis interspersis intimis liberis, pappi setis concretis. Planta *Urvillæana* cuius specim. pessimum in herb. Cand. exstat ab utrâque diversa videtur.

ECHINOPS ECHINOPHORUS Boiss.

E. caule infernè glabrescenti supernè cano valdè sulcato densè fo-

lioso simplici monocephalo, foliis bipinnatipartitis laciniis arcuè convolutis subulatis longissimis spinosis supra glabris subtus angustissimè canis inferioribus petiolo tereti suffultis superioribus sessilibus capitulum subsessile magnum æquantibus superantibusve, setis dimidium involucrum æquantibus fasciculatis, squamis exterioribus setas æquantibus apice spathulatis margine lanatulis cæterum glabris extimis muticis cæteris deltoideis acutiusculis, intermediis subulatis florum superiorum sæpè in spinas tenues floribus duplò longiores inferiorum flores æquantes productis, intimis ad $\frac{2}{3}$ longitudinis inter se coalitis apice linearibus acutiusculis fissis, pappi setis ab basin usquè liberis.

Hab. in *Syriâ* ubi legi loco non notato.

Species insignis rachide laciniisque foliorum angustè linearibus 4 $\frac{1}{2}$ –4 pollicem sæpè 2 pollices longis lineam circ. latis, involucrum florum inferiorum sæpè 12–14 lin. longum, spinæ florum superiorum 2–2 $\frac{1}{2}$ pollicares tenues subflexuosæ. Angustie et longitudine laciniarum foliorum distincta.

ECHINOPS ADENOCALLOS Boiss.

E. caule sulcato rubro simplici glandulis atrorubris aliis sessilibus aliis setulis aculeiformibus insidentibus densè exasperato, foliis bipinnatipartitis supra virescentibus breviter glanduloso-scabridis subtus araneoso-canis partitionibus remotis angustissimè lanceolato-linearibus ad costam ferè reductis in spinas luteas tenues breves abeuntibus, foliis summis minutis sub capitulo ad spinam ramosam reductis, setis copiosis involucrum dimidium æquantibus, squamis setas æquantibus glabris apice spathulatis margine brevissimè denticulatis etiam inferioribus longè attenuato-subulatis, intermediis subulatis in cornua flores æquantia vel superantia sæpè productis, interioribus ad $\frac{2}{3}$ longit. concretis parte liberà denticulato-serratis apice inæqualibus subulatis vel obtusiusculis fimbriatis, pappi setis ad medium usquè coalitis.

Hab. in *Galilæa* et Samariâ circà *Naplouse* copiosè. (Boiss.)

Folia inferiora cum petiolo ferè pedalia 3–4 poll. longa, lacinix 7–10 lin. longæ basi 4–4 $\frac{1}{2}$ latæ, involucrum magnum ferè sesquipollicare. A sp. præcedenti distinctus laciniis foliorum non convolutis, caule superne glanduloso-echinato, squamarum formâ, etc...

ECHINOPS LASIOCLINIUS Boiss.

E. caule simplici vix sulcato adpressè canescenti setulis rubellis tuberculis paucissimis consperso eglanduloso, foliis suprà parcè araneosis griseis subtùs adpressè canis lanceolatis bipinnatipartitis partitionibus laciniisque lanceolatis in spinas flavidas abeuntibus, capitulis magnis, receptaculo setis albis persistentibus eis flosculorum similibus præter apicem nudum densè piloso, setis involucrum dimidium æquantibus, involucri squamis exterioribus setis æquilongis apice spathulato-deltoides abruptè acuminatis margine ciliatulis, intermediis saltem florum superiorum in cornua canaliculata flosculis 2-2 $1\frac{1}{2}$ plò longiora productis, int̄mis medià parte concretis basi et supernè liberis inæqualibus aliis subulatis aliis obtusiusculis omnibus serrulato-fimbriatis, pappi setis a basi liberis.

Hab. in *Coesyrià* circà *Balbeck*. Legi. Jul. 1846.

Ab. *E. adenocaulo* cui affinis est formà foliorum, differt squamis exterioribus abruptè nec attenuatim acuminatis, ciliatulis nec denticulatis, setis pappi liberis. Ab eo ut et ab omnibus affinibus receptaculo non omninò nudo sed setis albis præter apicem nudum densè hirsuto præterea differt.

CIRSIUM HYGROPHILUM Boiss. (Sect. *Onotrophe*.)

C. totum papillis crispulis sparsis obsitum vel glabrescens virens, caule sulcato folioso supernè parcè et laxè corymboso-paniculato, foliis oblongo-lanceolatis lævibus irregulariter et parùm profundè lobatis longè crebrè et tenuiter flavescenti-spinosis basi in alas spinosas angustas decurrentibus superioribus diminutis pinnatipartitis spinosissimis capitula plùs minusve involucrentibus eisque brevioribus, involucri hemisphærici glabrescentis squamis ab exterioribus in spinulam flavam eis breviorè adpressam vel apice subpatulam abeuntibus ad superiores violaceas in acumen inermem abeuntes sensim elongatis, floribus purpureis, filamentis valdè papillosis.

Hab. in humidis montis *Totschal* propè *Teheran* Kotschy N° 694 (forma squamis paulò longioribus apice subpatulis), in monte *Elbrus* propè *Passgala* Kotschy N° 642 (forma squamis adpressiusculis).

Folia eis *C. uliginosi* angustiora multòque longius validius copiosiusque spinosa, capitula illius saltem duplò majora. Affine quoque *C. Kotschyano* quod differt foliis brevius spinosis, caule simplici con-

gestè corymboso, capitulis subsessilibus minoribus, squamis viridibus interioribus longius et tenuius cuspidatis, floribus albis, etc.

CIRSIUM LYCAONICUM Boiss. et Heldr. (Sect. *Onotrophe*.)

C. glabriusculum, caule elato sukato supernè densè folioso apice plùs minùs laxè corymboso-paniculato ; foliis glabris viridibus lanceolatis in alas spinulosas angustas foliaceas continuas secùs totum caulem decurrentibus pinnatilobatis lobis 2-3 fidis laciniis in spinas tenues flavidas longas abeuntibus, foliis summis secùs pedunculos angustis pinnatipartitis valdè spinosis, capitulis mediocribus, involucri globosi squamis viscidulis apice parcissimè lanatulis inferioribus oblongo-lanceolatis nigricantibus spinulà adpressà brevi abruptè terminatis, interioribus lanceolatis acuminatis inermibus, floribus pallidè roseis, filamentis valdè papillosis.

C. uliginosum pl. Heldr. Anat. exs. 1846 var.

Hab. inter lapides deciduos in locis irriguis regionis superioris montis *Anemas* Lycaoniæ alt. 6000'. Fl. Aug. (Heldreich.)

Planta 2-3 pedalis supernè densè foliosa, folia horizontalia 4-5 poll. longa sesquipollicem lata, capitula 10-12 pedunculis plùs minùs abbreviatis foliolosis suffulta magn. eorum *C. arvensis* vel *uliginosi*; huic ultimæ speciei valdè affine differt foliis densis angustioribus profundius lobatis longiusque spinosis superioribus longè decurrentibus quod in *C. uliginoso* non occurrit, involucri minùs abbreviati squamis glutinosis apice non patulis. Planta Kurdistanica Kotschy N° 421 ad nostram speciem probabiliter referenda est.

CARDUUS ESDRAELONICUS Boiss.

C. caule elato puberulo alato folioso supernè strictè ramoso, foliis suprà parcè subtùs copiosè araneosis canis teneris lanceolatis pinnatipartitis in alas angustas sæpè interruptas lobulato-dentatas crebrè spinulosas per totum caulem decurrentibus, lobis irregularibus triangularibus lobulatis breviter spinosis, pedunculis canis strictis foliorum superiorum decurrentià spinulosis 4 rariùs 2-3 floris corymbum laxum oligocephalum formantibus, involucri squamis viridibus sub lente breviter et adpressè setulosis parcè pilosulis e basi enervi subdilatatà lineari-lanceolatis trinerviis longis adpressis ab exterioribus ad intimas sensim elongatis omnibus spinulà brevi terminatis, receptaculi setis palea-

ceis plùs minùs dilatatis sæpè apice 2-3 fdis, flosculis purpureis involucrum non superantibus, acheniis viscidis lineolatis.

Hab. in humidis planitie *Esdraelon* et *Galilææ* superioris ad *Bahr el Houleh*. Legi Apr. 1846.

Planta bipedalis recta, folia indumento et naturâ ea *C. argentati* referentia sed spinosiora longèque decurrentia, capitula duplò majora, pedunculi striati alati nec ut in *C. argentato* patulo-incurvi nudi longissimi, squamæ involucri longiores, flosculi involucrum vix æquantes nec ut in eò multò longiores; juxta hanc speciem cæterum collocandus.

ONOPORDON BRACTEATUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.

O. totum adpressè araneosum niveum, caule crasso elato supernè polycephalo, foliis oblongo-lanceolatis breviter lobatis lobis lanceolatis subindivisis in spinas flavas validas abeuntibus, foliis supremis angustè lanceolato-linearibus ad capitulorum basin pluribus involucrantibus squamas sæpè æquantibus, alis caulibus et ramorum numerosis continuis niveis creberrimè lobulatis tenuiterque flavo-spinosissimis, capitulis magnis basi subtruncatis, involucri glabri squamis infernè latissimis planis longè attenuatis subulatis validis patulo-reflexis flores æquantibus ab exterioribus ad intimas rectas sensim elongatis, floribus roseis.

Hab. in saxosis propè *Aglansoun* ad radices montis *Boudroun* Pisiæ Fl. Aug. (Heldreich.)

Species insignis indumento denso adpressissimo niveo, ramis et caule tenuiter myriacanthis, capitulis basi foliis involucratibus illa *O. Illyrici* magnitudine et squamarum latitudine referentibus sed squamis multò longioribus et magis reflexis.

ONOPORDON ARGOLICUM Boiss.

O. totum glabrescens virens ad caules et partes superiores viscidohirtum, caule ramoso, foliis teneris subtus reticulatis rugosis lanceolatis pinpatipartitis segmentis oblongis lobatis subretrorsis lobis triangularibus in spinas tenues breves abeuntibus, alis caulibus et ramorum interruptis breviter subpalmatis spinosis, capitulis rotundis, involucro inter partem inferiorem squamarum valdè araneoso, squamis viscidulis virentibus angustè lanceolato-subulatis subæquilongis omnibus squaroso-patentibus.

Hab. in ruderatis propè *Naupliam* ad radices rupis cui arx *Palamedis* insidet latere meridionali. Legi Aprili capitulis nondum explicatis.

Virescentiâ et indumento glanduloso-viscido *O. virenti* et *O. elato* appropinquandum ab utroque distinctum foliis minùs rigidis profundius divisis, involuero laxè araneoso nec denudato, squamis angustioribus multò longius subulatis quarum intermediæ etiam in alabastro sesquipollicares sunt.

ONOPORDON CARDUIFORME Boiss.

O. totum araneoso-canum, caule humili infernè ramoso supernè 4-3 cephalo pedunculisque angustissimè alatis spinulosissimis, foliis lanceolatis tenuissimè bipinnatisectis in alas angustissimas spinosissimas decurrentibus laciniis subulatis in spinas numerosas tenues breves flavidas abeuntibus, capitulis mediocribus, involucri infernè valdè albo-lanati squamis lanceolatis planis apice attenuato-subulatis parùm inæqualibus intimis erectis cæteris patulo-deflexis, floribus purpureis.

Hab. in Palæstinâ circâ *Gazam*. (Boiss.)

Pedalis, folia 4-5 pollicaria pollicem lata tenuissimè dissecta quâ notâ ab omnibus mihi notis differt, spinæ caulis foliorumque numerosissimæ tenues 4 1/2-3 lin. tantum longæ, capitula eis *O. acanthii* paulò minora squamis latioribus brevioribusque intermediis vix 9-40 lin. longis.

ONOPORDON FLOCCOSUM Boiss.

O. totum lanâ floccosâ densâ non adpressâ facilè secedenti araneo-sum, caule ramoso pleiocephalo, foliis lanceolatis ad costam ferè usque partitis subtùs reticulato-nervosis segmentis rotundatis circumcîrca radiatim lobatis in spinas flavas validas abeuntibus, alis caulis et ramorum angustis interruptis ad spinas flavas longiusculas ferè reductis, capitulis mediocribus, involucri infernè valdè lanati squamis a basi latiori planâ lanceolatis canaliculatis validis acerosis subtriquetris longis erecto-patulis ab infimis brevibus ad intimas longiores sensim elongatis flores roseos æquantibus.

Hab. in aridis propè *Eden Libani*, legi Jul. 1846.

Caulis 2-3 pedalis 3-6 cephalus, squamæ pollicares basi eis. *On. Illyrici* æquilatæ sed multò longiores validioresque. subtriquetræ *O. ma-*

cracanthum Fl. Græc. tab. 832 a plantâ cl. Schousboë toto cælo diversum nostram speciem formâ squamarum refert sed differre videtur tomento denso omnium partium.

ONOPORDON ANISACANTHUM Boiss.

O. totum densè et adpressè niveo-araneosum, caule simplici vel parcè ramoso, foliis lanceolatis breviter lobatis margine spinulosis lobis brevibus in spinas flavas tenues eis æquilongas abeuntibus, foliis supremis lineari-subulatis strictis subintegrâ, alis caulis et ramorum continuis angustis subintegrâ spinulosis, capitulis latis depressis basi subtruncatis, involucri infernè nivei squamis parte superiori glabrescentibus infimis adpressiusculis brevibus tenuissimè apice subulatis, intermediis e basi latâ recurvis longissimis supernè angustè lanceolato-linearibus planiusculis acerosis, intimis subulatis rectis flosculos dimidios tantum æquantibus.

Hab. in *Cœlesyriâ* circâ *Balbek* ubi in areâ templorum et etiam in parte interiori templi minoris specimina mea legi.

Planta 2-3 pedalis, folia 4-5 poll. longa sesquipollicem lata, capitula formâ et magnitudine similia eis *O. heteracanthi* C. A. Meyer quod habet quoque squamas intermedias elongatas sed egregiè differt indumento multò minùs cano, squamis externis latis breviter lanceolatis intermediis sesquialtoribus. *O. ambiguum* differt capitulis minoribus ovatis, squamis infimis crassioribus deflexis. *O. Græcum* deniquè distinguitur eisdem notis squamarumque spinis tenuioribus vix inæqualibus. Squamæ intermedie *O. anisacanthi* ferè bipollicares, exteriores 5-6 lineas longæ, intimæ pollicares.

ONOPORDON ALEXANDRINUM Boiss.

O. parcè griseo-araneosum vel glabrescens, caule ramosissimo, foliis lanceolatis pinnatipartitis segmentis rotundatis plicatis lobatis circâ folii rachidem subverticillatis remotiusculis subbullato-rugosis lobis brevibus in spinas flavidas breves abeuntibus, alis ramorum angustis patulè et flavidè spinosissimis, capitulis parvis subrotundis, involucri parcè grisei araneosi squamis a basi latiori angustè lanceolatis subulato-acuminatis præter intimas rectas patentî-recurvis intermediis intimas et superiores superantibus, floribus roseis.

Hab. circâ *Alexandriam* *Ægypti*, legit Maio cl. Cadet de Fontenay.

Plantæ elatæ ramum tricephalum cum folio tantum vidi. Magnit. capitulorum, squamarum formâ et proportionem *O. Græcum* vel potius *O. ambiguum* refert sed ab eis et aliis speciebus generis differt præter glabritiem et ramos creberrimè spinosos foliis quorum segmenta vix cum spinis pollicem longa horizontaliter et s: bverticillatim rachidi folii insident, parenchymateque subbullato.

CYNARA SIBTHORPIANA Boiss. et Heldr.

C. humilis, foliis ferè omnibus radicalibus petiolo brevi spinuloso brevissimè papilloso-hirto suffultis suprâ glabris subtus adpressè canis ambitu latè oblongis pinnatipartitis segmentis oblongo-elongatis basi discretis vel confluentibus ad medium usquè lobatis lobis triangularibus brevibus in spinas breves fuscæscentes numerosas abeuntibus; caule 2-3 folia minuta gerenti monocephalo foliis radicalibus breviori, involucri squamis latis glabris exterioribus triangularibus brevibus planis breviter apice spinosis, cæteris sensim elongatis, superioribus basi dilatatis in appendicem crassam canaliculatam subulatam longam acerosissimam abeuntibus, intimis brevioribus linearibus inermibus, « flosculis albis, setis achenio quintuplò longioribus. » (Sibth.)

Hab. in *Peloponneso* et *Cretâ* (Sibth.), in saxosis maritimis *Cretæ* propè *Piskokephali* Eparchiæ Sitia. Heldr. legit. Apr. nondum floriferam.

C. humilis Fl. Græc. tab. 835 non L.

Folia radicalia cum petiolo 9-10 poll. longa 3 poll. lata, segmenta utrinquè 9-10 a folio medio sursum deorsumque longitudine decrescentia, caulis in meo specimine 5 pollicaris, capitulum eo *C. cardunculi* vix minus, squamæ superiores ferè bipollicares rigidissimæ. Pulchra species propè *C. Tournefortii* collocanda, a *C. humili* ut jam cl. Lindley in *Florâ Græcâ* notaverat toto cælo diversa.

CYNARA SYRIACA Boiss.

C. foliis radicalibus amplis ambitu ovatis petiolo canaliculato margine remotè spinoso suffultis pinnatisectis, segmentis utrinquè 5-6 lanceolatis elongatis acuminatis suprâ glabrescentibus subtus canescentibus reticulato-nervosis lobatis lobis triangularibus spinâ brevi flavescente terminatis, caulibus elatis crassis striatis araneoso-canis apice corymbosis congestim 3-7 cephalis, foliis caulinis tenuius laciniatis

superioribus linearibus pinnatilobatis lobis indivisis crebrè aurantiaco-spinosis, involucro ovato a basi latiori truncatâ attenuato apice sub-constricto, squamis glabris rubellis arcte imbricatis ad infimis ad superiores sensim elongatis ovatis vel oblongis planis apice appendice reflexâ basi obcordatâ in spinam attenuatâ eis æquilongâ vel breviori auctis, superioribus erectiusculis, intimis paucis angustè linearibus inermibus, floribus violaceis.

Hab. in pinguibus Syriæ littoralis propè *Tartous* ubi gregariè crescit et floriferam ineunte Julio 1846 legi.

Folia radicalia cum petiolo 1-1 $\frac{1}{2}$ pedalia segmentis a medio folio sursum deorsumque abbreviatis majoribus 4-6 poll. longis poll. latis, foliorum caulinarum segmenta valdè angustata 4-6 lin. lata, folia suprema angustissima, capitula 2 pollices et ampliùs longa basi sesquipollicem lata, flosculi numerosissimi involucrum valdè superantes. Pulcherrima species insignis involucris squamis appendice brevi eximie reflexâ basi 4 lin. circ. latâ cum spinâ 5-6 lin. longâ terminatis.

CARLINA LIBANOTICA Boiss. (Sect. *Mitina*.)

C. parcè lanata florifera glabrescens, caule humili supernè divaricatum 1-3 cephalo, pedunculis brevibus apice incrassatis, foliis rigidissimis reticulato-nervosis sessilibus amplexicaulibus lanceolatis canaliculato-plicatis pinnatilobatis inter spinas margine denticulatis lobis angustis flavido-spinosis, capitulis magnis, involucris squamis exterioribus suprâ basin ovatam duram enervem contractis dein dilatatis in appendicem foliaceam glabram oblongo-lanceolatam patulo-incurvam longè acuminatam marginibus et apice spinosam squamis intimis duplò longiorem foliis similem, squamis intermediis suprâ basin gibbam lineari-subulatis lanâ albâ araneosâ densâ conjunctis brevibus, intimis longioribus sulphureis linearibus acutis integerrimis radiantibus.

Hab. in regione intermediâ Libani circâ *Deir el Kammar*, *Abeih* et in *Cœlesyriâ*; floret Augusto omnibus aliis Cynareis seriùs. Legi fine Julii 1846 floribus nondum explicatis.

Planta 6-8 pollicaris, folia inferiora jam exsiccata non vidi, caulina 2-2 $\frac{1}{2}$ poll. longa pollicem lata. Capitula majora eis *C. involucratae* quæ in eadem regione crescit et nostræ affinis ab eâ differt squamis externis involucris angustioribus longioribusque a basi linearibus recurvo-patulis, intermediis glaberrimis linearibus mucronatis, pedun-

culis longioribus minùs incrassatis. *C. macrocephala* Moris involucri squamis interioribus purpureis, etc. longius distat.

ATRACTYLIS PROLIFERA Boiss. (Sect. *Spadactis* Cass.)

A. annua tota adpressè araneoso-canescens a collo radiatim ramosa capitulumque centrale sessile edens, ramis prostratis tenuibus simplicibus dichotomisque, capitulis terminalibus aliisque in dichotomiis breviter pedunculatis, foliis radicalibus rameisque angustè linearibus vix rigidis minutè denticulato-spinulosis plicatis basi attenuatis acutis supremis capitula involucrentibus eaque superantibus, involucre duplici floribus adpresso, involucri exterioris squamis paucis rigidulis lineari-subulatis pinnatifido-spinulosis involucri interioris subæquantibus, involucri interioris phyllis parcè et adpressè araneosis teneris planis mucrone setaceo inermi nigricanti terminatis ab inferioribus ovatis ad intimas lanceolato-lineares sensim elongatis, floribus exterioribus valdè radiantibus purpureis oblongis truncatis quinquedentatis, antherarum appendicibus acutis caudis plumosis, acheniis molliter et densissimè sericeis, pappo a basi plumoso niveo uniseriali basi villis aucto radii pauciseto.

Hab. in arenosis ad meridiem urbis *Gaza* in regione *Amalecitarum* Arabiæ finitimâ. Legi Aprili 1846.

Pulchra species ramis 3-5 poll. longis humi expansis, foliis 4-4 1/2 poll. longis 4-4 1/2 lineas latis, capitula eis *A. cancellata* vix majora, involucri exterioris phylla eis hujus similia sed pauciora brevius spinulosa, ligulæ radii 4 lineas circ. longæ sesquilineam latæ.

SERRATULA LATIFOLIA Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Klasea*.)

S. glaberrima, radice repenti, caule elato tereti albido simplici vel parcè ramoso ramis longis strictis monocephalis, foliis coriaceis lucidis pallidè virentibus costâ mediâ validâ albâ percursis prætereaque reticulato-nervosis integris inferioribus ovatis petiolo crasso brevi canaliculato basi membranaceo-marginato amplexicauli suffultis, intermediis sessilibus oblongis acutiusculis basi auriculatis auriculis acutis breviter decurrentibus summis rameisque linearibus strictis, capitulis longè pedunculatis, involucri oblongo-cylindrici apice subconstricti nitidi glaberrimi squamis arcuè adpressis inermibus subnerviis vix striatis co-

riaceis lutescentibus ab infimis ovatis minutè mucronulatis ad superiores ellipticas et lineares sensim auctis, flosculis lutescentibus omnibus æqualibus hermaphroditis involucri tertiâ parte longioribus, pappi setis albis subplumosis basi in anulum concretis facilè secedentibus.

Hab. propè *Gattade* in valle *Talagon* montis *Elbrus* Kotschy N° 548.

Caulis 2-3 pedalis basi crassitie pennæ anserinæ, folia inferiora 4-5 poll. longa 3-4 lata ramea inferiora pollicaria 3 lin. lata, involucri pollicem longum basi 6 lin. latum. Species insignis collocanda propè *S. cichoraceam* et *S. flavescentem*.

LEUZEA SCLEROPHYLLA Boiss. et Heldr. (Sect. *Fornicium*.)

L. glabriuscula caule angulato striato humili flexuoso 2-3 phyllo monocephalo, foliis coriaccissimis ovatis præter costam mediam validam utrinquè elevatim reticulato-nervosis circumcîrca grossè dentatis dentibus margine incrassatis triangularibus obtusissimis inferioribus petiolo brevi plano ancipiti semiamplexicauli suprâ lævi subtus striato suffultis rarè basi duobus segmentis minutis linearibus auctis sublyratis, folio superiori sessili, capitulo magno hemisphærico pedunculo crasso folio supremo breviori suffulto, involucri glabri squamis regulariter et adpressè imbricatis ab inferioribus ovatis oblongisve ad intimas elliptico-lineares sensim elongatis planis parallelè lineatis stramineo-nigricantibus obtusis appendice eximè reflexâ stramineâ angustè lanceolato-subulatâ molliusculâ eis breviori terminatis, achenio oblongo compresso lævi nigricanti angustissimè marginato, setis pappi niveis plumosis liberis achenio duplò longioribus.

Jurinea sclerophylla Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846 (per errorem schedulæ pro *Serratulâ*).

Hab. in collibus siccis propè *Betlam* suprâ *Ermenek* Isauriæ. (Heldr.)

Planta 8-10 pollicaris, folia inferiora circ. $1\frac{1}{2}$ pedem longa 4-5 lin. lata, capitulum magnitudinis ei *Rhapontici cynaroidis* $2\frac{1}{2}$ poll. latum, squamæ intermediæ involucri $2\frac{1}{2}$ lin. latæ appendice $3\frac{1}{2}$ lin. longâ basi semilineam latâ reflexâ terminatæ. Affinis *L. serratuloidi* F. et M. quæ foliis longis lyratis crenulatis minùs coriaceis aliisque notis longè differt. Ob pappum distinctè plumosum hæc planta meliùs in *Leuzea* sect. *Fornicio* quam in *Rhapontico* vel *Serratulâ* collocanda est, flores e sicco ochroleuci.

JURINEA ERYTHROLEPIS Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. exs. 1846.
(Sect. *Longifoliae*.)

J. basi suffruticosa procumbens, ramis numerosis erectis virgatis densiusculè foliosis simplicibus vel strictè ramulosis angulatis adpressè canescentibus, foliis strictis suprà pallidè virentibus sub lente scrobiculato-punctatis subtùs crispulè et adpressè canescentibus integerrimis margine vix revolutis lineari-lanceolatis inferioribus basi attenuatis obtusis superioribus basi rotundatis acutiusculis, ramealibus angustè linearibus brevibus, capitulis vel solitariis terminalibus vel paucis corymbosis pedunculo proprio eis æquilongo vel longiori suffultis, involucri ovati glabri squamis arcuè adpressis rubellis acutiusculis muticis ab infimis triangularibus ovatisque ad intimas ellipticas sensim auctis, inferioribus præsertim secùs lineam mediam costato-subcarinatis, flosculis roseis involucrio subdimidiò longioribus.

Hab. propè *Chickian* in valle *Talagon* montis *Elbrus* Kotsch. N° 544.

Planta 9-40 pollicaris, folia inferiora 1 1/2-2 poll. longa 2-3 lin. lata, capitula eis *J. stæchadifoliae* paulò crassiora brevioraque basi non attenuata. Ab hac specie et *J. linearifolia* insuper foliis multò latioribus distinguitur. *J. pulchella* affinior formà capitulorum et squamarum differt foliis pinnatipartitis angustissimis aliisque notis.

KENTROPHYLLUM SYRIACUM Boiss. (Sect. *Atraxyle*.)

K. bienne caule parcè crispo-lanato vel glabrescenti ramosissimo corymboso-paniculato, foliis breviter hirtellis et sub lente glanduloso-punctatis inferioribus tenerioribus citò exsiccatis pinnatipartitis laciniis linearibus denticulatis margine et apice tenuiter spinulosis, foliis superioribus duris rigidis nervosis oblongis vel oblongo-lanceolatis canaliculatis subrecurvis utrinquè 2-3 dentato-spinosis in spinam duram flavidam abeuntibus, capitulis minutis breviter pedunculatis, involucri phyllis exterioribus foliis supremis similibus viridibus coriaceis oblongo-lanceolatis subtrinerviis basi utrinquè pinnatim 2-3 spinosis acerosis erecto-patulis flores subæquantibus, interioribus scariosis oblongis lanceolato-linearibusque integerrimis acuminatis subpungentibus flore paulò brevioribus, floribus purpureis, acheniis ovatis tetragonis rugulosis marginalibus calvis interioribus læviusculis papposis, pappi albi paleis ab externis truncatis ad intermedias acutissimas sensim elongatis, serie intimà triplò breviori.

In Syrià inter *Edlip* et *Aleppum*, in siccis *Cælesyriæ* et in collibus propè *Antiochiam* (Boiss.) Jun.

Affine *K. glauco* et *Anatolico* ab utroque differt capitulis minoribus, a priori præterea involucri squamis exterioribus dimidiò angustioribus 3 nec 5 nervis, a posteriori pappi nivei nec rubelli paleis intermediis achenio 2 $4\frac{1}{2}$ plò nec 4 $4\frac{1}{2}$ longioribus acutissimis distinguitur.

KENTROPHYLLUM CRETICUM Boiss. (Sect. *Atraxyle*.)

K. bienne totum lanà sordidà parcè araneosum prætereaque ad folia breviter glanduloso-puberulum, foliis lanceolatis inferioribus pinnatipartitis cæteris canaliculatis recurvis infernè lobato-spinosis margine denticulatis apice aceroso-acuminatis, caule supernè divaricatim ramoso subcorymboso, capitulis pedunculis brevibus suffultis sæpiùs congestis, involucri squamis exterioribus foliaceis e basi breviter ovatà araneoso-lanatà angustè lineari-lanceolatis trinerviis aceroso-acuminatis utrinquè pinnatim 4-6 spinosis patulo-subincurvis flosculos superantibus, interioribus scariosis lanceolatis acuminatis integerrimis floribus vix brevioribus, flosculis purpureis, acheniis omnibus papposis, pappi rubelli paleis ab infimis retusis ad intermedias acutas sensim elongatis, serie intimà triplò breviori.

Hab. in *Cretà* undè retulit cl. Victor Raulin.

K. glauco et *K. Syriaco* nimis affine ab eis sat differre videtur indumento araneoso copiosiori, capitulis paucifloris tenuioribus magis elongatis, involucri squamis exterioribus multò magis attenuatis elongatisque flores superantibus nec eos vix æquantibus suprà basin non constrictis.

KENTROPHYLLUM AUREUM (Sect. *Thamnacantha*.)

K. bienne glaucescens totum flavicans, caule tenui tereti a medio ramoso corymbosè polycephalo ramisque flexuosis albidis, foliis inferioribus citò exsiccatis tenerioribus lanceolatis acutis basi in petiolum attenuatis denticulato-spinulosis superioribus rigidis nervosis canaliculato-plicatis sessilibus e basi latiori rotundato-subcordatà lanceolatis margine pectinato-spinosis valdè pungentibus acuminatis, capitulis terminalibus solitariis pedunculis foliosis suffultis, involucri glabriusculi squamis sub lente minutissimè pruinoso-puberulis exterioribus foliis similibus rigidis angustè lineari-lanceolatis suprà plicatis subtus cari-

natis infernè crebrè longiusculè et tenuiter ad marginem spinulosis longè attenuatis acerosis erecto-patulis flores subsuperantibus, squamis interioribus flosculis paulò brevioribus oblongis lineari-lanceolatisve subscariosis flavidis planis tenuiter multistriatis integerrimis subulato-acuminatis intimis inermibus, flosculis intensè luteis, antherarum filamentis torquato-pilosis, acheniis marginalibus epapposis læviusculis interioribus tetragonis supernè parcè rugulosis cæterum lævibus pappo violaceo non deciduo multiseriali eis longiori superatis, pappi paleis ad infimis retusis ad intimas acutiusculas sensim elongatis densè subplumoso-ciliatis.

Hab. in cultis derelictis planitierum elatarum *Syriæ* inter *Edlip* et *Aleppum* et in *Cœlesyriâ*, legi Jun. et Jul. 1846.

Color et habitus omninò *Carthami oxyacanthæ* MB. pro quo diù habui et qui præter characterem genericum omnium achenium nudorum differt indumento lanato caulis et ramorum, ramis abbreviatis, capitulis brevioribus confertis, involucri squamis exterioribus oblongo-lanceolatis latis plurinerviis nec vix trinerviis. *Onobroma flavescens* DC. utroque affine præter characteres fructûs differt involucri phyllis exterioribus brevissimè spinosis interiores vix æquantibus. Nostra species ob pappi seriem interiorem aliis non breviorē in sectione *Thamnacanthæ* militat.

CARDUNCELLUS ERIOCEPHALUS Boiss.

C. caule simplici usquè ad apicem folioso angulato-striato monocephalo supernè parcè lanato, foliis glabriusculis rigidis nervosis nitidulis pallidè virentibus inferioribus oblongis basi in petiolum attenuatis denticulatis superioribus rigidioribus e basi sessili subcordatè oblongo-lanceolatis acuminatis pinnatifido-spinosis, capitulo magnò, involucri squamis exterioribus infernè laxè arachnoideo-lanatis rigidis foliis similibus sed angustioribus quinquenerviis a basi latiori angustè lanceolatis margine tenuiter spinosis attenuato-acerosis subincurvis flores subæquantibus, interioribus scariosis paulò brevioribus oblongis linearibusve supernè margine lanatis apice ciliato-fimbriatis spinulà ciliis paulò longiori validiorique terminatis, flosculis cæruleis, pappo plumoso.

Hab. in regione *Amalecitarum* ad meridiem *Gaza*, legi flor. Apr. 1846.

Planta 6-12 pollicaris, folia inferiora cum petiolo 2 1/2 pollices longa

8 lin. lata, caulina sesquipollicaria, capitulum eo *C. cœrulei* ferè majus. Ei affinis sed distinctus involucri sordidè araneoso, squamis exterioribus rigidioribus canaliculatis aceroso-acuminatis sesquipollicaribus, interioribus albo-ciliatis nec in appendicem fuscam fimbriatam subdilatatis; pappi cum achenio proportionem in specim. meis junioribus observare non potui.

COUSINIA ERYNGIOIDES Boiss. in pl. Kotsch. Pers. bor. 1846.

C. foliis radicalibus amplis ambitu oblongo-lanceolatis pinnatipartitis vix rigidis parcè araneoso-canescens, segmentis a parte superiori folii deorsum decrescentibus ovatis oblongisve iterum 2-3 lobis nervis majoribus in spinas longas secundariis in spinulas excurrentibus valdè inæqualibus aliis magnis aliis 2-4 plò minoribus intermixtis omnibus basi subconfluentibus, caulibus folia pauca breviter pinnatim spinosa linearia antheseos tempore jam evanida ferentibus teretibus glabris albidis nitidis bis vel ter umbellato-proliferis ramis umbellarum divaricatis teretibus nudis, capitulis ad nodos umbellarum sessilibus solitariis terminalibusque 3-5 aggregatis omnibus cylindricis paucifloris, involucri glaberrimi squamis paucis a basi lanceolatè subulatis acerosis suprà concaviusculis subtus acutè triquetris inferioribus brevissimis cæteris recurvo-patentibus flores longè superantibus, flosculis purpureis, acheniis ovatis compressis ecoronatis, setis pappi uniseriatis achenio triplò brevioribus.

Hab. in argillosis convallium ad radices montis *Demawend* propè *Lar.* Kotschy N° 623. Fl. Aug.

Folia radicalia pedalia 2-3 pollices lata, caules bipedales, capitula angusta 8-9 lin. longa 2 1/2-3 lata, squamæ superiores 10-11 lin. longæ. Habitu *Centauream calcitrapam* vel *Eryngii* species quasdam referens, insignis inflorescentiâ capitulisque angustis tenuibus valdè squarrosis.

COUSINIA ALEPPICA Boiss.

C. basi lignosa multicaulis, caulibus pumilis ferè à basi divaricatis ramosissimis ramisque demum glabris tenuibus rigidis, foliis rigidis duris cartilagineis suprà glabris reticulato-nervosis subtus araneoso-canescens radicalibus lanceolatis elongatis pinnatilobatis lobis undulatis triangularibus iterum grossè dentatis aceroso-spinosis caulinis

multò minoribus oblongo-lanceolatis utrinquè 2-3 dentatis basi breviter decurrentibus, supremis ferè sub capitulo sitis et hoc subæquantibus, capitulis parvis ad ramulorum extremitatem solitariis, involucrio glabro breviter ovato basi truncato, squamis parvis virescentibus linearibus subtùs obtusè carinatis in mucronem acerosum brevem recurvopatulum abeuntibus, flosculis purpureis involucrio subduplò longioribus, achenio setulis brevissimis coronato, pappi setis uniserialibus caducissimis.

Hab. in collibus aridis inter *Edlip* et *Aleppum* sitis, legi Jun. 1846.

Planta 6-10 pollicaris ramosissima rigida, folia radicalia 4-6 pollic. longa pollicem lata infernè sensim attenuata, capitula magnitudinis *C. Hohenackeri* et *C. brachypteræ* quæ nostræ speciei affines ab eà statim dignoscuntur foliis radicalibus multò minoribus pinnatipartitis, ramis abbreviatis crassioribus lanatis, squamarum acumine quoque recurvopatulo sed longiori tenuissimo.

COUSINIA SQUARROSA Boiss. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846.

C. parcè araneosa subglabrescens virescens, caule erecto elato superne subdichotomè ramoso corymbosè 2-5 cephalo, foliis radicalibus....., caulinis parvis oblongo-linearibus strictis breviter dentatolobatis tenuiter flavido-spinulosis in alas eis ferè æquilatas dentatolobatas spinosas secùs totum caulem decurrentibus rigidis, ramis angustissimè et interruptè alatis sub capitulis nudis, capitulis mediocribus multifloris, involucri subglobosi præter squamarum basin parcè araneosam glabri virescentis squamis arcè imbricatis in appendicem arcuato-reflexam ovatam acutam 5 spinosam abeuntibus spinâ terminali lateralibus validiori triplòque longiori omnibus acerosissimis, flosculis roseis involucrio vix duplò longioribus, acheniis.....

Hab. in valle *Schahristonek* montis *Elbrus* Kotsch. N° 551.

Valdè affinis *C. calocephalæ* J. et Sp. Ill. tab. 178, ab eà mihi sat differre videtur foliis subtùs vix canescentibus nec lanato-tomentosis, caulinis in meo specimine vix 4 1-1½ poll. longis angustis breviter lobatis lobis integris nec 3-4 pollicaribus bipinnatilobatis, appendice squamarum ovato-triangulari nec triangulari-lanceolatâ, squamis majoribus, spinis foliorum et squamarum lutescentibus nec fuscis.

COUSINIA HERMONIS Boiss.

C. tota plùs minùsve araneoso-lanata canescens vel cana, collo squa-

moso, foliis radicalibus confertis lanceolatis pinnatisectis segmentis lobatis valdè undulato-plicatis secùs paginam superiorem versis confertissimis in spinas flavidas acerosissimas numerosas abeuntibus, caule a basi dichotomè ramosissimo divaricato-subcorymboso pleiocephalo, foliis caulinis e basi ovatà rotundato-auriculatà subdecurrenti in spinam longam recurvo-patulam abeuntibus infernè spinulosis, summis lanceolato-linearibus subintegris capitulo approximatis, capitulis mediocribus, involucri breviter ovati squamis arctissimè imbricatis basi plùs minùs lanatis in appendicem glabram viridem lanceolatam acerosam validam suprà concaviusculam subtùs subcarinatam patulam vel deflexam integerrimam capituli diametro æquilongam vel longiorem abeuntibus, flosculis roseis involucri vix duplò longioribus, acheniis compressis nigro-maculatis ecoronatis, pappo fugacissimo.

Hab. in totà regione inferiori *Hermonis* suprà *Rascheyà* in siccissimis, ad radices Libani in Cœlesyrià inter *Ainete* et *Deir el Achmar*. Legi Jul. 1846.

Folia radicalia sub anthesi jam exsiccata 2 4 poll. longa pollicem lata lobis sursùm directis valdè complicato-confertis, caulis $1\frac{1}{2}$ -4 $1\frac{1}{2}$ pedalis polycephalus. Capitula illis *C. crispæ* paulò majora, appendix squamarum intermediarum basi sesquilineam lata 7-8 lin. longa. Species pulchra propè *C. macrocephalam* et *Libanoticam* collocanda.

Plures *Cousiniæ* species in Jaub et Sp. Illustr. Or. vol 2 illustratæ, a me ipso plures menses ociùs in Diagn. N° 6 descriptæ fuerunt et sic quoad synonymiam restituendæ.

C. calcitrapiformis J. et Sp. tab. 158. — *C. minuta* Boiss. loc. cit. p. 117.

C. sphærocephala J. et Sp. tab. 164. — *C. chamæpeuce* Boiss. p. 120.

C. anisoptera J. et Sp. tab. 170. — *C. calolepis* Boiss. p. 116.

C. Olivieri J. et Sp. tab. 172 non DC. — *C. serratuloides* Boiss. p. 118.

C. involucreta J. et Sp. tab. 173. — *C. involucreta* Boiss. p. 114.

C. actinocephala J. et Sp. tab. 175. — *C. xyphiolepis* Boiss. p. 121.

C. silyboides J. et Sp. tab. 176. — *C. Kotschyi* Boiss. p. 120.

C. Schultzeana J. et Sp. tab. 177. — *C. cymbolepis* Boiss. p. 119.

C. hypoleuca Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. N° 557 accuratius observata ad *C. serratuloidem* Boiss. ut varietas spinis squamarum subelongatis referenda est.

PTOSIMOPAPPUS BRACTEATUS Boiss.

Pt. perennis sempervirens, caulibus hornotinis teretibus elatis nudis induratis parçè ramosis ad apicem ramorum folia congesta oblongo-spathulata obtusa integerrima in petiolum longè attenuata præter marginem adpressè et angustè albo-lanatum demùm glabrescentem glaberrima ferentibus, foliorum fasciculis vel terminalibus caules steriles coronantibus vel e centro edentibus ramum floralem annotinum caulem continuantem teretem striatum erectum sparsim foliosum dichotomè et strictè corymboso-ramosum, foliis ramealibus multò minoribus inferioribus oblongis petiolatis superioribus sessilibus, capitulis ad extremitatem ramulorum floralium valdè striatorum apice clavato-incrassatorum intus inanium solitariis, foliis floralibus 6-7 ovato-rotundis obtusis integerrimis enerviis cucullatis erecto-patulis capitulum involucrantibus involucri æquilongis, involucri ovato-conici apice subconstricti squamis glabris lævibus nitidis adpressissimè imbricatis coriaceis flavidis ab inferioribus triangularibus vel triangulari-lanceolatis acutiusculis mucronulo nigrescenti vix perspicuo adpresso faciliè ruptili terminatis ad intimas lineari-lanceolatas linearesque appendiculo membranaceo inermi integro vix distincto terminatas regulariter elongatis, flosculis flavis omnibus hermaphroditis, receptaculi setis copiosis rufescentibus achenia et pappum longè superantibus, acheniis oblongo-linearibus subcompressis lævissimis nitidis albidis pappo uniseriali caducissimo sordidè albo-rufescenti eis paulò longiori superatis, pappi setis ex circulo depresso umbonem circumdanti ortis subuniserialibus vel potius indistinctè 2-3 serialibus inæquilongis scabridis.

Hab. in totà regione inferiori montis *Cassii* Syriæ borealis ad margines sylvarum. Legi Junio 1846.

Planta 5-6 pedalis habitu peculiari stirpem Canariensem vel Madeirensensem potius quàm Europæam vel Orientalem referens. Caules indurati ferè fruticosi 3-4 pedales, folia in fasciculos terminales subrosulatos disposita cum petiolo 4-5 poll. longa 15-20 lin. lata subcoriacea, rami floriferi virgati 1 1/2-2 pedales folia multò minora sparsa stricta 4-2 pollic. longa ferentes corymbosè 3-7 cephalis, capitula ramulis parçè foliosis insidentia foliis cucullatis viridibus teneris bracteata involucri et squamarum formà *Centauream alatham* vel *Microlonchum Salmanticum* referentia. Achenii areola basilaris valdè lateralis, terminalis umbone elevato donata. Pappo uniformi subuniseriali caducissimo a

Centaurea distinctissima et optimè congruens generi *Ptosimopappo* a me in Suppl. Voy. bot. Esp. descripto et quod *C. sempervirentem* L. aliasque species Canarienses includit.

ÆGIALOPHILA Boiss. et Heldr.

Capitulum ovatum multiflorum. Involucri squamæ imbricatæ ovatæ margine scarioso-membranaceæ integræ in spinam rectam simplicem abeuntes. Receptaculum setis densis deciduis obsitum. Flosculi rosei marginales neutri radiantes vel vix radiantes, cæteri hermaphroditi. Anthæræ basi non caudatæ supernè in appendicem obtusam productæ. Filamenta valdè papillosa. Achenium adpressè hirsutum teretiusculum basi attenuatum areolâ basilari laterali donatum paleolis brevissimis denticulatis acutis persistentibus margine coronatum. Pappus albus biserialis achenio duplò longior setis omnibus basi in annulum concretis et cum eò facillimè deciduis exterioribus tenuibus plumosis interioribus paucis paulò latioribus vix scabridis brevioribus. — Plantæ Orientales arenarum maritimarum incolæ, caulibus subnullis, foliis lyratis, facie *Centaureæ*.

Genus a *Centaurea* cui hujus species hucusquè adnumeratæ fuerunt egregiè distinctum fructu paleolis persistentibus coronato, pappo in annulum basi concreto, deciduo, plumoso. Ob areolam basilarem lateralem inter *Centaurearum* tribum militat et a *Jurinea* longius distat.

ÆGIOLOPHILA PUMILA Boiss.

Æ. tota pilis intricatis araneosis breviter et adpressè cinerascens, foliis lineari-lanceolatis in segmenta ovata oblongo-linearia lineariave obtusa valdè inæqualia sæpè subretrorsa pinnatipartitis segmento terminali sæpè longiori angusto, caulibus brevissimis vel subnullis, involucri glabri squamis integris latè scariosis in spinam acerosam albam inferiorum brevem intermediarum squamâ longiorem abeuntibus, intimis in appendicem fuscescentem inermem sublaceram abeuntibus, flosculis neutris radiantibus, pappi breviter plumosi setis interioribus vix brevioribus latioribusque.

Centaurea pumila L. Amæn. Acad. Vent. Malm. tab. 9. Flor. Græc. tab. 948. — *C. mucronata*. Forsk.

Hab. in *Egypto inferiori* / insulâ Scio (Olivier in DC. herb.), *Attica* ex Sibth.

ÆGIALOPHILA CRETICA Boiss. et Heldr.

Æ. tota breviter araneoso-canescens foliis longè petiolatis oblongis acutiusculis minutè denticulatis vel ad limbi basin 2-4 lobulis minimis ovato-oblongis auriculiformibus auctis lyratis, caulibus nullis, involucri glabriusculi squamis latiusculè et integrè scariosis in spinam albam squamâ quadruplò breviorē attenuatis intimis in appendicem albam angustam inermem denticulatam abeuntibus, flosculis neutris vix radiantibus, pappi setis exterioribus longè plumosis, internis multò brevioribus.

Centaurea ægialophila Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1847.

Hab. in arenosis maritimis Cretæ ad portum *Sitia* infrâ *Piskokephali* Eparchiæ *Sitia*. Fl. Aprili. (Heldr.)

Centaurea Carduncella DC. etsi habitu præcedentibus affinis pappi characteribus vera *Centaurea* est.

CHEIROLEPIS Boiss.

Capitulum ovatum multiflorum. Involucri squamæ adpressæ coriaceæ productæ in appendicem plus minus longè palmatim spinulosam erectopatulam interiorum membranaceam muticam. Receptaculum fimbriiferum. Flores flavi radii neutri non radiantes cæteri hermaphroditi. Filamenta papillosa, antheræ breviter caudatæ appendicibus acutiusculis. Stigmata concreta. Achenia compressa apice angustissimè marginata areolâ basilari laterali. Pappus sordidè albus achenio multò longior pluriserialis setis infernè latiusculis plumosis persistentibus ab extimis ad intimas sensim auctis. — Herbæ perennes alpinæ orientales facie et involucris *Centaureas* e sect. *Mesocentro* vel *Calattropæ* omninò referentes.

Genus a *Centaurea* distinctissimum pappi non scabri sed plumosi setis indistinctè seriatis ab exterioribus ad intimas elongatis, a *Phaeopappo* Boiss. cui quoque accedit pappi setis elongatioribus plumosis nec scabris discedens. Hunc species sequentes spectant.

CHEIROLEPIS DRABIFOLIA Boiss.

C. basi suffrutescens pumila cæspitosa plùs minùsve araneoso-cana, foliis inferioribus petiolatis oblongis sinuato-denticulatis obtusis, superioribus lanceolatis acutis, squamarum appendicibus reflexis rufescentibus palmatim 5-7 spinosis spinà terminali aliis 2-3 plò longiori validiori.

Centaurea drabifolia Fl. Græc. tab. 940.

Hab. in *Olympe Bithyno*. (Sibt. Boiss.)

CHEIROLEPIS CAPPADOCICA Boiss.

C. basi suffrutescens pumila cæspitosa, foliis asperis infimis oblongo-linearibus cæteris lineari-elongatis integerrimis acutis, squamarum appendicibus erecto-patulis minimis 5-7 spinosis, spinis tenuibus terminali aliis vix duplò longiori validiorique.

Centaurea Cappadocica DC. Prodr.

Hab. in *Cappadocià ad Euphratem* (Auch. N° 3447), in monte *Ghelipel* Isauriæ suprà *Ermenek*. (Heldr.)

CHEIROLEPIS LIBANOTICA Boiss.

C. basi suffrutescens pumila cæspitosa foliis asperis angustè linearibus pinnatilobatis acutis lobis remotis dentiformibus triangularibus acutis, squamarum appendicibus patulis fuscis 7-11 spinosis, spinà terminali aliis duplò longiori validiorique.

Hab. in *Libano* suprà Cedros et cacuminibus *Hermonis*. (Boiss.)

Caules 2-6 pollicares, folia 2-2 $1\frac{1}{2}$ poll. longa 1 $1\frac{1}{2}$ -2 lin. lata basi in petiolum attenuata, capitula eis *C. drabifolia* paulò majora, spina intermedia circ. 3 lin. longa. Affinis *C. Cappadocicæ* a quâ differt foliis pinnatilobatis nec integerrimis appendiceque longius spinosà. Tres species præcedentes habitu genus *Myopordon* referunt.

CHEIROLAPIS KOTSCHYI Boiss. et Heldr.

C. caulibus ascendentibus elatis simplicibus vel supernè parcè ramosis, foliis asperis pallidè virentibus lanceolatis acutis integris inferioribus in petiolum attenuatis superioribus sessilibus, squamarum ap-

pendicibus inferioribus reflexis cæteris erectis omnibus pallidè rufescentibus palmatim 7-9 spinosis spinis tenuibus terminali aliis duplò longiori validiorique.

Centaurea Cappadocica var. pl. Anat. Heldr. exs. 1846.

Hab. in *Tauro* (Kotschy N° 260), Lycaoniâ inter *Beychehr* et *Koniah* et ad radices montis *Karadagh* propè *Larenda*. (Heldr.)

Caules 1½-4 pedales, folia inferiora cum petiolo 3-4 pollicaria 5-8 lin. lata. A *C. Cappadocica* cui foliis integris congruit differt caulibus proceris, foliis latis et spinis squamarum duplò longioribus.

CHEIROLEPIS PERSICA Boiss.

C. caulibus ascendentibus elatis simplicibus monocephalis, foliis pallidè virentibus asperulis lanceolatis acutis integris inferioribus in petiolum attenuatis superioribus sessilibus, squamarum appendicibus pallidè flavis erectis palmatim 7-11 spinosis, spinâ terminali aliis duplò longiori validiorique.

Phæopappus cheirolophus Boiss. in pl. Kotsch. Pers. bor. 1846.

Hab. in monte *Demawend* (Aucher N° 4836), in eodem jugo propè *Ask* Kotschy N° 629.

Habitu et foliis valdè affinis præcedenti a quâ differt appendicibus pallidis multò minoribus breviusque spinosis.

Centaurea lancifolia DC. et *C. cheirolopha* Fenzl. habitu præcedentibus affines habent pappum scabridum subpaleaceum *Centaureæ* et idèò ab hoc genere non separandæ sunt.

CENTAUREA CASSIA Boiss. (Sect. *Jacea*.)

C. perennis, caulibus tenuibus virgatis foliosis angulatis asperulis supernè ramosis ramis rigidulis erecto-patulis foliosis monocephalis corymbum oligocephalum laxum formantibus, foliis viridibus sub lente aculeolato-asperulis inferioribus petiolatis lyrato-pinnatipartitis lobo terminali oblongo obsolete denticulato obtuso vel acutiusculo lateralibus oblongo-linearibus triplò minoribus integris basi secus petiolum angustè decurrentibus, foliis caulinis intermediis sessilibus subpalmatim 3-5 partitis laciniis lineari-lanceolatis terminali duplò majori, rameis ellipticis integris, capitulis parvis, involucri glabri globosi squamis adpressiusculis, appendicibus totum involucrum obtegentibus scariosis pallidè brunneis muticis pectinato-fimbriatis fimbriis latitu-

dinem disci subæquantibus, intimis cucullatis laceris, flosculis roseis exterioribus neutris non radiantibus, acheniis pappo albo eis triplò breviori superatis.

Hab. in regione inferiori sylvaticà montis *Cassii* Syriæ borealis. Legi Jun. 1846.

Caules sesquipedales, folia radicalia cum petiolo 1 1/2-2 poll. longa, capitula in corymbo 4-6 ramis longiusculis suffulta eis *C. nigræ* minor, squamarum cilia eis *C. nigræ* dimidiò breviora. A *C. jaceda*, *nigrescenti* et affinibus floribus exterioribus non radiantibus, acheniis papposis, a *C. nigrâ* foliis pinnatis, floribus exterioribus neutris etc. distincta.

CENTAUREA LYCIA Boiss. (Sect. *Phalolepis*.)

C. basi suffrutescens tota indumento pannoso adpressissimo cana, foliis ad rhizomatis apicem congestis petiolatis infimis indivisis ovatis obtusiusculis breviter denticulatis cæteris pinnatipartitis segmentis lateralibus 2-6 oblongo-linearibus subintegris terminali 2-3 plò majori ovato vel oblongo parcè denticulato, caulibus floriferis infrà rosulas nascentibus erectis canis supernè parcè ramosis, ramis monocephalis, foliis caulinis inferioribus basi pinnatis laciniis lateralibus angustè linearibus terminali multoties majori lineari-oblongà, foliis superioribus linearibus indivisis, capitulis mediocribus, involucri glabri squamis in appendicem eas occultantem centro pallidè fuscescentem latissimè hyalino-membranaceam subretusam cucullatam obsolete denticulato-laceram in infimis setulà brevi duriusculà terminatam in cæteris muticam abeuntibus, flosculis roseis exterioribus neutris subradiantibus, pappo albo...

Hab propè *Elmalu* Lyciæ comm. cl. Pestalozza.

Pedalis vel longior, folia infima 2 poll. longa 45 lin. lata, sequentia longiùs petiolata, segmenta lateralia 6-8 lin. longa, capitula magnit. eorum *C. Cadmeæ* et *Aphrodisææ*. Affinis huic quæ facillè distinguitur foliis omnibus pinnatipartitis laciniis parvis linearibus, appendicibus squamarum angustioribus integris in mucronum inermem omnibus attenuatis.

CENTAUREA AMMOCYANUS Boiss. Sect. *Acrotophus*.

C. annua parcè araneoso-puberula subviscida griseo-virens, caulibus

angulatis tenuibus circulariter prostratis subdichotomè ramosissimis, foliis parvis radicalibus obovatis integris obsolete dentatis vel basi pinnato-sublyratis, caulinis angustè linearibus pinnatilobatis lobis utrinquè 2-6 brevissimis dentiformibus, foliis summis subintegris, capitulis parvis unico e collo radice sæpius subsessili cæteris ad ramorum apicem solitariis oblongis, involucri glabriusculi squamis viridibus enerviis appendice breviter decurrenti squamas suboccultanti centro fuscâ margine albofimbriatâ fimbriis diametrum squamæ æquantibus apice in spinam fuscescentem ciliis vix longiorem validioremque abeunti, flosculis roseis exterioribus neutris radiantibus, achenio minimo virescenti glabriusculo, setis pappi fuscescentibus exterioribus achenio æquilongis internis paulò latioribus conniventibus achenio triplò brevioribus.

Hab. in arenosis *Arabiae petreæ* Palæstinæ conterminæ ad meridiem *Gaza*, legi florif. Aprili 1846.

Caules sæpè 1½-1 pedem longi, folia radicalia cum petiolo vix sesquipollicem longa caulina minora, capitula eis *C. paniculatæ* paulò majora, involucri squamæ eleganter nigræ albofimbriatæ. Species distinctissima, radice annuâ et characteribus affinis *C. patulæ* DC. quæ differt foliis integris, capitulis ad ramorum apicem 2-3 sessilibus, spinis squamarum validioribus subpatulis.

CENTAUREA LEPTOCEPHALA Boiss. (Sect. *Acrolophus*.)

C. multicaulis tota parcè et brevissimè araneosa aspera pallidè virens, caulibus rigidis angulatis supernè ramosissimis effusè paniculato-corymbosis, foliis rigidis inferioribus pinnatipartitis segmentis rachideque angustissimè linearibus lateralibus brevibus, foliis caulinis linearibus basi dentatis integrisve, capitulis terminalibus solitariis minimis, involucri cylindrici squamis sub lente puberulis in appendicem rubellam lanceolatam spinosam squarroso-recurvam breviter et pinnatim ciliato-spinulosam abeuntibus, flosculis purpureis circ. 13, neutris ferè 6 non radiantibus cæteris hermaphroditis, acheniis compressis calvis.

Hab. in collibus sterilibus Antilibani et collium finitimorum Cœlesyriæ, legi flor. Julio.

E grege *C. virgatæ*, *consanguineæ*, *calolepidis* et *squarrosæ* ferè omnium capitulis minoribus donata, a duabus prioribus appendice spi-

nosâ, a posterioribus spinæ elongationis magisque recurvæ ciliis lateralibus squamarum diametro brevioribus faciliè distinguenda.

CENTAUREA DICHROA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Acrolophus*.)

C. infernè frutescens vestigiis caulium et petiolorum vetustorum obsita dein multicaulis caulibus tenuibus virgatis rigidulis parcè foliosis alternatim ramosis ramis rigidulis erecto-patulis monocephalis, foliis ad basin caulium congestis adpressè canescentibus pinnatipartitis segmentis integris acutiusculis subquinis rarius septenis rachideque linearibus caulinis strictis indivisis angustè linearibus, capitulis minutis, involucri oblongi glabri squamis ovatis pallidis adpressissimis vix appendiculatis margine breviter fimbriatis muticis fimbriis albidis diametro squamæ brevioribus membranà marginali vix decurrenti, corollis pallidè ochroleucis non radiantibus, antheris violaceis, acheniis pappo triplò breviori superatis.

Hab. in saxosis pinetorum ad *Tcherali* in radicibus montis *Taghtalu* Lyciæ. (Heldr.) Fl. Maio.

Sesquipedalis, folia inferiora cum petiolo bipollicaria segmentis 6-8 lin. longis 4-2 latis, capitula magnitudinis eis *C. ovinae* sed angustiora. Affinis huic speciei eximie differt caulibus vetustis frutescentibus, foliis radicalibus minùs dissectis, caulinis indivisis etc. Formam setarum pappi ex achenio unico anni præteriti ritè examinare non potui.

CENTAUREA DUMULOSA Boiss. (Sect. *Acrolophus*.)

C. collo lanato multicauli, caulibus subnudis a basi ramosissimis strictis tenuibus rigidis quadrangulis infernè parcè et adpressè canescenti-puberulis supernè glabris, ramis subintricatis rigidis monocephalis, foliis radicalibus...., caulinis paucis minimis pinnatipartitis rachide segmentisque lineari-subulatis lateralibus 2-4 brevissimis, foliis superioribus subulatis rameis abbreviatis squamæformibus, capitulis parvis, involucri oblongi squamis parcè puberulis sub 5 striatis appendice non decurrenti squamas superiores suboccultanti pallidà fimbriatà in spinulam rectam fimbriis albis duplò longiorem crassioremque abeunti terminatis, flosculis roseis, achenio nigro nitido glabriusculo pappi, setis albis exterioribus achenio triplò brevioribus interioribus brevissimis conniventibus.

Hab. in siccis regionis sylvaticæ ad radices Libani inter *Ainete* et *Deir el Achmar* sitæ. Legi Julio 1846.

Planta 1½-4 pedalis, capitula magnitudinis *C. arenariæ*, habitus omnino *C. scopariæ* Sieb. sed characteribus affinis *C. arenariæ* et *paniculatæ* a quibus differt habitu et formâ foliorum, capitulis ad extremitatem ramorum elongatorum solitariis.

CENTAUREA DAMASCENA Boiss.

C. basi suffrutescens multicaulis, caulibus subaphyllis brevissimè puberulis angulatis a basi ramosissimis, ramis rigidis tenuibus intricatis, foliis radicalibus linearibus pinnatipartitis laciniis paucis angustè linearibus brevissimis, caulinis et rameis abbreviatis squamæformibus, capitulis ad extremitatem ramorum solitariis parvis oblongis, involucris squamis glabriusculis in appendicem centro fusciscentem margine latè albo-membranaceam breviter denticulatam apice parcè et breviter sæpè fimbriatam spinulâ tenuissimâ appendici æquilongâ vel breviori terminatam abeuntibus interioribus apice hyalinis integris, flosculis pallidè roseis non radiantibus, pappo albo....

Hab. in collibus aridissimis ad *Damascus* Aucher N° 3208 et inter *Damascus* et *Antilibanum*. (Boiss.)

C. alba var. *spinescens* DC. quoad plantam Syriacam.

Dumus intricatus rigidus subspinescens 8-11 pollicaris, capitula illis *C. albæ* ferè dimidiò minora ea *C. paniculatæ* æquantia. *A. C. albæ* et *C. splendenti* diversissima capitulis parvis, involucris squamis dimidiò angustioribus, caulibus dichotomè ramosissimis, foliis et toto habitu. Aptius collocanda propè *C. paniculatam*. *C. dumulosam* et affines et appendicibus latè membranaceis quidem sed apice subfimbriatis transistum inter *Phalolepidem* et *Acrolophum* præbens.

CENTAUREA ARIFOLIA Boiss. (Sect. *Cynaroides*.)

C. perennis rhizomate tuberoso-incrassato, collo fibroso, caule tenui virgato striato erecto elato infernè parcè folioso crispulè pubescenti supernè glabro parcè breviter et remotè ramoso 1-3 cephalo, foliis radicalibus et caulinis infimis paucis petiolo striato crispulè pubescenti eis æquilongo vel longiori suffultis intensè viridibus tenuiter cartilagineis reticulato-nervosis utrinquè lucidis papillis albis sparsissimis crispis sub lente obsitis tactu asperulis obsoletissimè crenulato-repan-

dis oblongis vel ovatis cordato-hastatis acutiusculis rarissimè sub basi truncatà 2 segmentis minutis linearibus auctis, auriculis basilaribus folio 3-4 plò brevioribus foliorum radicalium obtusis vix divergentibus, caulinarum inferiorum valdè divergentibus latè triangularibus acutis, folio caulino superiori solitario sæpè deficienti oblongo lanceolato-acuminato in petiolum brevem attenuato, capitulis magnis globosis, squamis appendice scariosà rufo-nigricanti eis latiori ovato-triangulari a basi fimbriato-pectinatà apice in spinam subulatam rectam duriusculam squamarum infimarum brevissimam superiorum appendice 2-3 plò breviorē abeunti terminatis, squamarum intimarum linearium appendice eis angustiori oblongà vix fimbriatà breviter et inermè apiculatà, flosculis intensè purpureis radiantibus nullis, acheniis teretiusculis glabris, pappi sordidè rufescentis achenio sesquolongioris setis serierum exteriorum ab inferioribus ad interiores elongatis, intimæ seriei latioribus paleaceis achenio triplò brevioribus.

Hab. in umbrosis sylvaticis regionum inferiorum montis *Cassii* in viâ inter *Laodiceam* et *Suadiëh*, legi floriferam Jun. 1846.

Folia inferiora 6-8 poll. longa, 6-7 lata petiolo sæpè ferè pedem longo suffulta, caulis 2-4 pedalis, capitula eis *C. scabiosa* majora, appendix squamarum intermediarum absque spinâ 6-7 lin. longa lataque. Species foliorum magnitudine et formâ insignis propè *C. cardunculum* Boiss. et affines collocanda.

CENTAUREA SPICATA Boiss. (Sect. *Cynaroides*.)

C. biennis vel perennis caule crassiusculo striato papillis crispis sparsis infernè præsertim hirtulo folioso simplicissimo elato, foliis viridibus nervosis papillis albidis sparsis minimis asperulis radicalibus caulisque infimis longè petiolatis lyratis, segmento terminali maximo oblongo basi cuneato vel cordato obsolete denticulato, lateralibus utrinquè 1-2 parvis oblongis vel ovatis cum basi segmenti terminalis et inter se confluentibus, foliis caulinis intermediis oblongo-lanceolatis integris vel infernè lobulo auctis in petiolum brevem attenuatis, superioribus angustè linearibus integerrimis basi sessili secùs caulem in alas angustas integras decurrentibus, capitulis pedunculo stricto eis breviori foliolis lanceolato-subulatis squamæformibus 1-2 obsito suffultis secùs caulis partem superiorem alternis racemum spiciformem longum laxum formantibus, involucri glabri squamis apice subconstricto abeuntibus in appendicem fuscescentem duram e basi triangulari-ovatà ciliato-fim-

briatam spinâ rectâ validâ ei æquilongâ terminatam, squamarum intimarum appendice parvâ brevissimè ciliatâ spinosâque, flosculis purpureis non radiantibus, acheniis oblongis glabris nitidis albidis compressis pappo eis sesquolongiori violaceo terminatis, setis serierum exteriorum ab infimis ad interiores sensim auctis, serie interiori achenio triplò breviori paleis albidis conniventibus.

Hab. in pratis Syriæ littoralis inter *Laodiceam* et *Djiblet*. Legi Junio 1846.

Planta 2-2 1/2 pedalis, folia inferiora 5-6 poll. longa ferè 3 poll. lata, caulina ad basin pedunculorum 1 1/2 poll. circ. longa 3-4 lin. lata, capitula dimidiò minora eis *C. giganteæ* Schultz in Kotsch. pl. Kurd. quæ nostræ speciei inflorescentiâ valdè affinis differt indumento araneoso, foliis indivisis, squamarum appendice albâ lanceolatâ remotius et crassius ciliatâ, floribus ochroleucis.

CENTAUREA ONOPORDIFOLIA Boiss. (Sect. *Cynaroides*.)

C. tota adpressè araneoso-canescens, caulibus erectis alatis supernè subthyrsoidèo-paniculatis ramisque rigidissimis, foliis lanceolato-linearibus rigidissimis duris suprâ læviusculis subtùs elevato-nervosis pinnatilobatis inter lobos sinuato-undulatis spinoso-dentatis lobis triangulari-ovatis margine et apice in spinas flavas breves duras abeuntibus, radicalibus et inferioribus longissimis in petiolum brevem angustatis, caulinis plùs minùs abbreviatis strictis in alas eis æquilatas continuas lobato-spinosas abeuntibus, paniculæ ramis brevibus strictis moncephalis sæpiùs subsessiliter et alternè 2-3 cephalis, capitulis flavido-spinosissimis, involucri squamis adpressissimis albo-tomentosis appendice glaberrimâ flavâ terminatis, squamarum inferiorum appendice reflexâ brevissimâ ovatâ subpalmatim spinosâ spinis brevibus vix inæqualibus, intermediarum in spinam eâ multò longiorem erectam vel arcuatam acerosissimam attenuatâ utrinquè basi 3-4 spinis tenuibus auctâ, intimarum appendice cucullatâ subintegrâ apice tenuiter breviterque spinulosâ vel muticâ, flosculis luteis non radiantibus, acheniis oblongis compressis nigricantibus areolâ basilari valdè laterali, pappi nigricantis achenio duplò longioris setis scabridis ab extimis sensim elongatis, seriei intimæ paulò latioribus paleaceis conniventibus achenio triplò brevioribus.

Hab. in arvis incultis *Cælesyriæ* et collium adjacentium, legi fine Julii vix florere incipientem.

Caules plures 2-3 pedales rigidissimi valdè ruptiles, folia inferiora 12-16 poll. longa 2 circ. lata, superiora 2 $1\frac{1}{2}$ poll. longa, panicula thyrsoides 8-10 poll. longa, capitula illis *C. collinae* paulò minora, appendix squamarum inferiorum cum spinâ vix 2 lin. longa, superiorum spina sæpè pollicaris. Foliis longissimis, caulibus alatis *Onopordon* referens, appendicibus valdè inæqualibus squamarum ab omnibus aliis generis distinctissima. Forsan cum præcedentibus melius sectioni *Acrocentro* adnumeranda.

CENTAUREA ANTIOCHIA Boiss. (Sect. *Euacrocentron*.)

C. caule subangulato parcè et adpressissimè araneoso-pulverulento elato supernè longiusculè ramoso paniculato-corymboso, foliis glabriusculis radicalibus numerosis caulisque inferioribus petiolatis ambitu oblongo-lanceolatis sublyrato-pinnatipartitis, segmentis ovato-oblongis minutè et obtusè denticulatis a superiori paulò majori ad infima diminutis basi sæpè confluentibus; rachide inter segmenta lobulis sæpè auctâ, petiolis puberulis, foliis caulinis intermediis paucis segmentis linearibus subintegrîs, summis ad squamulas oblongas lineares reductis, capitulis magnis pedunculo eis longiori suffultis, involucri hemisphærici squamis glabriusculis ovatis margine supernè pectinato-ciliatis apice in appendicem e basi lanceolatâ ciliatâ recurvam patulam squamarum inferiorum breviorum cæterarum squamâ longiorum abeuntibus, squamis intimis appendice rotundatâ fimbriatâ inermi velutinâ terminatis, flosculis atropurpureis non radiantibus, acheniis compressis albo-velutinis pappo fusco eis paulò longiori terminatis, setis scabridis ab exterioribus sensim elongatis, seriei intimæ albis paleaceis conniventibus achenio triplo brevioribus.

Hab. in rupestribus calcareis montium ad *Orontem* inter *Suadiëh* et *Antiochiam* sitorum et in eadem arce Antiochiæ. Fl. Junio. (Boiss.)

Folia radicalia 5-6 pollicaria 15-16 lin. lata, segmentis lateralibus utrinquè 4-5, caules 3-4 pedales, capitula magnit. *C. calocephalæ*, spinæ squamarum intermediarum sæpè 8-9 lin. longæ. Species elegans floribus atropurpureis, foliis ad *C. scabiosam*, involucri ad *C. Olivierianam* et affines accedens.

CENTAUREA SCOPULORUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Acrocentron*.)

C. rhizomate crasso cylindrico, collo lanâ bombycinâ densâ vestito,

caule subangulato-striato brevissimè puberulo supernè dichotomè ramoso 3-5 cephalo, foliis pallidè virentibus sub lente tenuissimè asperulo-puberulis lanceolatis pinnatipartitis, segmentis oblongo-lanceolatis acutis acutè denticulatis basi sæpiùs attenuatis terminali sæpè paulò majori lateralibus versùs basin folii decrescentibus, rachide inter segmenta lobulis sæpè auctà, foliis caulinis superioribus sessilibus parvis pinnatim 3-5 partitis, capitulis magnis ad ramorum apicem solitariis, involucri hemisphærico lanà bombycinà squamas ferè occultanti densè obsito, squamis ovatis in appendicem nigricantem rectam breviter triangularem ciliato-pectinatam spinà patulà tenui ciliis triplò longiori validiorique terminatam abeuntibus, squamarum interiorum appendice rotundà muticà breviter fimbriata, flosculis roseis non radiantibus, acheniis compressis puberulis pappo albo eis subduplò longiori superatis, setis pappi vix scabridis ab exterioribus ad interiores sensim auctis, seriei intimæ paulò latioribus basi conniventibus intermediis subæquantibus.

Hab. in fissuris rupium verticalium prom. *Alaya* Pamphyliæ. Fl. Apr. (Heldr.)

Sesquipedalis, folia radicalia rosulata 6-10 poll. longa, segmentis 40-43 lin. longis 3-6 latis utrinquè 6-7, capitula magnitudinis *C. scabiosæ*, spinæ squamarum 3 lin. circ. longæ. Species pulcherrima in sect. *Acrocentro* propè *C. Oliverianam* collocanda a *Centaureæ* characterie serie intimæ pappi non abbreviatà paululùm discedens sed huic tamen omnibus aliis notis et etiam paleis seriei intimæ basi conniventibus optimè congruens.

CENTAUREA SPECIOSA Boiss. (Sect. *Acrocentron*.)

C. tota indumento araneoso tenui adpressissimo cinereo-cana, rhizomate suffrutescenti multicauli, caulibus brevibus canis ad apicem usquè densè foliosis monocephalis, foliis teneris omninò muticis utrinquè canescentibus ambitu oblongo-lanceolatis pinnatipartitis segmentis inferiorum latioribus oblongis basi angustatis obtusè obtusè pinnatilobatis superiorum angustioribus minoribus oblongo-linearibus integris vel denticulatis, capitulis magnis, involucri parctissimè araneosi vel glabrescentis squamis virescentibus appendice patulà vel reflexà flavidà basi lanceolatà canaliculatà 2-3 spinulis tenuibus utrinquè obsitâ in spinam longam acerosam validam squamâ 2-3 plò longiorem attenuatâ terminatis, squamarum intimarum appendice membranaceâ ovatâ mu-

ticà lacerà, flosculis roseis, acheniis pallidè virentibus glabris pappo albo vel rubello eis paulò longiori terminatis, setis ab exterioribus brevioribus sensim auctis, seriei intimæ non latioribus conniventibus achenio dimidiò brevioribus.

Hab. in rupibus verticalibus calidis vallium circà *Cæsaream Philippi* (*Banias*) Galilææ sitis. Legi flor. Aprili 1846.

Caules ex eodem rhizomate plures 6-10 pollicares, folia radicalia cauli æquilonga segmentis 6-10 lin. longis lobis ovatis, superiorum segmenta et lobi angustiora breviora, capitula magn. eis *C. ornata*. Pulchra species foliis et indumento *C. cinerascens*, capitulis *C. eryngioidem* referens.

CENTAUREA AINETENSIS Boiss. (Sect. *Acrocentron*.)

C. tota pilis annulatis mollibus patulis secus caules sparsis secus folia et petiolos densis cinerea, rhizomate indurato multicauli apice lanato, caulibus angulato-striatis erectis rigidis 1-2 cephalis, folia petiolatis pinnatipartitis segmentis valdè inæqualibus ovatis oblongis vel lineari-lanceolatis obtusis mucronulatis integris terminali sæpius elongato, rachide inter segmenta dentatà, foliis superioribus paucis brevibus segmentis angustis longè mucronatis vel indivisis linearibus, capitulis pedunculo rigido nudo eis longiori suffultis oblongis, involucri squamis adpressè pubescentibus margine albo-membranaceis breviter et latiusculè ciliatis in spinam flavidam basi pinnato-spinulosam patulam vel recurvam acerosam eis duplò longiorem attenuatis, squamis intimis apice latè hyalinis muticis vix laceris, flosculis pallidè carneis eleganter aurantiaco-striatis non radiantibus, antheris intensè purpureis, achenio hirtulo basi circà areolam longè penicillato pappo albo eis æquilongo terminato, setis ab exterioribus brevioribus sensim elongatis, seriei intimæ latioribus paleaceis conniventibus achenio dimidiò brevioribus.

Hab. in sylvaticis ad radices Libani in Cœlesyrià inter *Ainete* et *Deir el Achmar*, legi fructiferam Jul. 1846.

Caules $1\frac{1}{2}$ -1 pedales, folia ea *C. eryngioidis* referencia sed indumento pilorum longorum lente annulorum cinerea, lacinia longiores et angustiores, capitula eis *C. eryngioidis* æquilonga sed angustiora, cilia et spinæ breviores eæ 6-8 lin. longæ, corolla pallidior, antheræ purpureæ nec flavescentes, achenium basi multò longiùs penicillatum.

CENTAUREA CROCODYLIOIDES Boiss. (Sect. *Acrocentron*.)

C. annua vel biennis, caule virgato elato parçè puberulo aspero acutè angulato supernè ramoso, ramis strictis elongatis nudis monocephalis, foliis viridibus asperulis inferioribus lyratis lobo terminali oblongo integro vel denticulato lateralibus minoribus 4-6 oblongo-linearibus, foliis superioribus pinnatipartitis laciniis omnibus angustè linearibus, capitulis magnis, involucri globosi glabri squamis abeuntibus in appendicem breviter decurrentem supernè nigro-fuscam margine regulariter albo-fimbriatam fimbriis appendicis diametrum æquantibus apice spinâ tenui erectâ inferiorum abbreviatâ superiorum squamam superanti terminatam, flosculis roseis neutris valdè radiantibus, achenio compresso pilis flavidis detersilibus pubescenti, pappi setis externis tenuibus albis ab extimis brevissimis ad intimas achenio subduplò longiores sensim auctis, seriei intimæ paleacæ achenio dimidiò brevioris paleis rufis truncatis denticulatis arcetè conniventibus.

Hab. in collibus Galilææ ad planitiem *Esdraël*on. Legi flor. Maio 1846.

Sæpè 3-5 pedalis, omnibus notis habitu floribus et acheniis *C. crocodylio* quam quoque in Galilæâ legi simillima nisi quod appendix squamarum membranâ ad basin usquè longè pectinato-ciliatâ nec integerimâ marginata est et in spinam longiorem sæpè 9-10 linearem attenuatur. Hoc discrimen mihi nimis grave videtur ut ex hac plantâ solùm varietatem condam.

CENTAUREA PESTALOZZÆ Boiss. (Sect. *Crocodylium*.)

C. acaulis, rhizomate crassiusculo verticali, foliis omnibus radicalibus rosulatis pilis longis sub lente annulatis hispidis griseis ambitu lineari-oblongis pinnatipartitis segmentis minutis obovato-spahulatis obtusis mucronulatis basi attenuatis integris vel obsolete dentatis, lobulis minutis inter segmenta interjectis, capitulis inter folia sessilibus mediocribus, involucri glabri squamis pallidè flavis angustè albo-marginatis ciliatis ciliis versus apicem squamæ elongatis, spinâ terminali tenuissimâ flavâ erecto-patulâ squamæ æquilongâ vel breviori, squamis intimis appendice ovalâ cucullatâ denticulato-lacerâ terminatis, flosculis luteis, achenio densè hirsuto, pappo albido achenio longiori.

Hab. in monte *Akdagh* Lyciæ cl. Pestalozza.

Folia 2-2 1/2 poll. longa 8-10 lin. lata, capitula paulò minora eis *C.*

Hellenicæ cui ut et *C. aciculari* nostra species affinis est sed illæ præter indumentum diversum a nostrâ spinis longioribus validioribus basi pinnatim spinulosis differunt.

CENTAUREA IDÆA Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 4847. (Sect. *Mesocentron*.)

C. biennis? adpressè araneoso-canescens, foliis ferè omnibus rosulatis humi expansis ambitu lineari-spathulatis lyrato-pinnatipartitis lobis lateralibus numerosis minimis auriculæformibus ovato-triangularibus acutiusculè 2-3 denticulatis subretrorsis versùs basin folii decrescentibus terminali aliis triplò majori basi truncato vel subcordato deltoideo sæpiùs transversè latiori, rachide inter segmenta minutè lobulatâ, foliis caulinis inferioribus minoribus lobis lateralibus 2-6 dentiformibus terminali oblongo mucronato, foliis supremis lineari-oblongis basi attenuatis vel linearibus mucronatis angustissimè et integrè decurrentibus, caulibus pluribus e centro rosulæ ascendentibus pumillis supernè ramosis, ramis elongatis ancipiti-subalatis monocephalis, capitulis mediocribus, involucri globosi demùm glabrescentis squamis adpressis viridibus margine non membranaceis in spinam acerosam patulam erectamve flores superantem squamâ 4-5 plò longiorem non canaliculatam basi ustulatam duabusque spinulis ustulatis brevibus utrinquè auctam supernè flavam abeuntibus, squamis intimis in appendicem angustè membranaceam ustulatam spinulosam vel muticam abeuntibus, flosculis luteis non radiantibus, acheniis minimis albis marginalibus nudis cæteris papposis, setis tenuissimis albis seriei exterioris achenio æquilongis, interioris achenio sextuplò brevioribus.

Hab. in saxosis regionis sylvaticæ montis *Idæ* et montium *Sphacioticorum* alt. 3-5000'. (Heldreich.)

Folia inferiora 3-3 1/2 poll. longa, segmenta lateralia utrinquè 10-12 parva terminale 6-7 lin. latum 4-5 longum, caules longiores semipedales, capitula magnit. *C. solstitiatis* cui affinis est et a quâ differt formâ foliorum, caulibus numerosis pumillis etc. Spinæ involucri longiores 9-10 lineares. *C. Sicula* nostræ speciei quoque affinis differt caulibus latè et subundulatim alatis, involucri phyllis omninò et pallidè luteis minùs longè et validiùs spinosis, spinulis lateralibus numerosioribus.

C. procurrens Sieber est species propria quam in desertis Arabiæ petreæ quoque legi et quæ ab affnibus *C. pallescenti* et *Ægyptiacâ*

certè differt, sed cl. DC. sub hoc nomine partim descripsit specimina Schimp. N° 349 foliis decurrentibus spinisque involucri totâ longitudine spinulosi diversa et ad suam *C. Sinaicam* spectantia.

CENTAUREA BREVICAULIS Boiss. (Sect. *Calcitrapa* Cass.)

C. annua vel biennis, caulibus brevissimis prostratis flaccidis simplicibus vel parcè ramosis crispulè papillois, foliis flaccidis asperulis virentibus linearibus pinnatipartitis, rachide lato-linearì sæpè lobulatâ, segmentis angustè linearibus elongatis iterùm pinnatilobatis vel indivisis crispulè denticulatis terminali sæpè longiori, capitulis 4-2 secus ramos breviter pedunculatis terminalibusque solitariis mediocribus, involucri horridi squamis stramineis brevissimis margine non membranaceis in spinam stramineam nitidam latam supernè planam infernè convexam teneram medullâ farctam patulam floribus duplò longiorem basi utrinquè 3-5 spinulis brevissimis stipatam abeuntibus, squamis intimis muticis apice angustè membranaceis, flosculis luteis non radiantibus, acheniis stramineis, pappi setis exterioribus albis tenuissimis achenio paulò longioribus, seriei internæ minutissimis vix perspicuis rufescentibus.

C. calcitrapa var. *brevicaulis* DC. Prodr.

Hab. in Ægypto (Sieb., Aucher N° 3440), in Ægypto mediâ ad ripas Nili. (Boiss.)

Caules 3-6 pollicares, folia inferiora 2 1/2-3 poll. longa rachide ab apice ad basin ubi 2 1/2 lin. lata est dilatâtâ, segmenta longitudine varia 4-2 lin. lata. Species infaustè relata ad *C. calcitrapam* a quâ formâ foliorum, floribus luteis, acheniis papposis recedit et in sectione foliis flaccidis, spinis medullari-inflatis minimè duris distinctissima.

CENTAUREA PAMPHYLICA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Calcitrapa*.)

C. biennis, caulibus teretibus crassiusculis striatis foliosis dichotomè ramosis, foliis asperis parcequè papillois flaccidulis ambitu oblongis pinnatipartitis, rachide segmentisque angustè linearibus elongatis, minutè denticulatis ad denticulos et apicem spinulis aculeiformibus albis minimis crebrè obsitis, foliis summis oblongo-linearibus lobatis capitula bracteantibus eaque æquantibus, capitulis in dichotomiis supremis subsessilibus terminalibusque solitariis mediocribus,

involucris glabri squamis adpressiusculis coriaceis virentibus inferioribus apice truncatis subpalmatis et brevissimè 5-7 spinulosis spinis erectis, intermediis paucis in spinam validam duram lutescentem patulam lanceolatam suprâ canaliculatam flosculis sublongiorem imâ basi spinulosam abeuntibus, supremis appendice membranaceâ rufescenti ovatâ latâ denticulatâ inermi terminatis, flosculis roseis non radiantibus, acheniis ovatis compressis minimis omnibus nudis.

Hab. ad campos et vias Pamphyliæ ad fluvium *Cestrum* Julio. (Heldreich.)

Pedalis vel sesquipedalis, folior. segmenta circ. lineam lata, capitula magnit. eorum *C. calcitrapæ*, spinæ intermediæ 7-8 lin. tantum longæ. A *C. calcitrapæ* foliis crebrè spinulosis, squamis intermediis solis in spinam productis etc. egregiè differt. *C. Alexandrina* quoque affinis habet folia aliter dissecta, squamas omnes spinosas, spinas crassissimas latè canaliculatas infernè spinulosas, etc.

CENTAUREA ARANEOSA Boiss. (Sect. *Calcitrapa*.)

C. tota papillis crispis araneosa grisea, caulibus angulatis prostratis ramosissimis, foliis radicalibus bipinnatipartitis partitionibus primariis rachideque linearibus elongatis terminali lineari longiori rariùs oblongâ, partitionum segmentis minimis ovato-oblongis, foliis caulinis oblongo-lanceolatis latiusculis irregulariter lobatis denticulatisque denticulis mucronulatis, capitulis breviter pedunculatis foliis supremis ea subæquantibus bracteatis, involucre ad spinarum basin araneo-lanato squamis arcuè imbricatis virescentibus infimis integerrimis spinâ rectâ tenui eis æquilongâ vel breviori terminatis, intermediis in spinam validam patulam flavam duram basi latam canaliculatam spinulisque 3-4 utrinquè auctam flosculis æquilongam vel longiorem abeuntibus margine non membranaceis, squamis intimis appendice membranaceâ denticulatâ cucullatâ pallidâ terminatis inermibus, flosculis luteis non radiantibus, acheniis minimis, pappi setis exterioribus tenuissimis albis achenio subæquilongis, intimis rufescentibus inter se remotiusculis brevissimis.

Var. *β. tenuifolia*. — Laciniae foliorum angustiores spinæque capitulorum basi paulò minùs dilatatæ cæterum omnia speciei.

Hab. species in arenosis præsertim maritimis Palæstinæ, circâ *Gaza*, ad radices septentrionales *Carmeli* sub cænobio. Varietas ad meridiem urbis *Gaza* in regione *Amalecitarum*. (Boiss.)

Species a *C. calcitrapā* et *C. calcitrapoidi* auct. recentiorum distinctissima floribus flavis, capitulis araneoso-lanatis, spinis crassioribus 9-10 lin. longis basi 1 $\frac{1}{4}$ lin. latis. Forsan hūc ex verbis « *calyces basi lanuginosi* » spectat *C. calcitrapoides* L. Amæn. Acad. (quoad pl. Palæstinam non auctorum) species cæterum e mixtione plantarum diversarum orta ideò valdè dubia et ob folia « *indivisa serrata* » dicta in nostrā plantā ægrè agnoscenda.

CENTAUREA HERMONIS Boiss. (Sect. *Calcitrapa*.)

C. tota breviter papillosa griseo-virens, caulibus teretibus acutè striatis rectis a basi dichotomè ramosissimis, foliis præter pilos annulato-crispos asperis ambitu oblongo-lanceolatis pinnatipartitis, segmentis linearibus a mediâ parte rachidis utrinquè decrescendentibus iterum pinnatipartitis lobatis denticulatisve dentibus in aculeolos calcareos albos abeuntibus, foliis caulinis superioribus lineari-lanceolatis denticulatis, supremis ad basin capitulorum reflexis eis æquilongis, capitulis numerosis secus ramos sparsis subsessilibus terminalibusque, involucri glaberrimi squamis luteo-virentibus angustissimè et integrè membranaceo-marginatis infimis in spinam brevissimam rariùs 2 spinulis obsitam abeuntibus, intermediis in spinam flavam acerosam patulam supernè canaliculatam flosculis multò longiorem basi 2-4 spinulis obsitam abeuntibus, intimis appendice ovatâ membranaceâ integrâ terminatis, flosculis flavido-roseis non radiantibus, acheniis oblongis compressis, pappi exterioris setis albidis tenuibus ab extimis brevissimis ad interiores achenio breviores sensim auctis, seriei intimæ triangulari-lanceolatis dissitis brevissimis.

Hab. circà *Rascheya* in Antilibano et in siccissimis regionis inferioris *Hermonis*. Legi Julio 1846.

Ramosissima 1-1 $\frac{1}{2}$ pedalis, folia radicalia cum petiolo 4-5 pollic. sesquipollicem lata laciniis 1 $\frac{1}{2}$ -2 lin. latis, capitula magn. *C. calcitrapæ*, spinæ 12-14 lin. longæ basi lineam latæ. Species a. *C. calcitrapoidi* Auct. Fl. Gall. foliis multò magis dissectis lobis calcareo-aculeolatis, squamis involucri evidenter quamvis angustè membranaceis, colore flosculorum, pappo exteriori achenium non æquantì distincta. *C. hyalolepis* squamis latè hyalino-membranaceis longiùs distat.

DIAGNOSES
PLANTARUM ORIENTALIVM NOVARVM.

**PARISIIS. — TYPIS MARCI DUCLOUX ET CONS.,
VIA ÉCOLE-DE-MÉDECINE , 80.**

DIAGNOSES PLANTARUM ORIENTALIU NOVARUM

N° 11.

AUCTORE

E. BOISSIER,

SOC. PHYS. GENEV. SODALI.



PARISIIS.

TYPIS MARCI DUCLOUX ET CONS.

VIA ÉCOLE-DE-MÉDECINE, 80.

1849.

DIAGNOSES

PLANTARUM ORIENTALIVM NOVARVM.



COMPOSITÆ.

CORYMBIFERÆ.

BELLIS LONGIFOLIA Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1847.

B. perennis, radice fibris cylindricis tenuibus longis numerosis constanti, foliis uninerviis parçè et adpressiusculè hirsutis lineari-spathulatis elongatis obtusis utrinquè versùs apicem 2-4 denticulis minutissimis ascendentibus acutis obsitis, scapis folia 2-3 plò superantibus hirtulis, involucri phyllis nigris ellipticis obtusis basi parçè et adpressè albo-hirtis, ligulis pallidè roseis involucro sesquolongioribus, achenio compresso obovato obtusissimo margine crasso cincto.

Hab. in monte *Cavoutsi* provinciæ *Sitia* Cretæ alt. 5000'. Fl. Aprili. (Heldr.)

Folia majora 2-2 $1\frac{1}{2}$ poll. longa infernè longè attenuata supernè 4-5 lin. lata, capitula paulò minora eis *B. perennis* quæ differt foliis subtrinerviis obtusiusculè crenatis obovato vel oblongo-spathulatis, indumento e papillis crassioribus constanti. *B. sylvestris* longiùs distat capitulis multò majoribus, involucri phyllis acutiusculis.

ERIGERON ELBRUSENSE Boiss. in pl. Kotsch. Pers. bor. 1846.

E. cæspitosum nanum, radice fibris elongatis constanti, foliis præter margines glabros utrinquè glabris viridibus oblongo vel lineari-spa-

thulatis integris in petiolum attenuatis, caulibus hirsutis monocephalis capitulo vix longioribus, capitulis e foliis non exsertis, involucri phyllis linearibus dorso patulè papillari-hirtis basi viridibus apice scariosis purpurascentibus acuminatis, floribus fæmineis omnibus ligulatis palidè roseis subulatis disco paulò longioribus.

Hab. in schistosis ad lacum alpis *Hasartschal* in parte occidentali montis *Elbrus* Kotsch. N° 488. Fl. Jul.

Planta vix pollicaris, capitula paulò minora eis *E. uniflora* a quo præter capitula e cæspite non exserta differt involucri breviter hirta nec lanato, ligulis discum paulò tantum excedentibus.

EVAX ANATOLICA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.

E. acaulis vel e basi glomeruli centralis ramosa subumbellata ramis prostratis, foliis adpressè albo-lanatis oblongis acutis glomerulos duplò superantibus, capitulis in glomerulos planiusculos densissimè et indistinctè congestis, involucri phyllis oblongis subcarinato-cymbiformibus acutiusculis præter apicem angustè virescentem albo-membranaceis infernè nudis supernè omninò lanà crispà albà obsitis apice mucrone setuloso brevi glabro terminatis, acheniis cylindricis sub lente tenuissimè hirtulo-scabridis.

Hab. in siccis montanis Anatoliæ, monte *Ghelipel* vallis *Djoksou* Isauriæ, montibus ad orientem jugi *Gheidagh* sitis alt. 4500' (Heldr.), *Libano*. Labill. ex herb. Welb, circà *Diarbekir* Kotschy N° 489.

Ab *E. asterisciflora* et *pygmæo* facilè dignoscitur phyllis involucri non omninò vel saltem supernè glabris nec attenuato-acuminatis sed præter setulam terminalem glabram ad apicem usquè densè lanatis magis cymbiformi-plicatis. Icon *Fil. exigua* Fl. Græc. differt a nostrà plantà foliis floralibus obtusis glomerulo vix longioribus et *E. exigua* DC. et Guss. e Sicilia quæ ex cl. auctoribus species Sibthorpiana ipsa est ab *E. Anatolica* distinctissima est phyllis sensim attenuatis basi lanatis supernè nudis et forsan ab *E. pygmæa* capitulis basi magis lanatis non satis differt.

EVAX PALESTINA Boiss.

E. tota lanà adpressà grisea sub glomerulo centrali subsessili proliferè ramosa ramis prostratis iterum proliferis, foliis linearibus obtusis glomerulos duplò et ampliùs superantibus, capitulis in glomerulos

sphaericos dense congestis sed inter se distinctis apice e lanâ prominulis, involucri phyllis oblongis carinato-cymbiformibus dorso viridibus margine albo-membranaceis extûs totâ longitudine adpressè hirsutis omnibus in mucronem setaceum glabrum abeuntibus intimis brevissimè mucronatis, acheniis oblongis sub lente minutissimè puberulis.

Hab. circâ *Hierosolymam* ubi legi Aprili 1846. ineunte.

Diametro 2-4 pollicaris, folia floralia 6-8 lin. longa; affinis speciei præcedenti a quâ differt ramositate majori, foliis longioribus, glomerulis convexis nec planis, capitulis ob squamas interiores paulò longiores distinctis, involucri phyllis toto dorso nigro-viridibus longius setaceo-mucronatis.

EVAX ERIOSPHERA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.

E. tota lanâ griseâ adpressâ obsita a basi ramosissima, ramis brevissimis, glomerulis numerosis globosis densis in cespitem contiguus, foliis oblongis obtusis glomerulo globoso subbrevioribus, capitulis inter se in glomerulo indistinctis dense albo-lanatis, involucri phyllis oblongis subconvexis præter apicem virescentem omninò albo-membranaceis basi nudis supernè dense et longè albolanatis breviter acuminatis acumine glabro e lanâ non exserto, acheniis minimis oblongis glabris.

Hab. in aridis planitie *Adalia* in Pamphylia. (Heldr.)

Affinis *E. Palæstinæ* sed ab eo et *E. Anatolicâ* eximè distincta caule a basi nec proliferè et sub glomerulo centrali ramoso, foliis brevissimis, glomerulis densis contiguus, involucri phyllis non cymbiformibus non apice setacels sed acuminatis acumine e lanâ non exserto.

EVAX CONTRACTA Boiss.

E. acaulis, glomerulo unico radicali magnò, foliis adpressissimè canis glomerulum involucribus longèque superantibus basi in petiolum longè attenuatis supernè obovato-spathulatis mucronulatis post anthesin basi induratis circâ glomerulum contractis, capitulis dense congestis subindistinctis, involucri phyllis omninò membranaceis lutescentibus ovato-oblongis planiusculis in mucronem setaceum longiusculum acuminatis supernè extûs laxissimè lanatis, acheniis compressis ovato-triangularibus pruinoso-scabridis.

Hab. in *Arabia petrea* ad fines Palæstinæ (Boiss.), ad fontes petroli propè *Dalechi* Persiæ australis Kotschy N° 968.

Folia in petiolum angustum flores superantem attenuata cum eo 8-12 lineas longa supernè 2 1/2-3 lin. lata, glomerulus magnitudinis *Ev. asteriscifloræ* cui nostra species habitu affinis est et a quâ distinguitur formâ foliorum post anthesin basi contractorum, involucris phyllis angustè setaceo-acuminatis.

CERUANA SCHIMPERI Boiss.

C. perennis tota partibus junioribus sericeo-cana a basi indurata ramosa, caulibus brevibus procumbentibus erective flexuosis foliosis duris sub capitulis terminalibus semel vel pluries proliferè ramosis ramis divaricatis, foliis omnibus mollibus integris vel vix repandis oblongo-spathulatis obtusis brevissimè mucronulatis in petiolum inferiorem vix basi dilatatum cæterorum minutè auriculato-amplexicaulem angustatis, capitulis globosis subsessilibus minutis, bracteis foliaceis oblongo vel lineari-spathulatis erecto-patulis capitulo æquilongis, involucris adpressè hirti phyllis arctissimè imbricatis oblongis angustissimè membranaceis, flosculis marginalibus tridentatis paucis, paleis linearibus obtusis concavo-plicatis supernè hirtis, pappi paleis lanceolatis acutis laceris achenio adpressè hirtio æquilongis.

Hab. in *Arabia petrea* Schimper N° 719 sub *Buphtalmo graveolenti*.

Planta dumos subrotundos rigidos diametro 6-9 pollicares formans, folia inferiora cum petiolo 9-10 lin. longa apice 2-3 lata, capitula piso paulò majora. Ab *Asterisco graveolenti* præter flosculos marginales non ligulatos egregiè dignoscitur indumento magis cano, foliis nunquam pinnatifidis, capitulis dimidiò minoribus.

CHRYSPHTALMUM MONTANUM Boiss.

C. perenne multicaule basi suffrutescens totum adpressè pubescens collo parcè lanatum, caulibus tenuibus angulato-striatis foliosis erectis supernè parcè et alternatim ramosis, ramis monocephalis nudis angulato-striatis supernè subincrassatis, foliis lanceolatis utrinquè attenuatis acuminatis breviter petiolatis rigidulis nervosis integerrimis strictis, bracteis 1-2 linearibus inæqualibus capitulo sæpè longioribus, involucris adpressè hirtuli phyllis angustè lineari-lanceolatis acuminatis,

paleis setaceis plicatulis acutis, flosculis marginalibus brevioribus tridentatis, antheris basi caudâ lacerâ auctis, acheniis subtetragonis pappo albo piloso eis triplò breviori superatis.

Hab. in *Syriâ* circâ *Antab* Aucher N° 3228.

Etsi flores marginales tridentati sint hæc planta ob antheras basi caudatas *Chrysophthamo* nec *Ceruanæ* adnumeranda est et juxtâ *Ch. sternutatorium* Schultz collocanda.

CHRYSOPHTALMUM DICHOTOMUM Boiss. et Heldr. in pl. Anatol. 1846.

Ch. perenne pilis basi subincrassatis papillaribus brevibus adpressis albis pubescens subviscidum pallidè virens, collo incrassato lanato squamoso, caule unico tereti erecto flexuoso a basi alternè ramoso supernè dichotomè et divaricatim ramoso ramis nudis monocephalis apice clavato-incrassatis inanibus multistriatis, foliis inferioribus et turionum radicalium sessilium longè petiolatis, cæteris subsessilibus, omnibus oblongis vel oblongo-lanceolatis obtusiusculis integerrimis, floralibus 3-5 oblongis valdè inæqualibus capitula bracteantibus eaque sæpius superantibus, involucri patulè vel retrorsum albo-setulosi phyllis multiserialibus inferioribus paulò brevioribus subsquarroso-patentibus lineari-subspathulatis cæteris setaceis mucronatis, paleis setaceis mucronatis, flosculis omnibus quinquedentatis, acheniis tereti-subcylindricis striatis subincurvis hirtulis, antheris lacero-caudatis, pappo ad pilos brevissimos patulos vix perspicuos reducto.

Hab. in saxosis Tauri Pamphylici inter *Marla* et *Adalia* alt. 4000-4500' (Heldr.). Floret medio Julio.

Pedalis, foliâ turionum cum petiolo 2-3 pollicaria 4 lin. circ. lata, floralia capitulis sæpè duplò longiora, capitula illis *Ceruanæ pratensis* duplò majora ramo clavato 4 1/2-2 pollicari suffulta. Ab aliis generis speciebus indumento, pedunculis incrassatis, caule supernè dichotomo, pappo brevissimo distinctissima.

Ob ut videtur antiquiorem cl. Steetz *Pterochætam*, in 'Preiss. plant. Australasiæ, genus meum *Pterochæte* in Diagn. VI propositum in *Platychætæ* mutandum et ejus species sic nominandæ.

Pterochæte glutinosa. — *Platychæte glutinosa*.

Pterochæte Aucheri. — *Platychæte Aucheri*.

Pterochæte mucronifolia. — *Platychæte mucronifolia*.

Pterochæte glaucescens. — *Platychæte glaucescens*.

Inulam multicaulem. Boiss. Diagn. N° 4 ob antiquiorem *I. multicaulem* F. et M. muta in *Inulam Anatolicam* Boiss.

PULICARIA ELATA Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846.

P. perennis, caulibus basi denudatis ascendentibus dein erectis elatis foliosis supernè ramosis paniculato-corymbosis, foliis pallidè virentibus utrinquè adpressè et brevissimè subvelutinis pilis basi tuberculato-incrassatis inferioribus oblongo-linearibus spathulatis in petiolum brevem attenuatis intermediis latè lineari-spathulatis infernè subangustatis basi minutè cordato-auriculatis obtusis, rameis crebris linearibus obtusiusculis mucronulatis minutè et acutiusculè auriculatis, pedunculis nudis capitulo 2-6 plò longioribus, involucri squamis villosis lineari-subulatis adpressis, ligulis demùm reflexis angustè linearibus involucri duplò longioribus, acheniis parcè et adpressè hirtulis, pappo exteriori brevissimo coroniformi dentato interioris setis 10.

Hab. in locis humidis montis *Elbrus* propè *Derwend* Kotsch. N° 414.

Bipedalis, folia inferiora bipollicaria supernè 4-5 lin. lata, ramealia 5-7 lin. longa 1-1 1/4 lin. lata, capitula magnitudinis *Pul. uliginosæ*. Huic et *P. Kotschy* Schultz affinis sed distinctissima foliis ramulorum numerosis angustè linearibus minutè auriculatis nec oblongo-amplexicaulibus, pappo pauciseti. *P. desertorum* longiùs differt ligulis brevissimis, *P. Arabica* radice annuà, caulibus a basi ramosissimis, pedunculis tenuissimis, etc.

PHAGNALON GRÆCUM Boiss. et Heldr.

Ph. perenne dumosum caulibus basi suffrutescentibus decumbentibus supernè ramosis ramis erectis strictis densè foliosis canis foliis facie superiori junioribus subfloccosis dein glabris viridibus subtus canis oblongo-lanceolatis acutis margine undulato-sinuatis in petiolum basi dilatatum breviter auriculato-decurrentem attenuatis, supremis angustè linearibus integris, pedunculis floccosis demùm glabrescentibus, involucri campanulati glabri phyllis regulariter imbricatis adpressissimis non hyalino-marginatis ab infimis triangularibus lanceolatis acutiusculis apice fusciscentibus ad intermedias lineari-lanceolatas obtusas et superiores angustè lineares acutas flores excedentes sensim elongatis.

Ph. intermedium DC. quoad locos ex Oriente et Reut. et Marg. Fl. Zacynth. non Lagasca.

Hab. in rupestribus regionis calidæ totius Græciæ ad *Patras*, *Nauplia* (Boiss.), Atticâ ad *Acropolim* (Sprun.), Messeniâ ad *Pylos* (Heldr.). *Cretâ* (Sieb. sub *Con. saxatili*), *Zacyntho* (Marg.).

Var. *oxyphylla*. — Foliola involucris inferiora acutiora, superiora acutissima.

Hab. *Algeriæ* (Herb. Fauché).

Hæc species quam ipsi et auctores plures cum *Ph. saxatili* et *rupestri* confusimus ab eis sequentibus notis egregiè differt. A priori distinguitur foliis latioribus oblongo-lanceolatis nec sublinearibus, involucris phyllis non squarroso-patentibus nec margine hyalinis undulatisque. *Ph. rupestre* e Syriâ, Palæstinâ, Persiâ australi totâque regione Mediterraneâ occidentali oriundum sed quod hucusquè nec e Cretâ nec e Græciâ vidi, nostræ speciei foliorum formâ et undulatione involucris phyllis non squarrosis propius accedit sed differt phyllis conspicuè latioribus infimis ovatis intermediis oblongo-ellipticis omnibus præter intimas obtusissimis apice subscariosis subcucullatis. *Conyza saxatilis* Fl. Græc. tab. 862 quoad locum nostram speciem refert sed formâ involucris squamarum potius *Ph. rupestre* refert et ideò dubia est.

Conyza intermedia Lag. — *Ph. Lagascae* Cass. e descriptione et etiam e specimine Murcico ab ipso Lagasca mihi olim dato est *Ph. saxatile* ipsisimum.

ANTHEMIS PERSEPOLITANA Boiss. (Sect. *Chrysanthemis*.)

A. annua pluricaulis, caulibus ascendentibus abbreviatis parcè ramosis adpressè puberulis, foliis sub lente parcè et adpressè hirtulis virentibus ambitu linearibus pinnatisectis segmentis brevissimis in lobulos paucos ovato-oblongos obtusos confertos pinnatisectis, capitulis pedunculatis terminalibus, involucris glaberrimi phyllis omninò et latè scariosis pallidis ovatis erosulis cucullatis, ligulis flavis breviter ovatis disco brevioribus, flosculis tubulosis basi hirsutis, receptaculi convexi paleis lineari-setaceis acutis, acheniis...

A. scariosa Boiss. in pl. Kotsch. Pers. Austr. non DC.

Hab. in planitie propè ruinas *Persepolis* Kotschy N° 249.

Ab affini *A. scariosâ* cui primùm conjunxeram egregiè differt foliorum lobis non elongatis lineari-setaceis, ligulis brevissimis, paleis longioribus angustioribus non angustè lanceolatis nec carinato-plicatis.

A. hyalina DC. differt involucri phyllis pubescentibus, corollâ basi glabrâ, etc.

ANTHEMIS CORNUCOPIÆ Boiss. (Sect. *Euanthemis*.)

A. annua a basi ramosa, caulibus ascendentibus subsimplicibus glabris, foliis parçè hirtulis a basi tenuissimè bipinnatisectis laciniis setaceis mucronulo terminatis supremis pinnatisectis brevissimis, capitulis solitariis, involucri parçè hirti phyllis oblongo-linearibus præternervum medium subcarinantem virentem pallidis appendice ovato-triangulari scariosâ fuscâ secûs margines angustè decurrenti terminatis, receptaculo subgloboso toto paleaceo, paleis lanceolatis carinatis in mucronem subpungentem abeuntibus integris achenio longioribus dorso viridibus cæterùm scariosis, ligulis albis oblongis disco subbrevioribus demùm reflexis, florum hermaphroditorum tubo basi intrâ coronam achenii inflato ovato-pyriformi spongioso indurato hirtio purpureo, acheniis a basi angustiori obsoletè tuberculatâ sensim dilatatis obconicis obsoletè angulatis in coronam crassam dimidiatam corticosam sublobatam eis æquilongam abeuntibus, exterioribus angustioribus subcylindricis basi magis tuberculatis.

Hab. in planitie *Esdraëlon* Galilææ (Boiss.)

Habitu *Marutam fuscata* refert sed lacinia foliorum tenuiores, ligulæ breviores, receptaculum *Anthemidis*. Species insignis acheniis cornucopioideis maturis cum coronâ 2 $\frac{1}{2}$ lin. circ. longis; character tubi corollini basi spongioso-incrassati in *A. scariosâ* et pluribus aliis speciebus occurrit.

A. Pamphylica Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. ad *A. pseudocotulam* Boiss. Diagn. VI reducenda est.

ANTHEMIS RASCHEYANA Boiss. (Sect. *Euanthemis*.)

A. annua adpressè hirta grisea, caule pumilo infernè folioso ramosoque ramis arcuato-ascendentibus, foliis ambitu oblongis petiolatis bipinnatisectis lobulis brevibus tenuissimis confertis, capitulis pedunculo gracili longo fructifero non clavato suffultis, involucri phyllis glabriusculis oblongis latè et pallidè scariosis sublaceris, ligulis albis ovato-oblongis disco brevioribus citò reflexis, receptaculi hemisphærici paleis oblongo-lanceolatis obtusis vel truncatis denticulatis nervo

in aristam brevem exserto, acheniis omnibus albis tenuiter cylindricis lævibus obsolete striatis nudis.

Hab. in Antilibano inter *Rascheya* et *Damascum* Maio. (Boiss.)

Planta circ. 4 pollicaris, pedunculi parte nudā sesquipollicem longi, capitula eis *A. arvensis* minora; huic affinis sed distinctissima staturā minori, palearum formā, ligulis abbreviatis, acheniis conformibus externis margine non tumidis, etc.

ANTHEMIS CRASSIPES Boiss. (Sect. *Euanthemis*.)

A. annua adpressissimè hirta grisea a basi divaricatim ramosissima, foliis ambitu ovato-rotundis bipinnatisectis partitionibus divergentibus lobulis minutis brevibus, capitulis pedunculo longo nudo demum clavato-incrassato suffultis, involucri phyllis adpressissimis adpressè hirsutis ovatis latè scarioso-marginatis dentato-laceris, ligulis albis oblongis disco æquilongis, receptaculi hemisphærici paleis angustè lanceolatis carinatis in mucronem rigidum attenuatis integerrimis, acheniis tetragonis lævibus estriatis latere interiori coronā brevissimā dimidiatā marginiformi exteriorum fuscā crassiusculā lobatā interiorum albidā acutā superatis.

Hab. circā *Rascheya* et in *Antilibano* cum præcedenti. (Boiss.)

Hab. et magnitudo capitulorum *A. arvensis* var. *incrassata* sed magis divaricata; ab eā distinctissima involucri phyllis latius scariosis, receptaculo non conico, acheniis non profundè sulcatis coronā dimidiatā nec annulo tumido cinctis, corollā basi non incrassatā, etc. Variat 3-4 pollic. pedalisque et ejus formæ pumilæ ab *A. Rascheyana* cui pedunculis elongatis et habitu similes sunt distinguuntur pedunculis incrassatis, involucri phyllis hirtis, palearum et acheniorum formā, lobis foliorum magis divaricatis.

ANTHEMIS AMMOPHILA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 4846. (Sect. *Euanthemis*.)

A. annua a basi pluricaulis, caulibus pumilis procumbentibus erectisque subsimplicibus rubellis glabriusculis, foliis petiolatis minutis adpressè hirtis griseis pinnatisectis segmentis minimis in lobulos 2-5 confertos oblongos acutiusculos iterum pinnatis, pedunculis glabris fructiferis clavato-incrassatis, involucri phyllis adpressè hirtis supernè latè albo-scariosis oblongis obtusissimis suberosis, receptaculi conici

paleis oblongis caripatis acutis nervo carinali viridi excepto hyalinis flosculis paulò brevioribus, ligulis albis oblongis disco longioribus, acheniis minutis quadrangulis basi attenuatis lævibus apice truncatis obsolete et acutè marginatis omnibus conformibus.

Hab. in arenosis Pamphyliæ ad littora maris propè ostium fluv. *Melas* infra *Monargat*. Fl. April. (Heldr.)

Planta 3-4 pollicaris, folia cum petiolo 5-7 lin. longa 2 lata ea *A. secundirameæ* referentia sed segmenta lateralia breviora, capitula magna diametro pollicaria. Species pulchella ex affinitate *A. secundirameæ* quæ differt foliis glabris, ligulis abbreviatis, acheniis breviter coronatis et *A. peregrinæ* L. — *tomentosæ* d'Urv. indumento cano, ligulis minoribus et acheniis coronâ auriculæformi donatis distinctæ.

ANTHEMIS CASSIA Boiss. (Sect. *Euanthemis*.)

A. perennis basi suffrutescens cæspitosa tota sericeo-cana, foliis secus partem inferiorem caulium turionesque steriles congestis longè petiolatis ambitu oblongis pinnatisectis 3-4 jugis rachide segmentisque linearibus hisce profundè 2-3 fidis laciniis linearibus acutiusculis, caulibus elongatis simplicissimis præter basin foliosam nudis monocephalis, capitulis magnis, involucri phyllis adpressissimis lanceolatis acutis pallidis sparsim et breviter præsertim ad margines albolanatis, receptaculi hemisphærici paleis oblongis concavo-subcarinatis obtusis eroso-subdentatis nervo medio in mucronem rigidum flosculos æquantem producto, ligulis albis linearibus disco vix brevioribus, acheniis albis lævibus quadrangulis coronâ hyalinâ tenerrimâ brevi truncatâ suberosâ dimidiatâ latere interiori coronatis.

Hab. in regione superiori *Cassii*. Floret Junio. (Boiss.)

Folia cum petiolo tripollicaria segmentis 6-10 lin. longis rachide laciniisque sesquilineam circ. latis, caules pedales longioresque, capitula magnitudinis *Leucanthemi vulgaris*. Species pulcherrima ab omnibus *A. montanæ* varietalibus distincta foliorum laciniis multò latioribus, pedunculis longissimis, capitulis duplò majoribus diametro sesquipollicaribus. *A. absinthifolia* habet indumentum magis sericeum, folia ambitu ovata bipinnatisecta laciniis multò brevioribus paulòque angustioribus, capitula tertiâ parte minora multò brevius et tenuius pedunculata.

ANTHEMIS ANATOLICA Boiss. (Sect. *Euanthemis*.)

A. perennis basi subindurata cæspitosa, caulibus pluribus tenuibus

rigidulis ascendentibus infernè ramosis vel simplicibus, foliis adpressè cinereis turionum steriliū petiolatis ambitu ovatis bipinnatisectis lacinii angustissimè oblongo-linearibus obtusis, foliis caulinis paucis subsessilibus vel sessilibus a basi subsimpliciter pinnatisectis, capitulis longè pedunculatis, involucri phyllis adpressissimis breviter et parcè hirtis margine rufescentibus lanceolatis acutis interioribus apice obtusioribus magis scariosis, receptaculi conici paleis lanceolatis carinatis apice eroso-subdentatis in mucronem flosculos æquantem attenuatis, ligulis albis oblongis discum subæquantibus, acheniis albis quadrangulis obsoletè striatis exterioribus præsertim ad strias minutè tuberculatis coronâ brevissimâ integrâ dimidiatâ acutâ latere interiori superatis.

Var. β *discoidea*. — Sæpius minùs cinerea vel virescens lobi foliorum paulò magis divaricati, ligulæ nullæ.

Hab. in montosis et submontosis siccis Anatoliæ, *Cadmi* radices ad orientem urbis *Denisleh* et inter *Denisleh* et *Geyra*, in parte superiori *Mesogis* suprâ *Tralles*. Legi Jun. 1842.

Habitu affinis nonnullis formis minoribus *A. montanæ* quæcum eam confusi sed distincta capitulis longiùs pedunculatis, receptaculo conico, acheniis brevioribus marginalibus tuberculatis. Varietas in calidioribus crescens acheniis tuberculatis ab omnibus formis *A. Chryscephalæ* dignoscitur. *A. Reuteriana* nostræ speciei habitu affinis acheniis lævibus coronâ eis æquilongâ superatis eximiè differt.

ANTHEMIS RHODENSIS Boiss. (Sect. *Euanthemis*.)

A. basi suffruticosa ad partes juniores adpressè hirta cinerea, ramis tenuibus infernè densiusculè foliosis in pedunculum nudum monocephalum abeuntibus, foliis a basi pinnatisectis rachide segmentisque paucis planiusculis lineari-subulatis mucronulatis inferioribus indivisis superioribus terminalique paulò longioribus longiusculè 2-3 fidis, capitulis parvis discoideis, involucri phyllis triangularibus lanceolatisque acutis pallidis margine fusciscentibus adpressissimis, paleis linearibus carinatis apice in mucronem flosculos æquantem abruptè attenuatis, acheniis.....

Hab. in insulâ *Rhodo* Aucher N° 3253.

Affinis habitu et capitulorum magnitudine *A. pectinatae* et *Smyrneæ* ab eis distincta caulibus suffruticosis, segmentis foliorum tenuissimis quidem sed paucioribus utrinquè tantum 3-4 elongatis 2-3 lineas longis.

ANTHEMIS COELOPODA Boiss. (Sect. *Cota*.)

A. annua parçè et minutè puberula vel glabrescens viridis, caule crassiusculo ferè a basi divaricatim ramoso, ramis dichotomis, foliis ambitu ovatis bipinnatisectis rachide integrâ, partitionibus linearibus integris dentatis vel etiam lobatis dentibus lobisque divaricatis brevissimè mucronatis, capitulis magnis pedunculo valdè clavato-incrassato intus inani suffultis laxè corymbosis, involucri phyllis pallidis arcè imbricatis ab infimis triangularibus acutis ad intima lanceolata ciliatula apice breviter scariosa obtusiuscula elongatis, ligulis albis disco longioribus, receptaculi hemisphærici paleis oblongis carinatis abruptè in mucronem rigidum eis æquilongum flosculos æquantem contractis, acheniis tetragono-compressis ancipitibus exalatis utrinquè obsoletè 4-2 nerviis coronâ brevissimâ argutâ integrâ terminatis.

A. altissima Boiss. in Pinard pl. Anat. exs. non L.

Hab. in cultis planitie *Smyrnensis* (Boiss.) circâ *Geyra* Cariæ. (Pinard.)

Facie similis *A. altissimæ* sed a basi et divaricatim ramosa, segmenta et lobi foliorum magis divaricata brevissimè et subobsoletè mucronata, pedunculi crassiores inanes, achenia minora angustiora manifestè coronata utrâque facie præter nervum carinalem ferè lævia vel obsoletè 4-2 striata nec argutè 10 striata. *A. Cota* pedunculis non incrassatis, paleis sensim attenuatis, flosculis brevioribus, acheniis utrinquè 5 striatis et *A. austriaca* formâ foliorum, capitulis dimidiò brevioribus, pedunculis non incrassatis, acheniis subalatis longius differunt.

ANTHEMIS PESTALOTZÆ Boiss. (Sect. *Cota*.)

A. annua tota adpressè hirta grisea a basi multicaulis, caulibus tenuibus pumilīs simplicibus vel parçè ramosis, foliis parvis pinnatisectis segmentis minimis ovatis in lobulos confertos mucronulatos oblongos pinnatisectis, pedunculis tenuibus apice subincrassatis, capitulis parvis, involucri phyllis hirtis adpressissimis scariosis pallidis infimis acutis superioribus oblongis obtusis, receptaculi conici paleis oblongis carinatis obtusis mucrone brevi flosculos æquanti terminatis, acheniis subancipiti-compressis utrinquè obsoletè 5 striatis coronâ brevissimâ eximie denticulato-fimbriatâ terminatis.

Hab. propè *Elmalu* Lyciæ, legit et comm. cl. Dr Pestalozza, in parte inferiori montis *Taktalu* propè *Smyrnam*. (Boiss.)

Caules 4-5 pollicares, capitula magnit. formarum minorum *A. arvensis* a quâ acheniorum formâ, paleis obtusis mucronatis statim dignoscitur. Affinior *A. Austriacæ* quæ differt segmentis foliorum lineari-oblongis eximie pectinatis, paleis lanceolatis acutis, acheniis coronâ integerrimâ superatis.

ANACYCLUS NIGELLÆFOLIUS Boiss.

A. annuus sparsim et longè hirsutus, caule tenui erecto folioso simplici monocephalo vel medium versùs 4-2 ramis monocephalis aucto, foliis inferioribus petiolo basi pectinatim laciniato suffultis pinnatisectis laciniis rachideque tenuissimè lineari-setaceis profundè 2-3 partitis superioribus sessilibus laciniis indivisis omnibus mucronatis, pedunculo adpressè hirto longiusculo nudo fructifero sensim incrassato, capitulis parvis, involucri adpressè hirti pallidi phyllis adpressis inferioribus triangularibus acutis interioribus oblongis obtusis, ligulis minimis albis ovato-oblongis disco multò brevioribus, flosculis disci æqualiter quinquedentatis, paleis latè oblongis obtusis planis brevissimè mucronatis, acheniis plano-compressis obcordatis, alis hyalinis in lobos rotundatos abeuntibus semini æquilatis.

Hab. in collibus Antilibani inferioris circâ *Rascheya*. Fl. Maio. (Boiss.)

Caules semipedales vel paulò longiores, folia inferiora cum petiolo pollicaria, pedunculus bipollicaris fructifer apice sesquilineam diametro latus, capitula eis *A. clavati* ferè dimidiò minora, ligulæ paucæ vix 2 lineas longæ, achenium 2 lin. circ. longum latumque. Species caulibus erectis pumilis simpliciusculis, foliorum laciniis tenuissimis elongatis, capitulis minutis, ligulis abbreviatis etc. distinctissima.

LEUCOCYCLUS Boiss.

Capitulum multiflorum heterogamum. Flores radii ligulati uniseriales fœminei, flores disci tubulosi hermaphroditi quinquedentati exalati basi in duo labia breviter ovata celluloso-corticosa achenii apici utrinquè applicata producti. Receptaculum convexum paleis oblongo-linearibus concaviusculis obtusis denticulato-laceris muticis flosculos non æquantibus. Involucrum latè campanulatum pluriseriale phyllis persistentibus imbricatis membranaceis. Achenia plano-compressa cu-

neato-retusa alà integrà utrinquè apice in lobum brevissimum obtusum abeunti marginata (immatura) epapposa. Antheræ basi obtusæ ecaudatæ appendiculatæ inclusæ. Styli rami circinnati exappendiculati. — Herba perennis Orientalis alpina foliis *Achillearum Santolinearum* donata, capitulo amplo *Leucanthemi*. Genus affine *Anthemidi* et *Anacyclo*, a priori acheniis compressis obcordato-alatis discedens, a posteriori distinctum corollis disci non bialatis acheniisque epapposis, ab utroque præterea corollæ tubo basi in duo labia plana spongioso corticosa producto.

LEUCOCYCLUS FORMOSUS Boiss.

L. formosus totus villo rufescenti adpressiusculo lanatus, caulibus erectis densiusculè foliosis aliis sterilibus aliis apice nudis monocephalis, axillis foliorum fasciculos vel ramulos foliosos edentibus, foliis linearibus pinnatisectis segmentis minimis confertissimè imbricatis transversis ovatis convoluto-concavis acutis crebrè mucronulato-denticulatis, pedunculo apice incrassato, ligulis albis latè oblongo-spathulatis trilobis disco longioribus, involucri phyllis pallidis oblongis vel oblongo-linearibus angustè hyalino-marginatis obtusis adpressè hirtis.

Anacyclus formosus Fenzl. in Kotsch. pl. Taur. exs.

Hab. in alpinis *Tauri Cilioi*, Kotsch. N° 298.

Caules steriles semipedales, fructiferi 8-10 pollicares, folia pollicaria lineam circ. tantum lata, capitulum magn. ejus *Leucanthemi montani*, ligulæ 8-9 lin. longæ apice lin. 3 et amplius latæ.

ARTHROLEPIS Boiss.

Capitulum multiflorum heterogamum floribus radii ligulatis flavis disci tubulosis hermaphroditis quinquedentatis compresso-bialatis. Involucrium latè campanulatum multiseriale phyllis imbricatis ad medium subcoriaceis margine latè scarioso-hyalinis sectis faciem exteriorem receptaculi areolâ transversè ovatâ basilari articulatis anthesique peractâ deciduis. Receptaculum obconicum extus basibus involucri phyllorum areolatum supernè plano-concavum lineis brevibus elevatis lineari-oblongis concentricis ad acheniorum basin sitis exaratum. Paleæ oblongo-lineares carinatæ virescentes marginè et apice latè

hyalinæ obtusæ denticulatæ post involucri phylla tandem deciduæ. Anthera ecaudatæ appendiculatæ inclusæ. Styli rami non appendiculati apice barbulati. Achenia (immatura) oblongo-linearia plana angustè alata apice paulò latiori truncata epapposa. Herba perennis Orientalis facie *Anthemidis*, foliis *Achillearum Santolinearum* donata. Genus *Anthemidi* et *Achilleæ* affine utroque generi ab auctoribus prius associatum a priori acheniis manifestè alatis subretusis, a posteriori capitulis magnis solitariis et habitu, ab ambobus receptaculo plano-concavo involucrique phyllis insigniter jam antè paleas basi articulata sedcedentibus distinctum.

ARTHROLEPIS MEMBRANACEA Boiss.

A. perennis tota cano-tomentosa basi suffrutescens, caulibus simplicibus monocephalis vel supernè parcè ramosis, foliorum linearium pinnatisectorum segmentis minimis confertim imbricatis transversis 3-4 partitis partitionibus ovatis crebrè denticulatis denticulis mucronatis, involucri phyllis infimis ovato-rotundis interioribus oblongis omnibus obtusis latè albo-hyalinis nitidis dorso adpressiusculè hirtis, ligulis breviter oblongis luteis disco paulò brevioribus.

Anthemis membranacea Labill. Déc. 3 tab. 9. — *Achillea membranacea* DC. Prod.

Hab. in *Libano* (Lab.), in collibus ad meridiem *Damasei* (Boiss.), in *Mesopotamiâ* inter *Alep* et *Orfa* Kotsch. N° 6 (forma minùs incana).

A. *imbricata* Cels. tab. 54 e specimine imperfecto herb. DC. hujus generis quoque esse videtur sed certè speciei præcedentis non conspecifica, folia sunt enim formæ diversæ.

ACHILLEA OXYDONTA Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Filipendulinæ*.)

A. caulibus basi procumbentibus nudis dein ascendentibus foliosis erectis flexuosis elatis striatis glabriusculis simplicibus vel ex axillis inferioribus ramulosis, foliis sessilibus linearibus pinnatisectis rachide planà latiusculà segmentis remotiusculis minimis dentiformibus triangulari-oblongis bi vel trilobis lobis in mucronem abeuntibus, foliis summis acutè et pectinatim pinnatifidis, corymbo terminali denso composito subgloboso ramis circinnato-recurvis, pedicellis involucrum non

æquantibus, capitulis cylindricis paucifloris, involucri laxè lanati phyllis oblongis præter lineam mediam virescentem albo-membranaceis apice pallidè rufescentibus fimbriato-laceris, ligulis flavis 2-3 involucri multò brevioribus transversè latioribus brevissimè subtrilobis, paleis valdè lanatis flores non æquantibus.

Hab. in latere orientali faucis *Murch Mahal* ad radices montis *El-brus* Kotschy N° 159.

Caules tenues pedem et ampliùs longi, folia 9-11 lin. longa 2 lin. circ. lata, segmentis utrinquè 8-10. Corymbus diametro circ. pollicaris, capitula illis *A. millefolii* ferè æquilonga sed triplò tenuiora pauciflora. Species distinctissima propè *A. ageratum* et *coronopifolium* collocanda.

A. ambigua Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. N° 346 e monte *Dema-wend*. a formis *A. millefolii* non satis differt et huic admuneranda.

ACHILLEA TAYGETEA Boiss. et Heldr. (Sect. *Filipendulina*.)

A. tota densè et brevissimè albo-tomentosa basi suffruticulosa caules fertiles fasciculosque steriles foliorum edens, caulibus ascendentibus simplicissimis supernè nudis corymbum parvum compositum densissimum ferentibus, foliis ambitu linearibus pinnatisectis segmentis oblongis basi attenuatis in lacinias oblongas obtusas sæpè bilobas pinnatipartitis, foliis radicalibus petiolatis supremis sessilibus abbreviatis segmentis dentatis, capitulis minutis ovatis valdè congestis pedunculo eis breviori suffultis, involucri phyllis sordidè et breviter albo-lanatis pallidis ovatis oblongisve obtusis, flosculis marginalibus 4-5 fæmineis semiligulatis limbo minimo cæteris vix ampliori longiorique transversè 4-5 lobulato, acheniis oblongo-linearibus basi angustatis compressis angustissimè albo-marginatis, paleis oblongis concavis glabris obtusiusculis apice sublaceris.

A. Ægyptiaca Fl. Græca tab. 892 non L.

Hab. in regione excelsiori Taygeti. (Sibth., Heldr.)

Folia radicalia cum petiolo 2-2 1/2 poll. longa, 5 lin. lata, cætera breviora et angustiora, caules 1 1/2-1 pedales tenues, corymbi magnitudine inter 4 et 12 lineas diametro variantes polycephali, capitula magnit. eorum *A. millefolii*. Pulchra species a quâ *A. Tournefortii* — *A. Ægyptiaca* L. Tournef. Voy. pag. 87 egregiè differt præter stationem in calidis demissioribus, segmentis foliorum subrotundo-crenatis, corymbo ampliore folia inferiora elongata vix superanti, capitulis ma-

joribus, ligulis majoribus ovatis etc. *A. clypeolata* Sibth. affinis quoque differt paleis villosis, ligulis concavis, etc.

ACHILLEA TALAGONICA Boiss. in pl. Kotsch. Pers. bor. 1846. (Sect. *Santolinoideæ*.)

A. caulibus tenuibus erectis simplicissimis subangulatis foliosis adpressissimè hirtis albidis apice corymbum parvum polycephalum densum compositum ferentibus, foliis sparsis angustissimè linearibus glabrescentibus pinnatisectis segmentis transversis cucullatis ovato-rotundis 2-3 partitis mucronulato-denticulatis confertissimè imbricatis eximè distichis, pedunculis tenuibus capitulo æquilongis, capitulis parvis, involucri hemisphærici brevissimè hirti phyllis oblongis obtusis margine amplissimè scariosis, paleis linearibus carinato-p'licatis hyalinis supernè hirsutis obtusiusculis, ligulis paucis minimis flavis transversè latioribus subreniformibus 2-3 lobis.

Hab. in argillosis propè *Gattade* vallis *Talagon* montis *Elbrus* Kotschy N° 549.

Folia ferè pollicaria lineam dimidiam tantum lata, capitula magnitudinis *A. teretifoliæ*. Species propter foliorum segmenta angustissimè et densissimè disticha propè *A. microlobam* collocanda quæ distinctissima est foliis fasciculatis, caulibus teretibus, ligulis pallidè ochroleucis.

ACHILLEA LYCAONICA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Santolinoideæ*.)

A. caulibus angulato-striatis rigidis foliosis erectis adpressè canescentibus simplicibus vel infernè ramosis, corymbo terminali densissimo compacto polycephalo ramis angulatis, foliis sparsis virescentibus linearibus teretiusculis pinnatipartitis segmentis transversis laxiusculè imbricatis tripartitis lobis crustaceo-marginatis valdè spinuloso-mucronulatis, pedunculis crassis capitulo brevioribus, capitulis ovatis mediocribus, involucri parcè et adpressè hirti phyllis ab infimis ovatis ad intima oblonga sensim auctis angustè membranaceis, paleis oblongis carinatis acuminatis glabris, ligulis minimis flavis transversè sublatioribus trilobis.

Hab. propè *Souliman hatsi* ad radices montis *Karadagh* in aridis planitie *Isauriæ*.

Pedalis, folia ferè pollicaria lineas 1-1 $\frac{1}{4}$ lata, corymbi diametro 1-1 $\frac{1}{2}$ pollicares, capitula illis *A. teretifoliae* duplò majora. Convenit cum specie præcedenti caulibus angulatis foliisque sparsis sed differt foliorum latiorum segmentis non arcuè imbricatis, pedunculis crassis abbreviatis etc. *A. conferta* DC. magis affinis differt caule cano, capitulis subsessilibus, involucri phyllis etiam inferioribus oblongis, foliis angustioribus arcuè imbricatis. *A. albicaulis* C. A. M. ab hac et a præcedente foliorum lobis distinctis remotiusculis statim dignoscitur.

ACHILLEA SULPHUREA Boiss. et Heldr.

A. basi suffrutescens multicaulis, caulibus teretibus elatis simplicibus foliosis adpressè canis axillis foliorum fasciculiferis, foliis angustè lineari-teretiusculis adpressè canescentibus pinnatisectis segmentis minutissimis transversis densè et distichè imbricatis ovato-rotundis concavis trilobis minutissimè denticulatis, corymbis terminalibus compositis polycephalis densiusculis ramis elongatis, pedunculis capitulo 2-3 plò longioribus, capitulis mediocribus ovato-rotundis, involucri densè et brevissimè tomentello-canescentis phyllis adpressissimis vix membranaceis infimis ovatis cæteris oblongis, paleis oblongis carinatis obtusis apice ciliatis, ligulis sulphureis reniformibus retusis disco æquilongis.

A. Aleppica in pl. Anat. Heldr. exs. non DC.

Hab. in *Cappadocià ad Euphratem* (Auch. N° 3294), in herbidis siccis *Tauri Isaurici* inter *Ermenek* et *Tourtchalar* (Heldr.), ad radices *Antilibani* inter *Damascum* et *Zebdani*. (Boiss.)

Caules pedem et ampliùs longi, folia sæpè sesquipollicem longa lineæ $\frac{3}{4}$ lata, capitula magnit. eorum *A. vermiculatae* sed phyllis duris arcuè congestis. Species ex citatione erroneà plantæ Aucherianæ in DC. Prodr. a nobis primùm adnumerata *A. Aleppica* DC. — *trilingulata* Schultz in Kotsch. pl. Kurd. quæ capitulis tenuissimis omninò diversa. Accedit ad *A. Damascenam* DC. quæ ab eà facile dignoscitur foliis multò brevioribus deflexis flexuosis segmentis longioribus, capitulis intensè aureis, paleis glaberrimis supernè omninò hyalinis.

AMMANOTHUS. Boiss. et Heldr.

Capitulum multiflorum heterogamum ligulis neutris vel nullis, flosculis hermaphroditis tubulosis quinquedentatis non compressis eis

peripheriæ 1-2 serialibus purpureis cæteris luteis. Involucrum imbricatum latè campanulatum squamis margine angustè scariosis. Receptaculum hemisphæricum nudum punctatum. Antheræ appendiculatæ erostratæ. Styli rami breves apice ciliatuli. Achenia omnia conformia teretia obsoletè striata pappo coroniformi hyalino brevi fimbriato-lacero superata. — Herbæ Cretenses annuæ pumilæ multicaules facie *Cotulæ* vel *Anthemidis*.

Genus acheniis et habitu *Anthemidis* donatum ab eâ receptaculo nudo diversum, a *Pyrethro* ligulis cum adsunt neutris, acheniis non regulariter costatis, a *Cotulâ* corollæ tubo ecalcarato, acheniis nec stipitatis nec calvis distinctum.

AMMANTHUS MARITIMUS Boiss. et Heldr.

A. annuus, caulibus e collo numerosis procumbentibus tenuibus brevibus rubellis glabriusculis ramosissimis, foliis adpressè canescentibus minimis, radicalibus et inferioribus ovatis oblongisve longè petiolatis ad medium usquè 3-7 lobatis lobis minutis ovatis obtusissimis, intermediis sessilibus, superioribus secus ramos oblongo-spathulatis integerrimis, capitulis ad apicem ramorum filiformium supernè nudorum solitariis discoideis, involucri adpressè hirti phyllis adpressis oblongo-linearibus obtusis viridibus angustè albo-membranaceis, acheniis pappo denticulato-lacero eis triplò breviori latere exteriori abbreviato superatis pellucidè glanduloso-tuberculatis marginalibus subincurvis.

Amm. agiratifolius Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1847.

Hab. in arenosis maritimis promontorii *Sidero* Cretæ Maio. (Heldr.)

Caulis 5-6 pollicares, folia inferiora 2-3 lin. longa petiolo 3-4 lin. longo suffulta, superiora indivisa, capitula magnit. eorum *Lyonnetiæ abrotanifoliæ*, peduncula tenui 1-2 pollicari suffulta. Nomen specificum mutavimus post inspectionem Floræ Græcæ quæ nos docuit *Anthemidem agiratifoliam* plantam diversissimam perennem veramque *Anthemidem* esse.

AMMANTHUS FILICAULIS Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1847.

A. annuus, caulibus e collo numerosis filiformibus procumbentibus erectisve simplicibus monocephalis rariùs parçè ramosis, foliis parçè et adpressè hirtis canescentibus minutis radicalibus oblongis pinnatis

partitis petiolatis segmentis 5-7 oblongis basi attenuatis 2-3 partitis lobis oblongis acutiusculis, foliis intermediis subsessilibus pinnatisectis segmentis linearibus acutis indivisis, summis paucis linearibus integris, pedunculis nudis sub capitulo subincrassatis, capitulo ligulato, involucri adpressè hirti phyllis adpressis oblongo-linearibus obtusis latiusculè membranaceis, ligulis 5-7 ex sicco albidis breviter ovatis obsolete trilobis disco brevioribus, acheniis parè glandulosis pappo subdimidiato eis triplò breviori suffultis.

Hab. in saxosis inter frutices propè promontorium *Sidero* Cretæ. (Heldr.)

A. specie præcedenti distinctissimus foliis pinnatisectis absque petiolo 5-6 lin. longis acutè lobatis, caulibus subsimplicibus tenuioribus, involucri phyllis magis scariosis, etc. Flosculi marginales ligulis contigui in hac specie quoque purpurascentes sunt sed ad centrum capituli eundo sensim et gradatim in flavum vergentes.

CHAMÆMELUM Visian. Fl. Dalm. II, pag. 84.

Gastrostylum et *Tripleurospermum* Schultz Tanac. — *Matricariæ* sp. DC.

Genus meo sensu valdè naturale, achenio latere exteriori convexo ecostato interiori bisulco trisulcato costis omnibus e pappi substantiâ formatis lateralibus marginantibus distinctum, inter *Matricariam* et *Pyrethrum* collocandum. Prior differt receptaculo cavo conico, achenio unilateraliter quinquecostato, posterius distinguitur achenii teretis costis æqualibus æquidistantibus. Nomen Bauhinianum *Chamæmeli* propter affinitatem cum *Chamomilla* aptissimum felicissimè meo sensu a cl. Visiani huic generi restitutum fuit; sectio enim *Anthemidis* a cl. DC. eodem nomine designata minimè naturalis et nullo modo servanda. Species *Chamæmeli* hucusquè mihi notæ sequentes sunt.

Perennia.

CHAMÆMELUM ELONGATUM Boiss. — *Pyrethrum elongatum* F. et M.

CHAMÆMELUM CAUCASICUM Boiss. — *Pyrethrum caucasicum* W.

CHAMÆMELUM AMBIGUUM Boiss. — *Pyrethrum ambiguum* Ledeb.

In hac specie et in præcedenti achenia interna compressione sæpè medio dorso subcarinata esse videntur.

CHAMÆMELUM OREADES Boiss. — *Matricaria oreades* Boiss. Diagnos. VI. Hanc speciem in Libano anno 1846 fructiferam legi, ejus achenia nigricantia sunt dorso convexa epunctata ventre alba tricosata costis crassis latitudine sulcos superantibus, coronâ achenio quadruplò breviori lobatâ.

Var. β . canescens. — Major, pedalis et ultrâ, folia adpressè hirta grisea, involucri phylla magis fusca.

Hab. in rupibus Antilibani ad *Souk Wadi Barrada* Maii fine fructif. (Boiss.)

Annua vel Biennia.

CHAMÆMELUM PRÆCOX Vis. loc. cit. — *Pyrethrum præcox* MB. — *Matricaria præcox* DC. — *Matricaria modesta* Boiss. in pl. Kotsch. Pers. bor. 1846. — Hanc speciem quoad lacinias setaceas foliorum plùs minùs elongatas et glandulas binas apicis achenii plùs minùsve notatas variabilem e *Tauriâ*, *Asiâ minori*, *Persiâ*, *Syriâ* ad *Aleppum* jam vidi.

CHAMÆMELUM TRICHOPHYLLUM Boiss. — *Chrysanthemum trichophyllum* Boiss. Diagn. IV et *Matricaria trichophylla* Boiss. Diagn. VI. — *Cyarethrum trichophyllum* Gris. spicil.

CHAMÆMELUM UNIGLANDULOSUM Vis. Fl. Dalm. tab. 54. — Habitu et achenii formâ speciei præcedenti simile tamen distinctum videtur ob achenium dorso transversè glanduloso-rugosum dictum nec lævissimum; pori glandulares apicales bini insuper in unum quoque conjuncti, sed hæc nota variabilis est.

CHAMÆMELUM DISCIFORME Vis. loc. cit. — *Chrysanthemum disciforme* F. et M. — *Matricaria disciformis* DC. In hac specie nunquam ligulas etiam minimas mihi videre contigit; variat papposa et præsertim epapposa. (*Matricaria corymbifera* DC.)

CHAMÆMELUM INODORUM Vis. loc. cit. — *Chrysanthemum inodorum* L.

CHAMÆMELUM MARITIMUM Boiss. — *Matricaria maritima* L.

CHAMÆMELUM CALLOSUM Boiss. et Heldr.

Ch. bienne glabrum, caule elato folioso valdè striato supernè amplè et laxè corymboso, foliis ambitu oblongis sessilibus tripinnatisectis laciniis subdivergentibus lineari-setaceis in callum album mucronatum abeuntibus, capitulis pedunculo nudo tenui suffultis, involucri glabri phyllis inferioribus triangulari-lanceolatis margine angustè fusciscentibus apice scariosis laceris, interioribus oblongis, ligulis albis oblongo-linearibus disco æquilongis, flosculorum dentibus non glandulosis, acheniis minimis nigris transversè rugoso-tuberculatis dorso convexis apice biporoso-glandulosis ventre tricostatis costis albis tenuissimis apice truncatis, areolâ terminali quadrangulâ achenio æquilatâ pappo albo integro brevissimo marginiformi circumdatâ.

Hab. ad rivulos in montanis inter *Beychehr* et *Koniah*. (Heldr.)

Planta 2-3 pedalis habitu foliis capitulisque *Ch. trichophyllo* similima, sed hoc differt capitulis paulò majoribus, involucri phyllis omnibus obtusioribus et præsertim dentibus flosculorum apice aurantiaco-glandulosis, acheniis majoribus lævibus costis latis crassis, areolâ terminali minimâ nudâ.

CHAMÆMELUM DECIPiens Boiss.

Ch. annum glabrum, caulibus erectis striatis supernè ramosis corymbosis, foliis tripinnatisectis sessilibus laciniis longis setaceis calloso-mucronatis, involucri glabri phyllis oblongis pallidis albomarginatis, ligulis nullis, capitulis parvis, flosculorum dentibus glandulâ notatis, acheniis minimis transversè rugoso-tuberculatis dorso convexis apice biporoso-glandulosis ventre tricostatis costis albidis elevatis, areolâ terminali quadrangulâ achenio æquilatâ, coronâ marginiformi brevissimâ subpatulâ quadrangulâ.

Hab. in humidis prov. *Aderbidjan* (Szwowits), in ruderatis Asiæ minoris. (Sibth.)

Pyrethrum decipiens F. et M. Ind. Sém. 1835, pag. 43. — *Cotula aurea* Sibth. Fl. Græc. tab. 878 non L. et probabiliter quoque ex Lindley *Cot. complanata* Sibth. tab. 879.

Acheniis parvis *Ch. calloso* affine differt capitulis discoideis vix pisi magnitudinis, flosculorum dentibus glandulosis, acheniorum costis elevatis.

CHAMÆMELUM MICROCEPHALUM Boiss.

Ch. annuum? glabrum, caule elato striato paniculato-ramoso ramis apice densiusculè corymbosis, foliis sessilibus bipinnatisectis laciniis setaceis longissimis apice breviter callosis acutis, capitulis parvis globosis discoideis, involucri glabri phyllis oblongo-linearibus obtusiusculis præter lineam mediam fuscescentem albido-membranaceis, flosculorum dentibus glandulâ punctatis, acheniis minimis abbreviatis dorso convexis transversè et pellucidè rugulosis ventre tricostatis costis crassis corticosis albis, areolâ terminali quadrangulâ achenio æquilatâ, coronâ brevi subquadrilobâ.

Hab. in Assyriâ inter *Merdin* et *Asuaner* Kotschy, N° 357.

Capitula piso dimidiò minora; a *Ch. decipienti* cui magis affine eximè distinctum capitulis minimis, acheniis abbreviatis costis crassis corticosis lateralibus sulco contiguo æquilatis, coronâ terminali longiori.

CHAMÆMELUM AURICULATUM Boiss.

Ch. annuum glabriusculum basi multicaule, caulibus pumilis infernè tantùm foliosis simplicibus vel basi ramosis, pedunculis longis nudis filiformibus subscapiformibus, foliorum linearium pinnatisectorum segmentis brevibus linearibus integris dentatis vel pinnatilobatis, capitulis discoideis, involucri glabri phyllis ovato-oblongis pallidè virentibus latè albo-scariosis, receptaculo ovato, flosculorum dentibus eglandulosis, acheniis subincurvis dorso convexis apice bipunctatis ventre tricostatis costis albis crassis corticosis intermediâ latiori, pappo dimidiato auriculæformi hyalino oblongo achenio æquilongo vel longiori.

Hab. in arenosis *Arabie petreæ* ad limites *Palæstinæ* et in declivibus inter *Jerusalem* et *Jericho*. (Boiss.)

Planta habitu *Cotulæ*, 4-7 pollicaris, capitula diametro 4-6 lin. lata. Facie *Pyrethrum discoideum* Ledeb. referens quod ex acheniis (tamen immaturis) verum *Pyrethrum* mihi esse videtur et a nostrâ plantâ præterea differt foliorum villosorum segmentis paucis, pappo campanulato lacero.

PYRETHRUM CASSIUM Boiss. (Sect. *Leucoglossa*.)

P. perenne, radice cylindricâ subpræmorsâ longè et densè fibrosâ,

caule angulato-striato parcè hirtò elatò remotè folioso supernè laxissimè ramoso ramis longissimis subnudis monocephalis corymbosis, foliis hirtellis ambitu oblongis pinnatisectis segmentis subæqualibus oblongis iterum pinnatisectis laciniis oblongo-linearibus acutis integris vel bipartitis, foliis radicalibus petiolatis caulinis sessilibus summis ad ramorum ortum abbreviatis segmentis paucis, involucri pallidissimi phyllis arcè imbricatis adpressè hirtulis dorso elevatim subcarinatis apice scariosis oblongis obtusis, ligulis oblongis albis disco æquilongis, acheniis pappo tubuloso apice lobato-lacero eis paululùm breviori terminatis exterioribus subincurvis.

Hab. in regione sylvaticà inferiori *Cassii* ubi legi Jun. 1846.

Planta 2-4 pedalis, folia inferiora 2-3 pollices longa 4 1/2 lata segmentis 6-10 lin. longis, capitula magna *Pyr. Achilleæ* DC. a quo ut et a *P. corymboso* differt pedunculis 6-10 pollices longis, involucri phyllis elevato-nervosis, pappo achenium subæquanti nec multò breviori.

PYRETHRUM FILIPENDULINUM Boiss. (Sect. *Gymnoclines*.)

P. totum pube adpressà crispulà parcè obsitum pallidè virens, radice surculos steriles non edenti, caulibus simplicibus angulatis strictis foliosis, corymbo terminali composito densiusculo, foliis subsessilibus ambitu longè oblongis pinnatisectis segmentis linearibus rachide vix latioribus pinnatis lobatisve lobis breviter linearibus acutis ascendentibus inter se remotiusculis, capitulis sphaericis pedunculo subæquilongo suffultis, involucri hirti phyllis ovatis pallidis adpressis intimis apice brevissimè membranaceis, ligulis trilobis flosculos non superantibus.

Hab. in Mesopotamià inter *Suerek* et *Diarbekir* Kotschy N° 164.

Planta pedalis habitu *Achilleas* flavifloras omninò referens, folia 4-4 1/2 poll. longa 5-6 lin. lata, capitula magn. *P. Cadmei* Boiss. quod differt surculis sterilibus, segmentis foliorum multò regularius densisque pectinatis juniorum tomento inter se adhærentibus etc. In diagnosi *Pyr. Cadmei* Diagn. IV pag. 10 pro *P. niveo* lege *P. denso* (error calami).

PYRETHRUM SYRIACUM Boiss. (Sect. *Gymnoclines*.)

P. perenne totum densè et adpressè tomentosum griseo-flavescens basi procumbens caules floriferos aliosque steriles foliosos breviores

edens, foliis petiolatis oblongis regulariter et pectatim pinnatisectis segmentis linearibus obtusè lobulato-crenatis obtusis junioribus margine subtùs revolutis adultis planis, foliis superioribus paucis sessilibus summis simpliciter pectinatis, corymbo terminali simplici, pedunculis strictis nudis capitulo sphærico plerumquè pluries longioribus, involucri adpressè rufescenti-tomentelli phyllis oblongo-linearibus adpressissimis apice vix scariosis, ligulis flavis obsoletè tridentatis patulis disco parùm longioribus.

Hab. in *Syria* boreali propè *Antab* Aucher N° 3478.

Affine facie, magnit. capitulorum, longitudine ligularum *P. denso* quod a nostrà plantà distinguitur segmentis foliorum multò minutius et confertius lobulatis semper revolutis in foliis junioribus adèò contiguïs ut folium indivisum simulent, caule minori, involucri phyllis latioribus brevioribus, pedunculis foliosis nec nudis.

PYRETHRUM FLAVOVIRENS Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Gymnoclines*.)

P. basi suffrutescens surculos breves foliosos caulesque floriferos acutè sulcato-striatos glabriusculos parcè foliosos simplices edens, foliis inferioribus petiolatis pinnatisectis segmentis remotis ovato-oblongis sessilibus cuneatis in lobulos oblongos acutos profundè incisis, foliorum caulinarum sessilium segmentis angustè linearibus dentatis, omnibus adpressè puberulis griseis, corymbo terminali densiusculo composito, pedunculis angulatis squamulis paucis lineari-setaceis obsitis capitula ovata æquantibus, involucri glabriusculi vel parcè hirtuli flavo-virentis phyllis oblongis subcarinatis apice scariosis fimbriato-laceris, ligulis flavo-virentibus ovatis tridentatis diametro disci rufescentis dimidiò brevioribus.

Hab. in solo argilloso ad catarrhactas *Ser Abi Schir* montis *Elbrus* propè *Passgala* Kotschy. N° 307.

Folia cum petiolo tripollicaria segmentis utrinquè 6-7 ferè 2-3 lin. longis, caulibus pedalis vel paulò longior, corymbus *Achilleæ*. Species in suà sectione formà foliorum et ligulis pallidis distinctissima.

PYRETHRUM SZOWITSH Boiss. in Kotsch. pl. Pers. austr. (Sect. *Gymnoclines*.)

P. basi suffrutescens multicaule, caulibus glabrescentibus angulatis

foliosis rectis simplicibus vel parçè et corymbosè ramosis, foliis pallidè virentibus sub lente hirtis inferioribus petiolatis cæteris sessilibus bipinnatisectis laciniis minutissimis oblongo-linearibus lobulatis lobulisque obtusis confertis, rachide lobulatâ, corymbis compositis densiusculis, pedunculo nudo vel squamulâ lineari obsito capitulo oblongo sublongiori, involucri glabriusculi phyllis adpressis triangulari-lanceolatis rufescenti-marginatis apice angustè scariosis ciliatulis, floribus fæmineis marginalibus paucis tripartitis discum vix excedentibus.

P. myriophyllum β *subvirescens* DC. Prodr.

Hab. in prov. *Karabagh* et *Aderbidjan* (Szowits) propè pagum *Dermengun* prov. *Schiraz* et in faucibus montis *Kuh Daëna*. (Kots. N° 585 et 538.)

A. *P. myriophyllo* præter indumentum parciùs specificè differt capitulis magis attenuatis, involucri phyllis angustioribus rufescenti-marginatis ligulisque tripartitis nec trilobis.

PYRETHRUM DUDERANUM Boiss (Sect. *Gymnoclines*.)

P. basi, suffrutescens totum breviter et crispulè cinerascens, foliis turionum radicalium petiolatis caulinis sessilibus minoribus omnibus ambitu oblongis suprâdecompositis laciniis lobisque tenuissimis confertis, caulibus erectis supernè parçè ramosis in corymbum compositum densiusculum abeuntibus, pedunculis tomentosis capitula globosa paulò superantibus, involucri phyllis ovatis obtusissimis apice nigricantibus angustè albo-marginatis densè ciliatis, floribus fæmineis ligulatis paucissimis 4-5 dentatis disco subbrevioribus.

Hab. in solo argilloso faucis *Dudere* montis *Elbrus* Kotsch. N° 266.

Pyr. chiliophyllum Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. non F. et M.

Species a me infaustè relata ad *P. chiliophyllum* cui foliis affinis est sed quod longè differt lobulis minùs tenuibus, involucri phyllis minùs obtusis et præsertim ligulis aureis disco longioribus. Nostra species habitu et floribus fæmineis fissis quidem sed vix ligulatis affinis est *Tanaceto millefoliato* F. et M. et *T. canescenti* DC. quæ ambo ad *Pyrethrum* conjungenda crunt.

TANACETUM FLABELLIFOLIUM Boiss. et Heldr.

T. perenne totum adpressissimè tomentosum griseo-flavicans basi

suffrutescens multicaule densè foliosum, foliis inferioribus oblongo-cuneatis subspathulatis obtusis infernè in petiolum eis æquilongum attenuatis supernè utrinquè 4-5 crenis obtusis obsitis, caulinis sensim diminutis oblongo-linearibus apice paucidentatis summis linearibus integris, caulibus erectis foliosis simplicissimis apice corymbosis, corymbo composito denso polycephalo, capitulis parvis globosis pedicello eis æquilongo suffultis, involucris rufo-tomentosi phyllis oblongo-linearibus obtusis cucullatis adpressis, flosculis circ. 15 omnibus hermaphroditis tubulosis.

Achillea flabellifolia Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1847.

Hab. in fissuris rupium *Tauri Isaurici* inter valles *Ermenek* et *Tourchalar* alt. 4000' (Heldr.) Julio ineunte nondùm floriferum.

Cæspitosum, caules pedales, foliorum inferiorum limbus 12-15 lineas longus 6-8 latus petiolo ei æquilongo suffultus, corymbus diametro sesquipollicaris, capitula evoluta eis *Achilleæ millefolii* vix majora esse videntur. Species pulchra quam ex primâ inspectione speciminum nondùm floriferorum *Achilleæ* adnumeraveramus sed quæ ob receptaculum prorsus epaleaceum et flores omnes tubulosos *Tanaceto* adnumeranda est.

ARTEMISIA MELANOLEPIS Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846.
(Sect. *Absinthium*.)

A. perennis densè cæspitosa nana tota adpressè argyrea splendens, foliis ambita subrotundis multipartitis laciniis tenuibus brevibus confertissimis obtusiusculis radicalibus petiolatis caulinis subsessilibus basi dilatatis simpliciter pinnatis, caulibus brevissimis simplicibus, capitulis globosis subsessilibus ad apicem caulium confertis breviter et subunilateraliter spicatis infimis sæpè remotiusculis, involucris parçè lanati phyllis ovatis margine membranaceis nigris, flosculis apice purpureis pilosis, receptaculo longè villosa.

Hab. in alpibus *Hasartschal* in parte occidentali montis *Elbrus* propè lacum alt. 40000' Kotsch. N° 486.

Affinis *A. lasiocline* Boiss. et *A. alpinæ* MB. — *lanatæ* W. a quibus differt foliorum laciniis tenuioribus illas *A. mutellinæ* referentibus, capitulis minoribus in spicam densam 1½-1 pollicarem congestis, phyllis involucris nigro-marginatis, flosculis purpureis apice minùs hirsutis.

HELICHRYSUM PSYCHROPHILUM Boiss. in pl. Kotsch. Pers. bor. 1846.
(Sect. *Stæchadina*.)

H. totum adpressè araneosum griseum basi suffrutescens, caulibus diffusis nudis apice foliosis cæspitosis, foliis cæspitis rameisque angustè oblongo-spathulatis oblongis vel acutiusculis in petiolum basi angustatis, ramis brevibus decumbentibus apice 2-4 capitula majuscula subsessilia globosa ferentibus, involucri pallidè citrini vel subrufescentis glabri phyllis amplis ovatis oblongisque obtusis adpressis concaviusculis subundulatis discum æquantibus, flosculis omnibus hermaphroditis.

Hab. in monte *Elamout* seu *Elbrus* Aucher N° 4788, Kotschy N° 463, in monte *Totschal* propè *Teheran* N° 628.

Suffruticulus cæspitosus foliis speciminum majorum vix pollicem longis, eorum e locis excelsioribus oriundorum multò minoribus, rami floriferi 2-3 pollicares sæpè multò breviores monocephali, capitula magnit. *H. Anatolici* in cæspite sæpè subsessilia. Valdè affine *H. callichryso* DC. a quo differt ramis brevibus decumbentibus, foliis latioribus, capitulis minoribus. An tamen hujus forma e loco excelso orta?

H. Kotschyianum Boiss. Diagn. VI. ab *H. Armeni* DC. formis mihi non sat distinctum esse videtur et huic igitur conjungendum. *H. oligocephalum* DC. et probabilissimè quoque e fragmento herb. DC. *H. Belangerianum* ab *H. Armeno* specificè quoque non differunt. Specimina Kotsch. Pers. bor. N° 722 et 554 ad *H. Armeni* formam canam pertinent.

HELICHRYSUM AUCHERI Boiss. (Sect. *Stæchadina*.)

H. totum densè et adpressè araneoso-lanatum cano-griseum, foliis radicalibus densè cæspitosis caulinisque inferioribus oblongo-spathulatis obtusis muticis in petiolum longum attenuatis, caulinis superioribus linearibus acutiusculis strictis, caule elato simplici, corymbo terminali denso composito polycephalo, capitulis majusculis breviter pedunculatis citrinis globosis, involucri phyllis glabris oblongis apice concaviusculis obtusissimis rotundatis squarrosè patentibus intimis discum æquantibus, floribus omnibus hermaphroditis.

Hab. in *Persia* Aucher N° 4789, *Cappadocia ad Euphratem* Aucher N° 3445, *Mesopotamia* Kotschy N° 355.

Species naturà involucri phyllorum imbricatorum apiceque cuculla-

torum *H. arenario* cui cl. DC. specimina citata conjunxerat affinis sed ab eo certè distincta indumento densiori, foliis radicalibus latioribus obtusioribus, capitulis duplò majoribus, phyllis involucri apice squaroso-patentibus.

HELICHRYSUM TARDENTII Boiss. (Sect. *Stæchadina*.)

H. basi suffruticosum prostratum, caulibus virgatis simplicibus densè foliosis elatis ut et folia glandulis crebris subsessilibus aspersis cæterum glabris viridibus, foliis oblongo vel lineari-spathulatis infernè in petiolum angustatis turionum paucis sublanatis cæteris viridibus, corymbo parvo polycephalo simplici, capitulis breviter pedunculatis minutis oblongis citrinis, involucri phyllis glabris oblongis eximè imbricatis apice obtusis cucullatis erecto-patulis intimis discum æquantibus, floribus omnibus hermaphroditis.

Hab. in *Caucasi* regione non indicatà cl. Tardent.

Pedale, caules densiusculè et strictè foliosi, folia ferè pollicem longa inferiora supernè 3 lin. circ. longa cætera angustissima, capitula illis *H. arenarii* minora et præsertim magis attenuata quàm notà, caulibus suffrutescentibus, glandulositate et glabritie, involucri phyllis dimidiò minoribus ab eo egregiè distinguitur. *H. glandulosum* Ledeb. mihi descriptione tantum notum ob folia mucronata et phylla involucri plana erecta adpressa mea planta esse nequit.

HELICHRYSUM GLOBIFERUM Boiss. (Sect. *Stæchadina*.)

H. totum adpressè araneoso-canum, foliis radicalibus densè cæspitosis minutis oblongo-spathulatis caulinis inferioribus lineari-spathulatis cæterisque linearibus acutis, caulibus simplicissimis, capitulis subrotundis subsessilibus in glomerulum densum globosum terminalem congestis, involucri pallidè citrini glabri phyllis ovato-oblongis erectiusculis cucullatis obtusissimis flosculos superantibus.

Hab. in prov. *Aderbidjan* Aucher, N° 4783 et 4780.

Caulis 7-8 pollicaris, folia eis *H. arenarii* minora et angustiora. Capitula ferè 15 in glomerum densum avellanà vix majorem congesta quàm dispositione hæc species ab omnibus orientalibus differt præter *H. lanatum* DC. quod habet folia multò latiora, indumentum densum, glomerulos terminales ampliores deplanatos subtus foliis supremis longè

bracteatos et *H. graveolens* quod differt quoque foliis latioribus, involucri phyllis acutiusculis adpressis vix cucullatis rubellis.

HELICHRYSUM LEUCOCEPHALUM Boiss. (Sect. *Stachadina*?)

H. totum adpressè araneoso-canum, caulibus elatis simplicibus foliosis, foliis strictis inferioribus lineari-spathulatis obtusis cæteris linearibus acutis, corymbo terminali composito polycephalo densiusculo, capitulis minutis pedunculo eis subæquilongo suffultis ovatis, involucri griseo-albidi phyllis minutis oblongo-ellipticis basi adpressè imbricatis tomentellis apice glabris hyalinis margine undulatis patentireflexis intimis erectis disco æquilongis, flosculis omnibus hermaphroditis, pappi setis scabridis apice subincrassatis.

Hab. in monte *Ghenó* Persiæ australis Aucher, No 4786.

Pedale et longius, indumentum *Gnaphalii luteoalbi*, capitula illis *H. arenarii* paulò minora involucri phyllis infernè arctius imbricatis multò angustioribus. Species ut et sequens involucri albis nec luteis in sectione paululum anomala.

HELICHRYSUM NIVEUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Stachadina*?)

H. basi suffrutescens cæspitoso-multicaule totum indumento araneoso adpresso canum, caulibus elatis tenuibus erectis simplicibus, foliis radicalibus lineari-spathulatis acutiusculis infernè attenuatis caulinis angustè linearibus strictiusculis, corymbo terminali polycephalo composito subgloboso, capitulis breviter pedunculatis ovatis niveis, involucri phyllis niveis absque nitore imà basi exceptà glaberrimis ab infimis brevissimis ad intima sensim elongatis ovatis oblongisve obtusis apice sæpè fissis adpressis erectis imbricatis concaviusculis, flosculis omnibus hermaphroditis, pappi setis vix scabridis.

Hab. ad rupes apricas *Tauri Pamphylici* inter *Marla* et *Adalia* alt. circ. 3000'. Fl. Julio. (Heldr.)

Caules pedales longioresque, folia inferiora sesquipollicem longa 3 lin. circ. supernè lata, caulina media pollicaria sesquilineam lata, capitula eis *H. arenarii* vix minora sed paulò longiora. Species capitulis niveis conglobatis, involucri phyllis adpressis quidem sed concaviusculis opacis insignis et elegantissima.

In pl. Anat. Heldr. exs. 1846 loco *H. rupestris* var. e rupibus propè

Alaya lege *H. conglobatum* forma maritima latifolia. Hoc *H. conglobatum* cui *Gn. Siculum* Spr., *Gn. scandens* Sieber et *H. caespitosum* DC. ex parte associanda sunt et quod in Voy. Bot. Esp. sub nomine *H. decumbentis* var. *orientalis* minus benè designavi, in Oriente a Sicilia ad Anatoliam occidentalem frequentissimum est et ibi *H. stæchadis* locum tenet.

Helichrysi sp. ex fauce *Hagio Roumeli* Cretæ in pl. Cret. Heldr. 1847 est *H. Panormitanum* Tineo ex comparatione speciminis authenticici a cl. Heldreich factâ.

DORONICUM CACALIÆFOLIUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.

D. radice cylindricâ brevi truncatâ subhorizontali, collo glabro, foliis teneris viridibus utrinquè sparsim et minutissimè puberulis longissimè petiolatis reniformibus transversè latioribus sinu brevi latissimo cordatis circumcîrca crenato-dentatis dentibus acutis sinubus rotundatis, petiolo basi subdilato eo foliorum caulinarum inferiorum basi denticulato minutè auriculato, folio supremo sæpè ovato amplexicauli sessili minuto, caule elato angulato-striato supernè strictè et laxè paniculato 3-6 cephalo, capitulis parvis, involucri densè et breviter hirti phyllis oblongo-lanceolatis acuminatis disco non longioribus, ligulis disco 2 1/2 plò longioribus.

Hab. in umbrosis rupium septentrionalium montis *Gheidagh* Isauriæ alt. circ. 5500'. (Heldr.)

Folia 2-2 1/2 poll. longa 3-4 lata radicalia petiolo 6-8 poll. longo suffulta, caulina pauca præter supremum quoque longè petiolata, capitula eis omnium specierum generis paulò minora in paniculam contractam disposita. Species formâ foliorum distinctissima characteribus et habitu propè *D. macrophyllum* Fisch. et *reticulatum* Boiss. collocanda.

SENECIO VULCANICUS Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Obæjacoidei*.)

S. perennis? glaberrimus caespitosus subacaulis, radice cylindricâ tenui verticali, foliis minimis carnosulis ovato-oblongis oblongo-linearibusve pinnatilobatis vel pinnatipartitis lobis obtusissimis, infimis petiolo eis æquilongo suffultis superioribus in petiolum brevem subangustatis omnibus ob caules subnullos in caespitem congestis, pedun-

culis bracteolatis e foliis vix exsertis capitulo sesquilonioribus, calyculi phyllis minimis squamæformibus triangularibus acutis sphacelatis secus basin involucri sparsis, involucri glabri viridis phyllis oblongo-linearibus planis basi elevatim binerviis angustè membranaceis apice attenuatis acutiusculis sphacelatis, ligulis flavis oblongis demum revolutis radium valdè superantibus, acheniis longis tenuiter cylindricis sub 40 striatis glabris apice in collum subattenuatis, pappo niveo caduco achenio longiori.

Hab. in solo vulcanico regionis summæ montis *Demawend* Kotschy, N° 667 et in alpihus *Elamout* Aucher N° 4717.

Vix pollicaris, folia inferiora 3-4 lin. longa 2 lata, capitula paulò minora eis *S. vernalis* et *Nebrodensis* quibus affinis est et a quibus differt glabritie, caule subnullo, foliorum minimorum formâ, acheniis glabris elongatis.

SENECIO LACERUS Boiss. (Sect. *Obajacoides*.)

S. annuus ? præter papillas albas sparsissimas glaber, caulibus herbaceis striatis decumbentibus ramosissimis, ramis tenuibus erectis, capitulis terminalibus pedunculis longis tenuibus nudis suffultis laxè corymbosis, foliis flaccidis pinnatipartitis margine subtus revolutis rachide latâ planâ infernè in petiolum basi minutè auriculatum sensim angustatâ laciniis utrinquè 2-4 irregularibus linearibus integris vel trifidis, foliis summis tripartitis vel integris, capitulis parvis, calyculi squamis paucis minutissimis lineari-setaceis ad basin involucri sparsis, involucri phyllis angustè linearibus elevatim binerviis angustè membranaceis acutis, ligulis revolutis flosculos superantibus, acheniis tenuibus cylindricis sub 40 nerviis glabris, pappo albo fugaci achenio æquilongo.

Hab. in alpihus *Demawend* Aucher N° 4719.

Folia ferè pollicaria, rachis supernè sesquilineam lata, laciniæ 2-4 lin. longæ a superioribus ad inferiores abbreviatæ, capitula magnitudinis *S. coronopifolii* cui magis affinis sed hic facillè dignoscitur foliis basi latè auriculatâ laciniatis tenuius dissectis, phyllis apice sphacelatis. *S. rapistroides* C A M eisdem differt notis.

Xanthium Anatolicum Boiss. et Heldr. in pl. Anatol. exs. est *X. antiquorum* Wallr. Species affinis *X. strumario* et ab eo ut videtur sat distincta aculeis fructus densioribus eum ad apicem usquè obtegentibus.

CICHORACEÆ.

LAMPSANA PISIDICA Boiss. et Heldr.

L. annua vel biennis secùs partem inferiorem caulium et folia inferiora pilis longis crispis tenuibus subviscidis hispida supernè glaberrima, caule erecto supernè longè et dichotomè ramoso effusè paniculato-corymboso, foliis lyratis segmentis lateralibus utrinquè 2-3 basi attenuatis ovatis acutè repando-denticulatis terminali duplò majori e basi truncatà vel subcordatà triangulari-ovato acuto, rachide inter segmenta lobulis auctà, foliis caulinis superioribus angustè linearibus acutis integerrimis summis setaceis brevibus, pedunculis tenuibus rigidulis capitulo obconico 3-8 plò longioribus, involucri breviter calyculati phyllis lætè virentibus glaberrimis elliptico-linearibus obtusis, flosculis radii luteis involucro duplò longioribus.

L. intermedia var. in pl. Heldr. Anat. 1846.

Hab. in saxosis inter frutices faucis *Tsimbouckkan* inter *Adalia* et *Sparta*. (Heldr.)

Hæc species quam primùm cum *L. intermedia* MB combinaveramus ab eà notis sequentibus sat differre videtur. *L. intermedia* quæ cæterum perennis esse videtur habet infernè indumentum parcum brevissimumque, ramos caulinos ferè ad extremitatem usquè foliosos nec nudos, foliorum segmenta lateralia utrinquè solitaria nec bina vel terna triangulari vel ovato-acuminata, segmentum superius 2 poll. et ampliùs longum latumque nec ut in nostrà specie pollicare

LAMPSANA CASSIA Boiss.

L. annua vel biennis infernè densè glanduloso-pilosa supernè glaberrima, caule crasso elato supernè divaricato-ramosissimo effusè paniculato-corymboso, foliis pinnatipartitis segmentis lateralibus utrinquè 3-4 ovatis repando-dentatis basi attenuatis terminali aliis rarò majori ovato-triangulari vel oblongo, foliis caulinis superioribus angustè linearibus integerrimis summis setaceis, pedunculis tenuibus capitulo obconico-ovato 2-4 plò longioribus, involucri breviter calyculati phyllis glaberrimis livescentibus elliptico-linearibus obtusis, flosculis radii luteis involucro sesquolongioribus.

Hab. in umbrosis rupestribus regionis inferioris montis *Cassii* et Antilibani suprâ *Zebdani*. Legi Maio 1846.

Affinis præcedenti a quâ differt indumento glanduloso partis inferioris plantæ, foliis vix lyratis pinnatipartitis segmentis copiosioribus, caule multò ramosiori polycephalo pedunculis brevioribus, involucri phyllis livescentibus radio breviori. *L. intermedia* characteribus in Diagnosi præcedenti datis longius differt. *L. adenophora* deniquè tota ad apicem usquè glandulosa est, habet præterea folia lyrata, paniculam contractissimam, phylla ad medium setosa etc.

LAMPSANA RAMOSISSIMA Boiss.

L. biennis, infernè parcè pilis albis sparsis patulis flexuosis obsita supernè glaberrima, caule ferè a basi dichotomè ramosissimo effusimè paniculato, foliis radicalibus lyratis lobis lateralibus utrinquè 3-4 oblongis subretrorsis acutis repando-dentatis terminali 2-3 plò longiori oblongo vel e basi truncato-subcordatâ triangulari acuto, foliis caulinis paucis linearibus acutis rameis brevissimis setaceis, pedunculis gracillimis capitulo obconico 6-8 plò longioribus, involucri basi brevissimè calyculati phyllis viridi-sublivescentibus glabris vel infernè puberulo-glandulosis apice membranaceis acutiusculis, flosculis radii involucri subduplò longioribus.

Hab. in *Libano* suprâ *Cedros*, in lapidosis regionis inferioris *Hermonis* suprâ *Rascheya*.

Speciei præcedenti valdè affinis sat tamen differre videtur caule a basi ramoso non glanduloso, capitulis paulò minoribus, involucri phyllis apice membranaceo-attenuatis. — Species ternæ hic descriptæ forsan inter se nimis affines sed donec specimina intermedia eas formas unius speciei polymorphæ esse docuerint eas seorsim proponere debui.

KELPANIA SESSILIS Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846.

K. annua caulibus brevissimis sub anthesi sæpiùs nullis, foliis glaucis glabris linearibus brevibus integerrimis, capitulis ad collum et secus ramos sessilibus minimis, involucri phyllis adpressis lanatis elliptico-linearibus albo-marginatis, acheniis striatis dorso aculeis patulis hamatis obsitis præterea glabris in capitulis diversis dissimilibus altis elongatis semicirculariter incurvis apice subamplatis vix bifidis, altis

crassioribus brevioribus arcuè revolutis-subcircinnatis apice longissimè et divaricatis bipartitis.

Hab. in aridis provinciis *derbidjan* (Aucher N° 4875), in argillosis salsis propè *Teheran* (Kotschy N° 60).

Plantula nana cujus specimina prorsus acaulia habitu *Plantaginem Craticam* referunt. Folia 8-10 lin. longa basi lineam lata, capitula illis *K. linearis* minora. A *Kalp. lineari* eximie distincta foliis multò brevioribus pro longitudine latioribus, capitulis sessilibus nec longè pedunculatis, acheniis dimorphis præter aculeos dorsales non scabridis.

ROBERTIA TENUIFLORA Boiss.

R. foliis omnibus radicalibus oblongo-linearibus sub lente parè setosis viridibus runcinato-pinnatilobatis lobo terminali majori, scapis tenuissimis folia vix duplò superantibus supernè squamulis paucis ob-
sitis, capitulis parvis paucifloris, involucri phyllis planis albo-puberulis nigricantibus albomarginatis infernè longè et parè crinitis ab exterioribus ad intima elongatis paucis, ligulis concoloribus, receptaculis paleis membranaceis lineari-acuminatis achenia superantibus, acheniis transversè rugosis breviter attenuato-rostratis, pappi plumosi setis basi vix dilatatis.

Hab. in insulà *Cretâ* ubi legi cl. Prof. Raulin.

Planta bipollicaris, folia eis *R. taraxacoidis* minùs profundè divisa vix sesquipollicaria, scapi eis hujus duplò tenuiores, capitula minora; ab eâ insuper differt phyllis inæquilongis nec æquilongis exactèque uniserialibus, acheniis apice breviter attenuatis. Hæc planta habet faciem *Deloderii* sed hoc subgenus ab eâ differt receptaculo subnudo, acheniis longè rostratis, pappi setis paucis basi paleaceo-dilatatis, plumulis deciduis.

HAGIOSERIS Boiss.

Capitulum multiflorum. Involuerum biseriale squamis exterioribus linearibus patulis interioribus incurvis convoluto-cymbiformibus achenia radii soventibus apice longè acuminatis tandem deciduis. Receptaculum nudum. Achenia teretiuscula transversè rugosa exteriora valdè incurva pappo brevissimo coroniformi fimbriatulo superata interiora

rectiuscula plus minus breviter in rostrum attenuata pappo uniseriali e paleis 5 persistentibus longè attenuato-subulatis scabris plumosisque constanti plumis longissimis deciduis. — Herbae orientales annuae facie *Picrides* annuas referentes.

Hoc genus *Picridi* e grege *Spitzeliae* vel *Medicisae* affine ab eis egregiè differt pappo non annulatum deciduo multiserialique sed persistenti 5 paleaceo longè plumoso plumis deciduis, involucri phyllis deciduis; a *Thrincia* et *Kalbfussia* pappo uniseriali etc. longius distat. *Deloderium* Cass. acheniis muricatis, setis pappi basi in paleam dilatatis plumis deciduis affine differt receptaculo subpaleaceo, formà et naturà phyllorum involucri, acheniis conformibus.

HAGIOSERIS GALILÆA. Boiss.

H. caule erecto basi rubello jam infernè dichotomè ramosissimo ramisque setis brevibus basi incrassatis sparsis asperis cæterum glabris, foliis margine et utrinquè ad nervos parçè et breviter setulosis oblongo-lanceolatis subintegris inferioribus basi attenuatis superioribus oblongis sessilibus basi amplexicaulibus rotundato-auriculatis, pedunculis capitulo pluries longioribus demum fistuloso-subincrassatis sub capitulo squamulis 1-2 lineari-setaceis auctis, involucri phyllis exterioribus lineari-subulatis patulis setulosis dimidiò brevioribus, eis seriei interioris dorso carinatis undiquè extus setis aculeiformibus glochidiatis albis strigosis acumine subulato ciliato parti cymbiformi æquilongio terminatis, acheniis interioribus apice vix in collum attenuatis.

Hab. in herbis *Galilææ*. (Boiss.)

Habitus et magnitudo capitulorum *Picridis Sprengerianæ*. Ligulæ subtus rubellæ involucrio subduplò longiores.

HAGIOSERIS AMALECITANA Boiss.

H. tota pilis albis tenuibus apice sæpè breviter glochidiatis setulosa, foliis radicalibus rosulatis lanceolatis repando-dentatis, caulibus plurimis brevibus a basi dichotomè ramosis decumbentibus, foliis caulinis a basi amplexicauli auriculatà angustè lanceolato-linearibus acutis integris, pedunculis capitulo pluries longioribus supernè squamulis lineari-setaceis pluribus obsitis, involucri phyllis exterioribus angustè setaceis setulosis triplò brevioribus, eis seriei interioris rotundato-carinatis glochidiato-setulosis acumine a basi lanceolatà subulato parte

cymbiformi paulò breviori terminatis, acheniis interioribus longiusculè attenuato-scabridis.

Hab. in Palæstinâ Arabiæ conterminâ ad meridiem urbis Gaza. (Boiss.)

A. præcedenti distinctissima caulibus diffusis aliisque notis in diagnosi enumeratis.

PICRIS CAMPYLOCARPA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Eupicris*.)

P. biennis tota infernè longiùs supernè brevissimè et tenuiter setuloso-glochidiata asperula, caule erecto elato infernè folioso supernè dichotomè ramosissimo, foliis oblongo-spathulatis infimis basi attenuatâ pinnatilobatis lobis parvis obtusis, intermediis sessilibus basi obscurè auriculatis repando-sinuatis subintegræ, summis linearibus pedunculis nudis vel 4-2 squamulis obsitis capitula multò superantibus, involucri phyllis glaucescenti-livescentibus ad medium puberulis farinaceis ad marginem membranaceis non setosis, exterioribus triangularibus interioribus linearibus acutis, ligulis concoloribus involucri duplò longioribus, acheniis brevibus angulatis transversè valdè rugulosis valdè incurvis basi subattenuatis supernè in rostrum eis dimidiò brevius angustatis, pappo omnium conformi niveo achenio longiori.

Hab. in collo saxoso aprico propè *Kourmalu* Pamphylæ ad radices montis *limax* Fl. Maio. (Held.)

Planta bipedalis, flores illis *P. hieracioidis* majores, achenia cum rostro 2 $\frac{1}{2}$ lin. longa; ab eâ et cæteris speciebus generis distinctissima acheniis brevibus et valdè incurvis.

PICRIS CYANOCARPA Boiss.

P. annua tota setulis albis brevibus apice glochidiatis densiusculè canescens aspera, foliis radicalibus oblongis basi attenuatis pinnatilobatis runcinatis vel sinuato-repandis brevibus, caulibus scapiformibus ascendentibus pumilis simplicibus vel bifidis bicephalis folio caulino uno alterutro angustè lineari donatis, pedunculo parcè squamuloso, involucri phyllis exterioribus paucis linearibus interioribus linearibus acuminatis farinaceo-puberulis prætereâque dorso albo-setosis, ligulis concoloribus involucri duplò longioribus, acheniis omnibus conformibus cyaneo-glaucescentibus transversè valdè rugosis in ros-

trum tenue eis longius attenuatis, omnium pappo plumoso achenio æquilongo.

Hab. in valle *Mokatteb* Arabiæ Petreæ aliisque deserti locis. (Boiss.) Huc quoque spectare videtur Aucher N° 3411 e *Persia australi* ob flores nondum evolutos subincertum.

Folia pollicem aut amplius longa, caules 3-6 pollicares, capitula eis *P. paucifloræ* majora; species acheniis longè rostratis insignis hæc notâ ad *P. longirostrem* Schultz tantum accedens quæ foliis angustè linearibus, caulibus divaricatis ramosissimis, pedunculis apice in-crassatis, acheniis rufescentibus etc. discedit.

MILLINA ARABICA Boiss.

M. annua, foliis omnibus radicalibus rosulatis dense et breviter setulosis griseis linearibus pinnatipartitis segmentis brevibus angustè linearilanceolatis, scapis procumbentibus vel ascendentibus foliis 2-3 plò longioribus simplicibus vel bicephalis, involucri squamis adpressè imbricatis ab extimis ad intimas lineares sensim elongatis farinoso-puberulis apice nigricantibus, ligulis concoloribus disco sesquilongioribus, acheniis rectis tenuissimè cylindricis sulcatis transversè tenuiter rugulosis rostro setaceo acheniorum marginalium paulò breviori centralium æquilongo terminatis, pappi rostro æquilongi setis 10 basi paleaceo-dilatatis supernè plumosis plumis deciduis.

Hab. in *rabiâ petreâ* ad fines Palæstinæ cum *M. hispidulâ*, legi vere 1846.

Habitus et folia *Picridis radicatae* Lessing. A *M. hispidulâ* eximie differt foliis abbreviatis angustè linearibus, lobis brevioribus magis æqualibus, indumento griseo setuloso, involucri phyllis regularius imbricatis, acheniis abruptius et tenuius nec sensim in rostrum attenuatis, pappo achenio breviori nec æquilongo.

Pro *Millinâ Persicâ* Boiss. in Diagn. VII p. I lege MILLINA HISPIDULA Boiss. var. *tenuiloba*. Hanc plantam ex speciminibus in Arabiâ petreâ et Ægypto lectis agnosco pro formâ *Crepidis hispidulæ* Del. Æg. tab. 42 fig. I. — *Oporiniæ hispidulæ* DC. quæ foliis plus minus incisissimis ludit. Hæc species omnibus characteribus et imprimis acheniis evidenter et longè in rostrum attenuatis *Millinæ* nec *Crepidis* vel *Oporiniæ* adnumeranda est, inter *Millinæ* sectiones intermedia et eas optime conjungens.

LEONTODON GRÆCUM Boiss. et Heldr.

L. perenne totum pilis brevissimis apice 3-5 furcatis canescens asperulum, rhizomate indurato basi nudo ramoso cæspitoso, foliis omnibus radicalibus lanceolatis pinnatipartitis vel profunde pinnatifido-sublyratis segmentis triangularibus vel angustè lineari-lanceolatis acutis terminali majori acuto, caulibus scapiformibus folia pluries superantibus monocephalis rarius dicephalis præter squamulam linearem nudis sub capitulo demùm clavato incrassatis, involucri squamis adpressiusculis ab infimis brevioribus ad interiores sensim auctis linearibus acutis ad totam faciem exteriorem pilis minimis ramosis pulverulento-puberulis inferioribus præterea secùs lineam mediam pilis furcatis elongatis obsitis, ligulis subtus pallidè rubellis involucri sesquolongioribus, acheniis cylindricis supernè attenuatis erostratis tuberculato-scarbris pappo albo eis breviori superatis, pappi setis omnibus a basi plummosis exterioribus subbrevioribus.

Hab. in montibus Græciæ, *Lycabetto*, *Pentelico*. (Spruner. Boiss.)

Var. β *alpinum*. — Omnibus partibus minùs, indumentum magis griseum minùs abbreviatum, capitula minora et achenia paulò magis abbreviata.

Hab. in locis excelsioribus Taygeti loco *Choupata* dicto (Heldreich), in *Græcid* loco non notato. (Aucher N° 3334.)

Folia in formà vulgatiore 3-6 pollicaria profunde laciniata. Scapi 6-12 pollicares, capitula magnit. eorum *L. asperi* inter quod et *L. saxatile* medium est. A. *L. saxatili* differt pilis multò brevioribus 4-5 nec trifurcatis, scapis sæpè furcatis, capitulis plerumquè majoribus, involucri phyllis præter setas medianas pulverulento-hirtis nec glabris, ligulis magis elongatis. *L. asperum* habitu affiniùs distinctissimum est pilis longioribus sparsis, phyllis involucri margine eleganter pilis 5-7 fidis densissimè ciliatis et præter setas nonnullas secùs lineam mediam glabris. *L. biscutellæfolium* DC. denique pro quo am. Spruner nostram plantam habuerat in herb. DC. observatum longè differt squamis involucri longè acuminatis subrecurvis, achenio in rostrum manifestè attenuato, et (saltem planta Italica typus speciei) probabiliter ad *L. saxatilis* formas spectat.

LEONTODON LIBANOTICUM Boiss.

L. totum indumento denso adpresso pilis brevibus densis apice 3-4

furcatis constante canescens, rhizomate indurato nudo *cæspitoso*, foliis omnibus radicalibus lanceolatis obtusiusculè et irregulariter dentatis crispulis in petiolum attenuatis, scapis simplicibus vel imâ basi divaricatim furcatis supernè squamulis pluribus lineari-setaceis obsitis sub capitulo subincrassatis, involucri phyllis ab exterioribus subpatulis ad intima sensim elongatis acutis margine densè et tenuissimè sub lente albo-ciliolatis cæterùm glabris glaucis, ligulis concoloribus corollæ tubo æquilongis, acheniis cylindricis supernè subattenuatis muriculatis pappo eis paulò breviori superatis, setis pappi omnibus a basi plumosis exterioribus paulò brevioribus.

Hab. in *Libano* suprâ Cedros. (Boiss.)

Planta semipedalis, folia 4–2 lineas longa 4–5 lin. lata. A *L. saccatii* distinctum foliis tantùm dentatis, indumento magis canescenti, involucri phyllis præter ciliola marginalia brevissimis glabris etc. *L. asperum* differt ciliis phyllorum multò validioribus nec pruinæformibus, pilosque totius plantæ sparsos multò majores habet.

LEONTODON KOTSCHYI Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846.

L. perenne *cæspitosum* totum pilis brevissimis stellatis densè obsitum pannosum canescens, foliis omnibus radicalibus angustè lanceolatis in petiolum attenuatis remotè et acutè dentatis, caulibus scapiformibus simplicibus vel ramo auctis parcissimè squamulosis sub capitulo incrassatis, involucri phyllis margine et secùs lineam mediam brevissimè stellato-puberulis cæterùm glabris omnibus adpressis imbricatis ab infimis brevissimis ad intima lanceolato-lineararia sensim auctis, ligulis concoloribus basi pilosis tubo æquilongis, acheniis...

Hab. in monte *Demawend* alt. 6600'. Kotsch. N° 344.

Folia 3–4 poll. longa, 4–5 lin. lata, scapi 7–8 pollicares. Hanc speciem quoad achenia ignotam dubitanter propono; *L. Libanotico* imprimis affinis ab eo differt scapis erectis, phyllis involucri regulariùs imbricatis elongatis adpressis, foliis remotè dentatis. Ob phylla latiuscula regulariter imbricata *L. asperum* cæterùm diversissimum refert.

LEONTODON OXYLEPIS Boiss. et Heldr.

L. totum pilis brevissimis stellatim furcatis canescens *asperulum*, rhizomate indurato ramoso *cæspitoso*, foliis lanceolatis elongatis in petiolum longum attenuatis remotè et acutè dentatis acutis omnibus

radicalibus, caulibus scapiformibus simplicibus vel rariùs supernè bifurcis foliis subsesquilongioribus parcè setaceo-squamulosis sub capitulo incrassatis, involucri phyllis ab exterioribus patulis ad intima sensim auctis omnibus longè setaceo-acuminatis undiquè pilis densis brevibus furcatis obsitis, ligulis concoloribus tubo longioribus, acheniis cylindricis supernè subattenuatis aculeolatis pappo albo eis subbreviori terminatis, pappi setis omnibus a basi plumosis exterioribus brevioribus.

L. biscutellæfolium in pl. Heldr. Anat. 1846. non. DC.

Hab. in rupestribus Pisidiæ propè *Tcheltickchi*, Maio. (Heldr.)

Folia cum petiolo 8-9 poll. longa 6-9 lin. lata, scapi 12-14 pollicares, capitula magnitudinis eorum *L. asperi*. Affine *L. Græco* et *aspero* faciliè distinguitur foliis elongatis breviter et remotè dentatis et imprimis involucri phyllis longè et tenuissimè acuminatis.

LEONTODON DIVARICATUM Boiss.

L. perenne totum indumento densissimo pilis apice stellatis constanti canum pannosum asperulum, caulibus flexuosis a basi 2-4 ramos edentibus ad dichotomias foliosis, ramis divaricatis flexuosis monocephalis parcè et brevissimè squamosis sub capitulo incrassatis et valdè asperis, foliis lanceolatis inferioribus in petiolum attenuatis remotissimè et acutè 2-3 dentatis caulinis integris, involucri phyllis pilis stellatis inordinatim asperulis adpressiusculis ab infimis brevibus ad intima lanceolato-linearibus sensim elongatis, ligulis concoloribus basi pilosis tubo subæquilongis, acheniis apice subattenuatis muriculatis pappo albo eis sublongiori terminatis, setis pappi omnibus a basi plumosis.

Hab. in Tauro *Ciliciæ* Kotschy, No 324.

Cæspitosum? Caules subpedales, rami 4-5 poll. longi, folia inferiora semipedalia 5-6 lin. lata, capitulum magnit. ejus *L. asperi*. Species a præcedentibus distincta indumento densiori pannoso, caulis ramosi ramis divaricatis, acheniis abbreviatis. — Species *Leontodontis* hic descriptæ characteribus forsitan nimis lævibus distinguuntur, sed æquo jure ac plurimæ generis naturalissimi admittendæ sunt donec saltem observationes ultiores inter eas intermedia occurrere nos docuerint.

SCORZONERA MULTISCAPA Boiss. (Sect. *Euscorzoneræ*.)

Sc. radice fusiformi verticali, collo nudò, foliis omnibus radicalibus

brevissimè intertexto—puberulis pulverulento—canescentibus angustè linearibus gramineis flexuosis canaliculatis integerrimis inferioribus nonnullis sæpè margine crispulis apice subrevolutis, scapis numerosis canescentibus monocephalis erectis folia paulò superantibus, involucri puberuli phyllis paucis latis adpressis angustè albo-marginatis infimis triangulari-ovatis cæteris lanceolatis omnibus obtusiusculis, ligulis purpureis striatis involucri dimidiò brevioribus, acheniis basi dilatata angulatis supernè cylindricis sub lente parçè scabridis, pappo sordido achenia subæquantibus.

Hab. in collibus circà *Raschey* AntiLibani Maio. (Boiss.)

Folia 6-8 poll. longa 1-2 lin. lata, scapi 8-9 pollicares, capitula minora et breviora illis *Sc. roseæ* cui affinis est et quæ differt radicis collo filamentoso, foliis glabris planis elevatum nec obsolete nervosis, involucri phyllis attenuato-acuminatis, acheniis striatis.

Var. β . *compacta*. — Folia abbreviata patula 1-2 poll. longa in cæspitem compactum aggregata inferiora sæpè oblonga linearia. Scapi 4-5 pollic.

Hab. in cultis excelsis Libani in viâ inter *Beyrout* et *Damascus*.

Habitus diversus sed characteres capitulorum et acheniorum omnino speciei.

SCORZONERA CALYCVLATA Boiss. in Kostch. pl. Pers. bor. 1846.
(Sect. *Euscorzoneræ*.)

Sc. radice fusiformi, collo petiolis vetustis densè squamoso, foliis brevissimis ramosis sub lente hirtulis viridibus radicalibus et caulinis inferioribus angustè lineari-lanceolatis irregulariter incisè longè acuminatis lacinii triangulari-lanceolatis acutis, foliis caulinis intermedii et summi paucis linearibus parçè denticulatis basi rotundatis, caulibus ascendentibus teretibus glabris totâ longitudine ramis remotis brevibus auctis 2-4 cephalis, capitulis pedunculo eis breviori suffultis, involucri ovati glabri phyllis inferioribus cæteris dimidiò brevioribus lutescentibus ovatis vel oblongis obtusis interioribus virescentibus oblongo-ellipticis angustè albomarginatis, ligulis luteis extus rubellis involucri sesquolongioribus, acheniis...

Hab. in monte *Demawend* alt. 6000'. Kotschy N° 344 A.

Folia majora 5 poll. longa 6-9 lin. lata, caules pedales. Valdè affinis *Sc. incisæ* DC. quæ tantum differt foliis caulinis majoribus basi am-

plexicaulibus, involucri phyllis inferioribus non subæquilongis calyculumque formantibus sed in interiora sensim elongatis.

SCORZONERA LIBANOTICA Boiss. (Sect. *Euscorzoneria*.)

Sc. tota indumento floccoso adpresso sordido demum deterrenti lanata, collo valde squamoso, foliis inferioribus amplis oblongis vel oblongo-lanceolatis acutis minutè crispulo-denticulatis in petiolum brevem attenuatis, caulinis superioribus e basi amplexicauli oblongo-lanceolatis acuminatis infernè utrinquè 2-3 argutè denticulatis, caulibus elatis foliosis teretibus supernè ramosis 2-3 cephalis, capitulis magnis longè pedunculatis, involucri oblongi supernè subangustati phyllis glabris glaucescentibus latis ab infimis ovato-triangularibus ad intima lanceolata obtusissima sensim auctis, ligulis involucri sesquilongioribus flavis basi atropurpureis, acheniis...

Hab. in cultis derelictis Libani superioris in viâ inter *Damascum* et *Beyrout*. Legi flor. Maii fine.

Folia radicalia cum petiolo basi latè dilatato 6-9 poll. longa 4-4 1/2 poll. lata, caules 4-4 1/2 pedales, capitula vix minora eis *Sc. Hispanicæ* cui et *Sc. crispatulæ* affinis est et a quibus distinguitur foliorum formâ, phyllis regulariter imbricatis et ab infimis ad suprema sensim auctis, ligulis basi atropurpureis etc.

SCORZONERA RADICOSA Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Gelasia*?)

Sc. rhizomate crasso densissimè cæspitoso, foliis omnibus radicalibus confertissimis brevissimè puberulis canescentibus angustissimè linearibus flexuosis pleribusque integerrimis paucis pinnatifidis lobis linearibus brevissimis, scapis gracilibus folia æquantibus vel eis duplò longioribus, capitulis parvis, involucri obconici phyllis tenuiter puberulis triangulari-lanceolatis ab inferioribus ad superiores elongatis angustè membranaceis acutiusculis, ligulis subtus rubellis, pappi (junioris) setis apice glabellis.

Hab. in glareosis alpium *Hasartschal* in parte occidentali montis *Elbrus* alt. 10000' (Kotschy).

Folia 4-4 1/2 poll. longa canaliculata lineam aut vix amplius lata, capitula illis *Sc. pygmææ* ferè minora. Species tantum florifera nota, a *Podospermo cano* cui foliis nonnullis pinnatifidis accedit distincta

rhizomate crassè cæspitoso foliis capitulisque multò minoribus. Pappo immaturo quidem sed qui supernè scaber videtur inter *Gelasias* propè *Sc. pygmæam* et *rigidam* diversissimas militare videtur. Forsan *Podospermi* spec. sed hoc genus minimè naturale est et in posterum rursùs *Scorzonera* conjungendum.

SCORZONERA MACKMELIANA Boiss. (Sect. *Gelasia*.)

Sc. rhizomate lignoso cæspitosè compacto, foliis adpressissimè tomentosis canis brevibus linearibus obtusis rigidulis subcanaliculatis margineque subundulatis glabris, scapis foliis paulò longioribus monócephalis, capitulis parvis, involucris tomentelli canescentis phyllis paucis erecto-patulis ab infimis triangularibus ad interiora lanceolata elongata omnibus acuminatis, floribus paucis, ligulis subtùs rubris involucrum paulò superantibus, acheniis...

Hab. in editissimis jugis *Mackmel* Libani. (Boiss.)

Folia 9-12 lin. longa 4 1/2-2 lin. lata. Scapi 6-18 lin. longi, capitula illis *Sc. pygmæ* minora minùsque floribunda; huic affinis sed sat differre videtur indumento adpressè tomentoso nec hirtulo, foliis abbreviatis rigidioribus, involucris phyllis paucioribus acutioribus. *Sc. rigida* affinis quoque a nostrà differt collo valdè squamoso, foliis erectis nec expansis angustioribus multò longioribus supernèque attenuatis margine non undulatis. Forsan *Sc. tomentosa* 7 *linearis* DC. Prod. a *Sc. tomentosa* L. descriptione diversissima ad *Sc. Mackmelianam* spectat.

SCORZONERA CINEREA Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Gelasia*.)

S. tota tomento tenuissimo densissimo cinerea, caulibus elatis teretibus striatis foliosis supernè remotiusculè ramosis ramis strictis monócephalis angustè et elongatim racemosis, foliis integerrimis parallelè 5-6 nerviis inferioribus linearibus vel oblongo-lanceolatis superioribus a basi rotundatà acuminatis summis angustè linearibus, involucris squamis adpressè erecto-patulis sericeis omnibus subæquilongis angustè lineari-lanceolatis acuminatis, ligulis concoloribus involucro paulò longioribus, acheniis junioribus glabris, pappi setis basi tantùm plumosis.

Hab. in declivibus graminosis ad radices montis *Demawend* propè pagum *Ask* Kotschy N° 374.

Pulchra species caule sesquipedali longè et racemosè 3-4 cephalo, folia inferiora 3-4 poll. longa 4-6 lin. lata, rami cauli adpressi subbipollicares, involucrum 6-9 lineas longum. Affinis Sc. Ancyritanæ a quâ differt indumento hirtulo, foliis ovatis vel oblongis, floribus brevissimè pedunculatis, etc.

TRAGOPOGON KOTSCHYI Boiss.

Tr. glabrum multicaule caulibus pluribus cylindricis virgatis foliosis simplicibus erectis elatis, foliis inferioribus angustè linearibus gramineis plicatis subquinenerviis longis, intermedtiis a basi elliptico-oblongâ longissimè acuminatis summis linearibus acuminatis, caule sub capitulis subincrassato, involucri phyllis 8 glabris lanceolatis acutis flores exteriores subæquantibus, acheniis marginalibus albis obsoletè squamoso-tuberculatis supernè sensim et modicè attenuatis, parte attenuatâ semine ipso breviori, pappo sordido achenio breviori.

Hab. in graminosis ad radices montis Demawend propè Ask et in alpihus occidentalibus montis Elbrus N° 372 et 723.

Planta 1-1 1/2 pedalis, folia inferiora semipedalia 1-1 1/2 lin. lata, caulina 3-4 lineas lata abruptiusculè et longissimè acuminata, capitula magnit. eorum T. brevirostris, achenia 8-9 lin. tantùm longa quo caractere huic speciei affine sed distinctum caulibus simplicibus, achenio apice tantùm angustato nec rostro manifesto donato.

TRAGOPOGON ACANTHOCARPUM Boiss.

Tr. glabrum, radicis collo vaginato, caulibus tenuibus erectis simplicibus vel supernè parcè ramosis foliosis, foliis angustissimè linearibus plicatis gramineis longè attenuato-subulatis quinenerviis, supremis brevibus a basi oblongâ subulatis, capitulis pedunculis foliosis suffultis, involucri demùm glabrati phyllis circ. 10 lanceolatis subulato-attenuatis per anthesin erecto-patulis corollâ brevioribus fructiferis adpressis, acheniis acutè hexagonis ad angulos aculeis ascendentibus obsitis ad facies submuricatis in rostrum eis dimidiò brevius attenuatis, pappo sordido achenio paulò breviori.

Hab. in monte Totschal propè Teheran Kotschy N° 592. Huc etiam probabiliter spectant specimina florifera sub N° 82 ex hortis graminosis ad Teheran.

Habitu foliisque angustis simile Tr. Kotschyi sed folia caulina basi

vix dilatata, involucrum plurifolium et achenia validiora acutè angulata aculeataque nec teretia læviuscula.

TRAGOPOGON OLYMPICUM Boiss.

Tr. glabrum basi simplex vel pluriceps, collo membranis petiolorum vetustorum stipato, rhizomate tenui verticali elongato, caulibus pumilis infernè densiusculè foliosis, foliis infimis linearibus cæteris a basi latiori longè attenuatis rectis vel incurvis magine sæpè crispulis omnibus plurinerviis costâ mediâ latiori albidâ, capitulis mediocribus floriferis stellatim patentibus, involucri phyllis 8 infernè albotomentellis demùm glabrescentibus lanceolatis subulato-acuminatis ligulis luteis concoloribus paulò brevioribus, acheniis brevibus teretiusculis striatis acutè squamelloso-muricatis in rostrum eis brevius sensim attenuatis ad pappi basin tomentellis, pappo rufescenti achenium subæquantibus.

Hab. in pascuis siccis montium Anatoliæ, *Olympo Bithyno* (Boiss.), monte *Davros* Pisidiæ et *Anemas* Lycaoniæ alt. 6000' (Heldr.). Probab. quoquè hûc spectant specimina florifera e monte *Totschal* Persiæ borealis Kotschy N° 594. a. b. et c.

Caules 3-4 rariùs 6-7 pollicares, folia 1 1/2-2 poll. longa intermedia infernè 3-5 lin. lata, capitula magnit. *Tr. pusilli*, achenia 6-7 lin. longa. Affine præcedenti sed diversum caule pumilo, foliis brevioribus, acheniis non acutè angulatis. Habitu affine quoque *Tr. pusillo* MB. mihi quoad fructus ignoto sed hoc certè differt radice in tubercem oblongum infernè attenuatâ nec tenuiter cylindricâ, foliis angustius et multò longius linearibus capitulum æquantibus.

TRAGOPOGON PALÆSTINUM Boiss.

Tr. pumilum, rhizomate tenui verticali, collo parè vaginato pluricipiti, foliis omnibus a basi linearibus plurinerviis patulo-revolutis plicatis margine undulatis et sub lente tenuissimè denticulato-scabridis apice attenuatis radicalibus confertis, caulinis paucis abbreviatis, caulibus monocephalis folia vix superantibus apice non incrassatis, involucri phyllis 8-10 lanceolatis acuminatis ligulas concolores flavas non æquantibus, acheniis acutangulis ad angulos breviter squamoso-muricatis in rostrum eis subbrevis abruptè attenuatis, pappo sordido achenio æquilongo.

Hab. in *Palæstina* loco non notato. (Boiss.)

Planta 2-5 pollicaria, folia majora 3 poll. longa 3 lin. lata valdè revoluta, capitula magnit. *Tr. Olympici* et *pumili*, achenium circ. 6 lin. longum. Affine *Tr. Olympico* quod statim dignoscitur foliis e basi atiori attenuatis, acheniis non angulatis et *Tr. acanthocarp* quod differt caulibus elatioribus ramosis, foliis integerrimis, acheniis ad angulos longiusculè aculeatis in rostrum crassius brevius sensim nec abruptè attenuatis.

TRAGOPOGON NERVULOSUM Boiss.

Tr. parcissimè floccosum tandem glabrescens glaucum, rhizomate tenui elongato subrepenti nudo, caule humili infernè densè folioso simplici vel ramulo aucto sub capitulo paululùm incrassato, foliis omnibus a basi linearibus plicatis flexuosis margine integerrimo crispulis rigidiusculis elevatim multinerviis nervis albidis apice setaceo-attenuatis sæpè circinnatis, involucri phyllis 40 margine subundulatis lanceolatis acuminatis ligulas concolores flavas subæquantibus, acheniis subangulatis striatis obsoletè squamoso-muricatis apice sensim in rostrum eis brevius attenuatis, pappo sordido achenium æquanti.

Hab. in Libano circà *Eden*. Legi Julio 1846.

Planta 6-9 pollicaris, folia inferiora 3-4 poll. longa, 2-3 lin. lata, involucri fructiferi phylla sesquipollicem longa, achenium cum rostro 9 lin. longum. A *Tr. Palæstino* facillè distinguitur foliis margine integris evidenter albo-nervosis, acheniis longioribus obsoletius aculeatis in rostrum brevius et crassius sensim attenuatis.

TRAGOPOGON COELESYRIACUM Boiss.

Tr. glaucescens pumilum, rhizomate tenui cylindrico, collo pluricipiti-vaginis petiolorum stipato, foliis densè rosulatis e basi latiori plurinervi longè et tenuiter lineari-subulatis canaliculatis recurvis margine parçè lanato-hirtutis integerrimis, caulibus scapiformibus folia vix superantibus apicè distaloso-subincrassatis infernè folio uno alterove obsitis, involucri phyllis 5 longissimis longè lanceolato-subulatis, acheniis teretibus striatis acutè squamelloso-muricatis in rostrum eis paulò longius attenuatis, pappo sordido achenio breviori.

Hab. in incultis *Coelesyriae* ubi legi fruct. Aug. 1846.

Caules 3-4 poll., involucrium 18-20 lin. longum, achenium 6 lin. ros-

trum 7 lin. circ. longum sub pappo iterum breviter clavato-incrassatum. Species foliis radicalibus a basi 2 $1\frac{1}{2}$ –3 lin. tantum latè tenuissimè lineari-subulatis insignis foliatione *Stipam tortilem* referens. Involucro pentaphyllo affine *Tr. crocifolio* quod differt collo lanato, foliis basi non dilatatis, acheniis crassioribus brevioribus in rostrum eis dimidiò brevius attenuatis etc.

TARAXACUM PSYCHROPHILUM Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846.
(Sect. *Brevirostria*.)

T. glaberrimum, rhizomate verticali brevi, collo membranis fuscis vestito, foliis omnibus radicalibus patulis angustè lineari-lanceolatis infernè attenuatis integris vel parcè et obsoletissimè denticulatis, pedunculis folio brevioribus, capitulis parvis, involucri livescentis phyllis omnibus adpressis glaberrimis inferioribus dimidiò brevioribus omnibus breviter membranaceo-mucronatis, ligulis brevibus concoloribus, acheniis læviusculis supernè subattenuatis pappo niveo eis æquilongo terminatis.

Hab. propè lacum in albis *Hasartschal* partis occidentalis montis *Elbrus* Julio. (Heldr.)

Habitus, folia angusta integra et capitula parva *T. alpini* et *palustris* quæ formis *T. officinalis* adnumeranda sed ab eis distinctissimum acheniis attenuatis nec rostratis. Accedit ad *T. Bithynicum* DC. quod differt foliis magis dentatis brevioribus, capitulis dimidiò brevioribus, scapis lanatis, pappo breviori.

CHONDRILLA ACANTHOLEPIS Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846.

C. rhizomate duro tortuoso pluricauli, caulibus elatis tenuiter stratis basi sparsim setoso-aculeolatis cæterum glaberrimis glaucescentibus parcè foliosis a medio ramosissimis ramis strictis virgatis longissimis, foliis glabris glaucescentibus infimis subruncinato-pinnatifidis, laciniis triangulari-acuminatis cæteris integerrimis, caulinis linearibus, rameis lineari-filiformibus, capitulis parvis subsessilibus ad partem superiorum ramorum solitariis vel 2–3 in fasciculos dispositis, calyculi minutissimi squamis triangulari-acuminatis, involucri phyllis 8 lineari-lanceolatis angustè albomarginatis sub lente parcè pulverulento-tomentellis secus nervum medium setis aculeiformibus flavescensibus sparsis obsitis, rostro achenium striatum supernè muricatum subsequenti.

Hab. ad radices montis *Demawend* Kotschy N° 602.

Caules elati tripedales, folia intermedia 2-2 1/2 poll. longa 2 lin. lata. Habitus et capitulorum magnitudo *Ch. juncea* a qua differt foliis glabris, involucri phyllis aculeato-setosis nec glabris.

LACTUCA BRASSICÆFOLIA Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. 4846. (Sect. *Scariola*.)

L. glaberrima glaucescens perennis, caule ascendenti elato tereti tenuiter striato supernè patulè ramosissimo ramis apice dichotomis, foliis subcoriaceis argutè denticulatis radicalibus caulinisque infimis indivisis ovato-oblongis in petiolum brevem attenuatis vel sublyratis segmentis lateralibus 2-4 parvis terminali ovato, caulinis ovatis parvis auriculæformibus sessilibus ovatis basi cordato-amplexicaulibus auriculis rotundatis, capitulis ovatis brevissimè pedunculatis secùs ramulorum extremitatem 3-5 laxè dispositis, pedunculis ramisque breviter glandulosis, involucri phyllis glabris pallidis ab inferioribus triangulari-lanceolatis ad intima lanceolata sensim auctis, flosculis lutescentibus extùs rubellis involucrum non superantibus, achenio rufo lævi compresso oblongo-lineari utrinquè sub 5 striato, rostro tenuissimo achenio multoties breviori, pappo niveo achenio paulò longiori.

Hab. in schistosis montis *Elbrus* propè *Derwend* Kotsch. N° 442, in Persià Auch. N° 486.

Caulis infernè pennà anserinà crassior bipedalis, folia inferiora 2-3 poll. longa 4-4 1/2 lata, capitula inter ea *L. sylvestris* et *L. perennis* magn. media ovata, achenium lin. 4 1/3, rostrum lineæ 1/3 longum. Species distinctissima propè *L. polycladam* collocanda.

LACTUCA SCARIOLOIDES Boiss. (Sect. *Scariola*.)

L. biennis, caulibus glaberrimis albis tenuiter striatis supernè ramossissimis ramis dichotomis ramulisque elongatis strictis paniculam patentem laxam formantibus, foliis pallidè virentibus margine denticulato-spinulosis subtùs ad nervum medium aculeatis cæterùm glabris infimis basi attenuatis latè linearibus indivisis vel pinnatifido-runcinatis, superioribus a basi latissimè rotundato-auriculatà amplexicauli ovato-oblongis acuminato-attenuatis plùs minùs lobatis, capitulis subsessilibus pedunculatisve oblongis parvis, involucri pallidè livescentis glabri phyllis ab infimis triangularibus ad superiora lanceolata sensim

auctis, flosculis flavis involucro duplò longioribus, acheniis demùm atrorubris elliptico-linearibus utrinquè attenuatis compressis multi-striatis apice subscabridis rostro eis æquilongò vel subbreviori terminatis, pappo caducissimo.

Hab. in alpe *Kuh Delu* Persiæ australis Kotschy N° 506 et 506 a et in monte *Totschal* Persiæ borealis Kotschy N° 556.

Planta 2-3 pedalis foliis et habitu *L. scariolam* omninò referens quæ eximiè differt ligulis involucrum vix superantibus, acheniis minoribus minùs compressis sesquilineam nec 2-2 $\frac{1}{2}$ lineas longis rostro eis longiori nec breviori terminatis, pappo non caduco.

ZOLLIKOFERIA TENUILOBA Boiss.

Z. annua glabra glaucescens, caulibus a basi dichotomè divaricatis ramosis, foliis radicalibus elongatis linearibus pinnatipartitis rachide lineari denticulatà laciniis longis lineari-setaceis integris albo-mucronulatis, caulinis superioribus triangularibus acutis dentatis basi auriculatis auriculis minutis obtusis denticulatis fissisque, capitulis longiusculè pedunculatis laxè corymbosis, involucri glabri phyllis pallidè livescentibus adpressiusculè imbricatis infimis ovatis albo-acuminatis interioribus lanceolatis, ligulis luteis subtus lividis involucrum breviter superantibus, acheniis lineari-subquadrangulis tenuissimis multi-striatis exterioribus minutissimè puberulis interioribus glabris lævibus, pappo achenium æquanti.

Hab. in *Arabia petrea* Pælestinae contermina (Boiss.) in Syria littorali propè *Tyr* (Pestalozza).

Species a *Z. mucronata* Boiss. earundem regionum oriunda distinctissima caulibus a basi dichotomè ramosis nec a medio paniculatis, foliorum divisionibus primariis longis tenuibus integris nec iterùm pinnatis, ligulis subtus discoloribus, achenia quoque magis striata esse videntur. *Z. chondrilloides* nostræ habitu magis affinis differt rhizomate perenni indurato, phyllis inferioribus obtusis, acheniis 4 striatis, etc.

CYMBOSERIS Boiss.

Capitulum multiflorum. Involucrum basi breviter calyculatum phyllis sub anthesi planis enerviis post anthesin dorso valdè incrassato inflatis

induratis spongiosis extus carinato-convexis intus cymbiformibus. Receptaculum nudum. Achenia dissimilia disci calva compressa latè bi-alato-subtriquetra facie exteriori sensim prominenti carinata interiori convexa subcymbiformia involucri phyllis arcè incumbentia. Achenia radii cylindrica striata a basi subcalloso-incrassatà cavà ad apicem usquè sensim subattenuata papposa. Pappus pilosus albus mollis tenuissimus multiserialis achenio brevior persistens. — Herba annua Palæstina facie *Phæcasii* sed omnibus partibus major.

Genus a *Crepide*, *Endoptera* generibus affinis acheniis exterioribus calvis compresso-bialatis extus triquetris intus convexis nec ut in *Crepide* conformibus cylindricis nec ut in *Endoptera* intus unialatis nec ut in *Pterotheca* intus 3-5 alatis receptaculoque omninò nudo distinctissimum.

CYMBOSERIS PALÆSTINA Boiss.

C. annua brevissimè papillari-hirtula, caule erecto tereti folioso superne ramoso corymboso-paniculato, foliis lætè viridibus teneris inferioribus in petiolum attenuatis runcinatis lyratis segmentis lateralibus parvis ovatis triangularibusve terminali maximo ovato obtuso basi subcordato grossè et acutè lobato-dentato, foliis intermediis runcinato-lyratis medio angustatis basi-dilatato-amplexicaulibus, superioribus e basi latè et rotundatim cordato-amplexicauli ovatis vel oblongo-lanceolatis acuminatis, rameis e basi lineari setaceis, capitulis pedunculis longis erectis nudis suffultis, calyculi squamis 5-6 ovatis acutis alomarginatis adpressis involucri quadruplò brevioribus, involucri phyllis subbiseriis æquilongis sub anthesi linearibus glabris pallidis apice obtusis ciliatulis fructiferis dorso valdè spongioso-incrassatis albis, ligulis intensè flavis concoloribus involucri sesquialongioribus.

Hab. in umbrosis Palæstinæ, in *Carmelo*, monte *Ithabure*, prov. *Samariâ*. Legi Apr. et Maio.

Planta 4-4 1/2 pedalis, folia inferiora cum petiolo 7-8 poll. longa, segmentum terminale 3-3 1/2 poll. longum 2 et ampliùs latum, segmenta lateralia utrinquè 2-3 a superioribus 6-8 lin. longis obtusis ovato-oblongis ad inferiora triangularia acuta diminuta, capitula illis *Cr. biennis* paulò minora, involucrum fructif. 6-7 lin. longum. Achenia radii 4 lin. circ. longa alis utrinquè semini compresso æquilatis, disci 3 1/2 lin. longa angustissima pappo 2 lin. longo superata.

PSAMMOSERIS Boiss. et Reut.

Capitulum multiflorum. Involucrum uniseriale basi squamis paucis calyculatum phyllis immutatis. Receptaculum nudum foveolatum. Achenia exalata subcompressa sub 10 striata rostro setaceo albo eis quadruplò longiori terminata. Pappus multiserialis pilosus albus apici subincrassato rostri insertus deciduus. — Herbæ annuæ Ægyptiacæ et Arabicæ arenicolæ.

Genus a *Barckhausia* cui affine distinctum acheniis brevibus subcompressis nec tereti-cylindricis, abruptè in rostrum longissimum album nec ex achenii substantiâ ortum attenuatis.

PSAMMOSERIS SENECIOIDES Boiss. et Reut.

Ps. annua sub lente parcè et brevissimè hirtula, foliis rosulatis lanceolato-linearibus acutis pinnatilobatis dentatisve lobis triangularibus argutis margine parcè ciliatis, caulibus multis ascendentibus scapiformibus foliis vix longioribus simplicibus vel a medio ramosis 2-3 cephalis foliis 1-2 linearibus vel lineari-setaceis obsitis, capitulis minimis subcylindricis pedunculis setis brevibus paucis obsitis vel glabris, calyculo involucri quadruplò breviori, involucri livescentis phyllis conniventibus angustè nigrescenti-marginatis lineari-lanceolatis obtusiusculis dorso serie simplici aculeolato-setulosis, ligulis extùs rubellis involucri paulò longioribus.

Barckhausia senecioides Spr. — *Crepis senecioides* Delile Æg. tab. 42, fig. 2.

Hab. in arenosis Ægypti circà *Kahiram* (Del.) in palmetis ad *Sackara*. (Boiss.)

PSAMMOSERIS ARABICA Boiss. et Reut.

Ps. annua sub lente brevissimè setuloso-hirta, foliis rosulatis oblongis argutè dentatis pinnatilobatis partitisve segmentis parvis ovatis sæpè parcè denticulatis, caulibus pluribus ascendentibus a medio subdichotomè et breviter ramosis 3-7 cephalis foliis 2-4 plò longioribus, folio caulino inferiori sæpè pinnatisecto reliquis minimis setaceis, pedunculis glanduloso-hirtis, capitulis mediocribus, calyculo involucri

triplo breviori, involucri phyllis conniventibus lineari-lanceolatis obtusiusculis brevissimè setulis albis nigrisque hirtellis, ligulis luteis concoloribus involucri paulò superantibus.

Hab. in arenosis *Arabia petrea* Palestinam versùs. Legi Apr. 1846.

Folia 1-4 $1\frac{1}{2}$ poll. longa, caules 3-4 pollicares, capitula illis Sp. præcedentis majora, involucri phylla 5 lin. circ. longa. A præcedenti distincta foliis abbreviatis, caulibus ramosioribus apice glandulosis, involucrio densiusculè hirtò. Habitus *Lagoseridis Nemausensis*.

CREPIS CRETICA Boiss. (Sect. *Barckhausia*.)

Cr. annua breviter hirtula, foliis omnibus radicalibus obovatis obsolete denticulatis vel pinnatifidis, caulibus numerosis setaceo-filiformibus ascendentibus simplicibus vel parè ramosis glabris, capitulis minimis longiusculè pedunculatis, involucri squamis accessoriis 3-4 brevissimis setaceis, phyllis glabris vel dorso setulosis fructiferis patulis subinduratis canaliculatis dorso obtusè carinatis, acheniis oblongo-lanceolatis striatis apice in rostrum eis duplo brevius attenuatis, pappo valdè deciduo achenio breviori.

Hab. in *Cretâ* undè retulit cl. Prof. Raulin.

Barckausia Cretica Boiss. in Raulin pl. Cret. exs.

Plantula 2-3 pollicaris, capitula eis *B. cernuæ* ferè minora, involucri phylla vix ultrà 2 lin. longa. A *B. cernuâ* acheniis rostratis, a *B. leotodontoide* Rchb. foliis non elongatis, caulibus brevissimis acheniis dimidiò brevioribus distincta. *B. Suffreniana* rostro achenium æquant, *B. bellidifolia* caulibus crassioribus capitulis plùs duplo majoribus differunt. Species ex duobus speciminibus tantùm nota ulterius investiganda.

CREPIS SIEBERI Boiss. (Sect. *Eucrepis* DC.)

Cr. perennis, radicis præmorsæ fibris cylindricis tenuibus elongatis, collo lanà rufescenti vestito, caule parè pilosulo glabrove supernè laxè corymboso-paniculato, foliis teneris lætè virentibus sub lente secus costam densiùs in utrâque paginâ parè setulosis radicalibus inferioribusque petiolatis interruptè lyrato-pinnatifidis lobis lateralibus numerosis a superioribus ovatis angulatis subretrorsis ad infimos triangulares sensim diminutis terminali majori basi truncato vel subcordato-ovato acutiusculo obsolete dentato, folio caulino ad ramum in-

feriorem sito sublyrato basi amplexicauli cæteris linearibus integris brevibus, ramis pedunculisque glanduloso-pubescentibus, calyculi squamis adpressis triangulari-lanceolatis involucri quadruplò brevioribus, involucri puberuli phyllis linearibus uniserialibus acutis angustè albo-marginatis, ligulis intensè flavis concoloribus involucri duplò longioribus, acheniis angulatis sub 15 nerviis apice subattenuatis, pappo niveo deciduo achenii longitudinis.

Crepis interrupta Sieb. pl. Cret. exs. DC. Prodr. non Sibth. Flora Græca.

Hab. in rupestribus *Atticæ*, *Argolidis*, *Laconicæ* (Boiss. Sprun.), *Cretæ* (Sieb. Heldr.), *Zacynthi* (Margot.), insulæ *Cos* (d'Urv.).

Species pulchra toto cælo diversissima a verâ *Cr. interrupta* Sibth. tab. 308 quæ *Barckhausiam Zacynthiam* DC. sistit.

CREPIS HIEROSOLYMITANA BOISS. (Sect. *Eucrepis*.)

Cr. perennis, radice præmorsæ fibris longis tenuibus cylindricis collo glabro, caule imò basi setuloso cæterum glabro supernè laxè corymboso-paniculato, foliis teneris lætè virentibus ad rachidem subtus parçè setulosis cæterum glabris radicalibus petiolatis lyrato-pinnatis partitis rachide alata integrâ segmentis lateralibus numerosis ovato-rotundis subintegris obtusis a superioribus ad infima diminutis terminali a basi subcordatâ ovato-oblongo obtuso subrepando, foliis caulinis inferioribus 1-2 lyratis basi dilatâ amplexicaulibus rotundato-auriculatis, rameis linearibus abbreviatis, pedunculis glabris vel sub lente crispulè et minutissimè puberulis, calyculi squamis lanceolatis acuminatis laxiusculis involucri triplò brevioribus, involucri subfarinoso-puberuli phyllis lanceolatis angustè albo-marginatis acutis, ligulis concoloribus involucri duplò longioribus, acheniis subincurvis angulatis sub 11 nerviis supernè subattenuatis, pappo niveo citò deciduo acheniis longiori.

Hab. in rupestribus collium circâ *Hierosolimam* sitorum v. gr. in rupibus ad meridiem vallis *Hinnom*. Legi April.

Pedalis vel sesquipedalis, folia radicalia 3-4 poll. longa segmenta lateralìa 4-6 diametro 3-4 lin. lata, terminale pollicem circ. longum, panicula et capitula *C. Sieberi* cui habitu et characteribus valdè affinis est et a quâ differt radice collo non lanato, foliorum segmentis omnibus obtusis ferè integris rotundatis, calyculi squamis longioribus

acuminatis laxioribus inæqualibus, involucri et pedunculo parçè et farinosè nec glandulosè pubescentibus.

CREPIS MUNGERII Boiss. et Heldr. (Sect. *Eucrepis*.)

Cr. perennis, radice præmorsæ fibris tenuibus cylindricis collo glabro, caulibus pluribus subaphyllis glabriusculis infernè bifurcis vel a basi pluries et dichotomè ramosis folia vix duplò superantibus, foliis teneris lætè virentibus sub lente parçè setulosis runcinato-pinnatipartitis sublyratis petiolatis segmentis lateralibus numerosis a superioribus oblongis angulatis retrorsis ad infima triangularia diminutis terminali tantum duplò majori a basi truncato-subcordatà breviter ovato obtuso integro, foliis caulinis squamiformibus, pedunculis longis parçè squamulosis supernè minutissimè et crispulè puberulis, calyculi squamis breviter lanceolatis acutis involucri triplò brevioribus, involucri minutè glanduloso-puberuli phyllis linearibus acutiusculis, ligulis intensè luteis concoloribus involucri duplò longioribus, acheniis subincurvis sub 15 striatis utrinquè subattenuatis pappo niveo citò deciduo brevioribus.

Crepis Reuteriana var. *minor* pl. Cret. Heldr. 1847.

Hab. in quercetis montis *Idæ* suprà *Vorisa* alt. 3000-4000'. (Heldr.) Folia 2-4 poll. longa segmento terminali 5-7 lin. longo cæteris minoribus, caules cum pedunculis 4-6 pollicares, capitula magnit. eorum Cr. *Sieberi* cui affinis est et a quâ caulibus pluribus a basi bifurcis sæpius 2 rariùs pleiocephalis infernè glabris nec setulosis, foliorum lobo terminali aliis vix majori, radice collo glabro, calyculi squamis acutioribus, etc., sat differre videtur. Hanc erroneè primùm retuleramus ad speciem sequentem diversissimam caule elato ramoso, foliorum segmentis acutis, involucri phyllis demùm dorso induratis.

CREPIS REUTERIANA Boiss. (Sect. *Eucrepis*.)

Cr. perennis, radice præmorsæ fibris tenuibus cylindricis collo glabro, caulibus erectis infernè glanduloso-hirtis cæterum glabriusculis paulò suprà basin dichotomè et strictè ramosis laxè corymboso-paniculatis, foliis ferè omnibus radicalibus plus minus præsertim ad costas pubescenti-glandulosis petiolatis runcinato-pinnatipartitis lyratis segmentis retrorsis oblongis vel triangularibus acutissimis integris terminali basi truncato triangulari aliis 2-3 plò majori, folio caulino uno al-

terove lineari integro, pedunculis elongatis glabris nudis, capitulis medio-cribriis, calyculi squamis triangulari-lanceolatis acutis albomarginatis involucri quadruplò brevioribus, involucri glabri phyllis angustè linearibus floriferis livescentibus angustè albomarginatis fructiferis dorso ad tertiam vel dimidiam partem usquè secùs nervum medium elevatum rotundato-carinatum spongiosè incrassatis, ligulis luteis concoloribus involucri sesquolongioribus, acheniis cylindricis rectis sub 15 striatis supernè vix attenuatis pappo niveo demùm deciduo eis paulò longiori coronatis.

Hab. in montanis dumosis Anatoliæ, *Smyrnæ* in montibus suprâ *Siclar* (Boiss.), in fauce *Tsimboukkan* Pamphyliæ (Heldr.), in Antilibano circâ *Rascheya* (Boiss.).

Folia 3-5 pollic. longa 6-8 lin. lata illa *Aposeridis fetidæ* quodammodò referentia, caul's 1-1 1/2 pedales, capitula magnit. ferè *Cr. Sieberi*. Huic et duabus præcedentibus affinis sed distinctissima foliis indumento viscidulo obsitis, segmentis omnibus acutis non dentatis, caulinis subnullis vel angustè linearibus, phyllis non ut in eis fructiferis immutatis sed secùs nervum medium ut in *Phæcasio* et *Cymboseride* spongioso-incrassatis.

Var. β . — Pedunculi supernè involucraque pubescenti-viscida.

Hab. in regione mediâ Hermonis suprâ *Rascheya* et *Gebel Baruck* Libani. Legi Aug.

CREPIS SIBTHORPIANA Boiss. et Heldr. (Sect. *Eucrepis*.)

Cr. rhizomate nudo indurato ramoso cæspitoso, foliis ferè omnibus radicalibus breviter puberulis obtusiusculis rariùs acutis oblongo-lanceolatis dentatis vel runcinato-pinnatifidis segmentis triangularibus acutis retrorsis terminali paulò majori triangulari acuto, caulibus nanis puberulis striatis rigidis crassiusculis folia paulò superantibus supernè alternatim 2-4 cephalis ad pedunculorum insertionem infracto-flexuosis, pedunculis ferè horizontalibus crassis capitulo subbrevioribus basi foliolo lineari-setaceo suffultis, calyculi squamis adpressiusculis linearibus involucri albo tomentello triplò brevioribus, phyllis latiusculè elliptico-linearibus obtusiusculis secùs lineam mediam nigrescentibus margine albo-membranaceis, ligulis subtùs rubellis, acheniis sub 12 striatis cylindricis rectis basi et apice obsoletè attenuatis pappo niveo eis æquilongo superatis.

Cr. divaricata var. *canescens* pl. Cret. exs. 1847. — *Hieracium foetidum* Fl. græc. tab. 799 non Willd.

Hab. in saxosis montium Sphacioticorum Cretæ in monte *Stravopodia* (Heldr.) alt. 6000' (Sibth.).

Planta 3-5 pollic., folia 2-4 poll. circ. longa infima minùs profundè dentata, caules supernè ad pedunculos alternos eximiè angulato-flexuosi, pedunculi crassi 3-4 lin. longi, capitula magnit. eorum *Cr. Nicæensis*. Primitum retuleramus ad nostram *Cr. divaricatam* quæ accuratius comparata differt foliis longioribus profundius et acutius pinnatis præsertim caulibus divaricato-ramosissimis, pedunculis 1-2 pollices longis, involucris phyllis angustioribus parçè puberulis apice magis attenuatis. *Hier. foetidum* Willd. — *Crepis foetens* Frœlich in DC. Prodr. exs. planta Armena diversissima.

CREPIS MACROPUS Boiss. et Heldr. (Sect. *Eucrepis*.)

C. rhizomate crassiusculo nudo, collo squamoso, foliis radicalibus ad costam parçissimè hirsutis petiolatis runcinato-pinnatipartitis acuminatis segmentis omnibus retrorsis lanceolatis acutis integris vel denticulatis, caulibus puberulis simplicibus vel ad medium semel vel bis bifurcis 4-4 cephalis, foliis ad dichotomias angustè linearibus integris, pedunculis longis rectis squamulis setaceis paucis obsitis, capitulis mediocribus, calyculi squamis lineari-lanceolatis numerosis inæqualibus adpressis, involucris phyllis densè farinoso-tomentosis lanceolato-linearibus acutiusculis, ligulis flavis concoloribus involucri sesquilon- gioribus, acheniis sub 12 striatis cylindricis rectis apice vix attenuatis pappo niveo eis longiori superatis.

Cr. divaricata var. *longipes* pl. Heldr. Anat. exs. 1846.

Hab. in collibus aridis Lycaoniæ ad occidentem urbis *Koniah Beycheher* versùs. (Heldr.)

Planta 8-9 poll. longa, folia bipollicaria, pedunculi 3-4 poll. longi, capitula paulò majora eis *Cr. divaricata* et præcedentis a quibus differt foliorum segmentis longioribus, pedunculis longissimis, involucri valdè farinaceo-tomentoso, calyculi squamis numerosioribus.

CREPIS ATHOA Boiss. (Sect. *Eucrepis*.)

C. perennis, rhizomate cæspitoso, collo valdè squamoso, foliis radicalibus lanceolatis acutis in petiolum setulosum longè et angustè atte-

nuatis cæterum glabris lucidis lætè virentibus irregulariter et remotè dentatis dentibus brevibus triangularibus acutis, caule tenui erecto folia multò superanti supernè dichotomè 2-4 cephalo pedunculis longis rectis parcè lineari-squamulosis, foliis caulinis 4-2 longè et angustè linearibus integris, capitulis mediocribus, involucri brevissimè farinoso-tomentelli squamis accessoriis paucis triplò brevioribus lineari-lanceolatis phyllis nigricantibus linearibus obtusiusculis angustè albo-marginatis, ligulis pallidè flavis concoloribus involucri sesquolongioribus, acheniis subangulatis multistriatis utrinquè vix perspicuè attenuatis pappo niveo pauciseto eis paulò longiori terminatis exterioribus subincurvis.

Hab. in rupibus montis *Athonis*. (Aucher N° 3277, Friw.)

Folia cum petiolo ferè tripollicaria 4-6 lin. lata, caules 10-12 pollic., capitula magnit. *Leont. hastilis*. Species distinctissima ex affinitate *Cr. crocifoliae* Boiss. et Heldr. quæ differt foliis angustissimis integris, acheniis lævibus apice valdè attenuatis, etc.

CREPIS RAULINI Boiss. (Sect. *Eucrepis*.)

Cr. perennis tota setis sparsissimis glanduliferis parcè obsita, rhizomate incrassato duro cæspitoso, foliis omnibus radicalibus viridibus oblongis in petiolum attenuatis parcè et remotè repando-denticulatis, scapis monocephalis folia paulò superantibus squamis paucis setaceis obsitis, capitulis mediocribus, squamis accessoriis paucis lineari-setaceis adpressis involucri dimidiò brevioribus, involucri phyllis angustè linearibus acutis præter pubem sparsam brevissimam farinaceam setulis glandulosis paucis obsitis, ligulis flavis concoloribus involucri vix sesquolongioribus, acheniis..., pappo niveo.

Hab. in *Cretâ* undè retulit et mihi comm. cl. Dr. Raulin.

Pianta mihi ex unico specimine nota specimina parva *Seriolae lævigatae* quodammodò referens, folia pollicem aut paulò ampliùs longa 4-5 lin. lata acutiuscula acutè breviter et parcè dentata, scapi radicales bipollicares, capitula magna. *Cr. divaricatae* cui accedit sed a quâ distinctissima.

CREPIS ELBRUSENSIS Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Hieracioides*.)

Cr. rhizomate filiformi nudo, foliis rosulatis confertis pilis albis

brevibus dense hirtis abbreviatis petiolatis lyrato-pinnatipartitis segmentis subretrorsis oblongis triangularibusve parvis iterum sæpè argutè pinnatilobatis integrisve-terminali majori oblongo argutè et remotè denticulato obtusiusculo breviter mucronato, caulibus glabris folia 2-3 plò superantibus semel vel bis divaricatim bifurcis præter squamulam linearem ad dichotomiam sitam nudis, capitulis medlocribus pedunculo longo supernè nigro-glanduloso suffultis, calyculi squamis ovato-oblongis acutiusculis involucri triplò brevioribus, phyllis livescentibus præter pubem brevissimam farinaceam secùs lineam mediam glanduloso-setulosis, ligulis flavis concoloribus involucri sesquilon-gioribus, acheniis rectis cylindricis 12-15 striatis obsolete attenuatis pappo niveo caduco eis breviori superatis.

Hab. in loco *Char Gerdene* dicto propè pagum *Asadbar* in parte occidentali montis *Elbrus* Kotsch. N° 471, Aucher N° 4855. Hùc quoque spectare videtur Kotschy N° 676 e monte *Totschal* (forma major).

Folia rosulata pollicem vel sesquipollicem longa, caules 3-4 pollicares, capitula magn. Cr. *Bithynicæ*, involucri phylla 4 lin. longa. Ex affinitate Cr. *heterotrichæ* et *Bithynicæ*.

CREPIS ROBERTIODES Boiss. (Sect. *Hieracioides*.)

Cr. rhizomate cæspitoso petiolis vetustis valdè squamoso, foliis sub lente parçissimè puberulis vel omninò glabris omnibus radicalibus cæspitosis linearibus interruptè pinnatipartitis rachide angustè lineari planà segmentis triangularibus vel lineari-oblongis acutis sæpè subretrorsis valdè inæqualibus terminali oblongo aceto, caulibus numerosis scapiformibus monocephalis folia duplò superantibus squamulà unà alteràve setaceà obsitis, capitulis minutis, squamis accessoriis paucis angustè lineari-lanceolatis adpressis involucri triplò brevioribus, involucri phyllis parçè et brevissimè farinoso-puberulis livescentibus linearibus acutis, ligulis flavis subtis rubellis involucri sesquilongioribus, acheniis subangulatis multistriatis rectis utrinquè vix manifestè attenuatis pappo sordido eis æquilongo superatis.

Hab. in regione superiori *Hermonis* suprà *Rascheya* ubi gregarie crescit alt. 8000-9000'. Legi flor. Julio 1846.

Folia cæspitosa flaccidula 1 1/2-2 poll. longa laciniis tenuibus 1 1/2-2 lin. longis, scapi 2-2 1/2 pollicares, capitula magnit. eorum *Robertiæ taraxacoidis* cujus habitum omninò refert. Species pulchella.

HIERACIUM PERSICUM Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Piloselloidea*.)

H. pallidè virens, rhizomate præmorso, caulibus infernè minutissimè stellato-puberulis longiusculè et parcè setosis dein glabris apice densè et breviter stellato-puberulis corymbosis polycephalis, foliis radicalibus oblongis integerrimis in petiolum breviter attenuatis utrinquè setis longis adpressiusculis e tuberculo ortis obsitis cæterùm glabris, caulinis 2-3 parvis linearibus remotis, corymbo fastigiato, involucri phyllis nigricantibus pube rufescenti duplici alterà stellatà brevissimà alterà setulis elongatis constanti obsitis.

Hab. in fauce *Dudera* montis *Elbrus* Kotsch. N° 428.

Planta habitu et characteribus *H. cymoso* et *echioidi* valdè affinis. Prius differt foliis minùs densè et longè setosis, capitulis minoribus, corymbo congesto. Posterius habet caulem densè foliatum, involu-
crum albo-tomentosum etc.

CAMPANULACEÆ.

TRACHELIUM TUBULOSUM Boiss.

Tr. caudiculis suffrutescentibus brevibus fragillimis filiformibus sulcosis caules erectos pumilos cæspitosos simplices acutè angulato-sulcatos parcè scabridulos densè foliosos edentibus, foliis oblongis ellipticisve basi in petiolum attenuatis acutiusculis subintegris vel supernè utrinquè 2-5 denticulis mucronatis ascendentibus obsitis margine insuper ciliis ascendentibus valdè scabris subtùs ad nervos elevatos albidos parcissimè setulosis cæterùm glabris lucidis pallidè virentibus subcartilagineis pellucidis, floribus in corymbum umbelliformem multiflorum foliis supremis involucreto eisque subæquilongum condensatis, pedicellis setaceis flori æquilongis, bracteolis minutissimis setaceis pedicello multoties brevioribus, calycis glabri tubo hemisphærico apice truncato laciniis a basi setaceis tubo subduplò longioribus corollà dimidià subbrevioribus, corollà (e sicco albidà ? vel carneâ ?) glabrà latiusculè tubulosà brevi lobis brevissimis ovatis erectiusculis, filamentis a basi tenuissimis, antheris linearibus flavis filamento dimidiò brevioribus, stylo glabro corollà duplò longiori apice in stigma brevissimè

puberulum brevissimè trifidum sensim incrassato, capsulâ trilobulari valvis 3 basilaribus dehiscenti.

Hab. in parietibus rupium verticalium calidiorum Syriae littoralis ad ostium fluvii *Nacher el Kelb* propè *Beyrout* ubi detexit cl. et amic. Dr Pestalozza et ubi post eum abundè sed flor. fruct. orbatum Julio 1846 legi. Planta verosimiliter serotina fine autumnii florens.

Caules 3-5 pollicares, folia 9-15 lin. longa 3-5 lata, corymbi sessiles terminales foliis supremis vix longiores, corolla circ. 3-3 1/2 lin. longa lineam lata. Species insignis a reliquis generis habitu et corollis brevibus latis discedens sed characteribus et fructu optimè congruens.

MICHAUXIA THYRSOIDEA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.

M. perennis vel biennis? tota brevissimè tomentella canescens, foliis ferè omnibus radicalibus rosulatis oblongis vel oblongo-lanceolatis in petiolum latum brevem attenuatis sæpiùs sublyratis lobulis lateralibus utrinquè 4-2 minimis auriculiformibus lanceolatis acutis, terminali maximo acuto irregulariter et parùm profundè lobato margine acutè lacero-denticulato, caule crasso simplicissimò erecto ferè a basi floribus subsessilibus infernè laxiusculis dein approximatis onusto thyrsodeospicato, bracteis infimis latè linearibus vel lineari-spathulatis denticulatis cæteris angustè linearibus deflexis acutis calyci æquilongis, floribus octandris, calycis densè et brevissimè tomentelli asperuli laciniis 8 lanceolatis acutissimis tubo hemisphærico valdè costato sesquiquilongioribus, appendicibus reflexis triangulari-lanceolatis strigosis parvis acutis tubum calycinum dimidium æquantibus, corollâ tomentellâ campanulato-tubulosâ ad tertiam partem usquè in lacinias triangulari-lanceolatas obtusas fissâ, stylo exserto crasso asperulo, stigmatibus 8 linearibus revolutis.

Hab. in fissuris rupium Tauri Isaurici in viâ inter *Karaman* et *Ermenek* ad descensum vallis *Djoksou* alt. 3000' fl. Junio. (Heldr.)

Folia radicalia cum petiolo 3-6 pollicaria 4-2 poll. lata, spica e collo radice orta cylindrica pedalis et longior diametro sesquipollicaris a basi sæpius densissima, flores circ. pollicem longi. Species inflorescentiâ a cæteris *Michauxiis* distinctissima eis tamen characterè calycis et styli arcuè conjuncta, transitum inter eas et *Campanulas* e sect. *Medio* optimum præbens.

CAMPANULA PESTALOZZÆ Boiss. (Sect. *Medium*.)

C. annua patulè hispida strigulosa, caulibus tenuibus erectis pumilis supernè dichotomè ramosis, foliis oblongo-linearibus integris adpressiusculè setulosis infimis obtusis basi attenuatis superioribus oblongis a basi latiori acutiusculis, floribus in dichotomiis et ad ramulorum apicem laxè corymbosis parvis pedicello tenui patulè hispido calyci æquilongo vel breviori suffultis, calyce ferè ad basin usquè in lacinias lanceolatas acutas erecto-patulas margine præsertim ciliato-strigosas partito, appendicibus triangularibus acutiusculis ultrà basin tubi productis laciniiis plùs triplò brevioribus, corollà lacinias calycis vix excedenti campanulatà ad angulos extùs ciliatulà cæterum glabrà, stigmatibus ternis.

Hab. in *Caramanià* ubi legit amic. Dr Pestalozza.

Habitus omninò *C. drabifoliæ* a quà calyce appendiculato longè differt, collocanda juxtà *C. dichotomam* quæ differt floribus duplò majoribus, corollà calyce duplò longiori, calycinis laciniiis acutissimis appendicibus elongatis acutis.

CAMPANULA HIEROSOLYMITANA Boiss. (Sect. *Medium*.)

C. annua tota patulè valdè strigosa caulibus erectis subdichotomè ramosis pumilis acutè angulatis, foliis sessilibus oblongis integris, floribus ad ramorum apicem 2-4 approximatis corymbosis pedicello calyce multò breviori suffultis, bracteis e basi latiori rotundatà oblongis acutis, calyce valdè strigoso ad basin ferè usquè in lacinias lanceolatas acutas erectas partito, appendicibus ovatis obtusis paulò ultrà tubi basin productis laciniiis triplò brevioribus, corollà tubuloso-obconicà calyce duplò longiori extùs sub lente præsertim ad nervos hirtulà ad tertiam partem usquè in lobos ovatos acutiusculos divisà, stigmatibus ternis, capsulà nutanti.

Hab. ad pedem rupium propè *Hierosolimam* juxtà speluncas *Regum* et *Judicum* dictas et in Samarià propè *Naplouse*. Legi Maio ineunte.

Planta semipedalis, flores circ. 9-11 lin. longi violacei angusti. Valdè affinis *C. strigosæ* Russ. in eadem regione vulgatissimæ quæ differt minùs densè strigosa, floribus pedicello calyce sæpiùs longiori suffultis, laciniiis calycinis etiam floris e basi oblongà plùs minùs longè subulatis, appendicibus laciniiis dimidiò tantum brevioribus, corollà calyce triplò longiori parte superiori magis dilatatà obconicà glaberrimà.

CAMPANULA CAMPTOCLADA Boiss. (Sect. *Medium*.)

C. annua tota pilis patulis albis scabridulis hirsuta, caule a basi dichotomè et divaricatim ramosissimo ramisque flexuosis, foliis infinis ovato-spathulatis in petiolum brevem attenuatis cæteris sessilibus ovato-oblongis acutiusculis basi et apice angustatis, floribus ad ramulorum apicem subternis, pedicellis hispidis rectis flori æquilongis post anthesin valdè recurvis, bracteis oppositis linearibus ad medium pedicelli florum lateralium sitis, calycis breviter canescentis ad basin ferè usque partiti laciniis a basi ovato-oblongà attenuatis acutis, appendicibus ovatis obtusis paulò infrà calycini tubi basin productis laciniis plùs dimidiò brevioribus, corollà extùs valdè hispidulà tubuloso-campanulatà ad tertiam partem in lacinias oblongas divisà calyce plùs duplò longiori, stigmatibus ternis brevissimis, capsulà nutanti pyriformi appendicibus subinflatis tectà.

Hab. in fissuris rupium calidarum in vallibus Antilijsani circà *Banias* saxis arcè incumbens et secùs ea ramos suos curvans. Legi Apr. fine.

Planta tenera ramosissima asperula, folia majora 12-15 lin. longa 7-9 lata, flores illis *C. strigosæ* multò minores circ. 9 lin. longi. Ex affinitate præcedentis et *C. strigosæ* egregiè differt caule divaricato ramosissimo, indumento molliusculo breviori, foliis brevioribus latioribusque, corollæ angustæ tubo tenuiori. Hanc in pl. Pinard. *C. bicolorém* primùm nominaveram sed tubus albidus tantùm in corollis jam emarcidis occurrere videtur.

CAMPANULA STELLARIS Boiss. (Sect. *Medium*.)

C. annua tota pilis patulis albis brevibus strigulosa virens, caule angulato a basi ramosissimo supernè dichotomo corymboso-paniculato, foliis ovato vel oblongo-spathulatis inferioribus in petiolum brevem attenuatis obtusissimis superioribus oblongo-linearibus utrinque attenuatis obtusiusculis, floribus-pedicello calyce subbrevisiori post anthesin recurvo suffultis, calycis ferè ad basin usque quinquepartiti laciniis oblongo-lanceolatis obtusis margine strigoso-ciliatis cæterum glabris floriferis erecto-patulis fructiferis expansis stellatim rotatis trinerviis accretis, appendicibus oblongo-linearibus ciliatis obtusis infrà basin tubi productis laciniis calycis triplò brevioribus, corollà cæruleà campanulatà glabrà ultrà tertiam partem lobatà calyce duplò longiori, stig-

matibus ternis, capsulâ nutanti brevissimè obconicâ laciniis calycinis horizontaliter stellatis coronatâ.

Hab. in lapidosis dumosis montis *Carmeli* paulò suprà conventum. Legi fructif. Maio 1846.

Planta ferè pedalis, folia inferiora sesquipollicem longa 5-6 lineas lata, corolla brevis eam *Speculariæ* referens 6-7 lin. longa, calycis fructiferi stellati diametrum 10-12 lin. latum. Species ex affinitate præcedentium ab eis distincta corollâ abbreviatâ, calyce fructifero stellatim patenti. Hâc notâ valdè accedit ad *C. scutellatam* Griseb. quæ calyce exappendiculato statim dignoscitur.

CAMPANULA SULPHUREA Boiss. (Sect. *Medium*.)

C. annua pumila tota pilis sparsis caulis patulis foliorum adpressiusculis strigulosa virescens, caule a basi patulè ramoso sæpius erecto, ramis elongatis simplicibus dichotomisve apice 2-3 floris, foliis caulinis sessilibus linearibus obtusis, rameis brevioribus a basi sublatori rotundatâ acutiusculis, floribus pedicello calyci subæquilongo fructifero recurvo suffultis, calycis profundè quinquepartiti laciniis lanceolatis acutiusculis ad nervum medium marginè que lutescenti-strigosis cæterùm glabris, appendicibus ovatis obtusis valdè strigosis ultrâ tubi basin non productis laciniis triplò brevioribus, corollâ glaberrimâ campanulatâ intensè luteâ calyce plùs duplò longiori ad tertiam partem usquè lobatâ, stigmatibus tribus, capsulâ nutanti breviter obconicâ.

Hab. in arenâ mobili purâ collium littoralium Syriæ circâ *Gaza* (Boiss. Aucher N° 1856), circâ *Beyrout* (Boiss. Pestalozza).

Planta 4-6 pollicaris a basi ramosissima 3-12 flora caulibus erectis vel ascendentibus, folia caulina 8-12 lineas longa 2 lata, flores magni ferè pollicem longi. Affinis *C. strigosa* a quâ appendicibus abbreviatis laciniisque calycinis apice non subulatis discedit et insuper ab eâ et affinibus colore corollæ distinctissima.

CAMPANULA LEUCOSIPHON Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Medium*.)

C. perennis rhizomate cautes fragillimos filiformes cæspitosos parcè ramosos ascendentes molliter albo-lanatos foliosos edenti, foliis inferioribus petiolo latiusculo eis æquali suffultis superioribus subsessilibus omnibus teneris adpressiusculè et molliter canescentibus ovato-

rotundis basi truncatis utrinque 3-5 lobatis lobis triangularibus acutiusculis, floribus in racemos terminales 3-6 flores laxiusculè et sub-unilateraliter dispositis pedicello calyci æquilongo vel longiori bracteolato jam sub anthesi patulo-incurvo suffultis, bracteis ad basin pedicelli ovatis acutis dentatis, bracteolis pedicellaribus brevissimè linearibus, calyce densè et breviter albo-tomentello ultrà medium in lacinias triangulari-oblongas acutiusculas partito, appendicibus breviter ovatis obtusissimis ultrà tubi basin non productis lacinias dimidias æquantibus, corollà tomentellà lacteà tubulosà apice infundibuliformi in limbum parùm ampliata brevissimè quinquelobà calyce triplò longiori, stigmatibus tribus.

Hab. ad rupes umbrosas in valle *Speluncarum* dictà inter *Karaman* et *Ermenek* Isauriæ alt. 3000'. (Heldr.)

Caulis 3-5 pollicares, folia majora 6-8 lin. lata, flores 7-8 lin. longi tubo lineam circ. lato limbo 3 lineas lato. Ex affinitate *C. incanescens*, *Olivieri* et *Candidæ* ab eis formà foliorum, corollà longà infundibuliformi distincta.

CAMPANULA MACROSTYLA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. 1846. (Sect. *Medium*.)

C. annua vel biennis, caule erecto crassiusculo albostrigosissimo folioso supernè dichotomo corymbosè 3-5 floro, foliis lineari-lanceolatis sessilibus strictis obtusiusculis viridibus adpressiusculè strigosis, ramis erecto-patulis unifloris foliis paucis minoribus acutioribus ob-
sitis, floribus magnis, calyce viridi ad nervos et præsertim margines parcè setoso ultrà medium in lacinias latas lanceolatas longè acuminato-attenuatas partito, appendicibus ovatis latis cucullatis obtusis ultrà tubi basin subproductis calycis laciniis plùs duplò brevioribus, corollà e sicco albà vel flavidà glabrà calyce vix sesquolongiori breviter campanulatà patulà in lobos breves latos ovato-triangulares breviter attenuatos acutos divisà, stylo crasso e corollà longè exserto in stigma crassum priùs clavatum dein trifidum abeunti.

Hab. in glareosis ad littora lacùs *Egirdir* Pisidiæ et in saxosis ad *Ermenek* Isauriæ. (Heldr.) Fl. Julio ineunte.

Caulis rectus crassus circ. pedalis apice in 3-5 ramos erecto-patulos 2-3 pollices longos divisus, corolla formà eam *C. persicifoliæ* referens sed major diametro sesquipollicaris sesquipollicem longa, stylus cum stigmate sesquipollicem et ampliùs longus. Species stigmate crasso

nondam expanso 6-7 lin. longo 2 lato insignis propè *C. medium* collocanda.

CAMPANULA SCLEROTRICHA Boiss. in pl. Kotsch. Pers. bor. 1846.
(Sect. *Medium*.)

C. hiemalis vel *perennis*, caule crasso elato simplici rubello vix angulato setulis brevissimis retrorsum adpressis sparsissimis aspero, foliis setulis minimis sparsis præsertim in paginâ inferiori et ad nervos asperis ovatis cordatis, radicalibus longissimè petiolatis obtusiusculis profundè multilobatis lobis triangularibus-ovatis obtusiusculis obtusè dentatis, caulinis petiolo eis breviori suffultis acute dentato-serratis attenuato-acuminatis, floribus pedicello tubo calycis æquilongo fructifero recurvo suffultis racemum pauciflorum terminalem foliosum laxum subsecundum formantibus, foliis floralibus lineari-lanceolatis acutis infernè serrulatis flores æquantibus, calycis laciniis lanceolatis acutis ad nervum et margines regulariter pectinato-strigosis cæterum glabris, appendicibus latè ovatis obtusiusculis tubi basin non excedentibus strigose-ciliatis laciniis dimidio brevioribus, corollâ cæruleâ parcè strigosâ calycem parùm excedenti tubuloso-campanulatâ, stigmatibus ternis, capsulâ nutanti.

Hab. in hortis umbrosis propè *Derbend* Kotsch. N° 502.

Planta 2-3 pedalis, folia inferiora petiolo 6-10 pollicari suffulta 2-3 pollic. longa 2-2 1/2 lin. lata, caulina sensim diminuta, flores pollicem et paulò ampliùs longi. Affinis habitu et characteribus *C. Grosseckii* quæ eximiè differt foliis obtusè dentatis, floribus inferioribus ternatis nec solitariis, calyce corollâ triplò brevioris laciniis multò minoribus appendicibus parvis, etc.

CAMPANULA ODONTOSEPALA Boiss. (Sect. *Eucodon*.)

C. perennis, caulibus erectis glabris simplicibus subangulatis rubellis basi denudatis dein foliosis flexuosis, foliis petiolo eis breviori suffultis oblongis apice plùs minùs attenuato-acuminatis basi rotundatis vel subcordatis inferioribus obtusè superioribus acutiusculè denticulatis teneris viridibus margine ciliatulis cæterum glabris, floribus ad foliorum axillas binis vel solitariis pedicello recurvo basi bracteolato calyci æquilongo suffultis, calycis laciniis angustè lineari-lanceolatis patulis vel reflexis acutis parcè nigro-denticulatis albo-ciliatis cæterum gla-

bris tubo glabro hemisphærico duplò longioribus, corollâ campanulatâ calyce triplò longiori breviter lobatâ ad margines loborum araneoso-lobatâ cæterùm glabrâ, capsulâ nutanti ovato-rotundâ.

Hab. in sylvis excelsioribus *Ghilawi* Aucher N° 4907.

Planta e meo specimine vix pedalis, folia inferiora 2 $\frac{1}{2}$ polli, longa 4 $\frac{1}{2}$ lata, habitus et magnitudo florum *C. trachelii*. Planta floribus paucis ex axillis foliorum superiorum vix diminutorum insignis, a *C. trachelio* insuper diversissimâ calycis tubo glabro, laciniis 3 lin. circ. longis $\frac{1}{2}$ latis glanduloso-denticulatis; magis affinis *C. macranthæ* F. et M. quæ caule erecto non flexuoso, floribus erecto-patulis, sepalis integris lanceolato-triangularibus erectis longè differt.

CAMPANULA ATTICA Boiss. et Heldr. (Sect. *Eucodon*.)

C. annua tota pilis patulis hispidula, caulibus elongatis teneris decumbentibus vel diffusis divaricato-ramosissimis, foliis infimis oblongo-spathulatis basi attenuatis obtusis subintegris caulinis oblongis denticulatis denticulis ascendentibus, floralibus ovatis profundè trifidis lobis lanceolatis acutis lateralibus divergentibus brevioribus angustioribus, floribus ad dichotomias sitis terminalibusque pedicello tandem recurvo calyce breviori suffultis laxè cymosis, calycis hispidi laciniis lanceolatis acutis tubo breviter obconico 4-5 plò longioribus in fructu stellatim patentibus, corollâ cæruleâ campanulatâ glabrâ calyce duplò longiori lobis ovatis, capsulâ nutanti turbinatâ brevissimâ.

C. drabifolia Sprun. Boiss. et Heldr. pl. exs. — Sibth. quoad locum Atticam nec Icon. et descript.

Hab. in siccis *Atticæ* et *Argolidis* (Sprun. Boiss.), *Messeniae* (Heldr.)

Hæc species a *C. drabifolia* Fl. Græc tab. 215 quam in *Samo* Sibth. indicat et quam e *Rhodo* (Aucher N° 4386) habeo, egregiè differt caulibus longioribus magis diffusis, foliis latioribus floralibus profundè et acutè trifidis nec angustè lineari-lanceolatis integris vel utrinquè denticulo auctis, corollâ 8 nec 4 lineas longâ, capsulâ nutanti nec erectâ calycis laciniis stellatis nec erectis superatâ. *C. Rhodensis* A. DC. e descriptione foliis floralibus integris floribusque terminalibus dictis aliena est.

CAMPANULA DELICATULA Boiss. (Sect. *Eucodon*.)

C. annua tota breviter et patulè hispidulo-strigulosa canescens,

caulibus tenuiter filiformibus nanis teneris a basi flexuoso-ramosissimis, foliis ovatis obtusis basi attenuatis integris vel obsoletissimè 2-5 denticulatis, floralibus minimis acutis ellipticis, floribus pedicello capillari tandem recurvo calyce breviori suffultis dichotomialibus vel terminalibus solitariis, calycis patulè hispiduli laciniis lanceolatis acutis tubo quadruplò longioribus, corollà cærulescenti tubulosâ extus hirsutâ calycem parum superanti, capsulâ nutanti.

Hab. in *Cariâ* ad *Moglah* (Aucher N° 4838) in *Lyciâ* (Pestalozza).

Plantula 3-4 pollicaris, caules tenuissimi deniquè curvati distanter foliosi, folia majora 5-6 lin. longa, flores laxè dispositi ferè 4 lin. longi. Inter. *C. erinum* et *Atticam* media affiniore priori quæ differt caule erecto minus tenui, calycis laciniis brevioribus latioribus, corollâ minori. *C. Attica* cæteris neglectis omnibus partibus triplò vel quadruplò major est. *C. drabifolia* differt calycis laciniis linearibus, corollâ calyce duplò longiori, capsulâ erectâ etc.

CAMPANULA PODOCARPA Boiss. (Sect. *Eucodon*.)

C. annua tota brevissimè et patulè hirsuta aspera, caulibus filiformibus pumilis erectis dichotomè ramosis, foliis minutis sessilibus oblongis obtusis subdenticulatis, floralibus lineari-setaceis acutis, floribus parvis in dichotomiis sessilibus terminalibusque breviter pedicellatis laxissimè corymbosis, calycis adpressè strigulosi laciniis angustè lineari-lanceolatis acutis rectis tubo quadruplò longioribus, corollâ extus ad nervos setulosâ calyce subduplò longiori angustè tubulosâ in limbum minutum rectum vix ampliata, capsulâ rectâ a vertice compressâ discoideâ basi in stipitem brevem abruptè attenuatâ valvulis tribus ad stipitis basin sitis dehiscenti.

Hab. in *Pamphylîâ* ubi legit et mihi comm. amic. Pestalozza.

Plantula 4-5 pollic. ramosa ramis rigidulis, folia 3-4 lin. longa, flores 4 lin. circ. longi, capsulæ stipes lineæ $3\frac{1}{4}$ longus. Affinis *C. Ravayi* et *C. drabifolia* an eis præter flores laxè corymbosos caractere eximio capsulæ stipitatæ facillè distinguenda.

CAMPANULA TRICHOPODA Boiss. (Sect. *Eucodon*.)

C. nana perennis cæspitosa rosulata, caulibus extrarosularibus tenuissimè filiformibus simplicibus decumbentibus foliosis rubellis pa-

tulè hirtulis sæpè numerosissimis intricatis, foliis parvis adpressè tomentello-cinerascentibus rosulatis ovato-spathulatis in petiolum brevem attenuatis caulinis superioribus ovato-orbiculatis brevissimè petiolulatis omnibus integerrimis, floribus paucis axillaribus pedicellis setaceis strictiusculis vel flexuoso-incurvis eis pluries longioribus suffultis racemos terminales subsecundos pedicellorum longitudine inæquali subcorymbosos formantibus, floribus parvis, calycis griseo-tomentelli laciniis lanceolatis acutis tubo brevissimo obconico subduplò longioribus, corollà violaceà campanulatà extùs hirtà calyce 2 $\frac{1}{2}$ plò longiori lobis breviter triangularibus obtusiusculis, capsulà ovato-pyriformi rectà valvis tribus imà basi sitis dehiscenti.

Hab. ad saxa umbrosa circà fontem suprà pagum *Eden Libani* sitam.

Legi flor. Julio. E fissuris rupium nascitur caulesque saxo arcè applicati sunt. Planta elegans *Jiraseckiam tenellam* quodammodò referens. Caules tenuissimi 3-4 poll. longi, folia rosularum 4-5 lin. longa caulina media diametro 2 lin. lata summa minora, pedicelli capillares 5-8 lin. longi bracteolis setaceis mediùm versùs sæpè instructi. Propè *C. cymbalarium* et *C. humillimam* collocanda.

CAMPANULA MYRTIFOLIA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.
(Sect. *Eucodon*.)

C. perennis pulvinari-cæspitosa tota patulè et brevissimè puberula cinerascens asperula, rhizomate indurato, caulibus numerosissimis capillaribus brevibus densè foliosis rectis, foliis minimis sessilibus ovatis vel ovato-oblongis obtusis integerrimis firmis subcartilagineis, floribus 3-5 terminalibus pedicellis setaceis ad medium bracteolatis calyce longioribus suffultis e foliis supremis breviter exsertis, bracteolis setaceis, calycis densè hirtuli laciniis setaceis rectis tubo subgloboso sesquilongioribus, corollà extùs hirsutà calycis laciniis triplò longiori tubuloso-campanulatà tubo apice vix ampliato lobis brevibus obtusis rectis.

Hab. in fissuris rupium verticalium inter *Ermenek* et *Tourtchalar* alt. 3500' (Heldr.). Flor. Julio ineunte.

Caules 4-2 pollicares densissimè congesti, folia majora 3 lin. longa 2- $\frac{1}{2}$ lata minora 1 $\frac{1}{2}$ lin. vix longa, flores 4-5 lin. longi. Species pulchella distinctissima propè *C. trichopodam* et *C. humillimam* collocanda.

CAMPANULA LOURICA. Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Eucodon*.)

C. perennis nana densè cæspitosa tota densè et adpressissimè canescens, foliis rosulatis lineari-spathulatis infernè attenuatis obtusis integerrimis, caulibus extrarosularibus filiformibus brevibus decumbentibus foliosis apice dichotomè paucifloris, foliis caulinis minoribus strictis inferioribus spathulato cæteris lanceolato-linearibus, floribus pedicellis capillaribus flexuoso-incurvis eis æquilongis vel longioribus minutè bracteolatis suffultis, calycis canescentis laciniis lanceolatis apice setaceis tubo breviter obconico vix longioribus, corollà parvā hirtulā tubuloso-campanulatā laciniis calycinis duplò longiori breviter lobatā, capsulā globoso-obconicā valvulis basilaribus dehiscenti.

Hab. in rupibus vallis *Loura* montis *Elbrus* Kotsch. N° 535. (Heldr.)

Folia rosularum 6-7 lin. longa 1 1/2 lata, caulina multò minora, caules teneri 2-3 pollicares, flores 4-5 lin. longi. Affinis *C. Damascenæ* Lab. quæ differt indumento minùs cano, foliis acutiusculis crenatis, floribus subduplò majoribus, laciniis calycinis elongatis tubo duplò longioribus. A *C. trichopodè* quoque non longè distat.

CAMPANULA EUCLASTA Boiss. (Sect. *Eucodon*.)

C. perennis tota densè et brevissimè velutino-canescens, rhizomate ramosissimo densè cæspitoso, caulibus numerosis fragillimis filiformibus pumilis simplicibus erectis rigidis, foliis carnosulis omnibus secùs caules dispositis minutis oblongis obtusis margine plùs minùsve denticulato-crispulis inferioribus in petiolum attenuatis superioribus sessilibus e basi rotundatā latiori acutiusculis, floribus terminalibus rariùs solitariis sæpiùs sessilibus 3-4 capitato-fasciculatis, bracteis lanceolatis calycis basin cingentibus eo brevioribus, calycis brevissimè velutini laciniis lanceolatis acutis rectis tubo obconico subduplò longioribus, corollā albidā extùs brevissimè velutinā calycinis laciniis subtriplò longiori tubuloso-campanulatā lobis brevibus triangularibus acutiusculis.

Hab. in fissuris rupium calidarum collium *Salehieh* propè *Damascum*. Legi Maio. 1846.

Caulis 3-5 pollicares rigidi fragillimi e rhizomate nodoso orti cæspitem compactum sæpè amplum formantes, folia intermedia 3-4 lin. longa 1 1/2-2 lata, flores 9-10 lin. longi. Species foliis carnosulis cau-

libus rigidis, floribus capitato-fasciculatis insignis habitu *C. Olivieri* vel *C. candidam* referens sed exappendiculata et melius propè *C. Damascenam* quæ caulibus folisque teneris, floribus laxis etc. tamen valde distat collocanda.

CAMPANULA COMPACTA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Eucodon*.)

C. perennis tota pilis papillosis brevissimis densis retrorsum inclinatissimis obsita canescens compactè cæspitosa, foliis rosulatis angustè obovato vel lineari-spathulatis obtusis vel acutiusculis parè et obsolete subrepando-denticulatis margine subincrassato albido subundulato, caulibus numerosis extrarosularibus foliosis simplicibus brevibus unifloris, foliis caulinis strictis linearibus acutis, calycis lacinii lanceolatis obtusiusculis tubo brevissimè obconico sæpè bombycino-lanato rarius glabrescenti duplò longioribus, corollà glabrà calycinis lacinii subduplò longiori ferè ad basin usquè in lacinias erecto-patulas oblongo-lineares acutiusculas partitâ, capsulâ rectâ obovatâ valvis sub apice sitis dehiscenti.

Hab. in regione superiori montis *Davros dagh* Pisidiæ alt. 5500–6000'. Fl. Mali fine. (Heldr.)

Cæspites sæpè 4–5 pollices lati, folia rosularum 7–8 lin. longa apice 1 1/2 lin. lata, caules rigiduli 1–3 pollicares foliis 2–3 lin. longis, flores 5–6 lineas longi, stylus exsertus, stigma trifidum. Species insignis propè *C. Steveni* collocanda, corollâ partitâ transitum ad *Phyteumata Podantha* optimum præbens.

PHYTEUMA KOTSCHYI Boiss. (Sect. *Podanthum*.)

Ph. caule simplici virgato erecto infernè folioso toto pilis deflexis albis tomentello supernè glabro, foliis infimis brevissimè petiolatis oblongis acutis intermediis sessilibus oblongis superioribus e basi cordatâ triangulari-ovatis acuminatis sensim in bracteas decrescentibus omnibus utrinquè breviter setulosis argutè pectinato-serratis dentibus ascendenti-incurvis, floribus minutis in fasciculos sessiles densos in caulibus parte superiori remotiusculos terminalesque confluentes dispositis, bracteis triangulari-acuminatis inferioribus basi dentatis flores æquantibus superioribus lanceolatis integris brevioribus, calycis glaberrimi

laciniis angustè lanceolatis acutis tubo globoso duplò longioribus, corollà cæruleâ glabrâ laciniis calycinis triplò longiori.

Hab. in monte *Tauro* Kotsch. N° 338 sub *P. amplexicauli*.

Var β . *obtusicrenum*. — Omnia speciei sed folia ut in *Ph. Sibthorpiano* obtusè crenata.

Hab. in valle *Talagon* montis *Elbrus* Kotschy N° 743.

Pedale, folia inferiora 45 lin. circ. longa 6-7 lata, flores 4-5 lineas longi spicam bipollicarem infernè interruptam formantes. Longè distinctum a *Ph. amplexicauli* W. quod e descriptione est glaberrimum, habet folia duplicato-serrata, flores pedunculatos, corollam magnit. ejus *Ph. spicati*. *Ph. amplexicaule* Fl. Græc. tab. 249 (a plantâ Willd. probabiliter diversum) longè differt calycis laciniis setaceis reflexis, corollis semipollicaribus. *Ph. Kotschy* proximè accedit ad *Ph. Sibthorpium* Boem et Schult. Boiss. Diagn. IV. quod ab eo discedit foliis longiùs petiolatis obtusis superioribus lanceolato-linearibus, floribus 2-4 in spicam longam laxissimam digestis, calyce corollæque puberulis.

PHYTEUMA ASPERUM Boiss. (Sect. *Podanthum*.)

Ph. totum setulis sparsis adpressis pellucidis e tuberculo ortis asperum pallidè virens, radice verticali cylindricâ crassâ squamosâ caules plures erectos elatos virgatos simplicissimos infernè densiusculè foliosos edenti, foliis radicalibus paucissimis oblongo-lanceolatis acutiusculis in petiolum eis longiorem attenuatis, caulinis sessilibus lanceolato-linearibus utrinquè attenuatis acutis strictis inferioribus obsolete et minutè denticulatis superioribus sensim decrescentibus angustissimè linearibus, floribus solitariis vel binis sessilibus spicam tenuem virgatam laxissimam terminalem formantibus bracteâ lineari suffultis, calycis densè et brevissimè pubescentis laciniis lineari-lanceolatis rectis tubo vix æquilongis, corollâ hirtâ calycinis laciniis triplò longiori.

Hab. in rupestribus montis *Gara* Kurdistania Kotsch. pl. Alep. Kurd. N° 377 sub *Ph. rigido* var. *scabro*.

Caules bipedales, folia caulina inferiora sesquipollicaria 3 lin. lata, spica 6-9 poll. longa tenuissima, flores 4 lin. circ. longi. *Ph. rigidum* W. e descriptione omninò differt caule glabro, foliis glabriusculis, pedunculis subramosis trifloris. Nostra species habitu et inflorescentiâ *Ph. limonifolio* Auct. (nec Fl. Græca quod *Ph. repandum* Sm. diversissimum sistit) propiùs accedit, sed hoc faciliè dignoscitur foliis ferè omnibus radicalibus repando-denticulatis glabris puberulisve sed nun-

quam scabris, calycis laciniis tubo longioribus corollam dimidiam superantibus, etc.

PHYTEUMA CAPPADOCICUM Boiss. (Sect. *Podanthum*.)

Ph. totum pube brevissima tomentella canescens, caule crassiusculo subsulcato infernè folioso a parte mediâ alternè vel subdichotomè ramoso ramis strictis virgatis elongatis ramulosis, foliis oblongo-lanceolatis margine undulatis tenuissimè et acutè eroso-denticulatis longè attenuato-acuminatis inferioribus in petiolum longum longè attenuatis, superioribus sessilibus supremis linearibus abbreviatis, floribus 2-4 nis in fasciculos breviter pedunculatos sessilesve secùs ramos et ramulos distantes paniculatis, bracteis lineari-setaceis brevibus rectis, calycis glaberrimi laciniis angustè linearibus tubo oblongo-lineari valdè sulcato paulò longioribus, corollæ glabræ laciniis calyce vix sesquilon-gioribus.

Hab. in monte *Akdagh* Cappadociæ Aucher N° 4883.

Sesquipedale, folia inferiora 3 poll. longa petiolo eis æquilongo suffulta 7-8 lin. lata, rami paniculæ semipedales vel longiores, flores circ. 5 lin. longi. Affine *Ph. cichoriformi* quod differt foliis obtusis, bracteis floralibus ovatis acuminatis, calycis tubo brevi densè albolanato etc. *Ph. lobelioides* cui hæc planta in herb. Candolleano cum dubio refertur e descriptione longè differt foliis lineari-lanceolatis hispidis denticulis elongatis.

Campanula virgata Lab. Déc. 2 tab. 6. — *Ph. virgatum* W. est *Phyteumatis* species vera ex affinitate *Ph. Cappadocici* et *pulchelli* quam in calcareis calidis Libani circà *Eden* frequenter legi, sed *Camp. virgata* DC. Prodr. et herb. est planta diversissima ad formam strictam micrantham in regione mediterraneâ frequentem *C. rapunculi* spectans.

PHYTEUMA STYLIDIOIDES Boiss. (Sect. *Podanthum*.)

Ph. foliis omnibus radicalibus rosulatis brevibus oblongo-spathulatis sessilibus basi attenuatis apice rotundatis undulatis integris margine albo incrassato cinctis utrinquè parcè sub lente setulis retrorsis albis obsitis pallidè virentibus, caulibus scapiformibus tenuibus erectis simplicibus glabris præter 1-2 foliola ad basin sita minima angustè linearia nudis, floribus paucis solitariis pedicello calyce breviori erecto-

patulo suffultis secus scapi partem superiorem laxissimè spicatis inter se remotis basi tribracteatis, bracteis linearibus inæqualibus pedicello brevioribus, calycis tubo oblongo minutè tuberculato laciniis lineari-lanceolatis rectis tubo paulò longioribus, corollà glabrà dentibus calycis plùs duplò longiori.

Hab. in *Caramaniâ* ubi legit cl. Dr Pestalozza.

Folla vix pollicem longa supernè 3 $1\frac{1}{2}$ lin. lata, scapi semipedales, spica tripollicaris 5-9 flora, flores 5 lin. longi. Propè *Ph. repandum* collocandum, insigne foliis sessilibus obtusis margine incrassato cinctis, floribus solitariis distantibus.

PHYTEUMA PESTALOZZÆ Boiss. (Sect. *Podanthum*.)

Ph. cæspitosum, foliis omnibus ad collum congestis angustè lineari-lanceolatis apice attenuatis basi in petiolum planum longè angustatis acutis integerrimis margine valdè undulatis utrinquè densè et adpressissimè puberulis canescentibus, caulibus pluribus scapiformibus infernè foliolo uno alterove lineari-setaceo instructis puberulis tenuibus virgatis simplicibus, floribus solitariis distantibus infimis pedicellatis superioribus subsessilibus spicam tenuem longam laxam terminalem formantibus basi inæqualiter et brevissimè tribracteatis minimis, calycis glabri laciniis lineari-lanceolatis tubo oblongo æquilonis, corollà glabrà calycinis laciniis triplò longiori.

Hab. in *Lyciâ* ubi legit cl. et amic. Pestalozza.

Folia cum petiolo 2-2 $1\frac{1}{2}$ poll. longa 2-2 $1\frac{1}{2}$ lin. lata, caules pedales, spicæ semipedales, flores 3 lin. longi. Facie affine formis quibusdam angustifolliis *Ph. limonifolii* quæ tamen a nostrâ specie floribus 2-3 aggregatis sessilibus semper dignoscuntur. Speciei præcedenti proximum a quâ tamen foliorum formâ floribusque majoribus differt. Longitudo pedicellorum in hac specie mirè variat a 1-2 ad 6-8 lineas.

PHYTEUMA GRACILE Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Podanthum*.)

Ph. glaberrimum radice verticali cæspites densiusculos edenti, foliis ad collum congestis angustè lineari-lanceolatis vel linearibus plùs minùs elongatis in petiolum longè attenuatis acutiusculis integris vel obsoletissimè eroso-denticulatis, caulibus scapiformibus erectis virgatis

tenuibus ferè a basi jam parcè ramosis ad bifurcationes inferiores folio angustè lineari sessili instructis, ramis tenuibus erecto-patulis, floribus solitariis pedicello in infimis eis multò longiori in supremis eis breviori erecto-patulo suffultis racemos terminales subpyramidatos laxos formantibus, bracteis setaceis pedicello brevioribus, calycis glabri laciniis lanceolatis acutis tubo longè obconico æquilongis vel brevioribus, corollà glabrà calyce duplò longiori laciniis latiusculis.

Hab. in cacuminibus montis *Gheidagh* Tauri Isaurici alt. 7000'. (Heldr.) Julio.

Statura multum variare videtur, specimina alia 3-4 pollices longa alia pedalia, folia cum petiolo 1-3 pollicaria 1 1/2-2 lin. lata, racemi 3-5 pollicares pauciflori, pedicelli inferiores 8-9 lin. longi, flores 4-5 lin. longi. Species pulchella affinis præcedentibus binis a quibus differt glabritie, caulibus ramosis, foliorum formà, proxima quoque *Ph. lanceolato* W. quod ex icone Desf. Coroll. et ex descriptione tantum novi et differt foliis oblongo-lanceolatis acutè et grossè serratis, pedicellis calyce brevioribus, laciniis corollæ angustius linearibus reflexis.

PHYTEUMA LINIFOLIUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Podanthum*.)

Ph. glaberrimum, caudiculis albicantibus cylindricis brevibus fragillimis caules simplices filiformes ascendentes pumilos infernè foliosos edentibus, foliis angustè lineari-lanceolatis linearibusve teneris acutiusculis subintegris vel obsoletissimè denticulatis inferioribus basi attenuatis cæteris sessilibus, floribus secus caulis partem superiorem solitariis pedicello pruinoso puberulo calyci æquilongo suffultis racemum gracilem laxum formantibus, bracteis ad basin pedicelli lineari-setaceis, bracteolis ad medium pedicellum minimis squamæformibus sæpius evanidis, calycis glabri tubo campanulato laciniis setaceis patulis tubo brevioribus, corollæ cærulescentis partitionibus setaceis tubo calycis subduplò longioribus, capsulà ovatà poris sub apice sitis dehiscenti.

Hab. in fissuris rupium *Tauri Pamphylici* infra *Marla* alt. circ. 4000'. (Heldr.) Floret Julio ineunte.

Caules semipedales, folia 1-2 pollicaria 1-1 1/2 lin. lata. Habitus omninò *Camp. Waldsteinianæ* et affinium. Species corollæ laciniis lineari-setaceis insignis tubo latiusculo campanulato calycis transitum a sect. *Podantho* ad *Campanulam* optimum præbens.

PHYTEUMA LYCIUM Boiss. (Sect. *Podanthum*.)

Ph. caudiculis filiformibus brevibus caespites minutos edentibus, foliis omnibus subradicalibus minutis oblongis obtusiusculis in petiolum setaceum eis longiorem attenuatis integris margine crispulis supernè glabris infernè sub lente parcè hirtulis, caulibus scapiformibus glabris ascendentibus tenuissimè filiformibus pumilis simplicibus 4-2 foliis minimis setaceis obsitis, floribus 2-4 secus caulium extremitatem laxè racemosis solitariis pedicellis setaceis calyci æquilongis suffultis, bracteis setaceis, calycis tenuissimè pruinoso-tuberculati laciniis linearibus erectis tubo campanulato brevioribus, corollæ glabræ calyce subtriplo longioris partitionibus linearibus in tubum infernè subcon-
niventibus.

Hab. in monte *Bereket dagh* Lyciæ. (Pestalozza.)

Folia 2-3 lin. longa, scapi cum racemo 3-4 pollicares, flores 4 lin. longi, species venusta facie *Wahlenbergiæ* propè præcedentem ob formam tubi calycini collocanda.

NOTA. Corolla *Phyteumatum* e sectione *Podantho* ex observationibus a me factis nunquam etiam junior lobos apice connatos habet ut in veris *Phyteumatis* speciebus, inflorescentiaque insuper *Podanthi* et *Phyteumatis* omnino absimilis. *Podanthum* præterea habitu, florum dispositione, capsulâ et characteribus omnibus *C. rapunculo* et affinis simillimum est corollaque quinque partitâ tantum differt sed hoc discrimen non satis grave nam varietas *Campanulæ* species habent corollam ad medium usquè vel ad $3\frac{1}{4}$ lobatam, *C. rotundifolia* et aliæ formas monstrosas in quibus corolla ad basin usquè in 5 laciniis fissa est sæpè exhibent et transitus innumeri inter corollas lobatas et partitas in hoc agmine occurrunt. Mihi igitur aptius et affinitati naturali magis conforme videtur *Podanthum* ut subsectionem *Eucodontis* gener. *Campanulæ* conjungere et sic synonyma disponere.

Flores fasciculati.

CAMPANULA LIMONIFOLIA L. — *Ph. limonifolium* auct. DC. Prodr. non Sibth. — *Ph. stricta* Sims. — *Ph. collinum* Guss. — *Ph. tenuifolium* A. DC. mihi tantum varietas angustifolia hujus speciei polymorphæ videtur.

CAMPANULA RIGIDA Boiss. non Stock. — *Ph. rigidum* W.

CAMPANULA HESPERIDIFOLIA Boiss. — *Ph. lobelioides* W.

CAMPANULA FONTANESIANA Boiss. — *Ph. lanceolatum* W.

CAMPANULA PULCHELLA Boiss. non Salisb. — *Ph. pulchellum* F. et M.

CAMPANULA REPANDA Boiss. — *Ph. repandum* Sm. — *Ph. limonifolium*. Fl. Græc. non auctororum.

CAMPANULA SINAI Boiss. — *Ph. Sinai* A. DC.

CAMPANULA SALICIFOLIA Boiss. — *Ph. canescens* W. K. — *Ph. salicifolium* Besser.

CAMPANULA MARSCALLIANA Boiss. — *Ph. campanuloides* M. B.
 CAMPANULA SIBTHORPIANA Boiss. — *Ph. Sibthorpiantum* R. et Sch.
 CAMPANULA AMPLEXICAULIS Boiss. non Mich. — *Ph. amplexicaule* W.
 CAMPANULA FIRMA Boiss. — *Ph. Aucheri* a. DC.
 CAMPANULA CICHORIFORMIS Boiss. — *Ph. cichoriforme* Boiss.
 CAMPANULA CILICIA Boiss. — *Ph. Kotschyi* Boiss.
 CAMPANULA ASPERA Boiss. non Don. — *Ph. asperum* Don.
 CAMPANULA CAPPADOCICA Boiss. — *Ph. Cappadocicum* Boiss.
 CAMPANULA VIRGATA Labill. — *Ph. virgatum* W.

Flores solitarii.

CAMPANULA STYLIDIODES Boiss. — *Ph. stylidioides* Boiss.
 CAMPANULA PESTALOTZÆ Boiss. — *Ph. Pestalotzæ* Boiss.
 CAMPANULA GRACILIS Boiss. et Heldr. non alior. — *Ph. gracile* Boiss. et Heldr.
 CAMPANULA STENOPHYLLA Boiss. et Heldr. — *Ph. linifolium* Boiss. et Heldr.
 CAMPANULA LYCIA Boiss. — *Ph. Lycium* Boiss.
 Huic subsectioni *C. Persica* A. DC. et *C. multicaulis* Boiss. jam ab auctoribus *Campanulis* adnumerandæ omni jure conjungendæ sunt.

OLEACEÆ.

FRAXINUS SYRIACA Boiss.

Fr. arborea ramis cortice glaucescenti vestitis, gemmis nigris glabrescentibus viscidulis, foliis petiolo longo supernè canaliculato suffultis 1-2 jugis foliolis glabris pallidè virentibus subcoriaceis oblongis parte superiori acutè et ascendenti-serratis longè acuminatis lateralibus sessilibus basi breviter cuneatis vel rotundatis impari majori longius acuminato basi longè in petiolum attenuato, racemis strictis secus ramos strictè et longiusculè racemosis, floribus diandris, stigmatè bifido, samarīs glabriusculis ellipticis basi et apice attenuatis breviter acuminatis stylo persistenti mucronatis.

Hab. in rivum circà *Aleppum*. Legi Jul. 1846 fructiferam. Kotsch. pl. Alep.-Kurd. N° 22 florif.

Arbor ferè 30 pedalis, folia petiolo 2-3 pollicari suffulta, foliolum superius 2-3 poll. longum pollicem latum. Samaræ 12-14 lin. longæ 4-5 latæ. Species a *Fr. excelsiori* et *oxyphyllâ* foliis paucijugis coriaceis samarisque abbreviatis latioribus distincta. *Fr. parvifolia* Lam. *lentiscifolia* Desf. quæ Aleppi quoque indicatur et quam ex solâ de-

scriptione novi longè differre videtur foliolis 5-6 jugis minoribus ovatis vel ovato-rotundis, samarâ angustâ subcylindricâ 20-30 lineas longâ 3 lineas latâ.

FRAXINUS PERSICA Boiss. in Kotsch. pl. Pers. austr. 1845.

Fr. fruticosa humilis ramosissima cortice glaucescenti vestita, gemmis nigris minutis glabris, foliis coriaceis glaberrimis glaucescentibus breviter petiolatis indivisis vel 4-2 jugis foliolis minutis ovatis integris vel supernè vix denticulatis basi cuneato-attenuatis apice abruptè et breviter acuminatis impari majori petiolato, samaris...

Hab. in solo schistaceo montis Kuh Daëna Persiæ australis Kotsch. N° 646.

Folia cum petiolo 2-3 pollicaria, foliola superiora 10-14 lin. longa 6-8 lata cætera minora. Species forsân nimîâ audaciâ hîc proposita nam flores ut et fructus desunt; forsân fructu noto ad *Fr. parvifoliam* Lam. referenda erit.

Fr. rostrata in Kotsch. pl. Pers. bor. N° 489 e monte *Elbrus* specimenibus Aucherianis in Prodr. Cand. ad *Fr. rostratam* relatis equidem simillima est sed ambo a specie Gussonii in Jc. pl. rar. tab. 63 delineatâ diversissimæ sunt et ad *Fr. oxyphyllam* MB. nt forma foliis 2-3 jugis referendæ.

PRIMULACEÆ.

CYCLAMEN CILICICUM Boiss. et Heldr.

C. foliis hysteroanthiis..., pedunculis supernè calyceque glandulosohirtulis, calycis ad 3/4 partiti laciniis angustè lanceolatis acutis, corollæ parvæ roseæ tubo ovato ad faucem non constricto fauce violaceâ obtusè pentagonâ angulis rotundatis, laciniis corollinis ellipticis basi longè et angustè attenuatis acutis mucronatis, antheris subsessilibus cuspidatis fauci æquilongis, stylo subulato brevissimè exserto.

Hab. in fissuris rupium umbrosarum faucis Gülek Boghas (Pylæ Ciliciæ) in Ciliciâ (Heldr.) Flores prædeunt sept. fine, flores adhucdum ignoti.

Species distinctissima floribus parvis vix magnitudinis eorum *C. Cui*,

calycis laciniae eis omnium specierum mihi notarum angustiores. *C. hederæfolium* et *C. Græcum* Link solæ species autumnales hysteroanthiæ longè differunt corollæ fauce acutè angulatâ.

GENTIANEÆ.

GENTIANA GELIDA MB. var. prostrata. — Caules e collo 3-5 recurvo-patentes prostrati 3-4 pollicares, flores foliaque eis speciei minora.

Hab. in alpinis montis *Totschal* propè *Teheran* Kotsch. N° 636 et 576.

ASCLEPIADEÆ.

VINCETOXICUM PISIDICUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 4846.

V. radice e fibris longis cylindricis albidis constanti, caulibus humilibus simplicibus bifariam crispo-puberulis cæterum glabris, foliis breviter petiolatis inferioribus e basi rotundatâ vel subcordatâ ovatis acutis superioribus basi subcuneatis angustè elliptico-lanceolatis omnibus utrinquè ad nervos et marginem brevissimè puberulis cæterum glabris, umbellis ad axillas superiores sessilibus paucifloris foliis dimidiò brevioribus, pedicellis pubescentibus, calycis vix pubescentis corollâ triplò brevioris laciniis angustè lanceolatis acutis, corollæ luteo-fuscescentis ultrâ $3\frac{1}{4}$ quinquepartitæ laciniis oblongis obtusis obsolete albido-marginatis intus glabris, coronæ stamineæ patulæ pentagonæ gymnostegio paulò longioris lobis vel potiùs angulis ferè obsolete triangularibus, stigmate depresso, folliculis...

Hab. in montibus tophaceis arenosis Pisidiæ suprâ *Bouldour* (Heldr.) Fl. Maio.

Caules 6-8 pollicares, folia 1 $1\frac{1}{2}$ -2 $1\frac{1}{2}$ poll. longa 6-14 lin. lata, pedicelli 3-4 lin. longi, flores minores eis *C. Vincetoxici*. Ab eo ut et a *V. nivali* B. et Heldr. cui habitu accedit aliis neglectis statim dignoscitur umbellis florum sessilibus, floribus fuscescentibus, coronæ lobis ferè obsoleteis.

VINCETOXICUM FUNEBRE Boiss. et Kots. in Kotsch pl. Pers. bor. 4846.

V. caulis elatis teretibus bifariam hirtulis, foliis subsessilibus a

basi subcordatà ovato-subrotundis breviter acuminatis subtùs ad nervos vix hirtulis cæterum glaberrimis supernè subcluidis, floribus in racemos densifloros capitatos pedunculatos axillares foliis breviores racemum terminalem foliatum laxum formantes dispositis, pedicellis flore brevioribus, bracteis minimis lanceolato-linearibus acutis, calycis glabri corollà triplò brevioris laciniis triangularibus acutis, corollæ atroviolaceæ ultrà medium quinquepartitæ laciniis triangulari-lanceolatis obtusis intùs glaberrimis, coronà stamineà atroviolaceà gynostegium vix æquanti apice brevissimè quinquedentatà dentibus breviter triangularibus obtusis, stigmatè depresso, folliculis patulis brevibus glabris longè attenuato-rostratis.

Hab. in fauce *Nasserou* et propè *Germ ab* in monte *Demawend* Kotsch. N° 359.

Bipedale et ultrà, folia inferiora 2-2 1/2 poll. longa, flores magnit. inter eos *V. nigri* et *V. speciosi* intermedi. Species cæteris neglectis a generis speciebus nigrifloris corollæ laciniis intùs glaberrimis distinctissima. *V. medium* R. Br. — *fuscatum* Link floribus laxè racemosis, corollæ fusciscentis nec atræ laciniis elongatis, calycis laciniis lineari-lanceolatis, floribus distinctiùs pedicellatis longius distat.

GOMPHOCARPUS SINAICUS Boiss.

G. caulibus frutescentibus elatis virgatis teretibus puberulis glaucescentibus foliosis, foliis breviter petiolatis brevissimè utrinquè puberulo-canescens oblongo-lanceolatis vel linearibus acutis vel mucronulatis carnosulis margine sæpè subrevolutis, pedunculis ex axillis superioribus folio dimidiò brevioribus umbellam 5-6 florum ferentibus, calycis incani corollà triplò brevioris laciniis ovatis obtusis, corollæ lutescentis laciniis reflexis extùs puberulis utrinquè attenuatis acutiusculis, coronæ stamineæ foliolis truncatis ad utrumque angulum interiorem in denticulum acutum abeuntibus, folliculis erectis oblongis in rostrum attenuatis rubrosetosis inter setas farinoso-tomentellis.

Hab. in lapidosis vallium jugi *Sinaitici* (Boiss., Bové, Aucher, N° 1514, Schimper, N° 379.) In deserto *Egyptiaco-Arabico*. (Husson.)

Planta 1 1/2-2 pedalis, folia 1 1/2-2 poll. longa latitudine a lineis 2 1/2 ad semipollicem variantia crassa cartilaginea, flores magnit. eorum *G. fruticosi* qui egregiè differt virescentià et glabrescentià totius plantæ, foliis linearibus acutis, corollæ lobis glabris margine ciliatis, coronæ stamineæ foliolis angulo interiori bidentatis dente altero

longiori extrorsum recurvo, folliculis inter setas glabrescentibus. *G. setosus* R. Br. e descriptione foliis glaberrimis, pedunculis glabris coronæ stamineæ phyllis in dentem obtusum productis diversissimus est.

CONVOLVULACEÆ.

CONVOLVULUS SCHIMPERI Boiss.

C. perennis suffruticosus totus pilis patulis rufescentibus molliter hispidus, caulibus erectis ramosis ramis inermibus foliosis, foliis oblongis obtusis in petiolum attenuatis valdè nervoso-rugosis margine undulato-crispis subtus præsertim ferrugineo-pilosissimis, floribus in capitula 3-4 flora axillaria pedunculata foliis breviora congestis, bracteis sepalisque subæquilongis angustè lanceolato-linearibus densè hispidis, corollâ angustâ pilosâ calycem vix superanti.

Hab. in *Arabia felici*. (Schimper sub *C. salviaefolio*.)

Folia cum petiolo ferè sesquipollicem longa 4 lin. lata valdè rugosa undulataque, flores eis *C. secundi* dimidiò minores. Species pulchra ex affinitate *C. secundi* et *gonoclad*i Boiss. *C. salviaefolius* Sieb. verus ex specimine authentico ad *C. secundum* spectat nec ad *C. lanatum* qui ipse a *C. sericeo* Burm. mihi omninò diversus videtur.

CONVOLVULUS COMMUTATUS Boiss.

C. basi suffrutescens multicaulis totus indumento adpressissimo viridi-flavido brevi obsitus, caulibus erectis rigidis crassiusculis simplicibus vel parcè ramosis, foliis radicalibus ovato-spathulatis obtusissimis in petiolum eis longiorem attenuatis caulinis sessilibus oblongis utrinquè attenuatis acutiusculis, floribus ad caulis apicem densè capitatis folio florali uno alterove calyces æquanti suffultis, sepalis lanceolatis apice valdè attenuato-acuminatis densè et longè rufo-hispidis, corollâ extus valdè rufescenti-hispidâ calyce duplò longiori.

Hab. in Mesopotamiâ ad *Mossoul* Aucher N° 4444.

Hæc planta in Prodomo Candolleano ad *C. lanuginosum* β *canescentem* relata ab hac specie Europæo-occidentali certè differt indumento brevissimo adpresso, præsertim caulibus crassiusculis rigidioribus 7-10 pollicaribus foliorumque formâ quæ in *C. lanuginoso* semper linearia sunt. Corolla in hac specie saltem 12-14 lin. longa.

CONVOLVULUS SCHIRAZIANUS Boiss.

C. basi suffrutescens multicaulis totus pilis adpressissimis sericeo-flavescens, caulibus erectis tenuibus virgatis strictè ramosis remotiusculè foliosis, foliis linearibus sessilibus basi subattenuatis acutiusculis elongatis, floribus terminalibus longiusculè pedunculatis densè capitatis bracteis sepalisque similibus subæqualibus brevibus lineari-lanceolatis subpatulè rufescenti-hispidis, corollà flavidà adpressè hirtà calyce subtriplo longiori.

Hab. in *Persia australi* Aucher N° 4945, in monte *Sabst Buschom* propè *Schiraz* alt. 4800' Kotschy N° 379.

Caules 1½-4 pedales, folia inferiora sesquipollicaria 1 1½ lin. lata, calyx 3 1½ lin. tantum longus, corolla 10-12 lin. longa. A *C. saxatili* var. lineari ex Hispanià quocum conjunxeram certè diversus corollà elongatà, bracteis non foliaceis nec calyces superantibus.

CONVOLVULUS MODESTUS Boiss.

C. perennis totus adpressissimè sericeus, radice caules plures pumilos ascendentes parcè ramosos herbaceos edenti, foliis angustè lineari-lanceolatis utrinquè subattenuatis acutis inferioribus in petiolum brevem abeuntibus cæteris sessilibus, floribus in capitula densa pauciflora terminalia breviusculè pedunculata folio ea æquanti plerumquè suffulta dispositis, bracteis sepalisque densè patulè et longè rufescenti-hispidis angustissimè lanceolato-linearibus acuminato-attenuatis, corollà flavidà extus adpressè hirsutà calyce duplo longiori.

Hab. in prov. *Aderbidjan* Persiæ borealis Aucher N° 4947.

Caules 5-6 pollicares, folia inferiora sesquipollicaria 2 lin. lata, corolla 8-9 lin. longa. A precedenti distinctus caulibus humilibus a basi herbaceis, corollà abbreviatà, calyce majori. Habitu propius accedit ad *C. saxatilem* Vahl qui præter caules internè suffruticosos differt bracteis calyces superantibus capitula fulcrantibus.

CONVOLVULUS LIBANOTICUS Boiss.

C. rhizomate crassissimo lignoso tortuoso supernè ramoso cæspitem humi adpressissimum densum edenti, foliis radicalibus oblongo-linearibus obtusis vel acutiusculis basi breviter attenuatis pilis adpressis griseis canescentibus, caulibus adpressè hirtis tenuibus folio uno alte-

rove lineari acuto instructis brevibus decumbentibus simplicibus vel ramulo uno alterove instructis apice 3-5 flores laxiusculè approximatos ferentibus aliquandò subnullis unifloris, pedicellis calyci æquilongis, bracteis linearibus pedicellum æquantibus superantibusve, sepalis sub lente breviter et adpressè hirtis rubellis ovatis subæqualibus obtusis corollà extùs carneà hirtulà intùs albà calyce quadruplò longiori.

. Hab. in excelsis siccis *Libani* suprà Cedros (Boiss. Aucher N° 4399).

Folia radicalia 4-6 lin. longa lineam lata, caules longiores 2-3 pollicares, sepala vix 2 lin. longa. Species ex affinitate *C. compacti* ab eo distinctissima foliis minùs angustis indumento griseo nec sericeo ob-
sitis, sepalis glabrescentibus obtusis subæqualibus nec inæqualibus longè acuminatis etc.

CONVOLVULUS STRIGULOSUS Boiss.

C. acaulis rhizomate crasso lignoso cæspites densos compactos edenti, foliis densissimè cæspitosis lineari-oblongis linearibusque infernè attenuatis obtusis plicatis utrinquè pilis nitidis rigidis erecto-patulis densissimè strigulosis, floribus in cæspite sessilibus solitariis sepalis dense et adpressè pubescentibus minutissimis ovatis æqualibus muticis, corollà extùs valdè hirsutà calyce sextuplò longiori.

. Hab. in Anatolià circà *Angora* et *Tokat* Aucher N° 4939.

Folia 5-6 lin. longa apice lineam lata, calyx vix ultrà lineam longus. Species habitu *C. compacti* omninò donata sed diversa indumento striguloso nec adpressè argyreo-sericeo, sepalis multò minoribus ovatis muticis.

CONVOLVULUS CHONDRILLOIDES Boiss.

C. caulibus basi suffruticosis glabrescentibus viridibus erectis elatis subaphyllis strictè ramosissimis ramisque aphyllis tenuissimè virgatis scopariis laxissimè paniculatis paucifloris, foliis paucis inferioribus angustè linearibus basi attenuatis acutiusculis subtùs adpressè et parcè hirtis cæteris lineari-subulatis ad ortum ramorum oriundis ramo adpressis ramulis adpressè et parcissimè setulosis filiformibus rigidulis patentibus apice 1-2 flores minutos pedicello brevissimo sub anthesi nutanti postea erecto suffultos ferentibus, bracteis ovatis minutissimis squamæformibus, sepalis albo-membranaceis scariosis pilis rufis adpressè hirtis ovato-rotundis obtusiusculis, corollà albà extùs ad angulos sericeà patulà calyce triplò longiori.

Hab. in Persiâ australi Aucher N° 4941, in monte *Elbrus* propè *Derbend* Persiæ boreali Kotsch. N° 421.

Caules bipedales ramosi intricati, folia inferiora pollicaria supernè 4-4 $1\frac{1}{2}$ lin. lata, sepalâ lineâ unâ vix longiora latioraque. corollâ diametro 5-6 lin. lata. Species pulchella affinis *C. dorgenio* qui differt caulibus junioribus crassis hispidis, foliis obtusis multò latioribus, ramulis regulariter dichotomis cum flore subsessili in dichotomiâ, floribus duplò majoribus roseis, sepalis mucronulatis.

CONVOLVULUS PEDUNCULARIS Boiss.

C. perennis caulibus volubilibus elongatis flexuosis patulè rufescenti-tomentosis foliis tomento denso flavido adpressissimo sericeo-velutinis inferioribus pedunculo brevi suffultis superioribus subsessilibus omnibus oblongis acutis angustè cordatis subhastatis obsoletissimè repandis, auriculis non divergentibus triangularibus brevibus acutiusculis subbilobis, pedunculis folio sextuplò longioribus laxè 2-3 floris ad pedicellorum ortum bracteis oppositis lineari-setaceis pedicello brevioribus instructis, pedicellis rufo-hirsutis calyci æquilongis, sepalis rufescenti-hirsutis albidis lineari-lanceolatis apice triangulari-acuminatis virescentibus, corollâ ochroleucâ extùs ad angulos parcè et adpressè hirtâ calyce triplò longiori.

Hab. in *Mesopotamiâ* inter *Orfa* et *Sierek* Kotsch. N° 58.

Folia inferiora 4 $1\frac{1}{2}$ -2 pollicaria pedunculi communes semipedales, sepalâ sex lineas longa. Affinis *C. hirsuto* Stev. a quo indumento, auriculis foliorum non divergentibus, foliis acutioribus differt. *C. atriplicifolius* Poir. e descriptione foliis facie subpilosis margine ciliatis alienus est et a *C. hirsuto* Stev. non differre videtur.

CONVOLVULUS PALÆSTINUS Boiss.

C. perennis caulibus volubilibus filiformibus elongatis procumbentibus ramosis adpressè pubescentibus, foliis utrinquè tomento adpressissimo ad nervos venuloso nitenti canescentibus cordato-oblongis obtusè crenato-lobatis inferioribus longè pedunculatis obtusis superioribus brevissimè pedicellatis apice attenuatis acutis, auriculis omnium non divergentibus obtusis lobulatis, pedunculis axillaribus 4-4 floris folia axillaria vix superantibus ad bifurcationes bracteolis seta-

ceis obsitis, pedicellis tomentosis calyce longioribus, sepalis submembranaceis ovato-subrotundis obtusissimis muticis adpressè hirtis, corollâ citrinâ ad angulos sericeâ calyce quadruplò longiori.

Hab. in cultis *Palæstinæ* ubi legi loco non notato.

Caules prostrati 2-4 pedales, folia inferiora petiolo bipollicari suffulta omnia parva, majora pollicem longa basi 9 lin. lata, calyx 3 lin. longus. A *C. galatico* cui indumento affinis est differt eo minùs denso, foliis minùs rugosis, sepalis non ovatis acuminatis. *C. stachydifolius* foliis glabriusculis sepalis glabris mucronulatis differt.

β. diversifolius. — Folia inferiora subpalmatim dissecta laciniis utrinquè 2-3 lanceolato-linearibus intermediâ multò longiori, folia superiora longè linearia acuminata integerrima auriculis 2 lineari-setaceis hastata.

Hab. ad *Bolu* Bithyniæ (Pestalozza).

Indumentum et sejala omninò speciei; si tamen observationes ultiores formam foliorum constantem esse docent in novam speciem *C. Bithynicam* dicendam erigatur.

CONVOLVULUS COELESYRIACUS Boiss.

C. annuus multicaulis totus viridis minutè parcè et adpressè pilosusculus, caulibus volubilibus filiformibus procumbentibus angulesis, foliis inferioribus petiolo eis longiori suffultis latè cordatis ovato-subrotundis obtusissimis vix repandis intermediis obtusè quinquelobis tobo terminali elongato superioribus brevissimè petiolatis digitatim 5 partitis laciniis oblongo-linearibus acutis intermediâ longiori summis sæpè lineari-hastatis acuminatis, floribus solitariis axillaribus pedunculo recto folium superanti suffultis infrà medium 2 bracteolis setaceis suffulto, parte suprâ bracteolas sitâ (pedicello) post anthesin sensim a basi ad apicem incrassatâ recurvâ, sepalis patulè hirtis obovatis obtusissimis longè mucronatis, corollâ roseâ ad angulos apice pilosulâ calyce triplò longiori.

Hab. in cultis Cœlesyriæ inter *Hasbeya* et *Rascheya* et colui e seminibus relatis.

Affinis *C. Fatmensi* Kunze qui differt foliis oblongis omnibus utrinquè rotundatim 4-5 lobis, pedunculis abbreviatis, sepalis muticis, corollâ calyce vix duplò longiori. Corolla nostræ speciei 7 lineas circiter longa et diametro lata est.

CUSCUTA SCHIRAZIANA Boiss.

C. caulibus capillaceis floribus capitato-glomeratis glomerulis medio-cribus sessilibus, flore singulo sessili, calyce ad $3\frac{1}{4}$ usque in lacinias ovatas obtusas partito, corollâ albâ arceolatâ calyce vix longiori lobis obtusiusculis, staminibus faucem attingentibus antheris flavis oblongis, squamis ovatis obtusis denticulatis corollâ triplò brevioribus, stylis a basi divergentibus arcuatis obscure in stigma incrassatis.

Hab. in collibus propè Schiraz et Dalechi in Echinope, Pegano etc. parasitica Kotschy N° 118 et 318 sub C. minor. var.

Affinis C. minori pro quâ priùs habui differt corollâ albâ calycem subæquanti, calycis lobis obtusis, antheris flavis nec roseis, stylis a basi nec apice divergentibus.

CUSCUTA PALÆSTINA Boiss.

C. caulibus capillaceis rubellis floribus capitato-glomeratis glomerulis mediocribus sessilibus, flore singulo sessili, calycis carnosuli lobis triangulari-obtusis dorso costato-incrassatis, corollæ calyce vix longioris lobis brevibus ovatis obtusis, antheris flavis in fauce subsessilibus subrotundis, squamis minimis rotundatis denticulatis, stylis a basi divergentibus vix apice in stigmata incrassatis.

Hab. in Palæstinâ in Poterio spinoso parasitica. (Boiss.)

Capitula et flores eis præcedentis et C. minoris ferè dimidiò minores, calycis laciniis costato-incrassatis etc. ab eis distincta.

BORRAGINÆ.

HELIOTROPIMUM GRANDIFLORUM Aucher. (Sect. Catimas.)

H. totum adpressè et molliter canescens, foliis ovatis obtusis longiusculè petiolatis nervis subtùs parùm prominulis intensius canis, calycis hirsuto-cani partitionibus lanceolato-linearibus, corollæ hirtæ tubo calyce duplò longiori suprâ partem antheriferam subbasilarem constricto dein in limbum sensim dilatato, limbi laciniis triangularibus acutis in præfloratione revolutione marginum linearibus rectis conniventibus, antheris ad basin corollæ ferè insertis, stylo subnullo, stigmatè e basi disciformi glabriusculâ longè conico-subulato apice profundè bifido hirtulo, nuculis glabris tuberculatis.

Hab. in *Armeniâ* Aucher N° 2376.

Corolla 4 lin. longa. — Sub hoc nomine hæc species et sequens confusæ fuerunt quâ causâ diagnosin utriusque sic restituo.

HELIOTROPIUM CIRCINNATUM Griseb. Fl. Rumel. pag. 78. (Sect. *Catimas*.)

H. totum adpressè et molliter canescens, foliis ovatis acutiusculis breviter petiolatis nervis subtus valdè prominulis, calycis hirsuto-cani partitionibus oblongo-lanceolatis, corollæ hirtæ tubo calyce vix longiori jam ex apice partis antheriferæ in limbum ampliato, limbi partitionibus triangularibus margine convolutis in caudas setaceas antè et post anthesin intus circinnato-revolutas attenuatis, antheris ferè ad basin corollæ insertis, stylo subnullo, stigmatè e basi disciformi glabriusculâ elongato-conico indiviso longè barbato, nuculis tuberculatis glabris.

Hab. in *Mesopotamiâ* propè *Mossoul* Kotschy pl. Alepp. Kurd. N° 636 sub *H. grandifloro*.

Corolla 2 lin. tantum longa.

HELIOTROPIUM BOVEI Boiss. (Sect. *Catimas*.)

H. annuum totum pube molli densâ velutinum griseum, caulibus ramosis prostratis? foliis ovatis mucronulatis subsessilibus^s supernè lineatis subtus prominenti-nervosis, spicis abbreviatis, floribus sessilibus remotiusculis, calycis partitionibus lanceolato-linearibus acutiusculis, corollæ parvæ tubulosæ extus adpressè pubescentis intus glabræ tubo calyce subbreviori limbi minuti erecti laciniis triangulari-lanceolatis acuminatis margine supernè convolutis in præfloratione conniventibus mucrone recurvo terminatis, stigmatè subsessili e basi disciformi subulato-conico indiviso supernè pubescenti, nuculis ovato-rotundis glabris tuberculatis.

Hab. in *Arabîâ felici*. (Bové.)

Folia 4-5 lin. longa, flores remotiusculi, corolla vix sesquilineam longa. Affine habitu et indumento *H. rotundifolio* quod differt radice perenni, floribus majoribus, nuculis pubescentibus lævibus, antheris muticis, tubo corollino calycem subsuperanti etc. — Æstivatio corollæ inter sectiones *Catimas* et *Euheliotropium* mihi ex variatione latitudinis et convolutionis laciniarum calycis orta videtur; si laciniæ latæ

et obtusæ sunt tunc planæ et æstivatione quincunciales, si angustæ et acutæ tunc margine convolutæ apice incurvæ et æstivatione conniventes videntur, sed etiam in eis si rectè spectes ex quâdam irregularitate dispositionem quincuncialem potius quam valvarem dignosces.

HELIOTROPIUM DISSITIFLORUM Boiss. (Sect. *Euheliotropium*.)

H. annuum totum sub lente pilis rigidis brevissimis adpressiusculis albis e tuberculo ortis glandulis pellucidis intermixtis subcinerascens scabrum, caulibus teretibus divaricatis ramosissimis, foliis parvis ovatis obtusis breviter petiolatis subtus clavato-nervosis pallidioribus, spicis primum scorpioideis dein elongatis dissitifloris, floribus sessilibus parvis, calycis glandulosi adpressèque hirti quinquepartiti partitionibus lineari-lanceolatis obtusis, corollæ albæ tubo calyci æquilongo extus adpressè pubescenti intus glabro, limbi partitionibus ovato-rotundis obtusis præfloratione quincuncialibus, antheris paululum sub medio tubo corollæ insertis mucrone brevissimo obtuso inflexo terminatis, stylo patulè et densè barbato, stigmate stylo paululum longiori e basi disciformi glabrâ conico-subulato supernè puberulo, nucibus ovatis læviusculis glabris calyce superatis.

Hab. in Persiâ boreali propè *Sonak* in lapidosis montis *Elbrus* Kotschy, N° 583 A.

Caules pedales forsân diffusi, folia 4-6 lin. longa, spinæ fructiferæ sæpè semipedales, flores paulò minores eis *H. Eichwaldi* quod a nostrâ specie differt indumento non glanduloso, foliis majoribus, floribus non dissitis, stylo brevissimo glabro.

HELIOTROPIUM ALEPPICUM Boiss. (Sect. *Euheliotropium*.)

H. annuum totum setis albis brevibus basi tuberculosis densè strigosum cano-griseum, caule erecto pumilo a basi ramoso ramis strictiusculis, foliis oblongis vel oblongo-linearibus acutiusculis utrinquè attenuatis breviter petiolatis facie superiori viridioribus minùs setosis inferiori sæpè prominenter nervosis, spicis brevibus laxifloris terminalibus infernè bracteatis, calycis partitionibus triangulari-lanceolatis acutiusculis, corollæ parvæ ferè tubulosæ extus sericeæ intus glabræ tubo calyce vix longiori limbo minimo æstivatione quincunciali lobis subcrenato-denticulatis rotundatis, antheris paulò suprâ basin corollæ insertis apice breviter mucronatis, stylo nullo, stigmate e basi subdi-

latatâ cylindrico-subulato apice albo-penicillato cæterum glabro, nuculis minimis ovatis tuberculatis glabris calyce paulò superatis.

Hab. in planitie elatâ inter littora Syriæ et urbem *Aleppum* sitâ ubi legi Jun. 1846.

Planta 3-5 pollicaris, folia pollicem et amplius longa 3-4 lin. lata, flores eis *H. supini* vix majores. Species indumento, habitu stricto, spicis basi bracteatis distinctissima.

HELIOTROPIUM BREVILIMBE Boiss. (Sect. *Euheliotropium*.)

H. perenne suffrutescens totum adpressè velutinum canum, caulibus erectis subsimplicibus foliosis, foliis oblongis obtusiusculis in petiolum brevissimum attenuatis paginâ superiori vix lineatis inferiori elevato-nervosis, spicis terminalibus scorpioideis brevissimis densifloris, floribus sessilibus, calycis partitionibus lineari-lanceolatis obtusis externè densè albopilosis glandulosisque internè adpressè hirtis, corollæ densè et adpressissimè hirtæ crassiusculæ tubo calyce paulò longiori imâ basi constricto intus glabro, limbi minutissimi rubelli lobis ovato-rotundis æstivatione quincuncialibus, antheris sub medio tubo insertis apice vix mucronatis, stylo breviter hirtis, stigmate stylo paulò longiori e basi disciformi conico pubescenti, ovario glabro.

Hab. in Oriente probabiliter *Persia australi* Aucher, N° 5005 A.

Caules in meis speciminibus semipediales simplices crassiusculi, folia 4-6 lineas longa 3 lata, spicæ terminales semipollicares, corolla 2 lin. circ. longa species minutie limbi corollini notabilis dispositione spinæ *Helianthemum sessiflorum* referens, habitu affinis *H. rotundifolio* quod differt formâ foliorum, corollæ multò majoris limbo amplò, stylo nullo, antheris apiculatis, etc.

HELIOTROPIUM UNDULATUM Vahl var. *tuberosum*. — Fruticosum, caulibus rigidulis ramosissimis, totum pilis albis brevibus e tuberculo albo ortis scaberrimuno. Folia parva margine convoluta vermiculata. Spicæ florum valdè abbreviatæ, nuculæ glabræ plerumquè in fructum bipartibilem geminatim concretæ.

H. tuberosum Boiss. et Hohen. in Kotsch. pl. Pers. austr.

Hab. in insulâ *Korgo* Persiæ australis Kotsch. N° 22, in *Persia australi* Aucher, N° 5002.

Nihil variabilius *H. undulato* cui species plures a variis auctoribus propositæ conjungendæ sunt. Quoad habitum nunc dumosum micro-

phyllum convolutifolium est nunc diffusum elongatum foliis plüs minusve dilatatis margine undulatis; quoad indumentum ejus pili modò strigosi rari e tuberculo orti modò crebri adpressi molliores vix tuberculosi, fructüs modò glabri modò plüs minus pilosi. Nuculæ non minus variant, in formâ vulgari Ægyptiacâ fructus quadripartibilis est ob margines elevatos nucularum ad suturas quadricostatus, in speciminibus lanariensibus nonnullis fructüs quoque quadripartiti nuculæ minores sunt magis tuberculatæ et margine non elevatæ undè fructus ad suturas quadrisulcatus, in aliis speciminibus Canariensibus et in varietate *tuberculosâ* supernè descriptâ nuculæ binatim concretæ sunt quæ forma in Prodro-mo Candolleano inter *Heliophyta* sub *H. erosi* nomine recensita fuit hujus generis cum *Heliotropio* nimiam affinitatem demonstrans, in plantis Sennariensibus et Assyriacis Aucher, No 2378, fructus deniquè quadripartibilis est sed dorsum nucularum gibbo inani lævi albido auctum est. Omnes illæ fructüs variationes cum illis foliorum et indumenti tali modo combinatæ sunt ut nequidem varietates facilè delimitari possint. *H. undulato* igitur ut synonyma adjungenda sunt *H. ramosissimum* Sieb., *H. eriocarpum* Schimp. pl. Arab. non Del. *H. Persicum* Lam., *H. erosum* Lehm. et probabiliter quoque *H. Moroccanum* Lehm.

Legi fine Januarii 1846 *H. Kunzii* Lehm. in cultis Ægypti superioris suprâ *Esneh* copiosum, hujus radix constanter et evidenter annua est nec ut cl. Lehmann antumaverat perennis. Hæc species ex florum accuratiori examine ab *H. nilotigo* DC. et *H. ovatifolio* Forsk. non differt. *H. Coromandelianum* Retz etsi valdè affine forsân ab eo specificè differt sepalis angustioribus, stigmate longiùs conico apice hispidulo nec scabrido, antheris longioribus angustioribusque.

ECHIUM MARIANUM Boiss.

E. perenne totum molliter sericeo-villosum cano-griseum, caulibus densè foliosis, foliis sessilibus oblongo-lanceolatis acuminatis utrinquè ad nervos tenues vix prominulos albo-lineatis superioribus ad basin paniculæ sensim angustatis, paniculâ spiciformi ovato-cylindricâ densâ, bracteis calyces vix æquantibus, calycis adpressè albo-tomentosi quinquepartiti laciniis lanceolatis acutis, corollâ cæruleâ vix irregulari supernè breviter ad nervos longiùs strigulosâ, staminibus exsertis corollâ duplò longioribus, stylo stamina subsuperanti ad $3\frac{1}{4}$ longitudinis hirsuto apice longiusculè bifido.

E. fastuosum DC. Prodr. quoad pl. Hisp. non Jacq. — *E. candicans* DC. cat. Hort. Montp^p et herb. non L.

Habui ab amiciss. Dr Pablo Prolongo Malacensi qui legit specimen unicum hujus speciei in faucibus montis *Sierra Morena* secus viam *Matritensem* in consortio *Digitalis Marianæ*.

Hæc species meo sensu ab *E. fastuoso* sat differt foliorum indumento copiosiori sericeo, paniculæ densioris bracteis flores nunquam superantibus, floribus longè minoribus, calycis 2 lin. tantum longi indumento cano nec pilis strigoso-tuberculosis intermixto, corollâ magis regulari. *E. nervosum* Maderense nostræ speciei simile differt indumento adpressissimo asperulo, spicâ densissimâ, etc. Cum specimen imperfectum tantum viderim nescio an in plantâ Hispanicâ ille truncus lignosus occurrat in speciebus Canariensibus adeò manifestus. Specimina herb. DC. *E. caudicantis* cujus patria ignota erat meæ plantæ omnino conveniunt.

ECHIUM PAVONIANUM Boiss.

E. perenne caulibus densè foliosis densissimè et breviter cinereo-canis, foliis lanceolato-linearibus in petiolum breviter attenuatis acutis duplici indumento altero brevissimo lente perspicuo altero e pilis tuberculatis constanti obsitis adpressè hirsutis margine ciliatis paginâ, inferiori pallidioribus, foliis supremis ad paniculæ basin linearibus brevissimis, omnium nervis prominulis, paniculâ ovatâ spicæformi, laxiusculâ spiculis pedicellatis, calycis quinquepartiti adpressè hirti pallidè virentis laciniis linearibus crassiusculis obtusis ad nervos sparsim tuberculato-strigosis, corollâ e sicco carneâ calyce duplò longiori lobis rotundatis vix inæqualibus parçè et adpressè hirtis, staminibus corollâ duplò longioribus, stylo stamina superanti longè bifido ultrâ 3/4 longitudinis hirsuto.

E. fastuosum DC. Prodr. quoad notulam non Jacq.

Hab. in Hispaniâ propè *Aldeguela* (herb. Pavon). Hic locus mihi ignotus est sed ex schedulæ formâ et comparatione in provinciâ *Extremadurâ* probabiliter situs.

Habitus *E. virescentis* DC. Folia inferiora in meo specimine bipollicaria tres lineas lata, panicula 3-4 pollicaris, calyces 2 lin. corolla 3 1/2 lin. longa. Medium inter *E. Marianum* et *E. polycaulon* a priori differt indumento duplici, paniculâ laxiori, calycis adpressè hirti virentis nec densè albo-tomentosi laciniis obtusis, etc. *E. polycaulon*

longius differt indumento totius plantæ patulo striguloso, foliis caulinis basi latioribus subauriculatis, paniculâ, calycibus valdè strigosociliatis, etc.

ECHIMUM POLYCAULON Boiss.

E. perenne viride totum pilis brevibus albidis e tuberculo albido ortis strigulosum « foliis radicalibus magnis rosulatis lanceolato-linearibus, caulibus numerosis » simplicissimis ascendentibus infernè angulatis foliosis supernè longè pyramidato-spicatis, foliis caulinis a basi latiori subauriculatâ lanceolato-linearibus acutissimis sensim diminutis, spiculis brevibus subscorpioideis breviter pedunculatis folio florali lanceolato vel lineari in inferioribus flores æquanti in superioribus eis breviori suffultis in spicam non interruptam longam tenuem basi vix latiore appropinquatis, calycis infrâ medium usquè quinquepartiti infernè glabriusculi laciniis lanceolatis acutis supernè rigidè ad nervos et marginem strigoso-ciliatis, corollæ parvæ tubo glabro calyci æquilongo, limbo intensè violaceo extûs adpressè sericeo tubo æquilongo laciniis rotundatis subæquilongis, staminibus glabris corollâ duplò longioribus subæquilongis, antheris violaceis subrotundis, stylo stamina superanti apice bifido a basi infrâ medium hirtulo, nuculis minimis tuberculatis tuberculis acutis.

E. Lusitanicum DC. Prodr. et herb non alior.

Hab. in valle *Plasencia* Extremaduræ inter *Tornabacas* et *Cabezuela* (herb. Pavon.). Fl. Jun.

Ex descriptione schedulæ Parvoniæ caules numerosi concentricè e radice ascendentes esse videntur sed an e centro rosulæ aut infrâ eam nascantur nescio. Mea specimina sesquipedalia sunt infernè foliis 3-4 poll. longis 4-6 lin. latis densè obsita in spicam tenuem 5-8 pollicarem abeuntia. Flores e minimis generis, calyx vix 2 lin. longus corollâ 3 1/2 longa. Affine *E. Mariano* et *Pavoniano* a quibus differt indumento striguloso nec plûs minûsve sericeo, paniculâ longissimè spicæformi aliisque notis et cum eis formans sectionem ab omnibus *Echiis* Europæis corollâ minutâ subregulari distinctam. *E. Lusitanicum* quod in herb. Jussieu olim vidi est species distinctissima ex affinitate *E. Italici* cujus descriptio nostræ plantæ minimè convenit nam in eâ flores magni, stamina duo aliis multò longiora, folia molliusculè canescentia etc. esse dicuntur.

ECHIAM ELEGANS Lehm. var. *incana* Boiss. et Heldr. — Totum et densius secùs caules pube duplici alterâ brevissimâ densâ alterâ e pilis albis elongatis constanti adpressissimè cinereum, foliis margine subundulatis floralibus abbreviatis, calycis adpressè cani abbreviati laciniis obtusioribus.

Hab. in arenosis maritimis Cretæ ad *Cydoniam* cum formâ genuinâ. (Heldr.)

Primâ fronte hæc varietas diversissima videtur a specie in quâ indumentum valdè patulum et strigosum adest, sed specimina intermedia occurrunt in quibus pili partis superioris plantæ patuli fiunt. Eodem loco cl. Heldreich legit formam alteram submonstrosam *E. elegantis* indumento quoque adpresso donatam in quâ folia angustè linearia lineam tantum lata sunt, calycis lacinia linearis-setacea corollam ferè æquantes; hæc forma quoque et sæpè in eodem specimine ad formam vulgarem transit.

ECHIAM GLOMERATUM Poir. Dict. VIII, p. 670.

E. bienne pallidè virens foliis inferioribus lanceolatis vel lanceolato-linearibus in petiolum longè attenuatis obtusiusculis adpressè et tenuiter setosis setis subæqualibus tuberculatis, caule teretiusculo simplicissimo setis longis patulis pube brevissimâ intermixtâ hispido in spicam longissimam tenuem basi interruptam abeunti, foliis caulinis floralibusque basi vix dilatatis longè acuminatis hisce spiculas subsessiles secundas brevissimas glomeruliformes longè superantibus bracteis angustè linearibus inordinatim setoso-strigosis, calycis laciniis adpressè densè et æqualiter albo-setosis, tubo corollæ e calyce breviter exserto limbo vix longiori intus ut et filamenta glaberrimo.

Hab. in *Palæstinâ* (Boiss.) *Syriâ* Labill! Auch!

E. Elongatum Lam. ex spec. hort. Paris. in herb. DC.

Hujus speciei diagnosim dedi ob comparisonem cum sequenti *Hispanicâ* a me prius cum eâ confusâ.

ECHIAM POMPONIUM Boiss. Voy. Hisp. in Tab. 424.

E. bienne, cano-griseum, foliis inferioribus lanceolatis acutis basi breviter attenuatis adpressè et densè setosis, caule sulcato simplici rarius basi ramuloso setis sparsis albidis pubeque breviori intermixtâ strigoso in spicam longam infernè interruptam crassam jam ferè a basi

ipsa abeunti, foliis caulinis floralibusque basi dilatatis subcordatis hisce spiculas scorpioideas subelongatas non æquantibus, bracteis triangularibus acutis facie breviter puberulis margine regulariter ciliato-pectinatis, calycis laciniis pube duplici altera brevi adpressa, altera setis ad margines pectinatim ad nervos sparsim dispositis constanti obsitis, corollæ tubo e calyce breviter exserto limbo longiori intus ad basin filamentorum hirtorum hirsuto.

E. glomeratum Boiss. Voy. Hisp. p. 424 non Poir.— *E. Lagascae* Boiss. El. non Kechh. — *E. Boissieri* Bend. Nomencl. — *E. albicans* Schott. non Lagasca.

Hab. in *Hispania* australi (Boiss.), Africa boreali ad *Tingidem* (Salzm.) et *Algeriam* (Bové).

SYMPHYTUM PALESTINUM Boiss.

S. perenne, caulibus erectis ramosis angulatis petiolorum decurrentia angustè alatis pube brevissimâ viscidulâ pilis patulis sparsissimis mixtâ obsitis, foliis radicalibus petiolo alato eis longiori suffultis ovatis basi cordatis vel rotundatis obtusis, caulinis oblongis sessilibus subsessilibusve basi brevissimè attenuatâ decurrentibus acutis, floralibus ovatis cordatis, omnibus duplici pube alterâ minutissimâ viscidulâ alterâ e setis tenuibus non tuberculosi ad nervos et margines sparsis constanti obsitis viridibus molliusculis, calycis eadem duplici pube parè obsiti lobis triangularibus tubo quadruplò brevioribus, corollæ tubo calyce sesquilogiori, fornicibus lato-linearibus apice retuso-truncatis uninerviis pellucidis margine brevissimè ciliatulis antheras vix superantibus, calyce fructifero patulo deflexo breviter pedicellato oblongo-cylindrico fructu quadruplò longiori parè tuberculato-setoso, nuculis elongatis rectis, areolis angustis elongatis minutè tuberculatis.

Hab. ad margines rupium et in cavis umbrosis circa *Hierosolimam* et propè *Raseheya* in Antilibano. (Boiss.)

Facies *S. Orientalis* quod differt indumento copiosiori, caulibus non decurrenti-alatis, calyce corollæ proportionè breviori, nucibus multò brevioribus incurvis obsolete areolatis. *S. Anatolicum* distinguitur indumento-scabrido, caulibus non alatis, calycis fructiferi quoque aucti obconici pedicello elongato laciniisque elongatis, nuculis dimidiò minoribus areolis paucissimis.

Specimina Smyrnæa *S. Taurici* et illa *S. asperissimi* in insulâ *Cos* in Prodr. Cand. pag. 38 et 39 citata ad *S. Anatolicum* referenda sunt.

NONNEA REUTERIANA Boiss. (Sect. *Orthocaryum*.)

N. annua pilis inæqualibus basi tuberculis minutis asperula viscidula caulibus erectiusculis, foliis sessilibus obsolete denticulatis inferioribus elliptico-linearibus obtusis basi rotundatis superioribus e basi latiori semiamplexicauli ovatis acutis, floralibus calyces parum superantibus, racemis laxis bifidis, calycibus fructiferis breviter pedunculatis patentibus inflatis breviter ovatis ferè ad medium usquè 5 fidis dentibus lanceolatis acutis, corollæ ferè tubulosæ tubo flavido calyce breviori limbo brevissimo atroviolaceo erecto dentes calycis parum superanti lobis rotundatis, fornicibus subindistinctis ad faucem circum barbatum suprâ antheras formantibus, nuculis rectis apice subcurvatis basi subangustatis utrinquè angulato-carinatis lævibus albo-punctulatis parcè puberulis.

Hab... vidi in herb. amic. Reuter ex hort. Genev. cult. sub nomine *N. nigricantis*.

N. nigricanti habitu et floribus equidem similis sed distincta nuculis non subglobosis rostratis annuloque tumido plicato cinctis sed triplo minoribus rectis lineam vel paulò amplius longis lineam dimidiam latis illas *N. lamprocarpæ* referentibus sed punctulatis nunquam nitidis nec suprâ basin in collum constrictis.

NONNEA AURICULATA Boiss. (Sect. *Orthocaryum*.)

N. perennis, caule erecto sulcato folioso parte florali tantum ramuloso breviter glanduloso-pubescenti papillis albis intermixtis, foliis utrinquè breviter et adpressè molliusculis papillis crassioribus hinc inde intermixtis radicalibus oblongo-ovatis acutis in petiolum longissimum attenuatis caulinis oblongis vel oblongo-lanceolatis acutis sessilibus paulò suprâ basin utrinquè rotundato-auriculatam subangustatis, floralibus breviter ovatis acutioribus basi rotundatis, floribus in paniculam terminalem contractam dispositis, calyce adpressè velutino glanduloso ad tertiam partem acutè 5 lobo post anthesin inflato nutanti, corollæ violaceæ glabræ tubo calyci æquilongo limbi tubo duplò brevioris lobis rotundatis, squamis barbatis brevissimis ovatis ad antherarum altitudinem cum eis alternantibus, stigmate capitato, nuci-

bus ovatis rectis albidis lævibus latere interiori carinatis pilosis, margine basilarum angusto lævissimo.

Pulmonaria officinalis α. β. *mollis* Boiss, et Chaub. Fl. Pelop. N° 345 non Wolf.

Hab. in sylvis circa templum Apollinis propè *Phigaleam* in Messeniâ. Floret Maio.

Folia radicalia cum petiolo ferè pedalia, caulis pedalis et ultrâ. Habitus et magnitudo florum *N. pulcæ*. Species formâ foliorum distinctissima et radice perenni in sectione insignis.

NONNEA PHILISTÆA Boiss. (Sect. *Cryptanthera*.)

N. annua tota brevissimè pubescenti-viscida prætereaque setis sparsis brevibus rigidis e tuberculo ortis ad caules et foliorum margines copiosioribus aspera, caulibus procumbentibus ramosis, foliis sessilibus integris vel obsoletè repandis inferioribus lanceolato-linearibus infernè attenuatis superioribus ovato-subrotundis brevissimè decurrantibus acutis floralibus calyces superantibus acuminatis, racemis abbreviatis densiusculis 2-3 fidis, calyce subsessili fructifero erecto-patenti breviter ovato ad tertiam partem usquè in lacinias triangulares acutas fisso, nuculis transversè ovatis depressis margine basilarum vix incrassato acutissimè plicato donatis areolatis sub lente eximè punctulatis obsoletissimèque puberulis, corollæ pallidè aurantiacæ tubo calycem æquanti, limbo mediocri erecto-patulo, fornicibus nullis manifestis, fauce suprâ antheras circulo barbato cinctâ.

Hab. in Palæstinâ circa *Gaza* ubi legi Apr. 1846.

Affinis *N. luteæ* sed calyces magis abbreviati lacinii multò brevioribus corollæ paulò minores nuculæque non rectæ. A *N. flavescenti* cui magis affinis eadem nucularum notâ graviori discedit, melius collocanda propè *N. nigricantem* quæ differt colore florum, limbo corollino minuto, nuculis minùs depressis crebrius areolatis tuberculatis.

NONNEA MELANOCARPA Boiss. (Sect. *Cryptanthera*.)

N. annua tota setis albis tuberculatis inæqualibus aliis minimis adpressis aliis majoribus sparsis ad margines foliorum et caules copiosioribus strigosa, caulibus procumbentibus ramosis, foliis integris inferioribus oblongo-lanceolatis obtusis basi longè attenuatis cæteris ellipticis vel oblongis basi latiori subcordatis floralibus calyces superan-

tribus acuminatis, racemis laxiusculis simplicibus vel bifidis, calycibus fructiferis deflexis campanulatis infra tertiam partem in lacinjas lanceolatas acutas fissis, corollæ pallidæ violacæ tubo calycem superanti, limbi minuti erecto-patuli lobis rotundatis, fornicibus brevissimis circum barbatum ad faucem suprâ antheras formantibus, nuculis atris transversè oblongis duplò longioribus quàm altis albo-puberulis areolatis rugis parùm prominulis, margine basilari plicatulo non incrassato.

Hab. circa *Hierosolymam* ubi legi Apr. 1846.

Accedit ad *N. nigricantem* sed hæc differt tubo corollæ atropurpureæ calycem non superanti, nuculis subglobosis. *N. violacea* DC. colore corollæ magis affinis e descriptione et specimine culta herb. DC. differt limbo corollæ ampliori, nuculis glabris subglobosis.

NONNEA EUPHRATICA Boiss. (Sect. *Cryptanthera*.)

N. perennis flavida tota pilis adpressis aliis brevissimis viscidis aliis longioribus e tuberculo ortis hirsuta, caulibus humilibus foliosis, foliis oblongo-lanceolatis acutis radicalibus breviter in petiolum attenuatis caulinis semialexicaulibus, paniculâ valdè contractâ, calyce obconico ad tertiam partem 5 fido lobis triangularibus acutis post anthesin deflexo inflato, corollæ luteæ tubo calycem æquanti, limbi tubo vix brevioris lobis ovatis, squamis suprâ antheras ad faucem sitis longissimè et crispè flavido-barbatis, nucibus junioribus puberulis.

Hab. in *Armenia* in pratis ad *Euphratem* Aucher N° 4978 B.

Planta cæspitosa caulibus semipedalibus, paniculâ ut in *N. pullâ* contracta. Huic speciei characteribus et corollæ magnitudine affinis sed certè ab eâ distincta staturâ humiliori, colore flavido, corollæ colore, hujus limbo tubi proportionè longiori et præsertim squamis faucialibus triplò longiùs barbatis.

In Diag. pl. br. 7 pag. 32 dele quæ dixi de discrimine inter *N. Persicam* et *N. pullam*. *N. Persica* quam quoque in Persiâ boreali legit Kotschy abundè differt a *N. pullâ* foliis linearibus infernè glabris margine ciliatis, bracteis linearibus elongatis, corollæ lobis minimis, squamis brevissimè barbatis, nucibus subcristatis etc. sed planta Kotsch. Pers. Austr. N° 407 a me priùs erroneè ad *N. pullam* relata est *N. Caspica* Don radice annuâ, carpellis lævibus etc. diversissima.

NONNEA MACROSPERMA Boiss. et Heldr. (Sect. *Cryptanthera*.)

N. perennis, radice crassâ verticali, caule erecto a basi patulè ramo-

sissimo ramorum decurrentiâ angulato-compresso pube brevi subviscidâ retrorsum adpressiusculâ obsito, foliis radicalibus rosulatis oblongo-lanceolatis utrinquè attenuatis petiolatis, caulinis lanceolatis sessilibus basi semilamplexicaulibus rariùs subdecurrentibus omnibus duplici pube alterâ brevissimâ viscidulâ alterâ e pilis albis nitidis tenuibus e tuberculo ortis retrorsum adpressis constante valdè scabridâ in paginâ superiori copiosiori obsitis, pube viscidulâ in parte superiori plantæ prævalenti, ramis dichotomis, floribus in racemos elongatos laxiusculos dispositis, bracteis lanceolatis calyces æquantibus, calyce densè et viscidè hirsuto ultrâ tertiam partem 5 fido lobis lanceolatis acutis post anthesin valdè accreto inflato nutanti, corollæ luteæ tubo calyce paulò longiori, limbi minutissimi lobis rotundatis, squamis forniciformibus suprâ antheras sitis ovatis magnis inter se contiguis longissimè barbatis e fauce exsertis, nucibus semiglobosis lateraliter rostratis magnis glabris rugulosis latè annulatis annulo ad sphincterem plicatissimo.

Hab. in collibus aridis propè *Egirdir* Pisidiæ. (Heldr. Jun. 1845.)

Planta adpressè strigosa et supernè prætereâ viscidula, caulis 4-8 pollicaris, folia radicalia cum petiolo 3-5 pollicaria. Flores eis *N. pullæ* paulò minores. Nuculæ 2 1½ lineas longæ latæque. Species distinctissima caule divaricatim ramoso et imprimis squamis floralibus in fornices veras auctis et transitum ad *Anchusas* præbentibus. *N. decurrenti* appropinquanda quæ caule elato simplici, foliis caulinis decurrentibus, nuculis pubescentibus etc. etc. differt.

ANCHUSA SPRUNERI Boiss. (Sect. *Buglossum*.)

A. annua, caulibus erectis foliosis parcè ramosis pilis e tuberculo ortis patulis vel retrorsis asperis, foliis oblongo-lanceolatis repandis denticulatisque eisdem pilis brevibus tuberculosiis sparsis asperis, racemis pruribus subcorymbosis dichotomis, pedicellis post anthesin erecto-patulis fructu duplò longioribus, calycis quinquepartiti lobis adpressè hirsutis linearibus, corollæ cæruleæ tubo recto calyce subsesquilongiori, fornicibus e fauce exsertis obtusissimis ovatis margine vix papillois, stylo nuculis rugosis granulatis sesquilongiori.

A. stylosa β major. DC. Prodr.

Hab. in *Atticâ* (Spruner) *Asiâ minori* in *Pisidiâ* propè *Bouldour*. (Heldreich.)

Valdè affinis *A. stylosæ* MB. et cum quâdam dubitatione hic propo-

sita sed differre videtur indumento strigosiori, foliis latioribus, tubo corollino styloque calyce sesqui nec triplò longioribus, fornicibus vix margine papillosis.

A. Aucheri DC. in monte *Cassio* Syriae borealis quoque crescit et flores roseos nec ut cl. A. DC. e sicco putaverat flavos habet.

ANCHUSA THESSALA Boiss. et Spr. (Sect. *Buglossum*.)

A. annua tota pilis e tuberculo ortis albis adpressiusculis sparsis aspera, caule gracili erecto parcè ramoso, foliis lanceolatis obtusis viridibus infimis in petiolum brevem attenuatis cæteris sessilibus, racemis terminalibus rectis dichotomis laxifloris, pedunculis strictis, calycis adpressè strigosi ad basin quinquepartiti laciniis angustè linearibus corollinum tubum æquantibus in fructu rectiusculis nucas duplò superantibus, corollæ pallidè cæruleæ limbo tubo recto paulò breviori, fornicibus e fauce exsertis obtusissimè ovatis margine brevissimè papillosis, nuculis rectis angulatò-cylindricis longitudinaliter rugosis prætereàque tuberculatis margine basilari lævi, stylo calyce fructifero breviori.

Hab. inter segetes propè *Zeitoun* Thessaliæ. (Spruner. anno 1837.)

Species habitu et florum magnitudine *A. stylosæ* et *A. Spruneri* simillima sed ab eis distinctissima styli brevitate, calycis laciniis multò angustioribus fructu duplò longioribus nec ei æquilongis præsertim nuculis rectis elongatis tenuioribus nec ut in speciebus præcedentibus globoso-incurvis.

ANCHUSA LIMBATA Boiss. et Heldr.

A. biennis, caulibus humilibus rectis foliosis pilis albis longis paucis strigosis hispidissimis apice dichotomis corymbosis, foliis radicalibus numerosis elongatis basi subattenuatis, caulinis brevioribus, omnibus angustè lineari-lanceolatis linearibusque albo-strigosis pilis præsertim inferiorum e tuberculo ortis, racemis terminalibus brevibus paucifloris, calyce adpressè hispido ad quartam partem obtusiusculè quinquelobo post anthesin aucto campanulato patulo, corollæ tubo rubello calyce sesquilongiori sensim in limbum atropurpureum integrum vix crenulatum angustum rectum subdilato, antheris fornicibusque oblongis penicillatis inter se subæqualibus limbumque supe-

rantibus exsertis, stylo calyci fructifero æquilongo, nuculis junioribus glabris lævibus globoso-incurvis.

Hab. rarissima in colle calcareo pinetis consito Pamphyliæ inter *Adalia* et *Jenidjè Khan*. (Heldr.) Fl. Mart.

Species distincta corollâ 3 lin. longa sensim attenuatâ in limbum 1½ lineam tantum latum rectiusculum nec ut in aliis speciebus patulum, vix manifestè crenulatum nec lobatum. Fornices ut et antheræ corollam superantes.

ONOSMA SERICEA Willd. MB. — Hujus propter confusionem cum specie sequenti diagnosin hic dabo.

O. basi suffrutescens tota pilis simplicibus adpressis sericeo-cinerea griseo-argentea, foliis oblongo-lanceolatis acutiusculis in petiolum basi attenuatis, caulibus simplicibus racemos 2-3 terminales brevissimos strictos ferentibus, calyce adpressissimè setoso fructifero basi induratâ 5 carinato-gibbo laciniis accretis basi angustatis lanceolatis acutis, corollâ calyce duplò longiori, filamenti jam sub antherâ a corollâ liberi parte liberâ antheram subæquantî, nucibus lævissimis.

Hab. in *Iberiâ*, *Persiâ boreali*.

ONOSMA FLAVIDA Boiss. (Sect. *Aponosma*.)

O basi suffrutescens, tota pilis simplicibus adpressis sericea et præsertim ad folia caulium steriliû flavida; foliis radicalibus oblongo-spathulatis obtusis in petiolum attenuatis, caulinis subsessilibus oblongo-lanceolatis acutis, caulibus simplicibus supernè 2-3 racemos strictos breves ferentibus, calyce adpressissimè setoso fructifero basi induratâ acutè 5 carinato-gibbo, laciniis accretis lanceolatis acutis, corollâ calyce tertiâ parte longiori, filamenti etiam suprâ antheræ basin cum corollâ concreti parte liberâ antherâ dimidiâ breviori, nuculis nitidis obsolete tuberculatis utroque latere carinatis.

Hab. in *Syriâ* (Labill. Boiss.), *Mesopotamiâ* (Olivier et Brug.).

Simile præcedenti sed notis datis distinctum.

Colsmannia flava Lehm. ex icone et descriptione mihi species *Onosmatis* O. *sericeæ* affinis esse videtur; nucula quidem a cl. auctore basi perforata dicitur sed in icone imperforata et ut in *Onosmate* basi truncata exhibetur. Corollas ut in *Colsmanniâ* calycè breviores et eo occultatas in O. *flavido* submonstrosè occurrentes sæpè vidi et calycis forma omninò eadem.

ONOSMA TAYGETEA Boiss. et Heldr. (Sect. *Aponosma*.)

On. biennis? tota setis albis tenuissimis albidis rigidis patulis e tuberculo glabro ortis strigosissima inter eas scabrida flavo-virens, caule a basi patulè ramosissimo, foliis lineari-lanceolatis marginibus subtùs subrevolutis nervo medioque elevato longius setosis, racemis strictis axis bracteis lanceolatis acutis pedicello longioribus suffultis, calyce patulè tuberculato-strigosissimo ad basin usquè 4 partito laciniis duabus in unam apice bifidam connatis, fructifero aucto obconico laciniis rectis costà mediâ lutescenti elevatiori percursis fructu quadruplò longioribus, corollâ albidâ pubescenti supernè incrassatâ calycem vix superanti apice brevissimè 5 lobâ, antheris parte tertiâ superiori exsertis, filamentorum parte liberâ infrâ antheras vix productâ, nucibus oblongis rectis carinato-rostratis lente granulatis vix nitidis.

Hab. inter lapides in alveo exsiccato torrentis inter *la Varvara* et *Hagio Paraskev* Taygeti. (Heldr.) Fl. Jul.

Species inter *Aponosmata* caule ramoso, indumento valdè patulo strigosoque et antheris subexsertis distinctissima. Corolla 6-7 lin., calyx fructifer 9-10 lin. longi.

ONOSMA ISAUERICA Boiss. et Heldr. (Sect. *Aponosma*.)

O. basi suffruticosum surculos steriles foliosos breves et caules ascendentes flexuosos ramosos setis sparsis adpressis pube brevi intermixtis obsitos emittens, foliis ovato vel oblongo-spathulatis in petiolum brevem attenuatis apice rotundatis summis sessilibus acutiusculis omnibus setis adpressissimis e tuberculo stellato ortis cinereo-sericeis, racemis ad ramorum apicem abbreviato-scorpioideis dein post anthesin elongatis, calyce pilis simplicibus adpressis sericeo ultrâ medium et sæpè propè basin usquè irregulariter quadri vel tripartito laciniâ unâ vel binis apice plus minus profundè trilobis omnibus lanceolatis, fructifero infernè angustato basi truncatâ angulato-gibbo; corollâ pallidè ochroleucâ longiusculè et adpressè hirtâ a basi angustiori dilatato-clavatâ lobis 5 ovatis latis subrevolutis calycem paulò superanti, antheris apice exsertis filamenti parte liberâ infrâ antherarum basin non productâ, nuculis lævissimis rectis nitidis longè rostratis.

Hab. in rupestribus apricis *Isauriæ* suprâ *Bounarbachi* inter *Karman* et *Ermenek* Jun. 1845. (Heldreich.)

Onosma sericeum pl. Heldr. Anat. exs. non W.

Primo aspectu *O. sericea* adeò similis ut pro eà priùs habuerim sed re accuratius inspectà diversissimas esse reperi. *O. sericea* habet setas foliorum e tuberculis glaberrimis ortas, corollas calyce subduplò longiores, filamenta infrà antherarum basin libera, nuces trigonas incurvas, etc.

ONOSMA STRIGOSISSIMA Boiss. (Sect. *Euonosma*.)

On. perennis multiceps, radicis collo indurato, tota setis longis albis caulis patulis foliorum adpressulis e tuberculo glabro ortis strigosissima inter setas glaberrima, foliis oblongis et oblongo-lanceolatis obtusis in petiolum brevem attenuatis, caulinis multò minoribus, caulibus rectis abbreviatis racemum bipartitum capitato-confertum ferentibus, calyce setis flavidis longis strigosissimo quinquepartito laciniis lanceolatis acutis, fructifero recto accreto campanulato laciniis apice extus revolutis, corollà e sicco violascente calyce sesquilateraliori lobis triangularibus acutis apice recurvis, antheris semiexsertis, nucibus globosis acutis nitidis granuloso-tuberculatis.

Hab. in *Pamphylia* ubi legit amic. Pestalozza qui mihi communicavit.

Species affinis *O. frutescenti* Lam. quæ differt indumento breviori densiori adpressiori et e tuberculis multò minoribus orto, corollæ lobis brevioribus obtusatis, calyce fructifero cylindrico laciniis rectis, nucibus oblongis lævibus, caule fruticoso.

ONOSMA CASSIA Boiss. (Sect. *Euonosma*.)

O. perennis caudicibus tenuibus nigris duris prostratis, caulibus ascendentibus supernè 2-3 fidis pilis simplicibus tuberculis deflexis hispidis intes eos minutè puberulis, foliis virentibus radicalibus oblongis in petiolum brevem attenuatis, caulinis sessilibus oblongis omnibus obtusis abbreviatis setis e tuberculo glabro ortis sparsim et patulè strigosis inter eas minutissimè papillosis, racemis abbreviatis scorpioides calycibusque patulè et longè flavido-setosis, pedicellis erectis calyci fructifero æquilongis, laciniis lineari-lanceolatis acutis, corollà flavidà supernè ampliata calyce tertià parte longiori lobis triangularibus brevissimis subrevolutis, antheris brevissimè appendiculatis corollà brevioribus inclusis, filamento usquè ad antheræ basin corollæ coalito, nuculis parvis ovatis acutis lævibus nitidissimis.

Hab. in montosis *Cassii* in Syria boreali ubi legi Jun. 1846.

Caules pedales, folia 4-4 $1\frac{1}{2}$ poll. longa 5-6 lin. lata. Corolla 7-8 lineas longa. Species indumento deflexo caulis, racemis paucis scorpioideis habituque *O. oreodoxo* affinis sed distincta antheris brevissimè appendiculatis omninò inclusis aliisque notis.

ONOSMA OREODOXA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. 1846. (Sect. *Euonosma*.)

O. caule perenni? erecto elato supernè paniculato-ramoso pilis simplicibus albis tenuibus strigosis deflexis hispido inter eos lente puberulo, foliis virentibus lanceolatis, radicalibus obtusis in petiolum attenuatis, caulinis abbreviatis basi rotundatis acutis omnibus utrinquè setis tenuibus e tuberculo glabro ortis substrigosis, racemis ad ramorum extremitatem confertis capitato-scorpioideis paniculam compositam formantibus calycibusque densè lanà patulà niveâ obsitis, calycinis laciniis angustè lineari-lanceolatis acutis, corollæ albæ demùm rubellæ supernè ampliatae calyce vix quartâ partè longioris lobis triangularibus acutis demùm reflexis, antheris ultrà medium exsertis filamentis longioribus, nucibus brevibus.

Hab. in saxosis faucibus *Tsimboukkan* Pisidiæ inter *Adalia* et *Isparta* ubi legit cl. Heldreich Maio 1845.

Planta sesquipedalis. Corolla 7 lineas, antherarum pars exserta 2 $1\frac{1}{2}$ lineas longa; species inter eas antheris exsertis donatas caule elato herbaceo insignis.

ONOSMA TRACHYTRICHA Boiss. in pl. Kotsch. Pers. bor. 1846. (Sect. *Euonosma*.)

On. basi fruticosa, caulibus erectis foliosis parcè ramosis pube brevissimâ simplici setis albis adpressis intermixtâ albicantibus, foliis oblongis oblongo-lanceolatisque basi attenuatis obtusiusculis supernè sulco medium versùs percursis subtùs elevato-nervosis setis brevibus adpressis e tuberculo ortis asperis inter eas puberulis, racemis terminalibus paucifloris in anthesi congestis dein elongatis, calycis floriferi sericeo-hirsuti quinquepartiti laciniis æqualibus longè linearibus acutis fructiferi laciniis auctis oblongo-lanceolatis fructu quadruplò longioribus, corollis violascentibus puberulis tertiâ parte calycem excedentibus lobis triangularibus demùm reflexis apice penicillatis, anthe-

ris mucrone exsertis, filamenti parte liberâ antheræ basin infernè non excedenti, nuculis oblongis acuminatis albis lævibus.

Hab. in jugo *Gerdene Kutschek* propè *Teheran* Kotschy loc. cit. N° 399.

Habitus *O. sericei* a quo statim dignoscitur calyce regulari et *Onosmatis dasytrichi* indumento densissimo cano, foliis latè ovatis petiolatis, calycibus basi villosis—strigosis corollisque longis diversi.

ONOSMA PACHYPODA Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Euonosma*.)

C. basi suffrutescens pallidè virens tota pilis sparsis simplicibus brevibus adpressissimis oculo armato tantum perspicuis e tuberculo glabro ferè obsoleto ortis obsita asperula, caulibus flexuosis erectis foliosis ramosis, foliis oblongis utrinquè attenuatis acutis subrecurvis, racemis terminalibus paucifloris post anthesin elongatis, calyce parcè et adpressè sericeo ad basin usquè in lacinias angustè lineares acutas fructu quadruplò longiores diviso, corollà extus pubescenti e sicco pallidè carneo—rubellâ tubulosâ calyce duplò longiori lobis ovatis sub-revolutis, antheris corollam non excedentibus, filamenti parte liberâ infra antheras non productâ, pedicellis fructiferis elongatis erectis apice sensim in calycis basin incrassatis, nucibus oblongis nitidis scrobiculatis.

Hab. in schistosis faucis *Murch Mahal* montis *Elbrus* Kots. N° 158.

Caules pedales, corollæ pollicem longæ, calyx fructifer 9-10 lin. longus. Affinis florum magnitudine et calycis lacinii elongatis *O. trachytrichæ* sed distincta indumento peculiari sparso adpressissimo, foliis vix asperis pedicellis fructiferis magis clavatis et lacinii calycis etiam in plantâ fructiferâ linearibus nec basi angustatis oblongo—lanceolatis, nuculis obsoletè scrobiculatis nec lævibus.

ONOSMA BRACHYOLEN Boiss. (Sect. *Euonosma*.)

On. perennis basi suffrutescens multicaulis, caulibus erectis strictis simplicissimis sparsim et adpressè pilosis, foliis oblongo—lanceolatis inferioribus in petiolum attenuatis obtusis superioribus oblongis sessilibus omnibus adpressè strigosis virentibus pilis simplicibus e tuberculo glabro vix perspicuo oriundis, racemo paucifloro bipartito conferto capituliformi, calycis adpressè sericeo—strigosi 5 partiti lacinii

oblongis æqualibus, corollâ luteâ pubescente tubulosâ latâ calycem quartâ parte superanti obtusè et obsoletè lobatâ, antheris corollam subæquantibus parte liberâ filamenti quadruplò longioribus.

Hab. ad *Diarbekir* Kotschy pl. Assyr. N° 488.

Caules pedales approximativè foliosi rigiduli, folia abbreviata 6-12 lineas longa, racemus terminalis in capitulum nucis magnitud. conglobatus, corolla 6 lineas longa. Ex affinitate *O. simplicissimæ* quæ differt corollâ calyce triplò longiori aliisque notis.

ONOSMA HALOPHILA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Euonosma*.)

O. perennis virescenti-canescens tota pilis simplicibus brevibus et tuberculo glabro ortis adpressissimis acuto armato tantum faciliè distinguendis obsita asperula, radice verticali, caulibus pluribus ascendentibus foliosis sub rosulâ radicali nascentibus simplicibus, foliis radicalibus et inferioribus lanceolato-linearibus in petiolum longiusculum attenuatis obtusis, caulinis minoribus sessilibus linearibus acutis, racemo bifido post anthesin longiusculo, calycis 5 partiti adpressè hirsuti laciniis lineari-lanceolatis acutis fructu quadruplò longioribus, corollæ albidæ pubescentis calyce plùs duplò longioris apice dilatatæ lobis breviter ovatis obtusis subreflexis, antheris corollam æquantibus filamentorum parti liberæ æquilongis, nucibus minimis nitidis latere interiori bisulcatis.

Hab. in planitie interiori Lycaoniæ inter *Koniah* et montem *Karadagh* locis salsis hyeme inundatis (Heldreich). Junio 1845.

Caules 6-8 pollicares, folia radicalia cum petiolo 2-2 1/2 pollicaria tres lineas lata, racemi fructiferi 3-4 pollicares, corolla 9 lineas longa, nuculæ lineam tantum longæ. Habitus *O. simplicissimæ* quæ differt caulibus non infrarosularibus rectis, foliis margine ciliatis indumento copiosiori et minùs adpresso vestitis, filamento antheris multò longiori etc.

ONOSMA VELUTINA Boiss. (Sect. *Euonosma*.)

O. perennis cæspitosa humilis multicaulis tota pilis simplicibus molliusculis basi non tuberculatis sectis caules patulis albis longis ad folia et calyces adpressis flavidis hirsuta, caudiculis vestigiis foliorum vestustorum incrassatis, caulibus folia radicalia subduplò superantibus,

foliis planis non elevato-nervosis lineari-lanceolatis obtusis, caulinis abbreviatis erectis, floribus densè capitato-congestis, calycis 5 partiti laciniis angustè linearibus villosis obtusis fructu triplò longioribus, corollæ demùm cæruleæ glabræ calyce subduplò longioris lobis ovatis obtusis, filamenti parte liberâ antheris subæquilongâ, nuculis parvis nitidis subincurvis rostratis.

Hab. in *Olympo Bithyno* ubi legi Aug. 1842.

Caules 3-4 pollicares, folia radicalia bipollicaria 2-3 lin. lata, corolla 8-9 lin. longa. Valdè affinis *O. nanæ* DC. quæ differt indumento non molli velutino sed strigoso e tuberculis orto, foliis angustioribus non planis sed nervo medio subtùs elevato percursis. Hùc etiam forsàn spectat Aucher N° 4989 ex alpihus Ghilam.

ONOSMA GRÆCA Boiss. (Sect. *Euonosma*.)

On. biennis? tota præter pubem brevissimam setis flavidis longis basi obscurè et glabrè tuberculatis tenuibus vix strigosis secùs folia inclinatis secùs caulem et in parte superiori plantæ valdè patulis hispida, caule erecto mediocri supernè ramoso-paniculato, foliis lanceolato-linearibus obtusis inferioribus in petiolum attenuatis superioribus et floralibus e basi rotundatâ oblongo-lanceolatis longè ciliatis, omnibus facie inferiori margine et nervo medio elevatis, racemis paucifloris demùm elongatis extremitate floriferâ nutantibus, calycis quinquepartiti laciniis lanceolato-linearibus obtusiusculis longè et subpatulè ciliatis fructu triplò longioribus, corollâ pubescenti calyce duplò longiori angustè tubulosâ a parte dimidiâ paululùm latiori ad basin et apicem subangustatâ apice brevissimè et triangulariter 5lobâ luteâ demùm violaceâ, antheris apice subexsertis basi profundè bifidis, filamenti parte liberâ ultrâ antherarum basin infernè vix productâ, nuculis ovato-incurvis supernè valdè carinatis dorso ad carinæ latus utrinquè gibbosis nitidis scrobiculato-perfossis.

Hab. in *Græciâ*, montibus insulæ *Syra*, in monte *Hymetto*, ubiquè rara et solitariè crescens. Fl. Maio.

Caulis in speciminibus quæ possideo 5-8 pollicaris, folia radicalia 2-3 pollices longa 3-4 lineas lata, racemi apice nutantes, corolla 6 lineas, calyces fructiferi 8 lineas longi. Species indumento longo patulo rigido sed vix tuberculato strigosoque, corollis angustis apice angustatis notabilis, hâc corollæ formâ *On. tinctoriæ* quoque versicolori appropinquenda, quæ a nostrâ differt caule a basi ramosissimo, indu-

mento strigoso, calyce fructifero multò minus amplo, nuculis lævibus, etc.

ONOSMA DICHROANTHA Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Euonosma*.)

O. biennis ? multicaulis tota setis albis patulis simplicibus e tuberculo glabro ortis strigoso grisea inter setas pubescens, caulibus erectis elatis supernè strictè paniculato-ramosis, foliis inferioribus angustè linearibus obtusis basi attenuatis nervo medio subtus prominenti donatis, floralibus oblongo-lanceolatis acuminatis, calycis patulè hispidi laciniis angustè linearibus acutis, corollà subpuberulà albà dein cærulescenti calyce tertià parte longiori lobis triangularibus demùm revolutis basi intus coronulà glabrà auctà, antherarum apice subexserto, filamentì parte liberà antherà breviori, nuculis magnis lævibus nitidis subtrigonis subincurvis.

O. strigosa Stev. MSS. ex C. A. Meyer non H. B. K.

Hab. in Iberià propè *Baku* (Meyer!) Persià boreali in monte *Dema-wend* propè *Ask*. Kotsch. N° 383.

Pedalis vel sesquipedalis, folia inferiora 3 poll. longa 2-3 lin. lata, corolla pollicem et amplius longa. Habitu et foliis affinis *O. setosa* Led. quæ differt foliis inter setas glabris vel tantùm asperis, caule ramosiori, corollà breviori non versicolori, calycis adpressiusculè setosi laciniis brevioribus, nuculis minoribus.

ONOSMA ALEPPICA Boiss. (Sect. *Euonosma*.)

O. biennis multicaulis, caulibus crassis rectis a basi ferè ramosis setis albis rigidis patulis e tuberculo glabro ortis strigosis inter setas breviter puberulis, foliis lanceolatis viridibus adpressitis et subtus ad margines et nervum copiosis setosis infimis elongatis, racemis demùm elongatis apice florifero nutantibus, calycis basi præsertim longè et adpressiusculè albo-setosi laciniis lanceolato-linearibus acutiusculis, corollis e sicco albidis glabris calyce quartà parte longioribus brevissimè et obtusissimè 5 lobis imà basi intus circulariter ciliatulis, antherarum glabrarum apice subexserto, filamentorum parte liberà tenui antheris subæquilongà, nuculis rostratis magnis granulato-tuberculatis.

Hab. in collibus siccis circà *Aleppum* (Kotschy N° 465 Aucher

N° 4732) inter *Jerusalem* et *Jericho* (Boiss.) in desertis inter *Damascus* et *Antilibanum* (Boiss.), in Persiâ australi si schedulæ Aucher 2297 fides habenda.

O. echinata DC. Prodr. quoad pl. Syr. non Desf. — *O. echioides* Kotschy pl. exs.

Caules pedales ramosissimi, folia inferiora 3-4 poll. longa 5-6 lin. lata corollæ 8-9 lin. longæ. Olim a me ipso et cl. DC. cum *O. echioidi* combinata sed distinctissima. *O. echioides* L. — *arenaria* W. K. a nostro differt caulibus subsimplicibus, indumento densiori flavido adpresso minus strigoso, corollis puberulis flavis longius exsertis intus glabris, antheris puberulis, filamentis dilatatis, nucibus lævissimis. *O. setosa* Led. magis affinis differt quoque nucibus lævibus aliisque notis.

ONOSMA BULBOTRICHIA DC. — Hujus diagnosin hic dare utile putavi quia specimina a cl. DC. descripta valdè manca erant.

O. biennis tota setis simplicibus patulis albis e tuberculo glabro oriundis hispidissima junior flavescens strigosa pube breviori intermixtâ, caulibus erectis ferè a basi paniculato-ramosis, foliis lanceolato-linearibus inferioribus basi attenuatis obtusis superioribus sessilibus, racemis demùm valdè elongatis, calycis albo-strigosissimi lacinii lanceolato-linearibus, corollâ lutescenti puberulâ supernè ampliata calyce tertiâ parte longiori lobis 5 brevibus triangularibus subrevolutis paulò suprâ basin intus margine coroniformi lobato hirsuto auctâ, antherarum apice exserto, filamenti parte liberâ antheram subæquanti, nuculis dorso utrinquè gibbosis tuberculatis nitidis.

Hab. in Persiâ boreali Aucher. N° 2297 et 4993, propè *Schiraz* Kotschy N° 350.

O. echinata DC. Prodr. quoad pl. Pers. non Desf.

Affinis *O. Aleppicæ* sed magis strigosa, corolla major magis exserta extus puberula nec glabra non tantum ut in eâ basi ciliatula sed callo coronæformi densè barbato aucta. Planta Fontanesii ex icone et descriptione omninò differt filamentorum formâ, corollâ supernè manifestè ampliata habituque toto. Var. β . *flavescens* DC. Prodr. videtur tantum status junior plantæ. — Kotsch. Pers. bor. N° 437 et Pers. austr. N° 476 a me prius ob confusionem specierum præcedentium ad *O. echinatham* et *O. bulbotricham* relata adnumeranda sunt omnibus notis *O. microcarpæ* Stev. cui *O. concinna* DC. quoque adjungenda est.

ONOSMA XANTHOTRICHIA Boiss. (Sect. *Euonosma*.)

O. biennis tota setis patulis in parte superiori plantæ præsertim valdè flavidis e tuberculo ferè obsoleto glabro oriundis hispidissima pube breviori intermixtâ, caule erecto elato ferè a basi paniculato-ramoso, foliis inferioribus angustè lineari-lanceolatis basi longissimè attenuatis superioribus sessilibus linearibus paulò latioribus omnibus obtusiusculis pallidè virenti-flavidis, calycis patulè flavido-hispidissimi corollam subæquantis laciniis angustè linearibus, corollâ pallidè luteâ puberulâ supernè vix ampliata lobis brevibus ovato-triangularibus sub-revolutis tubo paulò suprâ basin intus margine coroniformi lobato longè barbato aucto, antherarum apice subexserto, filamenti parte liberâ antherâ breviori, nuculis...

Hab. in Antilibano propè *Zebdani* ubi legi Malo 1848.

Planta 4-4 1/2 pedalis, folia inferiora 6-7 poll. longa 4-6 lin. tantùm lata. Corollâ basi barbata characteribusque affinis *O. Aleppicæ* et *bulbotrichæ* sed ab utrâque sat distincta videtur tuberculis ad setarum basin subnullis, foliis inferioribus valdè elongatis angustatisque, calyce flavido-hispidissimo, corollâ calycem vix superanti.

ONOSMA SPRUNERI Boiss. (Sect. *Euonosma*.)

O. tota setis brevibus sparsis adpressissimis e tuberculo stellatim piloso ortis cinerascens, rhizomate crasso verticali apice fasciculum foliorum radicalium caulesque 4-3 ferenti, caule crasso elato supernè parcè ramoso pilis sparsis asperulis, foliis lanceolatis supernè sulco infernè nervo medio prominenti percursis radicalibus longis in petiolum longum albo-ciliatum attenuatis, caulinis sessilibus apice magis attenuatis, racemis demùm valdè elongatis strictis, calycis quinquepartiti ætis densis adpressis sericei laciniis æqualibus lanceolatis acutis, corollâ a basi angustiori ampliata adpressè pubescenti calyce subtriplo longiori lobis 5 brevibus triangularibus, filamentorum parte liberâ antheras inclusas subæquantî, pedicellis fructiferis strictis in calycem sensim incrassatis, nuculis magnis oblongis rectis rostratis obscurè granulatis nitidis.

Hab. ad radices montis *Citheron* Bœotiæ ubi legit am. Spruner 1839 qui sub nomine *O. sericei* communicavit.

Pulchra species indumento cinereo-sericeo *O. sericei* vestita sed ab eo distincta caule elato herbaceo, foliis radicalibus rosulatis cum pe-

tiolo 5-6 pollices longis 4-6 lineas latis, calycibus fructiferis basi attenuatis nec gibboso-incrassatis. Insuper stellato-pilosa est. Corollæ albidæ ferè pollicares.

Ab *O. stellulati* formis egregiè distincta indumento adpressiori multòque breviori, caule herbaceo nec basi suffrutescenti, foliis multò latioribus, nuculis rectis ferè 3 lineas longis triplò majoribus.

ONOSMA CÆRULESCENS Boiss. (Sect. *Euonosma*.)

O. frutescens basi ramosa tota setis brevibus e tuberculo parçè et stellatim piloso ortis densis canum, ramis patulè et breviter scabris, foliis parvis obovato-spathulatis basi in petiolum breviter attenuatis obtusissimis, racemis bifidis densis terminalibus subcapituliformibus, calycis longè et patulè albo-setosi pedicello eo paulò breviori suffulti lacinis a basi angustè linearibus obtusis, corollà glabrà tenui supernè subampliata calyce subduplò longiori albà dein cærulescenti lobis triangularibus acutiusculis revolutis, tubo basi intùs coronulà lobatà glabrà aucto, antherarum appendicibus subexsertis, filamentorum parte liberà antheris paulò breviori, nuculis acutè trigonis griseis lævibus nitidis.

Hab. in Antilibano inter *Raschey* et *Damascus* ubi legi Maio 1846.

Planta 8-12 pollicaris basi ramosa lignosa nuda, folia majora pollicem longa 3-4 lin. lata, corolla circ. 7 lin. longa. Affinis indumento et racemis confertis *O. hebebulæ* quæ est planta major habet folia 2-3 plò majora acutissima, lacinias calycinas acutas corollamque pubescentem.

ONOSMA RASCHHEYANA Boiss. (Sect. *Euonosma*.)

O. basi frutescens, caudicibus prostratis nudis ramosis, caulibus pumilis angulatis basi densè foliosis setis brevibus e tuberculo stellato ortis scabridis, foliis pallidè virentibus oblongo-lanceolatis acutiusculis in petiolum longè attenuatis margine revolutis supernè ad medium sulcatis subtùsque nervoso-prominulis adpressè setosis setis e tuberculo stellatim piloso oriundis, racemis terminalibus simplicibus vel bifidis confertifloris subcapitatis, floribus nutantibus, calycis subsessilis adpressissimè et virescenti hirsuti lacinis lanceolato-linearibus acutis, corollà priùs albà dein cæruleà supernè subampliata brevissimè pruinosa calyce tertią parte longiori basi coronulà glabrà auctà, lobis

triangularibus brevibus apice revolutis, antherarum apice subexserto, filamentorum parte liberâ antherâ breviori, nuculis...

Hab. in Antilibano inter *Rascheya* et *Damascum* Legi. Maio.

Inflorescentiâ *O. cœrulescenti* accedit sed differt pube multò adpressiori minùsque canâ, tuberculis regulariùs et densiùs stellato pilosis, calycis adpressè nec patulè et longè setosi laciniis latioribus acutis, corollâ latiori et ampliori ferè 11 lin. longâ. Affinis quoque formis pumilis *O. stellulati* sub *O. brevifolii* et *O. montani* nomine notis sed diversa corollâ versicolori proportionè calycis breviori nec ut in eis valdè ampliata. *O. congesta* DC. habitu floribusque cœruleis proxima eximiè differt indumento densissimo pannoso, foliis floralibus basi dilatatis, laciniis calycis obtusissimis, etc.

ONOSMA MITIS Boiss. et Heldr. (Sect. *Euonosma*.)

*O. rhizomate procumbenti suffrutescenti cœspitoso caules abbreviatis foliiferos aliosque fertiles simplices adpressè canos edenti, foliis indumento pannoso adpressissimo cinereo-cano pilorum stellatorum ob-
sitis vix asperis, angustè oblongo-lanceolatis obtusis basi longè attenuatis ciliatis supernè canaliculatis facile inferiori revolutis carinato-nervosis, superioribus linearibus acutis flavidis, racemis simplicibus erectis laxiusculis, calyce adpressè flavido hirsuto quinquepartito laciniis linearibus acutis, fructifero elongato stricto basi globoso, laciniis fructu quadruplò longioribus, corollâ ochroleucâ glabriusculâ calyce tertiâ parte longiori a basi angustiori ampliata lobis triangularibus acutis, antheris apice exsertis, nucibus ovatis acutis nitidis lævibus.*

Hab. in pinetis apricis ad radices montis *Taktalu* Lyciæ suprâ portum *Tcherali* (Heldrich). Fl. Aprili.

Folia majora 9-10 lineas longa supernè 2-3 lineas lata eleganter pilis stellatis densissimis minimè setosis pannosa. Caules semipedales tenuès recti racemo 4-7 florum terminati. Corolla calyxque fructifer 6 lineas longi. Species indumenti naturâ et corollâ multò minori ab *O. montanâ*, *stellulatâ* et affinibus facilè distinguenda, nuculis duplò majoribus ovatis nec acutè triquetris donata.

ONOSMA HELVETICA Boiss. (Sect. *Euonosma*.)

O. caulibus cœspitosis erectis basi induratis foliosis setis albis patulis e tuberculo piloso ortis strigosis simplicibus, foliis lanceolato-

linearibus obtusis margine subrevolutis setulis adpressis ad folia inferiora et basin foliorum superiorum e tuberculo glabro oriundis, ad folia superiora e tuberculo stellatim piloso ortis asperis, racemo bifido divaricato terminali, calycis adpressè flavido-setosi laciniis lanceolatis acutis, corollâ pallidè ochroleucâ puberulâ calyce subduplò longiori lobis triangularibus brevibus, filamentis latis parte liberâ antheræ æquilongis, nucibus læviusculis.

O. echioides var. *Helvetica* DC. Prodr. in notâ.

Hab. in vallibus alpium Sabaudiaë propè *Modane* in provinciâ *Maurienne*, in *Valesia* inferiori.

Species cum quâdam dubitatione hic proposita, inter *O. echioidem* et *O. stellulatam* media et eas naturâ indumenti conjungens, ulteriùs observanda, a priori pilis partis superioris foliorum stellulatis, filamentis parte liberâ breviori, a posteriori pilis basilaribus tuberculo glabro insidentibus, corollâ calyce duplò nec triplò longiori apice minùs ampliatio-clavatâ, calycis laciniis magis elongatis discedens.

O. stellulata meo sensu staturâ, corollâ plùs minùs puberulâ, foliis plùs minùs angustis valdè variat et ab eâ specificè distinguere nequeo *O. montanam* Sibth., *O. erectam*. Fl. Græc., *O. Tauricam* Pall., *O. brevifoliam* DC., *O. angustifoliam* Lehm. quæ omnes huic probabiliter conjungendæ.

ONOSMA PALLIDA Boiss. (Sect. *Eunosma*.)

O. caudicibus ascendentibus vel prostratis cæspitoso-multicaulibus, caulibus erectis foliosis simplicibus albidis cæsiisve tenuibus rigidis setis patulis albis etuberculosis valdè strigosis, foliis parvis angustè lanceolato-spathulatis in petiolum attenuatis supremis basi rotundatis omnibus margine subrevolutis nervo medio subtùs prominenti utrinquè setis e tuberculo stellatim piloso ortis patulè setoso-strigosis, racemo terminali bifido demùm valdè elongato divaricato, calycis patulè flavido-setosissimi laciniis angustè lanceolatis acutis, calyce fructifero vix aucto, corollâ albâ pubescenti tubo angustatâ supernè valdè clavato-ventricosâ calyce plùs duplò longiori lobis triangularibus brevibus acutis, filamentis parte liberâ antheris apice subexserto acutè bifidis breviori, nuculis parvis triquetris nitidis brevibus.

Hab. in totâ Anatoliâ occidentali, circâ *Smyrnam*, suprâ *Denisleh* (Boiss.), ad radices montis *Karadagh* Lycaoniaë (Heldr.), propè *Byzantium* (Noë), in Bæotiâ propè *Lividiam* (Sprun.).

Caules simplices 8-12 pollicares, racemi fructiferi 4-5 poll. longi, folia majora pollicaria supernè 2-3 lin. lata, corolla 8-9 lin. longa diametro limbi eo baseos triplò majori. Hæc species *O. stellulatæ* ejusque formis valdè affinis a me ipso cum eâ hucusquè confusa fuit sed ab eâ sat differe videtur indumento rariori strigoso patulo nec adpressissimo, foliis abbreviatis, corollâ abruptius clavatâ albâ vel pallidè ochroleucâ nec flavâ. Ambæ species tamen in locis naturalibus ulteriùs comparandæ. *O. rigida* DC. Prodr. est nostra species ipsissima sed *O. rigida* Ledeb. ex Tauriâ differt corollis calycem tertiâ parte tantum superantibus et sistere videtur plantam autumnò lectam in quâ caules anomalè tantum ob ramos elongatos apice floriferos rigidi sunt. — *O. Armena* DC. etsi affinis a nostrâ specie differt indumento flavido, racemis in capitulum congestis, calycis valdè plumosi laciniis corollam parum ampliata sibiæquantibus.

O. scaberrima Boiss. et Heldr. in pl. Anat. 1846 est ipsissima *O. Aucheriana* DC. Prodr. quam quoque ad *O. pallidam* ut formam prociorem scaberrimam refero.

PODONOSMA Boiss.

Calyx quinque partitus segmentis lineari-lanceolatis. Corolla regularis tubulosa fauce nuda basi circulariter intus barbulata apice in 5 lobos lanceolatos acutos antè anthesin valvatim conniventes per anthesin reflexos divisa. Filamenta usquè ad mediam partem corollæ eâ adnata supernè libera. Antheræ in appendicem membranaceam linearem apice emarginatam longè exsertam eis æquilongam abeuntes basi breviter sagittatæ inter se liberæ. Ovarium quadripartitum. Stylus glaber exsertus stigmate indistincto submarginato terminatus. Nuculæ quatuor areolâ planâ substipitatâ suprâ torum insertæ valdè incurvæ apice horizontaliter flexo oblongæ acutæ totâ superficie echinulatæ. Herba Orientalis e fissuris rupium et murorum erumpens perennis tota viloso-hispida fragillima.

Genus antheris longè appendiculatis *Onosma* referens sed ab eâ discedens eis basi nunquam connatis et præsertim nuculis non rectis ovoideo-trigonis sed a basi substipitatâ valdè curvatis horizontalibus omninò *Alkannæ*. Habitus et modus crescendi *Alkannarum* sed corollæ intus nudæ et antherarum formâ ab eis longius discedens.

PODONOSMA SYRIACA Boiss.

P. foliis ovato-lanceolatis lanceolatisve acutis inferioribus in petiolum brevem attenuatis superioribus sessilibus semiamplexicauli-subcordatis, racemis terminalibus latè bracteatis, capitulis post anthesin elongatis, corollis cæruleis glabris, antherarum appendicibus albis longè exsertis.

Onosma Syriaca Labill. Déc. 3 tab. 15.

Hab. in Syriâ omni calidiori et montanâ, in rupibus et muris *Hierosolymæ* cum *Hyosciamo aureo* et *Parietariâ Judaicâ* frequentissima, Ciliciâ (Kotschy), *Assyriâ* (Aucher), Persiâ australi inter *Buschir* et *Schiraz* Kotsch.

MOLTZIA ANATOLICA Boiss.

M. basi suffrutescens cæspitoso-multicaulis tota adpressissimè cinerascenti-cinerea, caulibus erectis humilibus densè foliosis canescentibus apice paniculato-capitatis, foliis inferioribus et radicalibus obovatis obtusis in petiolum attenuatis superioribus sessilibus lanceolatis linearibusque acutis, corollæ cæruleæ calyce triplò longioris tubo tenui in limbum subitò ampullatum eo dimidiò breviorē intus parçè strigosum ampliato lobis ovatis, filamentis breviter exsertis, antheris violaceis, racemis fructiferis elongatis adpressè strigosis, bracteis linearibus calycis lacinias elongatas æquantibus, nuculis sphæricis granulosis.

Hab. in collibus Cariæ propè *Jenidjè* (Boiss. Pinard), in Syriâ propè *Antiochiam* Auch. N° 2403.

Simillima *M. cæruleæ* quæ sat differre videtur limbo corollino tubo æquilongo, lobis longioribus oblongis, nucibus profundè scrobiculatis. *M. punctata* Lehm. ex icone et descript. longè differt indumento strigoso, corollâ calyce vix longiori. *M. Libanotica* Zuccar. nihil *Moltziæ* habet et est *Solenanthi* species.

MUNBYA Boiss.

Arnebiæ Sect. 2^a DC. Prodr.

Calyx quinquepartitus laciniis lanceolato-linearibus acutis. Corolla infundibuliformis tubo tenui elongato intus nudo, limbi patuli lobis

rotundatis. Stylus apice in stigma bilabiatum aut dicephalum fissus. Antheræ oblongæ vel oblongo-lineares subsessiles inclusæ. Nuculæ rectæ ovatæ basi truncatæ imperforatæ. — Herbæ perennes Orientales alpinæ floribus magnis, capitulis aggregatis, a cl. Alph. DC. cum *Arnebiis* ob stigma bipartitum combinatæ sed me iudice ab eis genericè diversæ radice perenni¹, habitu toto, inflorescentiâ. Stigma insuper in *Arnebiis* veris bis bifidum est et subquadripartitum, calyxque fructifer basi campanulato-incrassatus et gibbus quæ omnia a nostro genere abhorrent. *Munbya* a *Lithospermo* cui magis affinis sat tamen distat fauce corollæ prorsus nudâ, stigmate bipartito. Nuculæ insuper in omnibus speciebus quas fructiferas vidi valdè scrobiculatæ sunt facie interiori carinatæ nec ut in *Lithospermis* perennibus ovoideæ læves. Dicavi cl. et am. Munby Flor. Algeriensis auctori.

I. *Cyananthæ*.

MUNBYA PERENNIS Boiss.

M. hispida, inter setas adpressiusculas puberula, foliis omnibus lineari-lanceolatis radicalibus elongatis, spicis terminalibus subglobosis, calycis laciniis bracteisque corollam subæquantibus, nuculis...

Arnebia perennis A. DC. — *Stenosolenium perenne* Schrenk.

Hab. in montibus *Alatau* Songariæ Chinensis.

MUNBYA CYANOCHROA Boiss.

M. strigoso-asperrima, foliis radicalibus lanceolato-linearibus caulinis oblongis basi rotundatis, spicis terminalibus conglobato-paniculatis, corollæ tubo breviter exserto, nuculis subcristato-tuberculatis acutis.

Lithospermum cyanochromum Boiss. Diagn. — *Arnebia tingens* A. DC.

Hab. in montibus *Persicæ*. (Auch. Kotsch.)

In descriptione meâ per errorem faux corollæ plicatula dicta fuit quæ omninò lævis, dele quoque in DC. Prodr. verba « nuces læves, » error e specimine immaturo ortus.

II. *Chrysantha*.

MUNBYA DENSIFLORA Boiss.

M. adpressissimè setosa, foliis inferioribus oblongo-linearibus superioribus lanceolatis acutis, spicis versùs apicem caulis axillaribus in paniculam densissimam confertis, calycis laciniis linearibus rigidè et patulè pilosis, corollæ tubo calyce plus duplò longiori, nuculis apice compressis granulatis.

Arnebia densiflora Ledeb. Fl. Ross. II, p. 440.

Hab. in *Armenia* ad fines Turcicas. (Nordmann.)

MUNBYA CEPHALOTES Boiss.

M. densè fulvescenti-tomentosa, foliis lineari-lanceolatis acutis adpressissimè pannosis, caule humili folioso, spicis in paniculam conglobatam aggregatis, calycis basi albo-villosissimi laciniis adpressiusculè et fulvè villosis corollinum tubum subæquantibus.

Arnebia cephalotes DC. Prodr.

Hab. in monte *Akdagh* Cappadociæ (Aucher).

Caulis 4-6 pollicaris, calyx tubusque corollinus pollicem longi, limbus diametro subpollicaris.

MUNBYA CONGLOBATA Boiss.

M. rhizomate cæspitoso foliorum vestigiis densissimè vestito, foliis adpressissimè setis fulvescentibus sericeis angustè lineari-lanceolatis caulinis margine patulè ciliatis attenuato-acuminatis, caule humili folioso, capitulo terminali densissimo subgloboso, calycis fulvescentis patulè hispidi laciniis inæquilatis tubum corollinum dimidium æquantibus.

Hab. in monte *Bereket dagh*. Lyciæ. (Pestalozza.)

Caulis 4 pollices longus, folia radicalia bipollicaria 2 lineas lata, caulina pollicaria a basi 2 lineas latà valdè attenuato-acuminata. Calyx 6-7 lin. longus. Corollæ tubus 11-12 lin. longus limbus diametro 7-8 lin. latus. Similis *M. cephaloti* differt indumento setosiori in parte superiori plantæ patulo, calycis et corollæ præportione diversâ, foliis caulinis multò magis angustatis.

Arnebia echiioides DC. mihi ex specimine equidem incompleto stigma indivisum habere videtur et cum insuper inflorescentiam laxam nec corymbosam habeat eam donec melius nota sit cum cl. F. et M. *Lithospermo* adnumero.

ARNEBIA TINCTORIA Forsk. Fl. Æg. p. 63.

A. tota adpressè et densè strigoso-cinerascens, foliis oblongo-lanceolatis obtusis basi attenuatis, racemis secundis densis terminalibus bracteatis bracteis linearibus calyces corollasque paulò superantibus, calycis laciniis linearibus adpressiusculè et densè setosis cinerascensibus plantæ fructiferæ indistinctè trinerviis, corollâ cærulescenti calycis lacinias vix superanti glaberrimâ, limbi a tubo vix distincti erecti lobis rotundatis, nuculis nitidis læviusculis.

Lithospermum tinctorium Vahl. Symb. 2 tab. 38! — *Lith. arnebia* Delile Fl. Ægypt. et Lehm. Asp. N° 231.

Hab. in desertis Ægypti et Arabiæ petreæ.

Corolla tres lineas longa, calyx fructifer quinque lineas longus.

ARNEBIA FLAVESCENS Boiss.

A. tota setis flavescentibus strigosa, foliis oblongo-lanceolatis obtusis basi attenuatis, racemis densis secundis terminalibus bracteatis, bracteis linearibus calyces non æquantibus, calycis basi patulè et longè flavo-setosi laciniis linearibus ad nervos et margines præsertim adpressè setosis fructiferis trinerviis et reticulato-nervulosis, corollâ luteâ calycis lacinias superanti apice densè hispidulâ, limbi erecto-patuli lobis ovato-oblongis, nuculis scrobiculatis tuberculatis.

Arnebia tinctoria DC. Prodr. et herb. ex parte. — *A. linearifolia* DC.

Hab. in desertis Ægypti (Husson), Arabiæ petreæ (Schimp. Boiss.)

Corolla sex lineas longa, calyx fructifer ferè pollicem longus. Species prior hic descripta est certissimè *A. tinctoria* Forsk. et Vahlil ex icone et descriptione in quâ corolla violacea et nuculæ læves dicuntur. Descriptiones ambarum specierum in Prodr. Cand. descriptarum ad *A. flavescentem* spectant. Nomen *A. linearifoliæ* omnino improprium seponendum. — *A. cornuta* F. et M. abundat cum præcedentibus in desertis Arabiæ petreæ speciminibus Ibericis simillima.

ALKANNA BRACTEOSA Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846.

A. tota setis flavidis brevibus basi regulariter tuberculatis aspera et ad bractearum foliorumque margines setoso-ciliata inter setas sub lente asperula, rhizomate crasso, foliis radicalibus lanceolatis acutis basi longè attenuatis cauli subæquilongis, racemis ferè radicalibus rigidis dichotomis distichis laxis, bracteis amplis elliptico-lanceolatis acutiusculis calyces multoties superantibus, calyce strigoso-hirsuto fructifero accreto nutanti laciniis lanceolato-linearibus acutis, corollæ aurantiacæ tubo calyce sesquiolongiori limbi ampli patuli lobis ovatis, nuculis magnis a dorso subcompressis valdè incurvis acutè rostratis tuberculatis, areolâ umbilicari basilari sessili concavâ.

Hab. in fauce Dudera montis Elbrus Kotschy N° 269.

Folia radicalia cum petiolo 3-5 pollicaria 6-9 lin. lata, caules cum racemis 5-6 pollicares, bracteæ pollicem et sesquipollicem longæ 4-5 lin. latæ, flores magnitudinis A. Orientalis, nucula 2 lin. longa. Species inter flavifloras racemis subradicalibus, bracteis amplis, nuculâ magnâ tuberculatâ distinctissima.

ALKANNA GALILÆA Boiss.

A. flavido-virens tota præter indumentum brevissimum velutinum setis rigidis albis e tuberculo ortis sparsis in parte superiori plantæ et ad margines foliorum copiosioribus strigosa, caulibus procumbentibus elongatis internè denudatis, foliis obtusis inferioribus oblongo-lanceolatis, floralibus oblongis ovatisve basi cordato-subauriculatis flores superantibus, racemis demum valdè elongatis foliosis laxis, calycis adpressiusculè et præsertim internè albo-strigosi laciniis lanceolato-linearibus tubo corollino brevioribus, corollâ flavo-aurantiacâ, fornicibus pliciformibus minutissimis glabris, calyce fructifero deflexo laciniis erecto-patentibus, nuculis magnis profundè reticulato-insculptis valdè curvatis areolâ umbilicali ad curvaturæ extremitatem rostro oppositam sitâ.

Hab. in agris derelictis in descensu ad urbem Tiberiadem. Legi Maio.

Affinis characteribus, florum magnitudine etc. A. Orientali a quâ differt indumento strigoso nunquam viscido, foliis inferioribus non undulatis, floralibus brevioribus latioribusque, racemis prostratis sæpè pedalis laxissimis, calycis fructiferi laciniis non conniventibus, nuculis plus duplò majoribus illas A. megacarpæ æquantibus. Affinis

quoque *A. Kotschyanae* quæ differt foliis floralibus oblongo-linearibus non auriculatis multò minoribus, villo tomentoso molliori, limbo corollæ minimo, nuculis præter reticulationes tuberculatis. *A. hirsutissima* DC. affinis quoque est.

ALKANNA ROSTELLATA Boiss.

A. tota densissimè velutino-cana setis nonnullis basi tuberculatis adpressissimis intermixtis, caulibus pumilis, foliis radicalibus oblongo-lanceolatis acutiusculis in petiolum attenuatis, caulinis bracteisque lineari-lanceolatis, calycis sericeo-hirsuti laciniis lineari-lanceolatis acutis, corollæ flavæ tubo calyce subduplò longiori, limbi parvi lobis rotundis, nucibus parvis eximiè et minutè tuberculatis angulo ferè recto incurvis in rostrum valdè attenuatis acutis, areolà umbilicari basilari in collum constrictà oblongà anticè acutà rostellatà.

Hab. in *Tauro* Aucher herb. meum sub N° 2278 bis.

Folia radicalia cum petiolo 2 $\frac{1}{2}$ pollicaria 4-5 lin. lata, caules 3-4 pollicares. Indumentum et calyces fructiferi minuti *A. incanae* et *macrophyllæ* sed ab eis eximiè distincta colore florum, nuculis eodem modo tuberculatis sed angulo recto nec semicirculariter incurvatis apice multò magis attenuato-rostellatis, areolæ formà et situ omninò diversis.

ALKANNA VISCIDULA Boiss.

A. tota villo brevi viscidulo secùs caules et calyces subpatulo non tuberculato mollis grisea, foliis oblongo-lanceolatis acutiusculis radicalibus in petiolum attenuatis, floralibus ovato-oblongis calyces paulò superantibus, caulibus ascendentibus mediocribus, calyce breviter pedunculato patulè albo-hirsuto viscidulo laciniis e basi latiori lineari-setaceis, corollæ luteæ tubo calycem parùm superanti limbo parvo, nuculis parvis albidis valdè incurvis scrobiculatis tuberculis elevatis basi confluentibus densè obsitis areolà umbilicari basilari substipitatà.

Hab. in monte *Akdagh* Tauri Aucher N° 2414.

Species florum minutie et limbi corollini formà *A. rostellatæ* affinis ab eà et omnibus aliis distincta indumento molli brevi viscidulo, inter species reticulato-rugosas et species tuberculatas intermedia prioribus potius adnumeranda et post *A. Pinardi* collocanda.

A. flaginoides A. DC. mihi tantùm videtur forma pumila corollæ limbo paulò minori *A. Pinardi* meæ.

ALKANNA MACROSIPHON Boiss. et Heldr. in pl. Anat. 1846.

A. tota setis albis patulis basi tuberculis strigosa inter setas pubescenti-viscida, caulibus procumbentibus supernè ascendentibus ramosis, foliis radicalibus oblongis vel oblongo-lanceolatis basi attenuatis, caulinis basi rotundatis ellipticis omnibus obtusis, racemis bipartitis post anthesin elongatis, bracteis latè linearibus obtusis calyces æquantibus, calycis strigosi quinquepartiti laciniis erecto-patulis lanceolatis obtusis, corollæ purpurascèntis tubo calyce plùs duplò longiori limbo brevissimo a tubo vix distincto lobis erectis ovatis, antheris sub medio tubo insertis, plicis faucis vix perspicuis glabris, nuculis profundè reticulato-scribiculatis valdè incurvis curvaturæ ramis inter se æqualibus subparallelis areolà stipitatà basilari.

Hab. in rupestribus submontosis ad Alaya Pamphyliæ (Heldr.) Fl. April.

Indumentum et facies A. strigosæ a quâ differt corollæ limbo brevi rectiusculo, nuculis valdè incurvis areolà basilari donatis. A. tubulosa corollæ formâ quoque affinis differt indumento molli, corollâ lutescenti, nuculæ minùs curvatæ ramis curvaturæ inæqualibus basilari breviori, areolà brevius stipitatà.

ALKANNA MACROPHYLLA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. 1846.

A. caulibus ascendentibus foliosis fragillimis supernè ramosis retrorsum ciliato-villosis inter setas viscido-puberulis, foliis denticulatis acutiusculis teneris inferioribus magnis oblongis vel oblongo-lanceolatis infernè longè attenuatis brevissimè velutinis virentibus setis sparsis basi tuberculatis albis utrinquè et ad margines plùs minùs obsitis, caulinis superioribus bracteisque ovato-oblongis basi cordatis ut et tota pars superior plantæ molliter argyreis ciliatis, calycis laciniis lineari-lanceolatis acutis, corollæ azureæ tubo calyce subduplò longiori ad faucem 5 plicato 5 purpureo-vittato, calyce fructifero minimo nutanti, nuculâ parvâ verruculis basi distinctis conicis obsitâ, areolâ basilari convexâ ferè usquè ad curvaturæ apicem extensâ.

Hab. in muris Pamphyliæ, ad Adalia (Pestaloza), in muris amphitheatis Perge (Heldr.) Fl. Marte.

Caules 1½-4 pedales, folia inferiora 2 1½-4 poll. longa 3¼-4 1¼ poll. longa, corolla 6 lin. longa, nuculæ lineam dimidiam vel paulò ampliùs longæ latæque, corolla 6 lin. longa, nuculæ lineam dimidiam vel

paulò ampliùs longæ latæque. A finis characteribus et nuculis *A. incanæ* ab eâ differt indumento multò minùs pannoso setis intermixto, caule et foliorum margine setosis, foliis multò majoribus, caulinis basi valde cordatis.

MYOSOTIS IDÆA Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1847.

M. annua pumila infernè subpatentim supernè adpressiusculè pilosa, caule basi ramoso, foliis radicalibus obovato-spathulatis basi breviter attenuatis, caulinis paucis elliptico-linearibus, racemis ebracteatis fructiferis rectis laxis, calycis adpressè pilosi laciniis lanceolatis obtusiusculis erecto-patulis, pedicellis sub anthesi erectis calycem æquantibus fructiferis clavato-incrassatis calyce sesquolongioribus erecto-patulis vel subrecurvis, corollæ cæruleæ minimæ tubo calyce paulò longiori limbo exiguo, nuculis nitidis nigris ovatis subcompressis acutis.

Hab. in saxosis regionis alpinæ montis *Idæ* alt 5000-6000' (Heldr.), in monte *Lazzaro* jugi *Lassiti* rariùs (Heldr.). Fl. Mai.

Planta 3-4 pollicaris, racemi fructiferi bipollicares, folia inferiora 6-9 lin. longa 3-4 lata. Pedicelli fructiferi 2 lin. longi. Flores magnit. *M. collinæ*. Affinis *M. pusillæ* et *littoralis* ab eis differt pedunculo calycem æquanti vel superanti fructifero patulo, inflorescentiâ laxiori, corollâ cæruleâ. E descriptione *M. incrassatæ* Guss. in multis convenit sed hæc a nostrâ differt racemis brevissimis pollicaribus, pedicellis fructiferis erectis, lobis calycinis demum conniventibus, corollâ calycem non superanti.

MYOSOTIS CRETICA Boiss et Heldr.

M. annua pumila adpressiusculè pilosa, caule basi ramoso, foliis radicalibus minimis ovato-rotundis subsessilibus, caulinis oblongo-ellipticis, racemis brevibus basi bracteatis fructiferis laxis flexuosis, calycis adpressissimè pilosi laciniis lanceolatis acutis erecto-patulis, pedicellis erectis post anthesin non incrassatis calyce paulò longioribus, corollis minimis albidis rariùs margine pallidè cærulescentibus calyce non longioribus, nuculis ovatis nitidissimis.

Hab. cum præcedenti. (Heldr.)

Habitu præcedenti speciei simillima cum eâ sub eodem numero confusa missaque tamen distincta videtur racemis fructiferis ad 1-2 pedi-

cellos infimos bracteatis ad pedicellorum insertionem flexuosis nec rectis, pedicello fructifero nunquam clavato minùs patulo, corollà albidà nec intensè cæruleà calycem non superanti. *A. M. pusilla* cui corollis albis racemisque basi bracteatis convenit differt racemis laxis et paucifloris flexuosis, pedicello calycem superanti vel æquanti nec brevissimo, calycis laciniis longioribus.

MYOSOTIS CADMEA Boiss.

M. annua gracilis pumila adpressiusculè pilosa, caulibus simplicibus vel suprà basin semel vel bis dichotomis, foliis radicalibus obovatis obtusis basi breviter attenuatis, caulinis paucis elliptico-lanceolatis acutis, racemis demùm elongatis laxis subincurvis nudis rachide vix flexuosà, pedicellis floriferis tenuibus calycem æquantibus fructiferis incurvo-patulis clavatis in calycem incrassatis eo longioribus, calycis adpressè pilosi laciniis lanceolatis acuminatis non conniventibus, corollæ tubo brevi calycem vix superanti, limbo amplo patenti azureo fauce lutescenti, stylo brevissimo, nuculis ovatis nitidis acutis.

Hab. in jugo montis *Cadmi* Asiæ minoris suprà pagum *Khonas* sito. Legi Jun. 1842.

Semipedalis gracilis virens, racemi fructiferi tripollicares, pedicelli fructiferi 2 lin. longi, corollà eà *M. cæspitosæ* ferè major. Ab eà ut et a *M. palustri* differt radice sensu stricto annuà, pedicellis incrassatis, laciniis calycis longioribus et magis attenuatis. *M. Ideæ* habitu pedicellisque incrassatis valdè affinis differt tamen corollæ magnæ limbo non minuto erecto-patulo sed magno rotato.

MYOSOTIS ABYSSINICA Boiss. et Reut.

M. annua tota patulè hispida, caulibus erectis ramosis, foliis oblongis ellipticisque basi angustatis obtusis superioribus acutiusculis, racemis vix scorpioideis basi bracteatis fructiferis elongatis, pedicellis fructiferis erecto-patulis calyce brevioribus, calyce ad medium usque quinquefido fructifero aperto toto patulè piloso pilis baseos uncinatis, laciniis lanceolatis acutis, corollæ albidæ tubo calycem paulò superanti limbo erecto-patulo, nuculis ovatis compressis nitidis nigris.

M. hispida var. *bracteata* Schimp. pl. exs.

Hab. in Abyssinià circà *Demerki* et in monte *Schotoda* propè *Adoam* Schimp. N° 1146 et 1889.

Species a *M. hispida* diversissima caule plerumquē elatiori ramiosiori, racemis bracteatis, pedicellis calyce brevioribus non horizontalibus, calycis minùs densè et apice etiam patulè pilosi laciniis acutioribus, corollà albidà nec intensè cæruleà. A. *M. versicolori* et *strictà* calyce fructifero aperto statim dignoscitur.

MYOSOTIS HISPIDA var. *grandiflora* Boiss. et Heldr. in pl. Cret. 1847.
— Corollæ limbus major calycem manifestè superans.

Hab. in olivetis et agris Cretæ propè *Cydoniam* (Heldr.) Fl. Marte.

A. specie differre tantùm videtur corollæ limbo majori et cum eà conjungitur speciminibus intermediis a cl. Schultz in Fl. d. Fr. et d'Allem. N° 59 editis. Tamen ulteriùs observanda.

ERITRICHUM PERSICUM Boiss. in pl. Pers. bor. Kotsch. 1846. (Sect. *Eueritrichum*.)

E. totum breviter et crispulè velutinum cinereum, collo vestigiis petiolorum vetustorum densè stipato, foliis radicalibus numerosis obovatis obtusis retusisve in petiolum longè attenuatis, caulinis angustè lineari-lanceolatis, caulibus 2-4 procumbentibus ascendentibusve folia radicalia subtriplo superantibus, racemis 1-3 sub anthesi scorpioideo-capitatis, floribus subsessilibus, calyce adpressè hirsuto quinquepartito laciniis elliptico-linearibus obtusis, corollà hypocateriformi calycem parùm superanti e sicco albido-flavidà ad loborum extremitatem circulariter cæruleà, lobis obovatis, fornicibus oblongis rotundatis glabris, stylo ovario breviori, nuculis...

Hab. ad nives deliquescentes in alpibus *Hasartschal* jugi *Elbrus* Persiæ borealis alt. 44000'. Kotschy, N° 500.

Caules 2-3 pollicares procumbentes, folia radicalia pollicaria 3-4 lineas apice lata, flores eis *Er. nani* minores. Habitus nonnularum formarum *Myos. alpestris* sed indumentum diversum et ab hoc genere corollæ æstivatione distinctè quincunciali alienum. Fructu ignoto inter *Eritrichium* et *Echinosperrum* dubium est sed potiùs priori ob habitum et stationem alpinam adnumerandum.

ECHINOSPERMUM ISPAHANICUM Boiss.

E. totum setulis tenuibus elongatis adpressis e tuberculo ortis cinescens obscurè virens, caule elato supernè ramoso ramis erectis, foliis

lanceolatis obtusiusculis strictis, calycis adpressè ciliati lobis elliptico-linearibus obtusis fructu æquilongis, corollâ cæruleâ calyce paulò longiori, pedicello fructifero recto fructu subbreuiori, nucularum disco oblongo-convexo ecarinato tuberculato margine biserialiter aculeato aculeis omnibus tenuibus glochidiatis basi distinctis nec inter se confluentibus, seriei exterioris utrinquè 5-6 subdimidiò brevioribus.

Hab. in Persiâ *ad Ispahan* Aucher, N° 5048.

Habitus et florum magnitudo *E. lappulæ* a quo ut et ab *E. barbato* facillimè dignoscitur aculeis basi distantibus nec basi valdè dilatatâ inter se connexis. *E. rigidum* quod *E. barbato* valdè affine est ab *E. Ispahanico* differt pedicellis fructus longioribus, aculeis disci crassi brevissimis tuberculiformibus.

E. CARIENSE Boiss. Diagn. 4 pag. 40 a me priùs cum *E. patulo* comparatum et a cl. DC. in Prodr. inter *Echinospërma* uniserialia recensitum accuratiùs et ex speciminibus numerosis a cl. Heldreich collectis comparatum collocandum est propè *E. barbatum* a quo vix ac ne vix differt disco nucularum distinctiùs secùs carinam longitudinalem aculeato. Forsan hujus mera varietas.

ECHINOSPERMUM SESSILIFLORUM Boiss. (Sect. *Sclerocaryum*.)

E. annuum pumilum basi ramosum totum setis adpressissimis cinereo-canum, foliis linearibus obtusis, racemis subradicalibus bracteatis fructiferis valdè elongatis laxis, floribus sessilibus minimis, calycis quinquepartiti laciniis elliptico-linearibus, corollâ cæruleâ calycem paulò superanti, fructu secùs rachidè sessili pyramidato calycem superanti nuculis tuberculatis ad apicem usquè stylo connatis sed margine inter se liberis constanti, disco elongato-triangulari tuberculato longitudinaliter carinatocrassiusculè albomarginato margine aculeis brevissimis conicis glochidiatis uniserialibus coronato.

Hab. in Persiâ *Ispahan* Aucher, N° 5047.

Plantula 2-5 pollicaris caulibus ferè a basi floriferis, racemis fructiferis sæpè 4-5 pollicaribus, flores e minimis generis, fructus pyramidem quadrangularem basi truncato-incrassatam formâ suâ referens $1\frac{1}{2}$ lin. longus. Species distinctissima inter *Echinospërma* et *Heterocaryum* quasi media propter nucas ad apicem usquè adhærentes sed cum *E. Sinaico* et *E. Vahlîano* potiùs priori generi adnumeranda nam nuculæ margine liberæ sunt nec ut in *Heterocaryo* styli angulis

accretis inter se marginibus arctè concretæ. In specimine fructifero hujus speciei quod observavi nucula superior omnium fructuum racemi (an semper?) margine lato calathiformi membranaceo nec ut in tribus aliis crasso coriaceo cingitur affinitatem arctam *Echinospirmi* cum *Pectocaryo* et *Omphalode* demonstrans.

E. speciminibus ex *Pisidiâ* a cl. Heldreich acceptis nihil fructu plurium specierum *Heterocaryi* variabilius et nuculæ ejusdem speciminis vel inter se similes sunt vel diversæ. *H. Szovitsianum* DC. cum *H. minimo* absque dubio conjungendum est et *H. pachypodum* eis similimum et margine nucularum dilatato tantum distinctum probabiliter ejusdem speciei tantum varietas est. *H. rigidum* bonam speciem sistit.

CYNOGLOSSUM SPHACIOTICUM Boiss. et Heldr.

C. totum molliter hirsutum cinerascenti-virens, rhizomate crassiusculo prostrato caules plures pumilos foliosos rectos edenti, foliis inferioribus oblongo-lanceolatis in petiolum attenuatis cæteris sessilibus vel semiamplexicaulibus oblongo-linearibus omnibus obtusis facie superiori densius hirsutis, racemis 1-2 terminalibus ebracteatis paucifloris brevibus rachide flexuosis, pedicellis fructiferis rectis fructibus longitudinis, calycis adpressè hirsuti lobis rotundatis, corollæ atrovioleæ lobis rotundatis, fornicibus obtusissimis papillosis faucem claudentibus, nuculis calyce multò longioribus convexo-depressis nullo margine cinctis aculeis rufescentibus glochidiatis densè obsitis.

Hab. rarò in summo vertice *Stravopodia* montium Sphacioticorum alt. 7000'.

Planta 3-4 pollicaris, folia 6-12 lin. longa 2-3 lata, racemi fructiferi sesquipollicares 4-7 flori, fructus magnitudinis ejus *C. officinalis* sed minimè marginato-incrassatus, flores eis hujus speciei minores. Species pulchella *Omphalodi myosotoidi* in eodem jugo oriundo habitu similis ab eo characteribus carpologicis statim dignoscenda.

SOLENANTHUS PETIOLARIS DC. Hujus speciei e speciminibus valdè imperfectis hucusque tantum descriptæ diagnosin dabo ad comparationem cum specie sequenti.

S. totus plûs minûsve pilis adpressiusculis crispulis pubescens, caule elato folioso sulcato longè et laxè thyrsoidèo-paniculato, foliis radicalibus et infimis caulinis longè petiolatis ovato-oblongis basi cordatis rotundato-auriculatis obtusis, caulinis semiamplexicaulibus oblongo-

lanceolatis, summis abbreviatis ovatis, racemis ebracteatis sub anthesi scorpioides dein elongatis laxis, calycis adpressè pubescentis 5 partiti laciniis oblongis obtusis basi subangustatis, corollà cæruleâ calyce tertiâ parte longiori sinubus lobisque rotundatis, fornicibus albidis subrotundis ciliatis sub mediâ tubi parte sitis, filamentis albidis corollâ duplò ferè longioribus, antheris parvis ovatis flavis, pedicello fructifero demùm subrecurvo, nuculâ depressâ extùs planâ aculeis glochidiatis basi dilatatis triangularibus infernè inter se in cristam subconnatis marginatâ, disco iisdem aculeis sparsis et tuberculis parvis conicis acutis numerosis echinatâ.

S. rumicifolius Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor.

Hab. in montosis totius Persiæ, propè *Ispahan* et in prov. *Aderbidjan* Aucher N° 4973 et 4974, in monte *Kuh Barf* propè *Schiraz* Kotschy N° 325 sub nomine *S. Tournefortii*, in monte *Elbrus* propè *Derbend* Kotschy N° 129, in *Kurdistanâ* Aucher N° 2295.

Planta 1 1/2-2 pedalis, folia inferiora eis *Rumicis obtusifoliae* similia sed minora 3-6 pollices longa 2 1/2 lata petiolo 5-6 poll. longo suffulta. Flores magnit. eorum *S. Tournefortii* foliis inferioribus attenuatis aliisque notis diversissimi et quocum per errorem in Kotsch. pl. Pers. austr. confusus fuit.

SOLENTHEUS AMPLIFOLIUS Boiss.

S. totùs plùs minùsve pilis adpressiusculis minutis pubescens, foliis teneris radicalibus longè petiolatis amplis ovato-oblongis basi cordatis lobis rotundatis, caulinis sessilibus amplexicaulibus amplè et rotundatim auriculato-cordatis ovatis, supremis ovato-rotundis, caule elato sulcato supernè amplè paniculato, racemis elongatis ebracteatis laxis erecto-patulis calycibusque cano-tomentosis, laciniis calycinis oblongo-spathulatis obtusissimis basi angustioribus, corollâ cæruleâ tubulosâ calycem vix æquanti lobis rotundatis, fornicibus albidis subrotundis ciliatis sub medio tubo sitis, filamentis exsertis corollâ duplò longioribus, nuculâ depressâ extùs convexusculâ disco tuberculato sectùs lineam mediam aculeato-glochidiato circumcîrca aculeis pluriserialibus glochidiatis basi dilatatis cincto.

Hab. in pinguibus umbrosis ad radices rupium Antilibani inter *Zebdani* et *Zachte*. Legi Maio 1846.

Folia radicalia 9-40 poll. longa 6-7 lata petiolo eis æquilongò suffulta, caules bipedales. Omnibus notis *S. petiolaris* affinis differt tamen

foliis multò amplioribus caulinis amplissimè auriculatis, laciniis calycinis magis spatulatis corollam subæquantibus, nuculis majoribus, aculeis marginalibus longioribus vix imà basi connatis marginemque minus distinctum formantibus.

SOLENANTHUS CERINTHOIDES Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846.

S. glaberrimus glaucescens, caule elato crasso tereti supernè corymbosè paniculato-ramoso, foliis rigidis coriaceis nervoso-venosis subtùs tuberculis minutis calcareis parcissimè obsitis, radicalibus amplis oblongis basi angustatis petiolo longo suffultis, caulinis sessilibus a basiori sessili cordatà rotundato-auriculatà oblongo-lanceolatis omnibus obtusiusculis mucronulatis, racemis terminalibus abbreviatis basi bracteatis, pedicellis sub anthesi tenuibus rectis calyci æquilongis fructiferis incrassatis patulo-recurvis fructu triplò longioribus, calycis glabri ad basin usquè quinquepartiti laciniis oblongis obtusis basi subangustatis fructiferi subdilatatis, corollà tubulosà calyce tertià parte longiori ad medium usquè quinquefidà lacinis rectis lanceolatis obtusis basi extùs saccato-bigibbis rubris flavo-marginatis, fornicibus ad basin corollæ loborum insertis a basi triangulari lanceolato-linearibus teretiusculis obtusis glabris, antheris subsessilibus sub corollæ sinibus insertis longè linearibus corollam subæquantibus, nuculis calycis longitudinis convexo-depressis nullo margine cinctis aculeis glochidiatis tuberculiformibus brevissimis omninò obsitis.

Hab. ad radices montis *Demawend* propè pagum *Ask* Kots. N° 384.

Planta sesquipedalis, folia inferiora 4-5 poll. longa petiolo eis æquilongo suffulta. Corolla 3 lin. longa, fructùs omninò *Cynoglossi*, magnit. ejus *Cynoglossi clandestini*. Species distinctissima.

MATTIA BRACHYANTHA Boiss.

M. tota adpressè puberula cinereo-virens foliis inferioribus lanceolatis obtusis in petiolum longè attenuatis, caulinis linearibus sessilibus strictis, caule sulcato florifero thyrsoidèo paniculato, floribus sub anthesi ad apicem ramorum strictorum congesto-capitatis subsessilibus, calycis lanà crispà albà densè obsiti laciniis ovatis obtusis, corollà albà calyce sesquilogiori ultra medium in 5 lacinias lineares obtusas rectas divisà, fornicibus ovato-rotundis retusis glabris paulò suprà basin sitis, antheris subsessilibus corollà paulò brevioribus, nuculis...

Hab. In *Armeniâ* ? vel *Persiâ* ? Aucher N° 4976.

Caulis in meo specimine semipedalis, folia radicalia cum petiolo tripollicaria 4-5 lin. lata, calyx 2 lin. corolla 3 lin. longa. *M. canescens* DC. meæ speciei valdè affinis ab eâ dignoscitur staturâ elatiori totâque plantæ parte superiori albopannosâ, calycis longioris laciniis linearibus, corollâ 5-6 lin. longâ, fornicibus sesquilineam suprâ basin corollæ sitis, antheris duplò longioribus filamento manifesto insertis.

OMPHALODES PAVONIANA Boiss.

O. glabra, caule foliato erecto supernè ex axillis superioribus racemoso-paniculato, foliis caulinis omnibus sessilibus basi subœordato-auriculatis ovatis acutiusculis præter nervos medios primarium et secundarios nervis binis margini parallelis semicircularibus antè apicem confluentibus percursis, racemis paucifloris brevibus ebracteatis, pedicellis erecto-patulis calyci post anthesin accreto æquilongis, calycinis laciniis lanceolatis serrulato-denticulatis patulis, corollâ albâ calyce subbrevisiori, nuculis disco pubescentibus margine inflexo longè echinato-ciliato cinctis.

Hab. probabilissimè in Hispaniâ sed locus proprius incertus. (herb. Pavon.)

Plantæ pars inferior mihi non nota, caulis herbaceus 9 pollices longus, folia crebra alterna 9-15 lin. longa 7-8 lata, calyx et corolla *O. linifoliae* et *littoralis* sed hæc calyce brevior. Nucularum margo longè ciliatus. Species ab affinibus formâ et nervatione foliorum, corollis minutis distinctissima.

PARACARYUM Boiss.

Omphalodes Sect. I *Pseudanchusa* et Sect. II *Paracaryi* subdivisio prima. — *Mattiæ* subdivisio tertia DC. Prodr.

Calyx quinque vel subquinquepartitus. Corolla infundibuliformis limbo erecto-patulo breviter quinquelobo, fauce clausâ fornicibus obtusis. Stamina quinque inclusa antheris ellipticis linearibusve filamento longioribus. Stylus simplex. Stigma punctiformi-capitatum submarginatum. Ovarium quadrilobum. Nuculæ quatuor depresso-planæ ventre stylo pyramidato lateraliter areolâ elongatâ affixæ membranâ vel inflexâ calathiformi vel planâ integrâ dentatâve marginatâ disco tuber-

ovulatae rarius laeves. Semen pendulum radicula superà cotyledonibus oblongis ovatisve radicula majoribus. — Herbae Orientales montanae habitu et floribus *Cynoglossi* donatae.

Hoc novum genus cui nomen ex nucularum insertione laterali sumptum et a cl. A. DC. jam pro sectione propositum et aptissimum dedi, ab *Omphalode* optimè dignoscitur habitu alieno, corollà infundibuliformi nec rotatà; nuculae insuper lateraliter et areolà elongatà stylo affixae sunt et inde semina pendula nec ut in *Omphalodis* speciebus pluribus horizontalia vel obliquè ascendentia. *Mattia* species genuinae a nostro genere differunt ut *Solenanthus* a *Cynoglossio* corollà non infundibuliformi breviter quinquelobà sed tubulosà profundè quinquefidà laciniis rectis angustatis. *Omphalodes* genere *Paracaryo* ab eo separato constabit sectionibus *Maschalantho* et *Euomphalodi* praetereaue parte secundà sectionis *Paracaryi* Candolleanae id est *O. linifolia* et affinis in quibus corolla omninò rotata et nuculae etsi sublaterales sint areolà tamen valdè angustà basi styli adherent.

Sect. I. *Euparacaryum*. — Nuculae margine introflexo bullato undulato urceolatae.

PARACARYUM MICRANTHUM Boiss. — *Omph. intermedia* Decaisne.

Hab. praeter Arabiam petraeam ubi in jugo Sinaitico frequens, in desertis Aegypti superioris (Husson).

Var. α . *urceolatum*. — Margo nuculae dilatatus intus valdè inflexus transversèque plicatus et ideò nucula urceolaris.

Omphalodes papillosa DC. Prodr.

Var. β . *calathiforme*. — Margo nuculae angustior margine parùm inflexus denticulatus. Nucula calathiformis.

Omphalodes micrantha DC.

Ambo formae promiscuè crescunt et etiam saepè in eodem specimine ab unà ad alteram transeunt.

PARACARYUM RUGULOSUM Boiss. — *Omph. rugulosa* DC. — *O. myosotoides* Schimp. pl. Arab. non Schrank.

PARACARYUM PERSICUM Boiss. — *Omph. Persica* Boiss. Diagn. VI.

PARACARYUM UNDULATUM Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846.

P. totum pilis longis tenuibus e tuberculo ortis caulis deflexo-patulis

foliorum patulis hispidum asperulum, caulibus erectis foliosis longè paniculatis, foliis lanceolatis acutis margine grossè et irregulariter undulato-crispis, radicalibus in petiolum longè hispidum attenuatis, cæteris sessilibus, paniculae ramis abbreviatis paucifloris, calycis adpressè hirsuti laciniis ellipticis, corollae caeruleae tubo calyce subbreviori, limbi lobis ovatis, fornicibus triangularibus obtusis brevissimè papillois. stylo ovario paulò breviori, nucibus.

Hab. in schistosis montis *Elbrus* propè *Derbent*. *Kotsch.* N° 136.

Caules plures pedales, folia radicalia cum petiolo hipollicaria 2-3 lin. lata, flores magnit. *Par. rugulosi*, nuculae in meo specimine nullae sunt sed specimen *Aucheri* N° 4927 ex *Aderbidjan* huc verosimiliter referendum eas habet subsphaerico-calathiformes aperturà angustà tuberculato-denticulatà, disco areolato-tuberculato. Affine *P. Persico* quod differt indumento brevi densè velutino, foliis margine non undulatis.

PARACARYUM HIRSUTUM Boiss. — *Omph. hirsuta* DC.

Caules elatiores et indumentum multò strigosius et asperum eo *P. Cariensis* a quo praeterea differt nuculis margine valdè inflexo muricato-bullato urceolatis nec margine vix flexo integro concaviusculis, aculei glochidiati ad discum siti eis aliarum specierum mihi notarum praeterea longiores sunt.

Sect. II. *Mattiastrum*. — Nuculae margine planiusculo rectiusculo instructae planae vel concaviusculae.

PARACARYUM MYOSOTOIDES Boiss. — *Cynoglossum myosotoides* Lah. — *Omphalodes myosotoides* Schrank.

Variat nuculis disco laevibus margineque integris (*Antilibanus* in cacumine *Hermonis* Boiss.), vel disco laevibus margine denticulatis (*Libanus!*), vel disco glochidiatis margineque denticulatis (*Libanus* in cacumine *Makmel*. Boiss., cacumina *Sphaciotica* Cretae Sibth. Heldr.) hanc ultimam formam primum pro specie propria in pl. Heldr. Cret. sub *Par. Sibthorpii* nomine habueram.

PARACARYUM CARIENSE Boiss. — *Omph. Cariensis* Boiss. Diagn. et DC. Prodr.

PARACARYUM LAMPROCARUM Boiss.

P. totum pilis albis longiusculis patulis basi tuberculatis rigiditate asperum griseum, caulibus erectis elatis supernè strictè ramosis, foliis lanceolato-linearibus linearibusve obtusiusculis inferioribus in petiolum attenuatis caulinis sessilibus, racemis fructiferis elongatis laxis unilateralibus rectis, pedicellis axi strictis fructu subbrevioribus, calyce ovato-rotundo patulè et densè albo-strigoso laciniis ellipticis, corollæ brevis intensè violaceæ tubo calyce incluso limbi minuti lobis ovatis, fornicibus ovatis crassiusculis papillosis limbo vix brevioribus e fauce exsertis, nuculis planis orbiculari-ovatis glabris, disco albo nitrido alâ rubellâ integerrimâ cincto, stylo brevi fructum superanti.

Hab. ad rupes Antilibani orientalis suprâ Souk wadi Barrada in viâ inter Damascus et Zebdani. Legi Maio 1846.

Planta 4 1/2-2 pedalis, folia radicalia 4-5 poll. longa, 4-5 lin. lata, flores eis *P. hirsuti* ferè minores, nuculæ diametro 5-6 lin. latæ. Affine *P. Cariensi* a quo differt indumento magis strigoso, caule robustiori non ascendenti nec a basi ferè ramoso, nuculis majoribus lævissimis, corollæ limbo minuto.

PARACARYUM AUCHERI Boiss. — *Mattia Aucheri* DC. Prodr.

PARACARYUM GLASTIFOLIUM Boiss. — *Mattia glastifolia* Don. — *Cynoglossum glastifolium* W.

PARACARYUM ANGUSTIFOLIUM Boiss. — *Mattia angustifolia* Don. — *Cynoglossum angustifolium* W.

PARACARYUM LEPTOPHYLLUM Boiss. — *Mattia leptophylla* A. DC.

PARACARYUM CRISTATUM Boiss. — *Mattia cristata* Don. — *Cynoglossum cristatum* Lam.

PARACARYUM CORYMBIFORME Boiss. — *Mattia corymbiformis* DC.

PARACARYUM AZUREUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. 1846.

P. totum pilis adpressissimis e tuberculo ortis canescens, rhizomate indurato cæspitoso, foliis angustè lanceolato-linearibus obtusiusculis radicalibus in petiolum longè attenuatis, caulinis paucis sessilibus linearibus, caulibus folia radicalia 2-3 plò superantibus supernè in 2-4 ramos nudos divisus corymboso-paniculatis, calycis adpressè villosi laciniis elliptico-linearibus obtusis, corollæ intensè azureæ tubo calycem æquanti in limbum amplum campanulatum apice in 3 lobos rotundatos

divisum eo paulò longiorem sensim ampliato, antheris brevi filamentò suffultis corollæ sinus æquantibus, fornicibus antheram dimidiam vix æquantibus linearibus apice tridentatis dentibus lateralibus rotundatis gibbiformibus intermedio obtuso lineari aliis duplò longiori, racemis fructiferis elongatis unilateralibus, pedicellis erecto-patulis fructu duplò longioribus, nuculis planis margine recto integro aut obsolete denticulato circulariter instructis orbiculatis disco parè et breviter tuberculatis.

Hab. in collibus aridis propè *Ghelindost* inter *Koragatsch* et *Koniah* in *Lycaoniâ* (Heldr.) Jun. 1845.

Caules semipedales fructiferi sæpè paulò longiores, folia radicalia cum petiolo 3-4 poll. longa 2-3 lin. lata, racemi fructiferi 4-5 poll. longi, pedunculi omnes ad latus internum racemi spectantes sæpè pollicares, corolla 5 lin. longa, nuculæ orbiculares diametro 5 lin. latæ. Affine *P. corymbiformis* quod eximie differt caule elatiori densius et latius foliato, indumento minus cæco, corollæ limbo tubo subbrevisiori, fornicibus antheras æquantibus infra medium utrinquè gibbosis dente intermedio subulato gibbis multoties longiori.

PARACARYUM LONGIFLORUM Boiss. → *Omphalodes longiflora* DC.

CACCINIA Savi.

Sic characteres fructus describendi. — Nuculæ 2-3 fructus sæpius abortivæ. Styli basis in alas latas crustaceo-membranaceas cupuliformes sub nuculis fertilibus expansa. Nuculæ fertiles 2 sæpius 1 compressæ planiusculæ per areolam latam læviusculam oblongam cupulæ stylari adhærentes pendulæ sed nucularum binarum abortione petitis horizontales. Pericarpium osseo-crustaceum facie exteriori læve vel plus minusve cristato-rugosum. Semina pendula compressissima. Radicula brevissima subincurva hilum spectans. Cotyledones amplæ compresso-planæ obovatæ. — Genus quoad specierum distinctionem hucusquè malè notum et cujus omnium quas novi diagnoses hic dabo.

CACCINIA GLAUCA Savi Cos. bot. pag. I. tab. 4.

C. perennis glaucescens caule erecto-elato anguloso glaberrimo folioso a medio vel jam infra medium ramoso foliorum costâ mediâ decurrenti angulato, paniculato, foliis carnosulis oblongis oblongo-lan-

ceolatis sessilibus basi angustatis ad margines et faciem superiorem aculeis conicis albis brevissimis subincurvis e tuberculo ortis muricatis subtus nervo medio excepto glabris, racemis paucifloris bracteatibus bracteis oblongo-lanceolatis acutis, pedicellis extrà axillaribus sparsissimè aculeolatis post anthesin cernuis, calycis ultrà medium quinquefidi laciniis sub anthesi linearibus apice aculeis crebrioribus in setas elongatis albo-penicillatis, corollæ tubo calyce duplò longiori, limbi laciniis elliptico-linearibus acutissimis, antheris omnibus inæqualibus a majori magis exsertà ad infimam minorem sensim diminutis, calyce fructifero valdè ampliato stellato-patenti lobis breviter triangularibus, nuculis binis ovatis disco planis grossè nervo medio longitudinali aliisque lateralibus denticulato-rugosis breviter circumcinctis dentibus triangularibus cristatis.

Hab. in prov. *Aderbidjan* Persiæ Aucher, N° 5006, ad radices montis *Demawend* propè *Ask*. Kotschy, N° 368 A.

Hæc planta ex icone et descriptione citatis est ipsissima *C. glauca* Savi qui semina prob. in Persiâ boreali quoquè lecta a cl. Fischer absque nomine receperat.

CACCINIA CELSI Boiss.

C. perennis, caulibus erectis lævibus costâ foliorum decurrenti angulatis infernè rubellis supernè parcè paniculato-ramosis, foliis carnosis glaucis sessilibus oblongo-lanceolatis acutis margine et secus faciem superiorem tuberculis sparsis albis obsoletè aculeatis, floralibus lanceolato-linearibus subconniventibus subtus margine et ad nervum aculeolatis apice longè setoso-penicillatis, corollæ tubo calyce quartâ parte longiori lobis linearibus inæqualibus obtusis, antherâ superiori aliis inter se subæqualibus duplò majori, calyce fructifero acreto stellato-patenti, nuculis margine recto angustissimo denticulato cinctis disco (immaturo) squamuloso-tuberculatis.

Hab. in Persiâ inter *Amadan* et *Tsهران* (Olivier et Bruguère). Vidi cultam ex Hort. Cels.

Borrigo crassifolia Vent. Hort. Cels. pag. 100, tab. 100.

Affinis *C. glauca* a qua quantum e specimine culto dijudicare possum sat differre videtur corollæ tubo calycem parum excedenti, antherarum proportionè, nuculâ margine vix denticulatâ nec dentibus triangularibus cristatâ.

CACCINIA STRIGOSA Boiss.

C. perennis glaucescens, caule erecto glabro vel supernè parciſsimè aculeato a medio aut infrà medium ramoso ramorum et costæ mediæ foliorum decurrentiâ valdè angulato paniculato, foliis amplis oblengis sessilibus basi brevissimè decurrentibus utrinquè aculeis conicis sparsis e tuberculo albo ortis strigosis, aculeis costarum et marginum majoribus, racemis demùm elongatis nudis, pedicellis valdè aculeatis demùm cernuis incrassato-subclavatis, calycis floriferi ad tertiam partem quinqueſdi laciniis triangularibus strigoso-ciliatis, corollæ tubo calyce triplò longiori laciniis ellipticis acutis, antherâ superiori majori cæteris illâ dimidiò minoribus inter se vix inæqualibus, calyce fructifero ampliato stellato laciniis brevissimè triangularibus introflexis, nuculâ solitariâ (juniori) disco læviusculâ margine obsolete denticulatâ.

Hab. ad radices montis *Demawend* Kotsch., No 368.

Differt a *C. glauca* foliis utrinquè et crebrius aculeatis amplioribus, racemis nudis, calycis laciniis abbreviatis, tubi corollæ cum calyce proportionè diversâ, nuce non rugosâ.

CACCINIA KOTSCHY Boiss. Diagn. VII. — A præcedentibus diversa caule tenuiori bienni? foliis non carnosis viridibus nec glaucis, tuberculis dimidiò minoribus setas nec aculeos veros edentibus, nuculis margine integerrimis nec dentatis. Corollæ tubus calycem tertiâ parte superat, antheræ a superiori majori ad infimam sensim diminuantur. In Diagnosi citatâ corrigendum est quod de urceolo membranaceo nuculam fovendi dixi qui est basis stylî dilatata nec carpellum abortivum.

CACCINIA RUSSELLI Boiss.

C. biennis, caule simplici erecto paulò suprâ basin ramos floriferos numerosissimos in thyrsum pyramidalem dispositos edenti, foliis viridibus oblongo vel lanceolato-linearibus inferioribus obtusiusculis in petiolum infernè longè attenuatis superioribus ad basin ramorum et secus ramos sessilibus angustè lineari-lanceolatis acutis omnibus facie superiori et secus margines tuberculis albis setiferis aculeatis, calycis laciniis triangulari-lanceolatis acutis erecto-patulis infernè ad nervum et margines aculeolatis apice longè setoso-penicillatis, corollæ tubo calyce duplò longiori laciniis linearibus, antherâ superiori altis inter se subæqualibus ferè triplò majori, calyce fructifero stellatim patenti,

nuculis margine erecto angustissimo obsolete denticulato cinctis disco lævi nitido lineis elevatis paucis irregulariter percurso.

Hab. inter *Aleppum* et *Bir* in agris Aucher N° 2348, *Aleppi* Russell, Kotschy N° 257.

Borrage macranthera Russ. Descript. Alep. II, p. 246. — *Caccinia Rauwolfii* DC. Prodr. non C. Koch.

Species ab omnibus aliis inflorescentiâ thyrsoidæo-paniculatâ foliisque lanceolatis distincta. *C. Rauwolfii* C. Koch in Linn. 17 p. 303 planta Armena certissimè nostra planta non est nam carnosâ glauca paniculato-ramosa dicitur antheris omnibus inæqualibus donata et ex ejus descriptione cæterum valdè incompletâ nihil obstat eam ad *C. glaucam* Savi referre. Probabiliter Icon Rauwolfii Itin. quam non vidi ad nostram speciem referenda.

SOLANACEÆ.

SOLANUM SINAICUM Boiss.

S. perenne a basi ramosissimum suffrutescens cæspitoso-dumulosum, ramis vetustis abbreviatis frutescentibus nudis albidis plûs minûs intricatis annotinis herbaceis virgatis tenuibus simpliciusculis obsolete angulatis puberulis, foliis ovatis vel ovato-subrhombeis obtusis subintegris vel sæpius acutis irregularibus obtusiusculè dentatis inferioribus longè superioribus breviter petiolatis omnibus setulis papillosis plûs minûsve densè pubescentibus, pedunculis rectis foliis æquilongis vel brevioribus umbellatim 2-5 floris, pedicellis deflexis adpressè hirtis flori æquilongis longioribusve, calycis laciniis ovatis obtusissimis, corollâ albidâ, bacis nigricantibus.

Hab. in fissuris rupium jugi Sinaitici in valle *Wadi Scheick*. Legi Mart. 4846.

Suffrutex ramosissimus 6-10 pollicaris, folia majora pollicem longa, flores et hæcæ magnitudinis *S. nigri* et affinium a quibus caulibus suffrutescentibus, indumento, etc. egregiè differt.

ACANTHACEÆ.

ACANTHUS SYRIACUS Boiss.

A. foliis secûs costas et nervos brevissimè papilloso-puberulis lan-

ceolatis elongatis basi in petiolum brevem sensim attenuatis ferè ad basin usquè pinnatipartitis laciniis triangulari-lanceolatis margine et apice in spinas flavidas validas abeuntibus, caule brevi folia 4-3 radicalibus similia ferenti, spicà compactà sub anthesi ovatà dein cylindricà foliis vix longiori brevissimè puberulà, bractea anteriori amplà marginibus ciliatula cæterum glabrà ovato-oblongà coriaceà elevatim 8-40 nervi inter nervos reticulatà utroque margine in 4-5 spinas subulatas abeunti apice subrecurvo patulo in spinam lanceolatam aliis latiorè validioremque attenuato, bracteis lateralibus linearibus spinosis hirtulis bractea interiori corollaque brevioribus, calycis laciniis interioribus occultatis ovato-rotundis sessilibus margine ciliatis repandenticulatis exterioribus maximis foliaceis margine et ad nervos puberulis oblongo-spathulatis superiori angustè denticulatà inferiori bifida lobis spinulosis, corollà lutescenti glaberrimà trilobà lobis rotundatis, antheris copiose albo-barbatis.

Hab. in Galilæa circà Nazareth et Banias, in totà Cœlesyriâ inferiori ad radices Antilibani (Boiss.), in Mesopotamiâ inter Orfa et Suerek Kotsch. No 63.

Acanthus spinosus var. β . Nees in DC. Prodr. ex parte non L.

Folia sæpè pedalia et ultrà, 3-5 poll. lata, spica sæpè pedem longa, flores 2 $\frac{1}{2}$ poll. longi. Affinis *A. hirsuto* Boiss. ab eo distinctus spinis foliorum et præsertim bractearum multò validioribus, indumento raro brevi, bracteis lateralibus abbreviatis, sepalo superiori denticulato, corollà glabrà. Tota planta multò major.

Nescio quibus rationibus ductus cl. Nees ab Esenbeck in DC. Prodr. II p. 274. *A. spinosum* L. plantam Europæam omnibus notam phrasi Linnæanâ « *foliis pinnatis* » distinctissimam et insuper synonymis omnium auctorum antiquorum confirmatam in *A. hirsuto* meo plantâ Orientali quæsierit, *A. spinosum* verum sub nomine *A. spinosissimi* describens. Hæc synonymia nullo pacto admittenda et sic restituenda est.

ACANTHUS SPINOSUS Linn. — *A. spinosissimus* Desf. Cat. — Nees in DC. Prodr.

ACANTHUS HIRSUTUS Boiss. — *A. spinosus* Nees in DC. Prodr. nec L. nec auctorum.



DIAGNOSES

PLANTARUM ORIENTALIU^M NOVARUM.

DIAGNOSES
PLANTARUM ORIENTALIU NOVARUM.

Nº 12.

AUCTORE

E. BOISSIER,

Soc. PHYS. GENEV. SODALI.



NEOCOMI.

TYPIS HENRICI WOLFRATH.

1883.

DIAGNOSES

PLANTARUM ORIENTALIVM NOVARVM.

SCROPHULARINEÆ.

VERBASCUM CAMPESTRE Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Thapsus*).

V. bienne tomento tenui demùm deterrenti canescens, radice verticali tenui fibrilliferâ, caule simplicissimo, foliis radicalibus oblongis vel oblongo-lanceolatis obtusiusculis in petiolum longiusculè attenuatis minutè et obtusè crenulatis, caulinis parvis strictis oblongo-linearibus basi subattenuatis rotundatisve acutis, floribus sessilibus per 2-3 fasciculatis racemum simplicissimum tenem densum basi interruptum lanâ griseâ demùm deterrenti obductum formantibus, bracteis linearibus calyces subæquantibus, calyce ferè ad basin usquè in lacinias breviter lanceolatas acutas excepto apice villo occultatas partito, corollâ extûs stellato-tomentosâ canâ calyce triplò longiori, filamentis flavido-lanatis, antheris staminum longiorum breviter decurrentibus, cæteris reniformibus, capsulâ subglobosâ mucronulatâ calyci æquilongâ tomento deterrenti tectâ.

Hab. in campis propè pagum *Karkın* ad orientem urbis *Koniah* Anatoliæ. Fl. Junio (Heldreich).

Planta pedalis vel vix sesquipedalis, folia radicalia cum petiolo semipedalia pollicem vel sesquipollicem lata, racemus semipedalis

vel longior. Affine *V. rotundifolio* Ten. et *V. crenatifolio* Boiss. ab eis differt foliis angustis elongatis, caulinis basi non auriculatis. Refert quoque specimina macra *V. phlomoidis* vel *montani* sed folia ut in eis minimè decurrentia.

VERBASCUM MACROCARPUM Boiss. (Sect. *Blattaria*).

V. bienne totum pube papillosà crispà rufescenti secùs partem superiorem plantæ copiosiori et glanduloso-viscidà pubescens, caule simplicissimo elato infernè folioso supernè in racemum longum simplicissimum abeunti, foliis viridibus tenuibus inferioribus oblongis vel oblongo-ellipticis breviter petiolatis acutè grossè et subduplicatè dentatis dentibus triangularibus basi subangustatis, caulinis intermediis superioribusque e basi truncatà subauriculato-cordatà oblongo-lanceolatis acutissimè sed minùs profundè serratis acuminatis sensim diminutis, floribus solitariis pedunculo calyce breviori suffultis laxiusculè racemosis, bracteis calycem subæquantibus a basi latiori ovalà attenuato-acuminatis, calycis valdè glanduloso-hispidi laciniis integerrimis oblongo-ellipticis acutis, corollà luteà, staminibus omnibus longè purpureo-lanatis, duorum longiorum apice denudatorum antheris rectis subdecurentibus, cæterorum reniformibus, capsulà magnà pedicello incrassato recto eà breviori suffultà tomentello-viscidà ovato-rotundà longiusculè mucronulatà calycem auctum vix superanti.

Hab. propè pagum *Dervent* montis *Elburs Persiæ* borealis (Kotschy n° 715), in Persià australi (Kotschy n° 926).

Planta tripedalis, folia infima cum petiolo 4-5 pollices longa sesquipollicem lata, capsula piso multò major. A. *V. virgato* cui affine egregiè distinctum foliis magis teneris, racemo valdè glanduloso, bracteis basi latioribus, calyce capsulàque duplò majoribus.

VERBASCUM VULCANICUM Boiss. et Heldr. in pl. Anatol. exs. 1846 (Sect. *Lychnitis Thapsoidea*).

V. bienne? totum indumento sordidè albo asperulo secùs folia tenuiori evanescenti secùs racemum crasso flavido obsitum, foliis mediocribus oblongis obtusis crenulatis basi attenuatis inferioribus petiolatis caulinis sessilibus supremis basi subcordatis, caule mediocri simplici vel ad basin racemi parcè ramoso, floribus sessilibus per 3-4

in fasciculos approximatos racemum longum densiusculum formantes dispositis, bracteis lanceolato-linearibus acuminatis fasciculos subæquantibus, calycis pannosi flavidi laciniis lanceolatis acutis, corollâ flavâ extûs tomentosâ basi intûs violaceo maculatâ, filamentis omnibus violaceo-lanatis superioribus apice nudis, antheris omnibus reniformibus, capsulâ....

Hab. in arenosis vulcanicis regionis inferioris montis *Karadagh Anatoliæ*. Fl. Junio. (Heldreich).

Planta pedalis, folia inferiora cum petiolo 3-4 pollices longa 1 1/4 lata, racemus 8-10 pollicaris, calyx florifer 3 lineas longus. Valdè affine *V. Boerrhavia* a quo tamen indumento denso et pannoso non deterrenti racemi, bracteis abbreviatis, calyce multò breviori sat distinctum credo.

VERBASCUM CÆSAREUM Boiss. (Sect. *Lychnitis Thapsodea*).

V. indumento flavido asperulo secûs caulem et folia præsertim inferiora tenui deterrenti secûs racemum floccoso denso obsitum, caule elato crasso subsimplici, foliis radicalibus amplis oblongis basi rotundatis obtusis obtusè crenatis indivisis vel irregulariter subsinuato-lobatis petiolatis, caulinis sessilibus oblongis vel ovatis integris acutis basi subcordato-auriculatis suprâ virentibus subtûs lutescenti-tomentosis nervis elevatis percursis, floribus sessilibus per 3-4 in fasciculos racemum densum longum terminalem basi tantum subinterruptum formantes dispositis, bracteis lanceolatis acutis calyces subæquantibus, calycis valdè flavido-tomentosi laciniis lanceolatis acuminatis, corollâ luteâ extûs tomentosâ calyce triplò longiori, filamentis violaceo-lanatis, antheris omnibus reniformibus, capsulâ....

Hab. in vallibus circâ *Banias (Cæsaream Philippi) Galileæ* ubi legi floriferum maio 1847.

Folia inferiora 10-12 pollices longa 4-5 lata petiolo 2-3 pollicari suffulta, caulina sensim diminuta. Caulis 3-4 pedalis. Racemus simplex aut basi breviter et parcè ramosus sæpè sesquipedalis. Calyx ferè 3 lineas longus. Affine *V. matali* et *V. Lydio*; prius est planta multò minor indumento araneoso rarescenti, fasciculis florum dissitis nec densè racemosis; posterius longè differt foliis teneris sessilibus basi angustatis, caulinis breviter decurrentibus, racemo toto valdè floccoso, etc.

VERBASCUM GALILÆUM Boiss. (Sect. *Lychnitis Thapsoidea*).

V. totum tomento griseo tenuissimo pulverulento faciliè deterrenti obsitum viride, caule elato in paniculam longam abeunt, foliis amplis oblongo-lanceolatis obtusis irregulariter repando-lobatis margine obtusè denticulatis, inferioribus basi breviter attenuatis cæteris suprà basin cordato-auriculatam angustatis, floribus sessilibus in fasciculos 3-5 floros omnes remotos distinctosque bracteis 2-3 ovato-rotundis mucronatis calyces subæquantibus involucratos dispositis racemos longos laxissimos formantibus, calycis ad $\frac{3}{4}$ tantum partiti laciniis latè triangulari-lanceolatis acutis, corollæ amplæ calyce triplò longioris extùs tomentosæ segmentis inæqualibus, filamentis omnibus violaceo-lanatis, antheris omnibus reniformibus, capsulâ....

Hab. in monte *Carmelo*, in monte *Ithabure* Galilææ et ni fallor circà lacum *Tiberiadis*. (Boiss. vere 1847).

Planta procera pluripedalis, folia inferiora 1-1 $\frac{1}{2}$, pedalia 4-5 pollices lata, paniculæ racemi pedem et ampliùs longi, calyx florifer 3 lineas longus. Affine *V. Lydio* et *V. matali* sed distinctissimum indumento tenui, fasciculis florum remotis, calycis laciniis latioribus et præsertim bracteis latis acuminatis fasciculos florum involucrantibus.

VERBASCUM PTYCHOPHYLLUM Boiss. (Sect. *Lychnitis Thapsoidea*).

V. totum tomento denso flavescenti aspero non deterrenti pannosum, foliis radicalibus ovatis oblongisve obtusis margine valdè sinuato-lobatis valdè undulatis basi subtruncatis vel breviter cuneatis petiolo brevi suffultis, caulinis basi longè decurrentibus oblongis acutis breviter denticulatis integrisve, caulibus simplicibus rariùs ramo auctis crassis parte inferiori densè foliosis superiori in racemum longum laxum abeuntibus, floribus sessilibus per 3-4 in fasciculos remotos dispositis, bractea e basi subcordatà triangulari acutà fasciculum æquanti, calycis valdè tomentosi laciniis triangulari-lanceolatis acutis, corollâ luteâ extùs tomentosâ, filamentis omnibus violaceo-lanatis, antheris omnibus reniformibus, capsulâ ovatâ obtusâ mucronulatâ glabrâ calyci æquilongâ.

Hab. in collibus inter *Damascus* urbem et *Antilibanum* sitis, in regione inferiori *Antilibani* circà *Rascheya* et *Zebdani*. Legi florif. et fruct. æstate 1847.

Folia radicalia 3-4 pollices longa ferè 2 lata, caules 4-5 pedales, calix crassus florifer 4 lineas longus fructifer elongatus. Hæc species cui planta Syriaca in DC. Prodr. sub *V. undulato* citata adnumerari debet ob folia undulata confusa fuit cum *V. undulato* Lam. et Tourn. Voy. et. IC. — *V. plicato* Fl. Græca quod distinctissimum est foliis radicalibus elongatis multò profundius lobatis, caulinis basi auriculato-cordatis nunquam decurrentibus, caule multò humiliori, corollâ ampliori, filamentis flavido-lanatis.

VERBASCUM TRIPOLITANUM Boiss. (Sect. *Lychnitis Thapsoidea*).

V. totum tomento lutescenti asperulo in rosulis sterilibus denso in caulinis tenuissimo obsitum, foliis radicalibus caulinisque inferioribus oblongis vel oblongo-lanceolatis obtusis basi angustatis petiolatis grossè lobatis lobis triangulari-ovatis obtusis sæpius obtusissimè repando-dentatis, foliis caulinis intermediis subsessilibus sæpè versùs basin ad costum mediam usquè partitis, supremis e basi subcordatâ nunquam decurrenti oblongo-lanceolatis acutis acutiusculè dentatis, caule demùm glabrato rubro paulò suprâ basin ramosissimo ramis longissimis virgatis strictis, floribus subsessilibus in fasciculos 3-4 flores bractea obcordatâ acutâ eis breviori suffultos remotos racemos laxissimos formantes dispositis, calycis sordidè lanati laciniis oblongis acutis, corollâ flavâ calyce triplò majori, filamentis violaceo-lanatis longioribus supernè nudis, antheris omnibus reniformibus, capsulâ...

Hab. propè *Tripolin Syriæ* ad radices montis *Torbol* ubi legi flori ferum Junio ineunte.

Folia radicalia 6-7 pollices longa 3 pollices lata grossè lobata minimè undulata. Caulis 3-4 pedalis ut in *V. sinuato* ramosissimus. Calyx florifer 3 lineas longus. Species pulchra habitu et filamentis violaceis ad *V. sinuatum* accedens sed ab eo foliis petiolatis minimè undulatis, caulinis nunquam decurrentibus, calycis sessilis saltem duplò majoris laciniis elongatis etc., distinctissimum.

VERBASCUM ANTIOCHUM Boiss. (Sect. *Lychnitis Glomerata*).

V. bienne, foliis suprâ glabrescentibus vel brevissimè puberulis subtùs tomento asperulo brevissimo non deterrentibus pannosis elevatim reticulato-nervosis, radicalibus oblongis obtusis breviter petiolatis margine obtusè et obsoletè crenulatis, caulinis multò minoribus inter

se distantibus inferioribus oblongis sessilibus basi rotundatis superioribus basi latiori subcordato-amplexicaulibus ovato-oblongis acutis, caule simplicissimo juniore pube stellatâ brevi griseâ detergili obsito tandem glaberrimo rubello, floribus sessilibus in glomerulos sessiles densos 3-6 floros distantes dispositis racemum longissimum interruptum formantibus, bracteis triangularibus calyces non æquantibus, calyce tomento rufo-griseo non detergili pannoso ferè ad basin usquè in lacinias triangulares acutas partito, corollâ mediocri luteâ extûs tomentosa, filamentis flavido-lanatis, antheris omnibus reniformibus, capsulâ ovatâ breviter mucronulatâ tomento detergili obsitâ demùm glabrâ calycem non superanti.

Hab. inter *Damascum* et *Rascheya* in *Antilibano* (Boiss.), ad rupes et mœnia arcis *Antiochiæ* (Aucher ! Boiss.)

Folia radicalia 4-7 pollices longa. Caulis 2-4 pedalis basi crassitie digiti, racemus simplicissimus sæpè bipedalis, calyx florifer 4 lineas longus, capsula 3 lineas longa. Planta a cl et amiciss. G. Benthani ad *V. gnaphalodem* relata quod a me collatum specificè differt indumento araneoso niveo lævi tenuissimè nec pannosè aspero niveo, racemo breviori eodem indumento bombycino ferè occultato, bracteis lanceolatis calyces superantibus, foliis lævibus nec valdè reticulato-rugosis, etc.

VERBASCUM LEPTOCLADUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.

V. basi suffrutescens multicaule totum indumento araneoso cano tenuissimo demùm plûs minûsve evanescenti obsitum, foliis canescentibus ad caulium basin numerosis oblongo-lanceolatis acutiusculis tenuissimè crenulatis in petiolum longè attenuatis, caulinis paucis, superioribus sessilibus linearibus basi rotundatis, caulibus basi canis supernè glabrescentibus erectis virgatis tenuibus a medio ramosis ramis elongatis subflexuosis rigidulis, floribus subsessilibus 1-3 in fasciculos minutos dispositis laxè et tenuissimè racemosis, bracteis linearibus calyce vix brevioribus, calycis internè cani lacinii glabrescentibus lanceolato-linearibus, corollâ minutâ calyce triplò longiori flavâ extûs tomentosa, filamentis omnibus sordidè flavescenti-lanatis, antheris omnibus reniformibus, capsulâ ob pedunculum crassum brevissimum subclavatâ ovatâ canâ calyci æquilongâ.

Hab. in pinetis apricis arenosis maritimis ad orientem urbis *Adalia* (Heldr.). Fl. fine Junii.

Planta 1-1 1/2 pedalis, folia inferiora cum petiolo 3-4 pollices longa 7-10 lineas lata, racemi recti ferè pedales, calyx florifer 2 lineas frutifer ut et capsula 3 lineas longus. Corolla 7-8 lineas diametro lata. Affine *V. simplici* et *V. salviæfolio* ab utroque indumento tenui araneoso, ramis tenuiter virgatis, floribus multò minoribus, calycis laciniis linearibus nec ovatis facilè distinguendum.

VERBASCUM SCHIMPERIANUM Boiss (Sect. *Lychnitis Glomerata*).

V. foliis ferè omnibus ad collum congestis angustè oblongo-lanceolatis obtusis basi in petiolum brevissimum attenuatis margine valdè sublobato-undulatis lobis sinubusque rotundatis crispatis, foliis caulinis paucissimis abbreviatis sessilibus basi non decurrenti subauriculato-cordatis subundulatis acutiusculis, foliis omnibus tomento denso aspero supernè ferrugineo subtùs magis virescenti obsitis pannosis, caule ferè a basi ramosissimo paniculato ramis tenuissimis virgatis inferioribus longissimis superioribus angulo recto patentibus, inflorescentià totà eodem tomento lutescenti sed tenuissimo obsitâ, floribus minutis subsessilibus secùs ramulos sparsis solitariis racemos gracillimos formantibus, bractea basilari minutissimâ oblongâ tomento occultatâ, calycis tomentosi laciniis ovatis obtusiusculis, corollâ parvâ luteâ extùs tomentosâ, filamentis omnibus sordidè albo-lanatis, antheris omnibus reniformibus, capsulâ....

Hab. in *Arabia Petræa* Schimper absque numero.

Folia radicalia cum petiolo 4-4 1/2 pollicaria pollicem circiter lata eximiè undulata crispa lobis rotundatis. Caulis bipedalis eximiè ramosus. Calyx eo *V. sinuati* ferè minor subsessilis. Species caulibus aphyllis ramisque tenuissimis notabilis floribus minutis et formâ foliorum accedens ad *V. sinuatum* a quo præter caules subnudos differt foliis caulinis non decurrentibus, floribus subsessilibus, filamentis non purpureo-lanatis ramisque multò gracilioribus.

VERBASCUM PYCNOSTACHYUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs 1846 (Sect. *Lychnitis Pyramidata*).

V. totum tomento denso albo non detersili pannosum pumilum, foliis parvis oblongis acutis integris minutissimè crenulatis inferiori-

bus in petiolum brevem attenuatis, caulinis caulem densè obtegentibus strictis secùs caulem in alam angustam folio ipso plerumquè triplò breviorē decurrentibus versùs caulis apicem diminutis acuminatis, paniculæ terminalis ramosissimæ ramis congestis brevibus strictis tenuibus terminali cæteris multò longiori, floribus sessilibus in fasciculos 2-3 flores subcontiguos dispositis ramos ferè obtegentibus, bracteis minimis breviter ovatis breviter et tenuiter cuspidatis calyce brevioribus, calyce pannoso ad medium usquè aut paulò inferiùs in lacinias triangulares acutas partito, corollæ parvæ extùs tomentellæ tubo longiusculo, filamentis parùm inæqualibus imà basi rubellis glabris supernè densè albo-barbatis, antheris omnium reniformibus, capsulà lanà deterrenti vestitâ globosâ muticâ calyci æquilongâ.

Hab. in agris propè *Egirdir* Pisidiæ (Heldr.). Aug. 1846.

Planta ex speciminibus quæ vidi 14-18 pollicaris, folia inferiora cum petiolo tripollicaria 12-13 lineas lata, superiora sensim minora, panicula ferè pedalis ramis lateralibus tantùm 2-3 pollices longis. Calyx tres lineas longus, capsula piso dimidiò minor. Species pulchella nulli aliæ propiùs accedens.

VERBASCUM ELEGANS Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs 1846. (Sect. *Lychnitis Pyramidata*).

V. tomento denso pannoso non deterrenti canum, foliis radicalibus numerosis congestis oblongis acutiusculis in petiolum eis subbreviorem attenuatis infimis paginâ inferiori reticulato-rugosis, caule erecto tenui infernè densè folioso supernè in paniculam elongatam angustam basi parcè et brevissimè ramosam abeunti, foliis caulinis albo-pannosis sessilibus oblongis basi subattenuatis strictis, floribus solitariis vel sæpiùs 2-3 fasciculatis secùs ramos laxiusculè dispositis pedunculo pannoso calyce breviori suffultis minimis, bracteis lanceolatis calyces subæquantibus, calyce densè pannoso ultrâ mediani partem in lacinias oblongo-lineares acutiusculas partito, corollæ basi extùs albo-tomentellæ margine glabræ calyce triplò longioris e siceo luteæ tubo brevissimo, filamentis omnibus a basi purpureo-lanatis, antheris omnibus reniformibus, capsulâ....

Hab. in *Anatoliâ*. Unicum specimen inter specimina *V. pumili* e collibus *Kontak* ab. am. Heldreich relati mixtum habui.

Folia radicalia cum petiolo sesquipollicaria 6-7 lineas lata, caulis pedalis, panicula semipedalis ramis lateralibus 1-1 1/2 poll. longis, calyx 2 lineas longus. A. *V. pumilo* cui floribus parvis accedit distinctum indumento densius cano minimè deterili, foliis multò minoribus, paniculà angustà brevissimè ramosà, floribus brevius pedunculatis, calyce densè pannoso et his notis melius inter *Pyramidata* propè *V. chrysorrhacos* collocandum.

VERBASCUM ASTROPHYLLUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs 1846. (Sect. *Lychnitis Lychnitidea*).

V. foliis rosulæ sterilis numerosis regulariter lumi expansis oblongo-lanceolatis acutis basi attenuatis tomento pannoso albo densissimo obsitis crassis, caule florifero elato crasso anguloso demùm glabrescenti supernè ramosissimo ramis longissimis erecto-patulis paniculam amplissimam formantibus, foliis caulinis sparsis tomento tenui canescenti demùm deterili vestitis inferioribus oblongo-lanceolatis basi longè attenuatis superioribus ovato-oblongis basi subcordatis, floribus parvis pedunculo calyce subbreviori suffultis in glomerulos multifloros inter se approximatos a basi ramorum racemos longos tenues laxiusculos formantes congestis, bracteis minimis triangulari-lanceolatis calyce brevioribus, calyce parvo brevi densè canescenti ad medium usquè in lacinias triangulares breves acutas partito, corollà calyce quintuplò majori luteà extùs tomentellà lobis subinæqualibus, filamentis omnibus flavescenti-lanatis, antheris omnibus reniformibus, capsulà....

Hab. in campis sterilibus propè urbem *Beychehr* (Heldr.). Fl. Aug.

Rosulæ in meis speciminibus 50-60 phyllæ foliis exterioribus majoribus pedalis 2-2 1/2 lineas latis, interioribus sensim diminutis omnibus lineam dimidiam crassis. Caulis ut videtur 3-4 pedalis, paniculæ rami inferiores pedales et ultrà. Calyx 2 lineas tamtùm longus, corolla 10-12 lineas diametro lata. Species foliis rosularum et caulinis valdè dissimilibus, paniculà amplissimà, floribus parvis densè glomeratis insignis inter *Pyramidata* et *Lychnitidea* dubia.

VERBASCUM RINGENS Boiss. et Heldr. (Sect. *Lychnitis Lychnitidea*).

V. totum tomento crassiusculo griseo flavido deterili vestitum, foliis radicalibus oblongis acutiusculis in petiolum brevem attenuatis,

caulinis densè congestis infimis subpetiolatis cæteris e basi cordato-subauriculatâ acutis oblongis, summis parvis ovatis breviter acuminatis, caule crasso supernè paniculato-pyramidato, floribus pedunculis calycem æquantibus suffultis 3-4 in glomerulos racemos tenuissimos elongatos laxiusculos formantes congestis, bracteis ad fasciculi basin triangulari-ovatis acuminatis fasciculum æquantibus, calyce brevi ad basin usquè in lacinias triangulares fisso densè flavido-tomentoso, corollæ valdè irregularis extûs tomentosæ lobis duobus ovato-spathulatis cæteris duplò majoribus ovato-rotundis, filamentis omnibus sordidè albo-lanatis, antheris omnibus reniformibus, capsulâ parvâ rotundâ muticâ tomentellâ demùm deterrenti calyce vix longiori.

Hab. in campis montosis aridis montis *Anemas Lycaoniæ* suprâ *Tourtchalar* alt. 4000' (Heldr.). Fl. Aug.

Folia radicalia saltem in meo specimine tantùm 4-5 pollices longa, caulis bipedalis densè foliosus. Calyces ferè omninò *V. astrophylli* cui accedit sed a quo præter indumentum diversum differt caule humiliori densè folioso, bracteis latioribus, floribus longiùs pedunculatis in glomerulos paucifloros dispositis, corollæ formâ.

VERBASCUM INSULARE Boiss. et Heldr. in. pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Lychnitis Lychnitidea*).

V. totum indumento niveo floccoso deterrenti in plantâ fructiferâ omninò evanido obsitum tandem viride, foliis oblongis obtusiusculis breviter acuminatis in petiolum basi longè attenuatis tenuissimè crenulatis, caulinis diminutis basi brevius attenuatis summis sessilibus basi rotundatis, caule crasso infernè densè folioso supernè paniculato ramis strictis, floribus pedunculis calyci æquilongis suffultis in fasciculos multifloros bracteâ minimâ demùm evanidâ suffultos densiusculè racemosos dispositis, lacinias calycinis angustè linearibus, corollâ luteâ subregulari calyce quadruplò longiori, filamentis omnibus sordidè flavido-lanatis, antheris omnibus reniformibus, capsulâ oblongâ mucronulatâ pedunculo stricto eâ subbrevisiori suffultâ calyce vix duplò longiori.

Hab. in insulâ lacûs *Beychehr Pisidiæ* (Heldr.). Fl. Aug.

Folia majora cum petiolo semipedalia supernè 2 pollices lata. Caulis subtripedalis racemis semipedalibus et ultrâ. Capsula tres lineas longa. Ex affinitate *V. lychnitidis* et *V. astrophylli*, prius differt

indumento tenui, foliis crenato-dentatis, racemis brevioribus; posterius indumento dense pannoso, laciniis calycinis latis, fasciculis florum remotis. Quædam specimina hujus speciei in pl. Anatol. sub nomine *V. deterrentis* per errorem distributa sunt. *V. deterrentis* nihil communis habet præter indumentum et differt florum fasciculis remotissimis, calycis multò majoris laciniis lanceolatis, foliis supremis basi valde cordatis, etc.

VERBASCUM ORGYALE Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Lychnitis Lychnitidea*).

V. foliis radicalibus tomento cano vel cinereo plus minus denso non deterrenti pannosis longis lanceolatis acutis infernè longè angustatis, caulinis inferioribus oblongis acuminatis basi rotundatis supremis parvis basi auriculato-cordatis ovalis, caule crasso elatissimo supernè amplissimè pyramidato ramosissimo ramis longissimis tenuibus, inflorescentià totà tomento tenuissimo cinerascenti deterrenti obsitâ, floribus pedunculis calyce brevioribus suffultis 2-4 in fasciculos remotiusculos a basi ramorum racemos laxos formantes dispositis, bracteis minutissimis setaceis calyce brevioribus, calycis minuti laciniis subulatis acutis, corollâ parvâ luteâ extûs basin versûs tomentellâ calyce quintuplò majori, filamentis omnibus lutescenti-barbatis, antheris omnibus reniformibus.

Hab. in rupestribus apricis fauci montis *Climactis Lyciæ* suprâ *Kourmalu* ad alt. 1000' (Heldr.). Fl. Maio ineunte.

Planta hominem et ampliùs alta, folia inferiora cum petiolo pedalia et ultrâ 3 pollices lata, paniculæ rami numerosissimi sæpè sesquipedales tenuissimi. Calyx vix lineam longus. Corolla diametro 10-11 lineas lata. Pulchra species affinis *V. floccoso* quod differt paniculæ indumento multò densiori floccoso, floribus longè pedunculatis, calycibus floribusque majoribus, foliis radicalibus pro longitudine latioribus. *V. Olympicum* affine quoque habet glomerulos florum multifloros, calyces longè pedunculatos saltem duplò majores, corollam duplò ampliorem, etc.

VERBASCUM DETERSILE Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Lychnitis Lychnitidea*).

V. foliis radicalibus oblongis obtusiusculis subintegris vel irregulariter et obsoletè sinuato-repandis in petiolum brevem attenuatis,

caule crasso elato folioso supernè laxè et longè pyramidato-paniculato ut et folia caulina et partes florales omnes indumento bombycino niveo tenui facillimè detersili obsito jam sub anthesi ut et rami glabrato nigricanti-rubello nitido, foliis caulinis inferioribus oblongis breviter attenuatis superioribus valdè auriculato-cordatis summis ovato-rotundis abruptè et breviter acuminatis, floribus sessilibus in fasciculos 2-4 flores secùs ramos inflorescentiæ distantes laxissimè racemosos dispositis, bracteis lanceolatis calyces subæquantibus, calycis laciniis lanceolatis patentibus ut et bracteæ flocco bombycino citò deciduo glandulisque stipitatis densè obsitis, corollà luteâ amplâ glabellâ, filamentis omnibus lanâ sordidè albâ longè barbatis, antheris omnibus reniformibus, capsulâ...

Hab. in rupestribus apricis faucis montis *Climacis Lyciæ* suprâ *Kourmalu* cum præcedentis (Heldr.). Fl. Maio.

Folia radicalia speciminis mei 7-8 pollices longa, 2 3 lata, caulis tripedalis sub anthesi ut et rami glaberrimus ater, tota inflorescentia villo valdè detersili obsita, calyces 2 lineas longi. Ex affinitate quoque *V. floccosi* sed distinctissimum caule denudato, floribus subsessilibus, calycibus bracteisque majoribus, calycis glandulositate. Hâc notâ accedit sed *V. Prusianum* quod cæterùm differt indumento, formâ foliorum, calyce triplò majori et ob antherarum formam in sectione *Thapso* militat.

VERBASCUM PISIDICUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Lychnitis Lychnitidea*).

V. foliis radicalibus tomento denso albo-flavescenti vestitis asperulis crassis oblongo-lanceolatis acutis internè longè angustatis margine minutè crenulatis subtùs elevatim nervosis, indumento partis superioris plantæ tenui pulverulento rufescenti demùm secedenti, caule pyramidatim paniculato ramosissimo, foliis caulinis e basi sessili subcordatâ oblongis summis ovato-cordatis acuminatis, floribus pedunculo calyci æquilongo vel longiori suffultis in fasciculos remotiusculos a basi ramorum racemos virgatos tenuissimos laxos formantes congestis, bracteis triangulari-subulatis fasciculo brevioribus, calyce minimo rufescenti ad basin usquè in lacinias angustè lineares partito, corolla parvæ extùs tomentellæ luteæ lobis subinæqualibus, filamentis omnibus sordidè albo lanatis, antheris reniformibus, capsulâ parvâ oblongâ obtusâ demùm glabrescenti calyce duplò longiori.

Hab. in fruticetis apricis regionis inferioris montis *Boudroun Pistidiæ* ad meridiem urbis *Isbarta* alt. circ. 2000' (Heldr.). Fl. Aug.

Folia inferiora 6-11 pollices longa, caulis 2-3 pedalis, calyx florifer lineam unam longus fructifer paululum auctus, capsula 2 lineas longa, corolla diametro majori 7-8 lineas lata. *V. astrophylllo* et *V. ringenti* affine ab eis præter alias notas differt calyce dimidiò minori capsulæque elongatâ. *V. lychnitis* et *V. Bannaticum* indumento etiam foliorum inferiorum tenuissimo capsulâ minùs angustatâ distinguuntur. *V. cheiranthifolium* tandem differt præter indumentum tenue foliis integerrimis, floribus longiùs pedicellatis, calyce majori.

VERBASCUM STENOPHYLLUM Boiss. et Heldreich, in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Lychnitis Lychnitidea*).

V. tomento brevissimo tenui denso stellato griseo vel flavescenti minimè deterili asperulum pannosum, foliis radicalibus numerosis angustè lanceolatis vel lanceolato-linearibus acutis in petiolum longè attenuatis subtilùs elevatim reticulato rugosis integerrimis, caule erecto infernè folioso supernè simplici vel parcè paniculato ramis strictis, foliis caulinis parvis lanceolatis inferioribus basi attenuatis superioribus sæpè subauriculato-cordatis, floribus pedunculo calyci æquilongo vel breviori suffultis fasciculatis, fasciculis a basi ramorum racemos tenues laxiusculos formantibus, bracteis lineari-lanceolatis cuspidatis inferioribus flores æquantibus, calycis cani laciniis linearibus acutis, corollâ luteâ extùs tomentosâ calyce 3-4 plò majori lobis inæqualibus, filamentis omnibus sordidè albo-barbatis, antheris omnibus reniformibus, capsulâ oblongâ demùm glabratâ mucronulatâ calyce duplò longiori.

Hab. in jugo montis *Tauri*, regio superior montis *Boudroun Pistidiæ* alt. 3000-6000!, montes suprâ *Ermenek Isauriæ* alt. 4500', mons *Anemas Lycaoniæ* ad nives alt. circ. 8000! (Heldreich).

Planta sesquipedalis, folia radicalia 6-8 pollicaria 6-12 lineas lata in plantâ montis *Anemas* sæpè tantùm 4 lineas lata. Racemi semipedales, calyx sesquilineam longus, corolla 10-12 lineas diametro lata, capsula 2 1/2 lin. longa. Affine *V. cheiranthifolio* ab eo differt foliis pro longitudine angustioribus, caule humiliori minùs ramoso, racemis crebrioribus, calyce ferè duplò majori, tomento crassiori non evanescenti pannoso.

VERBASCUM STENOCARPUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. 1846 (Sect. *Lychnitis Lychnitidea*).

V. foliis radicalibus caulinisque infimis dense et breviter pannosis ferrugineis non deterribilibus oblongis vel lanceolatis acutis valdè sinuatis undulatisque, caule elato infernè folioso supernè strictè paniculato-pyramidato ramo centrali multò longiori, foliis caulinis ut tota pars superior plantæ indumento tenuissimo griseo demùm in floceum deterribili vestitis oblongo-lanceolatis plus minùs repandis basi semper attenuatis, floribus minimis pedunculo calyceam subæquanti suffultis in fasciculos 2-4 flores remotiusculos a basi ramorum racemos tenuissimos laxos formantes dispositis, bracteis lineari-setaceis fasciculos florum non æquantibus, calycis laciniis subulatis acutis, corollà parvâ calyce 4 vel 5 plò majori luteâ extùs glabellâ lobis parùm inæqualibus, filamentis omnibus sordidè griseo-lanatis, antheris omnibus reniformibus, capsulâ pedunculo incrassato æquilongo suffultâ pube squamuloso-stellatâ griseâ demùm deterribili vestitâ oblongo-cylindricâ angustissimâ obtusâ mucronulatâ calyce subtriplo longiori.

Hab. in rupestribus *Pamphylia* ad *Alaya* inter urbem et castellum ubi medio aprilis jam fructiferum detexit cl. de Heldreich.

Folia radicalia aliquandò pedalia 2-3 pollices lata sæpè minora profundè sinuata sinibus undulatis lobisque rotundatis obtusissimis, rami paniculæ numerosi longi tenues, calyx lineam unam longus, corolla diametro 6-7 lineas lata, capsula 2 $\frac{1}{2}$ lineas longa vix lineam lata. Species foliis sinuatis fructuque angusto distinctissima ob flores minutos *Leianthis* forsàn aptiùs adnumeranda.

VERBASCUM RASCHEYANUM Boiss. (Sect. *Lychnitis Lychnitidea*).

V. tomento griseo tenui in foliis radicalibus magis persistenti in parte superiori plantæ deterribili vestitum, foliis radicalibus mediocribus ovatis vel oblongis obtusis grossè et irregulariter lobatis lobis obtusissimis sinibusque subundulatis basi rotundatis vel brevissimè cuneatis petiolo eis paulò breviori suffultis, caule elato longè pyramidato-paniculato cum ramis longis tenuibus citò denudato nigricanti, foliis caulinis sparsis superioribus sessilibus ovatis brevissimè acuminatis supremis ad ramorum basin argutè denticulatis longè acuminatis, floribus solitariis vel 2-3 nis pedunculis capillaribus calyci

æquilongis suffultis secùs ramos remotiusculis racemos laxissimos formantibus, bracteis setaceis glabratil calyces æquantibus, calycis laciniis subulato-setaceis, corollà luteà extùs hirtulà calyce 3-4 plò longiori basi longiusculè tubulosà, filamentis lutescenti-lanatis, antheris reniformibus, capsulà....

Hab. in *Antilibano* propè *Rascheya* ubi legi florif. Maio ineunte.

Folia inferiora 4-6 pollices longa 2-3 pollices lata, paniculæ rami 6-10 pollicares, calyces ferè 2 lineas longi; quamvis hujus speciei capsulam non viderim eam elongatam esse suspicor ut in. *V. stenocarpo* cui affine est et a quo egregiè differt foliis petiolatis ovato-oblongis nec oblongo-lanceolatis, floribus magis sparsis, calyce duplò longiori, etc.

VERBASCUM CEDRETI Boiss. (Sect. *Lychnitis Lychnitidea*).

V. foliis radicalibus tomento denso crasso lutescenti non deterrenti pannosis oblongis acutiusculis basi rotundatis vel subcuneatis breviter petiolatis crenulatis, caulinis minutis sessilibus basi subcordato-auriculatis integris plùs minùs ve acuminatis, caule ferè a basi pyramidalato-ramosissimo ut rami et inflorescentia tota indumento griseo citissimè deterrenti obsito, floribus pedunculis calyci æquilongis suffultis in fasciculos 2-3 floros basi bracteà lineari-setaceà suffultos dispositis secùs ramos racemos strictos tenues laxissimos formantibus, calycis laciniis subulatis acutis, corollà luteà extùs tomentellà calyce 4-5 plò longiori, filamentis omnibus sordidè flavescenti-lanatis, antheris omnibus reniformibus, capsulà oblongo-ellipticà calyce plùs duplò longiori obtusà longè mucronatà.

Hab. in *Libano* in sylvulà *Cedrorum* ubi legi florif. Julio 1846.

Folia inferiora 4-6 pollices longa 1 1/2 pollices lata, caulis 1 1/2-2 pedalis, calyces sesquilineam longi, capsula cum mucrone 3 lineas longa diametro 1 1/4 lata. Affinis *V. Rascheyano* a quo differt tomento crasso pannoso lutescenti, foliis crenulatis nec undulato-lobatis, etc.

VERBASCUM DAMASCENUM Boiss. (Sect. *Lychnitis Lychnitidea*).

V. foliis radicalibus resulatis integris ovatis obtusis in petiolum eis æquilongum vel breviorè breviter attenuatis tomento densissimo aspero sordidè albido-lutescenti pannosis subtilùs elevato-nervosis,

caulinis ovatis sessilibus minoribus basi subattenuatis brevissimè acuminatis ut tota pars superior plantæ tomento sordido demùm deterili obsitis, caule angulato jam paulò suprâ basin ramoso ramis erectis elongatis subflexuosis, floribus pedunculo calyci æquilongò suffultis in fasciculos 3-4 flores racemos laxos formantes dispositis, bracteis lineari-setaceis fasciculo brevioribus, calycis minuti laciniis angustè linearibus, corollâ mediocri, filamentis omnibus violaceo-lanatis, antheris omnibus reniformibus, capsulâ demùm glabrâ pedunculo crasso eâ breviori suffultâ oblongâ sulcatâ supernè angustatâ obtusâ longiusculè mucronatâ calyce duplò longiori.

Hab. in collibus aridis ad *Salehteh* propè *Damascum* ubi legi maio 1846.

Folia inferiora 3-4 pollices longa 2-2 $1\frac{1}{2}$ lata petiolo 1-2 pollicari suffulta. Caulis cum paniculâ strictâ 1 $1\frac{1}{2}$ -2 pedalis, calyx florifer densè lanatus vix 2 lineas longus, capsula 3 lineas longa 1 $1\frac{1}{2}$ lata. Affine *V. Cedreti* ab eo differt foliis integris inferioribus densius pannotis, supremis non subcordatis, filamentis violaceo lanatis, etc.

VERBASCUM PUMILUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Lychnitis Lychnitidea*).

V. pumilum, foliis ferè omnibus in rosulam radicalem congestis plùs minùs densè tomento non deterili pannosis canis vel canescentibus oblongis obtusiusculis tenuissimè crenulatis in petiolum eis subæquilongum attenuatis, caule a basi patulè ramosissimo latè et breviter paniculato ramis gracillimis breviter tomentellis glabrescentibusve rubellis, foliis caulinis inferioribus sessilibus ovato-oblongis superioribus ovato-subcordatis acutis omnibus parvis sæpè glabrescentibus, floribus minutis in fasciculos 2-3 flores secùs ramos laxiusculè dispositis pedunculatis pedunculis flori capsulæque æquilongis fructiferis incrassatis, bracteis linearibus pedunculo æquilongis, calyce tomento griseo deterili lanato ad basin usquè in lacinias lineares obtusiusculas partito, corollæ calyce quintuplò longioris extùs tomentellæ luteæ basi violaceo-maculatæ lobis inæqualibus, tubo brevissimo, filamentis omnibus purpureo-lanatis longioribus basi nudis, antheris omnibus reniformibus, capsulâ tomento deterili obductâ obtusâ mucronulatâ calycem paulò excedenti.

Hab. in montibus aridis inter *Beychehr* et *Koniah* leucis quinque ad occidentem hujus urbis. Fl. Junii initio. (Heldr.)

Folia radicalia 1-2 poll. longa $1\frac{1}{2}$ -1 lata petiolo eis æquilongo suffulta, panícula pedem dimidium longa lataque, pedunculi 2-3 lineas, calyces vix 2 lineas longi. Capsula tres lineas longa, corolla diametro sex lineas ferè lata. Species distinctissima quoad affinitatem dubia forsàn meliùs in sect. *Leiantha* collocanda.

VERBASCUM MYRIOCARPUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846 (Sect. *Lychnitis Leiantha*).

V. foliis tomento sericeo adpressissimo tenuissimo argyreo canis radicalibus amplis elliptico-lanceolatis acutis basi brevissimè cuneatis breviter petiolatis margine crenis rotundatis instructis prætereàque grossè subundulatis, caulinis multò minoribus oblongis integris breviter petiolatis sessilibusque, caule ferè a basi ramoso in paniculam ramosissimam abeunti ramis tenuibus teretibus ut et plantæ tota pars superior glabrescentibus, floribus pedunculo setaceo calyci æquilongo vel longiori suffultis in fasciculos plurifloros secùs ramulos racemos laxiusculos tenuissimos formantes dispositis minutissimis, bracteis subulatis pedunculos æquantibus, calycis tomento detergili obsiti laciniis setaceis, corollà minimà luteà, filamentis omnibus sordidè albo barbatis, antheris omnibus reniformibus, capsulà glabrata viscidulà pedunculo subæquilongà oblongo-cylindricà obtusà mucronulatà calyce 3-4 plò longiori.

Hab. in rupestribus *Pamphylia* in regione pinorum *Tauri* inter *Marla* et *Adalia* alt. 4000' (Heldr.) Fine Julii fructiferum.

Folia radicalia ferè pedalia 4 pollices lata, flores eis omnium specierum mihi notarum minutissimi. Calyx florifer capite aciculæ vix major. Capsula sesquilineam longa lineam dimidiam aut paulò amplius diametro lata. Species minutie partium floralium et multitudine florum inter *Leiantha* insignis.

VERBASCUM CERINUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Leiantha*.)

V. foliis omnibus ad collum et partem infimam caulis congestis indumento densissimo aspero sordidè albo-pannosis integris oblongo-lanceolatis acutiusculis in petiolum basi attenuatis, caulinis citò decrescentibus minutis oblongis sessilibus paucis, caule ut et tota inflorescentia denudato lutescenti cerino-nitido ferè a basi crebrè ramoso

in longam paniculam abeunt, ramis basi subincrassatis folio florali lanceolato acuminato suffultis, floribus subsessilibus in fasciculos 3-5 florum secus ramos remotos bractea ovata acuta eis breviori suffultis dispositis, calycis viridis glabri laciniis ovatis acutis, corolla mediocri lutea, filamentis flavo-barbatis, antheris omnibus reniformibus, capsula....

Hab. in collibus aridis ab urbe *Koniah* occidentem versus unam leucam remotis. Fl. Junio (Heldr.).

Folia radicalia densa semipedalia vel longiora 1 1/2-2 pollices lata. Caulis 1 1/2-2 pedalis crassiusculus a basi crebre ramosus ramis ad insertionem subdilatis subinaequalis, calyx florifer fere 2 lineas longus. Haec species quam tantum floriferam novi ab omnibus *Leianthis* mihi notis floribus subsessilibus fasciculatis differt. Caules et rami in planta viva ex am. de Heldreich mire nitidi veluti cera illiniti.

VERBASCUM ISAURICUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846 (Sect. *Leiantha*).

V. foliis radicalibus indumento densissimo albido non deterili panosis ovatis oblongisve obtusiusculis basi breviter in petiolum eis brevior attenuatis minutissime crenulatis, caule elato tereti foliisque caulinis tomento griseo fugaciori obsitis, panicula ramosissima glabrescenti viscidula, foliis caulinis minoribus ovato-oblongis acutis integerrimis basi latiori auriculato-amplexicaulibus, floribus solitariis rarius binis pedunculis calyce subbrevioribus suffultis laxissime racemosis bracteis minimis ovato-acuminatis, calycis valde glanduloso-viscidi laciniis oblongis acutis, corolla lutea calyce 4-5 plò longiori laciniis inaequalibus, filamentis pallide violaceo-barbatis 2 majoribus apice nudis, antheris omnibus reniformibus, capsula glabrescenti calyce duplò longiori breviter ovata acutiuscula longiusculè mucronata pedunculo subincrassato erecto-patulo aequilongo suffulta.

Hab. in saxosis apricis propè urbem *Ermenek Isauriae* (Heldr.). Fl. Julio.

Folia radicalia saltem in speciminibus quæ vidi 3-4 pollices tantum longa. Caules fere bipedales, rami numerosi erecto-patuli. Calyx florifer sesquilineam longus, corolla diametro fere pollicem longa. Capsula piso paulò minor. Affine videtur *V. Pinardi* a quo differt calycis laciniis oblongis nec subulatis, filamentis violaceo-nec albo barbatis multisque aliis notis.

VERBASCUM RUBRICAULE Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Leiantha*).

V. foliis tomento denso albo non deterrenti pannosis integris radicalibus et caulinis inferioribus oblongis obtusis in petiolum attenuatis margine vix crenulatis, caulinis superioribus sensim diminutis oblongis obtusiusculis basi rotundatis, caule tereti denudato lucido infernè densiusculè folioso rubro supernè ramoso-paniculato ramis virgatis tenuibus strictis longissimis, inflorescentiâ totâ glabrescenti, floribus solitariis pedunculo calyce multò breviori suffultis secùs ramos laxissimè racemosos bractea minimâ ovatâ acutâ pedunculo breviori suffultis, calycis visciduli laciniis ovatis acutis demùm oblongis, corollâ calyce 4-5 plò longiori intensè flavâ subregulari, filamentis omnibus flavido-lanatis majori apice denudato, antheris omnibus reniformibus, capsulâ pedunculo incrassato recto eâ paulò breviori suffultâ ovatâ obtusâ mucronulatâ glabratâ calyce sesquolongiori.

Hab. in fruticetis apricis *Tauri Isaurici* in valle *Djoksu* propè *Pichackschi kouprou* inter *Karaman* et *Ermenek*. Fl. Jun. (Heldr.).

Caulis quadripedalis ramique virgati longissimi; folia parva, caulina infima 2-2½ poll. tantùm longa. Calyx florifer circ. 2 lin. longus. Corolla diametro pollicaris et ultrâ. Capsula pisum minutum æquans. Præcedenti affine differt foliis minoribus, caule ramisque strictioribus magis virgatis, floribus majoribus brevius pedunculatis, filamentis lutescenti-barbatis, capsulâ majori obtusâ A *V. Pinardi* quoque calycis laciniis non subulatis aliisque notis differt.

VERBASCUM DENUDATUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. Sect. *Leiantha*.

V. foliis ferè omnibus in rosulam basilarem congestis tomento denso adpressissimo asperulo pannoso griseo-viridibus subnitentibus petiolatis ambitu oblongo-lanceolatis runcinato-lyratis, segmentis integris auriculæformibus oblongis apice rotundatis a superioribus sinu rotundato confluentibus ad inferiores distinctos demùm minimos triangulares sensim diminutis terminali basi cum lateralibus latè confluenti ovato acuto irregulariter 3-4 repando vel lobato, caule rubro infernè simplici aphylo supernè ramosissimo longè paniculato paniculâque denudatis glabris, floribus solitariis pedunculo capillari calyci æquilongo suffultis secùs ramos laxè et tenuissimè racemosos, bractea

oblongo-triangulari acutâ pedunculo dimidiò breviori, calycis glandulosi laciniis oblongo-ellipticis obtusis, corollâ flavâ vix irregulari calyce 7-8 plò longiori, filamentis omnibus lutescenti-barbatis majoribus supernè nudis, antheris omnibus reniformibus, capsulâ globosâ obtusâ mucronulatâ glabrâ calyce sesquolongiori.

Hab. in rupestribus faucis *Tsimboukkan Pamphyliæ* et in collibus tophaceis propè *Bouldour Pisidiæ* (Heldr. 1846) Fl. Maio.

Folia cum petiolo 3-8 pollices longa supernè 1-1½, pollices lata lobis plus minùs humerosis profundisque terminali semper multò majori. Caulis 3-4 pedalis. Calyx florifer sesquilineam longus. Corolla diametro 12-13 lineas lata. Capsula piso dimidiò minor bisulca. Species a *V. napifolio* foliorum segmento supremo non rotundato obtuso, a *V. parvifloro* segmentis foliorum non retrorsis nec dentatis, ab utroque laciniis calycinis non spathulato-linearibus distinctissima.

VERBASCUM MESOPOTAMICUM Boiss. (Sect. *Lychnitis Suffruticosa*).

V. pilis minimis stellatis sparsis sub lente cinerascens pallidè virens, caule recto tereti tenui basi folioso supernè parcè paniculato-ramoso, foliis parvis oblongis integerrimis acutiusculis inferioribus in petiolum brevem attenuatis superioribus basi angustè cordatis, pedunculis calyce duplò longioribus solitariis incurvis erecto-patulis aliis (ramorum lateralium) unifloris ad medium sæpiùs unibracteolatis, aliis (rami centralis) ad medium bibracteolatis trifloris, bractea ad basin pedunculi sitâ oblongo-lineari acutâ eo breviori, calyce densè cinerascenti patenti ad medium usquè in laciniis triangulari-ovatas acutiusculas fisso, corollâ luteâ extùs densè tomentellâ calyce subtriplò longiori, filamentis omnibus pallidè violaceo-lanatis, antheris omnibus reniformibus, capsulâ....

Hab. in *Mesopotamiâ* inter *Orfa* et *Suerek* Kotschy pl. Assyriacæ N° 67.

Planta e specimine meo pedalis, folia inferiora pollicem longa 3-6 lineas lata; pedunculi ferè 3 lineas longi, caulis centralis nonnulli potiùs pro ramo abbreviato paucifloro quam pro pedunculo propriò habendi, calyx 2 lineas longus et supernè ferè tres lineas latus. Species insignis calyce brevi lato planiusculo tantùm usquè ad mediam partem lobato. Huic sectioni potiùs quam *Blattarioides* ob habitum, folia minuta, indumentum parcum minimè glandulosum adnumerandum.

VERBASCUM PESTALOZZÆ Boiss. (Sect. *Lychnitis Suffruticosa*).

V. nanum caudiculis procumbentibus basi induratis nudis apice densè foliosis, foliis ad basin caulium congestis tomento densissimo pannoso flavido vestitis crassis oblongis vel oblongo-lanceolatis obtusis in petiolum brevem attenuatis suprâ venulosè subtùs rugosè et elevatim reticulato-nervosis, caule scapiformi simplici infernè folio caulino uno alterutro ve sessili oblongo-lineari munito paulò suprâ basin florifero, floribus solitariis alternis pedunculo tenui stricto calyci æquilongo suffultis racemum spiciformem simplicem densiusculum lanâ stellatâ detersili flavidâ obsitum formantibus, bracteis linearibus elongatis pedunculo sublongioribus, calyce usquè ad basin in lacinias angustè lineares acutas villo connexas partito, corollâ luteâ extùs valdè tomentosâ, filamentis omnibus flavido-lanatis, antheris reniformibus, capsulâ globosâ tandem glabrâ calyce breviori.

Hab. in montibus elatis *Lyciæ* ubi detexit et mihi communicavit am. Dc. Pestalozza.

Planta 6 pollicaris, folia inferiora ferè sesquipollicaria 6-8 lineas lata. Racemus 3-4 pollicaris tenuis, pedunculi stricti 4 lineas longi, calyx 4 lineas ferè longus. Corolla ut e speciminibus malè exsiccatis dijudicare queo calyce tantùm duplò longior tubo brevi. Species insignis staturâ minutâ, foliis valdè rugosis ferè Phlomidis, racemo tenui, floribus longe pedunculatis, nulli sectionis approximanda forsàn optiùs propè. *V. simplex* vel *V. Salvææfolium* collocanda.

VERBASCUM STACHYDIFOLIUM Boiss. et Heldr. in pl. Anatol. exs. 1856 (Sect. *Lychnitis Blattarioidea*).

V. foliis tomento adpressissimo plùs minùs ve canis radicalibus confertis lanceolatis acutis in petiolum brevem attenuatis tenuiter rugulosis margine crenulatis, caulinis paucissimis sessilibus angustè linearibus integerrimis, caulibus erectis simplicibus vel medium versùs parè ramosis paniculatis ut tota inflorescentia tenuissimè et parè tomentellis, floribus solitariis vel binis pedunculo erecto-patulo calyce duplò longiori suffultis basi bracteâ lineari pedunculis dimidiò breviori suffultis racemos elongatos formantibus, calycis canescenti-tomentelli laciniiis linearibus acutiusculis, corollâ calycem triplò excedenti luteâ extùs tomentellâ, filamentis aurantiacis sordidè

albo-lanatis, antheris omnibus reniformibus, capsulâ oblongâ acutiusculâ demum glabrescenti pedunculo incrassato erecto-patulo subincurvo eâ paulò longiori suffultâ calyce subduplò longiori.

Hab. in saxosis apricis planitiei *Kontak* inter *Karkin* et *Souliman hatsi* ad radices montis *Karadagh* (Heldr.). Fl. Junio.

Pedale aut paulò procerius, folia radicalia tripollicaria 4-6 lineas lata. Pedunculi fructiferi 5-6 lineas circiter longi. Calyx ferè 2 lineas longus. Capsula 3 lineas longa. Pulchra species affinis *V. biscutellæ-folio* Bth. quod differt indumento griseo lanato-asperulo, inflorescentiâ glabrescenti, pedunculis gracilioribus calyce 4-5 plò longioribus, filamentis purpureo-lanatis, capsulâ ovatâ longè mucronatâ etc. Habitus *Celsiæ* sed stamina semper quinque.

VERBASCUM SCAPOSUM Boiss. (Sect. *Lychnitis Blattarioidea*).

V. radice tuberoso-incrassatâ breviter cylindricâ, foliis radicalibus paucis rosulatis parvis glaberrimis ovatis obtusissimis rotundato-crenulatis basi in petiolum planum brevissimum abeuntibus, caule scapiformi tereti simplicissimo foliis paucis minimis linearibus basi non dilatâtâ minutè auriculato-subhastatis obsito, pedunculis calyce subquadruplò longioribus erecto-patulis basi bracteâ oblongo-lanceolatâ brevissimè suffultis racemum elongatum terminalem formantibus, calycis ad basin usquè partiti laciniis oblongis acutis margine glandulosis cæterùm glabris, corollâ....., capsulâ ovato-rotundâ glabrâ brevi mucronatâ calycis laciniis patulis vel deflexis duplò longiori.

Hab. inter pineta in regione inferiori jugi *Cassii Syriæ* borealis in planitie ad meridiem pagi *Cassab* sitâ. Legi fructiferum Junio.

Folia radicalia pollicem longa 7-8 lineas lata, caulina 5-6 lineas longa lineam lata. Caules cum racemo ferè pedales, pedunculi 7-8 lineas longi. Capsula piso minor. Corolla mihi ignota et ideò *Verbascum* potius quam *Celsiæ* adnumeravi tantùm ob affinitatem cum *V. phæniceo* cui plurimis notis congruit et quod differt foliis majoribus basi cordatis subtùs ad nervos pubescentibus, pedunculis calycibusque densè glandulosis.

VERBASCUM TIBERIADIS Boiss (Sect. *Lychnitis Blattarioidea*).

V. totum parte inferiori pilis longis adpressiusculis papillois nitentibus albis obsitum, inflorescentiâ totâ densè glanduloso-tomentellâ

rufâ, foliis radicalibus et caulinis inferioribus amplis oblongis vel latè lanceolatis ad medium usquè profundè inciso-lobatis basi sæpè sub-pinnatipartitis in petiolum brevem latum attenuatis, segmentis magnis triangulari-lanceolatis acutissimis acutè dentatis, foliis caulinis intermediis et superioribus sessilibus e basi cordatâ longè acuminatis denticulatis, caule crasso supernè paniculato-ramosissimo, floribus solitariis pedunculo per anthesin calyce subbreviori suffultis racemos longissimos laxos formantibus, bracteis triangularibus acutis brevissimis, calycis densissimè glanduloso-hirti laciniis ovatis acutiusculis, corollâ flavâ calyce 3-4 plò majori, filamentis omnibus purpureo-lanatis, antheris omnibus reniformibus, capsulâ pedunculo elongato incrassato erecto-patulo eâ longiori suffultâ glabrâ ovato-rotundâ longè mucronatâ laciniis calycis parùm superanti.

Hab. circâ lacum *Tiberiadis* et infrâ *Bantias Galileæ* Legi floriferum Maio 1846.

Folia inferiora cum petiolo sepè pedalia 3-6 pollices lata ea *Salviæ sclareæ* referentia sed plerumque angustiora profundius incisa segmentis sæpè 2 pollices longis angustis. Caulis bipedalis et longior ramis virgatis longis numerosissimis. Calyx florifer ferè 2 lineas longus. Capsula ferè magnitudine Pisi. Species propè *V. lyratifolium* collocanda a quo foliis amplis profundè et acutè lobatis, pedunculis brevibus, etc. differt.

VERBASCUM LEUCONEURUM Boiss et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846 (Sect. *Lychnitis Blattarioidea*).

V. foliis tomento araneoso tenui canescenti subtùs secùs nervos et secùs petiolos copiosiori bombycino niveo obsitis integris oblongis infimis obtusis basi longè attenuatis superioribus sensim diminutis sessilibus truncatis vel subcordatis, caule crasso infernè simplici densiusculè folioso supernè ut inflorescentia tota glabrato rubello longissimè paniculato ramis elongatis, floribus solitariis pedunculo erecto-patulo incurvo calyce 3-5 plò longiori suffultis racemos multifloros laxos formantibus, bracteis ovato-triangularibus acutis pedunculo multoties brevioribus, calycis glandulosi laciniis ovato-oblongis acutis, corollâ?... , capsulâ glabrâ ovatâ obtusâ mucronulatâ calyce paulò longiori pedunculo eâ 2-3 plò longiori suffultâ?

Hab. in pinetis vallis superioris *Ermenek Tauri Isaurici* ubi Julio ineunte jam fructiferum legit cl de Heldreich.

Folia infima in meo specimine cum petiolo 6-8 pollices longa supernè 2 pollices lata, cætera sensim diminuta. Caulis 4-5 pedalis, paniculæ rami 2-2 1/2 pedales, calyx circiter 2 lineas longus. Capsula piso paulò minor pedunculo erecto-incurvo 6-9 lineas longo suffulta. Species ob corollam ignotam inter *Verbascum* et *Celsiam* dubia sed generi priori probabilissimè ex foliorum formà et habitu adnumeranda.

VERBASCUM BERYTEUM Boiss (Sect. *Lychnitis Blattarioidea*).

V. totum virescens brevissimè hirtellum viscidulum radice brevi incrassatà cylindricà, foliis radicalibus petiolatis pinnatipartito-lyratis, segmentis inferioribus utrinquè 2-3 minimis ovalis aliquandò evanidis terminali maximo ovato vel oblongo obtuso irregulariter sinuato vel lobato lobis rotundatis obtusè dentatis, foliis caulinis inferioribus paucis oblongis breviter petiolatis acutiusculè denticulatis, superioribus parvis e basi latiori sessili rotundà oblongis acutis minutè denticulatis, caule laxè ramoso paniculato, floribus solitariis pedunculo tenuiter filiformi erecto-patulo subincurvo calyce quadruplò longiori suffultis racemos longos laxos formantibus, bracteis minimis oblongis acuminatis basi sæpè 1-2 dentatis pedunculo multoties brevioribus, calycis basi præsertim glandulosi 5 partiti laciniis oblongo-ellipticis acutiusculis, corollà calyce quadruplò longiori glabrà, filamentis violaceo-lanafis superioribus apice nudis, antheris omnibus reniformibus, capsulà pedunculo incrassato elongato patulo eà multoties longiori suffultà ovatà mucronatà calycis laciniis vix sesquolongiori.

Hab. ad margines viarum cavarum et sepes Cacti circà *Beyrout*. Fl. vere et æstate.

Folia radicalia 2-6 pollices longa 1-1 1/2 lata lobis lateralibus minimis, caules 2-3 pedales racemis florum longissimis, pedunculi fructiferi pollicares et ultrà, corolla tenera diametro 9-10 lineas lata, capsula piso minor. Species pulchra habitu *Celsiam* omninò referens sed 8 staminibus donata. Affine *V. lyratifolio* Köchel quod egregiè differt petiolis hispidis, foliorum majorum lobis acuminatis, etc.

CELSIA PYROLIFORMIS Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846 (Sect. *Nefflea*).

C. perennis glaberrima, radice verticali pluricauli, caulibus scapiformibus ascendentibus simplicissimis parcè foliosis supernè race-

mosis, foliis radicalibus angustè oblongo-lanceolatis obtusis vel acutiusculis in petiolum longè attenuatis crassiusculis carnosulis sub-uninerviis subcanaliculato-plicatis, caulinis sensim decrescentibus citò ad squamulas breves lineares reductis, floribus pedunculo filiformi calyce 4-3 plò longiori erectiusculo suffultis racemum terminalem laxum formantibus, bracteis minimis ovatis acuminatis squamæformibus, calycis parvi glaberrimi laciniis oblongis acutiusculis, corollà parvâ luteâ glabrâ, filamentis omnibus sordidè albolanatis, antheris omnibus reniformibus, capsulâ pedunculo erecto strictiusculo suffultâ ovatâ acutiusculâ muticâ laciniis calycinis triplò longiori.

Hab. in salsis hyeme inundatis planitie *Koniah* ad radices montis *Karadagh* (Heldr.). Fl. Junio.

Folia radicalia cum petiolo 2-3 pollices longa 3-6 lineas lata. Caules cum racemo 1½-1 pedales, racemus 3-6 pollicaris, pedunculi 6-8 lineas longi, calyx lineam unam longus. Species foliis longis angustis carnosulis, glabritie, distinctissima.

CELSIA AUCHERI Boiss. (Sect. *Nefflea*).

C. foliis parvis adpressè tomentosis canescentibus parvis infimis lyratis lobis inferioribus minimis oblongis superiori magno oblongo obtusiusculè dentato, foliis intermediis paucis petiolatis oblongis acutiusculè dentatis, cæteris a basi cordatâ subamplexicauli ovatis oblongisve acutis obsoletè denticulatis, caule a parte inferiori paniculatum ramosissimo inflorescentiâque totâ viridibus glandulis minimis longè stipitatis sparsis obsitis, floribus solitariis pedunculis capillaribus calyce 3-4 plò longioribus patulis rigidulis suffultis racemos longos laxos formantibus, bracteis a basi oblongâ setaceis minimis, calycis glandulosi quinquepartiti laciniis oblongis breviter acuminulatis, corollâ luteâ extùs puberulâ, filamentis sordidè albo-lanatis superioribus apice nudis, antheris reniformibus, capsulâ ovatâ acutâ mucronulatâ pedunculo erecto-patulo elongato subincrassato eâ 3-4 plò longiori suffultâ calyce subsesquilongiori.

Celsia intricata var. β Bth. in Dc. Prodr.

Hab. in aridis ad *Teheran Persiæ* Aucher N° 8043, in declivibus montis *Elburs* propè *Derbent* (Kotschy pl. Pers. bor. N° 881).

Folia inferiora sesquipodem longa 5-7 pollices lata lobis lateralibus 1-1½-2 lineas longis terminali multò majori. Caulis cum racemis ses-

quipedalis. Calyx florifer 1 $1\frac{1}{4}$ lineas tantum longus. Pedunculi fructiferi pollicares, capsula magnitudine Pisi. Planta a cl. Benthham qui specimina incompleta Aucheri tantum viderat ad *C. intricatam* relata quæ omnino differt ramis multo tenuioribus repetitè ramosissimis apice subspinescentibus, capsulis triplò minoribus, foliorum formà.

CELSIA PINETORUM Boiss. (Sect. *Nefflea*).

C. caule tereti infernè pilis papillosis patulis hispido supernè longè paniculato-ramoso ut panicula tota glanduloso-hispidulo, foliis radicalibus ad nervos et petiolos papillari-hispidis pinnatipartito-lyratis petiolatis segmentis lateralibus binis rariùs 4-6 parvis oblongis terminali multò majori oblongo plùs minùs inciso-lobato omnibus acutè dentatis, foliis caulinis acutis dentatis dentibus triangularibus acuminiatis inferioribus oblongis petiolatis superioribus sessilibus truncato-subcordatis triangulari-ovatis acuminatis parcè et acutè dentatis, floribus solitariis pedunculo capillari calyce pluries longiori erectopatulo suffultis racemos longos laxos formantibus, bracteis a basi ovatà in cuspidem subulatam longam attenuatis integerrimis pedunculo triplò brevioribus, calycis quinquepartiti glanduloso-punctati laciniis elliptico-lanceolatis acutis, corollà glabrà tenerà luteà calyce sextuplò majori, filamentis omnibus violaceo-barbatis longioribus apice nudis, antheris omnibus reniformibus, capsulà globosà glabrà mucronatà calyce sesquilongiori pedunculo patulo vix incrassato tenuissimè filiformi eà multoties longiori suffultà.

Hab. in declivibus ad pinetorum margines in vallibus jugi *Cassii* inter *Cassab* et *Suadieh*. Legi Jun. 1846.

Folia radicalia cum petiolo 2-2 $1\frac{1}{2}$ poll. longa pollicem aut ampliùs lata. Canles cum paniculà bipedales; racemi 6-10 pollices, pedunculi floriferi 7-8 lineas fructiferi 10-11 lineas longi. Capsula piso minor. Planta elegantissima foliis et inflorescentià. *C. Dænzeri* et *C. arcturum* referens sed tenuior et discrepans formà bractearum, antheris non decurrentibus, etc.

CELSIA CILICIA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Nefflea*).

C. foliis parvis ferè omnibus radicalibus breviter petiolatis indivisis breviter ovatis basi rotundatis vel breviter cuneatis obtusis argutè serratodentatis dentibus triangularibus, caulibus præter folia pauca

sessilia minuta orbiculata denticulata nudis sub lente minutè hirtuloglandulosis ramosissimis, floribus solitariis pedunculis filiformibus subpatulis calyce 3-6 plò longioribus suffultis racemos laxissimos formantibus, bracteis minimis squamæformibus ovatis acutiusculis, calycis densè glandulosi laciniis ovatis acutiusculis, corollà luteà glabrà, filamentis omnibus violaceo-lanatis apice nudis, antheris reniformibus, capsulà ovato-globosà calyce subsesquilongiori.

Hab. in saxosis *Tauri Cilici* ad radices montis *Bulghurdagh* propè *Tchiftékhan* ubi fine Septembris specimina jam vetusta legit cl. de Heldreich.

Hæc species foliorum magnitudine habituque præcedenti affinis esse videtur, distincta tamen foliis non pinnatipartitis, bracteis ad squamulas reductis, etc.

SCROPHULARIA CRYPTOPHILLA Boiss. et Heldr. (Sect. *Venilia* Don.)

S. perennis caulibus ut et petioli patulè hispidulis obsoletè quadrangulis erectis simplicibus foliosis, foliis petiolo eis æquilongo suffultis ovato-rotundis sinu angusto clauso cordatis circumcircuitim crenato-lobatis crenis lobisque obtusissimis mucronulatis utrâque paginâ ad nervos parcè papillosos margine ciliatulis cæterum glabris tenerrimis, cymis in parte superiori caulis paniculam brevem pyramidatam formantibus infimis longiùs superioribus brevius pedunculatis, foliis floralibus pedunculo brevioribus subsessilibus ovato-triangularibus acutis acutè dentatis supremis minimis, pedicellis tenuissimis divergentibus calyce longioribus parcè glanduloso-puberulis, bracteolis minutissimis oblongo-subulatis, calycis viridis glaberrimi laciniis ovatis obtusiusculis immarginalis, corollà flavescenti, staminibus exsertis, rudimento staminis quinti nullo, capsulà breviter ovatâ glaberrimâ calyce duplò longiori.

Scrophularia Kotschyana pl. Heldr. Anat. exs. 1846 non Bth. Prodr.

Hab. in speluncis obscuris montis *Gheidagh Isauriæ* alt. 3500', in ruinis veteris ecclesiæ ad cacumen montis *Karadagh Lycaoniæ* sitæ alt. circ. 3000' (Heldreich), in monte *Berckètdagh Lyciæ* (Pestallozza).

Sesquipedalis, folia inferiora diametro tripollicaria, panicula pyramidata 4-5 pollices longa; hanc primum habuimus pro *S. Kotschyana*

Bth. e Tauro Cilicio oriundâ et quæ meliùs observata egregiè differt caule ut videtur bienni, indumento copiosiori longiorique, foliorum inferiorum sinu baseos multò latiori, cymulis florum strictis inter se subæquilongis paniculam laxam foliatam elongatam secùs caulem ferè a basi formantibus, bracteolis triplò majoribus, capsulis laciniisque calycis viscido-puberulis.

SCROPHULARIA POLYBOTRYS Boiss. in Kotschy, pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Venilia*).

S. perennis, caulibus erectis simplicibus elatis teretibus glabriusculis infernè foliosis supernè in thyrsum elongatum angustum strictum aphyllum abeuntibus, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis basi rotundatis vel breviter attenuatis petiolo brevi suffultis argutè et breviter denticulatis, summis integris, omnibus pallidè virentibus nigricantibus nervosis ad nervos infernè sub lente parcissimè glandulosæ cæterum glabris, inflorescentiâ totâ glandulis minimis viridibus sessilibus conspersâ, cymis paucifloris pedunculo brevi stricto suffultis laxiusculis, pedicellis calyci æquilongis, bracteolis dichotomiarum setaceis brevissimis, calycis glaberrimi laciniis ovato-oblongis obtusis ferè immarginatis, corollâ intensè purpureâ, staminibus longè exsertis, appendice nullâ.

Hab. ad radices montis *Damawend* propè *Lar*. (Kotschy pl. Pers. bor. N° 315).

Planta 2-2 $1\frac{1}{2}$ pedalis, thyrsus 8-10 pollicaris, folia inferiora 2 $1\frac{1}{2}$ -3 pollices longa. Ex affinitate *S. Orientalis* quæ differt caulibus angulosis, foliis angustioribus inferioribus pinnatifidis, floribus lutescentibus, calycis laciniis latiusculè membranaceis. *S. nervosa* differt caulibus angulatis infernè villosulis, foliis minùs dentatis, paniculâ densiùs glandulosâ, bracteis longioribus; huic ut synonymon referenda *Sc. Olivieri* Jaub. et Spach. tab. 222 non Wydler.

SCROPHULARIA MACROPHYLLA Boiss. in Pinard pl. exs 1846. (Sect. *Scorodonia* Don.)

S. perennis glabra, caule obtusè quadrangulo crasso valdè elato ramoso stricto, foliis amplis oblongis inferioribus petiolo eis breviori suffultis sinu angusto cordatis obtusè et latè crenatis obtusis, superioribus basi truncatis acutis acutè subduplicato-serratis, cymis breviter

pedunculatis dichotomè ramosissimis confertim multifloris inter se distantibus thyrsus aphyllum longum laxum formantibus, pedicellis calyce paulò longioribus glabris vel parçissimè glandulosis, bracteolis oblongo-linearibus brevissimis, calycis glaberrimi laciniis ovatis obtusis angustè albomarginatis, corollæ flavidæ labio superiori paulò provectori, staminibus inclusis, appendice reniformi, capsulà ovatà acutiusculà calyce triplò longiori.

Hab. ad aquas in valle calidiori *Jordani* ad fontem *Ain Sultan* propè *Jericho* et ad lacum *Samochonitidem* (Boiss. Pinard). Fl. Maio.

Planta pluripedalis, folia inferiora 8-9 pollices longa 5 lata, caulina sensim minora. Thyrsus sæpè pedalis, flores minores eis *Sc. nodosæ* cui affinis est et quæ differt foliis minoribus acutè serratis acuminatis, thyrso latiori breviori paucifloro, capsulà acutiori, etc.

SCROPHULARIA PISIDICA Boiss. et Heldr. (Sect. *Scorodonia*).

Sc. perennis glabra caule argutè quadrangulari infrà foliorum insertionem argutè et crispulè alato, foliis ovato-oblongis petiolo alato eis breviori suffultis infimis basi subcordatis obtusis obtusè crenatis, superioribus acutis acutè serratis, paniculà terminali pyramidatà longissimà aphyllà, cymis breviter pedunculatis divaricato-ramosis, pedicellis copiosè glanduliferis tenuibus calyci æquilongis fructiferis recurvis, bracteolis setaceis minimis, calycis glabri laciniis ovato-subrotundis rufescenti-marginatis, corollà purpurascenti, staminibus subexsertis, rudimento transversè latiori reniformi-emarginato, capsulà minutà ovato-rotundà acutà calyce duplò longiori.

Sc. aquatica var. *parviflora* in Heldr. pl. Anat. exs. 1846.

Hab. ad aquas *Pisidiæ* locis umbrosis, ad pagum *Aglansoun*, in insulà lacùs *Beychehr Isauriæ* (Heldr.)

Hæc species quam priùs ad *Sc. aquaticam*. — *S. Ehrharti* Steven et Koch retuleranus meliùs observata ab eà specificè differre videtur thyrso magis multifloro omninò aphylo, floribus minoribus, pedicellis glandulosissimis fructiferis recurvis, capsulis minoribus, caule parte inferiori distinctè et crispulè alato, foliis longiùs petiolatis.

SCROPHULARIA OLIGANTHA Boiss. et Heldr. (Sect. *Scorodonia*).

Sc. multicaulis, caulibus simplicissimis obsoletè quadrangulis glanduloso-puberulis infernè nudiusculis, foliis brevissimè pubescentibus

breviter petiolatis ovatis acutis utrinquè profundè et acutè 7-8 dentatis, thyrso terminali brevissimo 3-10 floro aphylo pedunculato oblongo, bracteis lineari-setaceis, pedicellis valdè glandulosis calyce longioribus, calycis glaberrimi laciniis rotundis angustissimè marginatis, capsulà ovatà acutà calyce duplò longiori, corollà flavidà, staminibus subexsertis, appendice reniformi angustà.

Hab. in regione summà *Taygeti* ad pedem rupium rarissima (Heldr.). Fl. Augusto.

Planta 8-10 pollicaris, folia majora 12-15 lineas longa. Flores et capsulæ ferè dimidiò minores eis *Sc. grandidentatæ* cui affinis est; calyces semper angustissimè membranacei quā notā ab eā ut et a *S. Scopolii* et *S. Smyrnææ* discrepat. An tamen *Sc. Scopolii* varietas?

SCROPHULARIA MESOPOTAMICA Boiss. (Sect. *Tomiophyllum Lucidæ*).

Sc. biennis vel perennis præter glandulas minimas sessiles sub lente secus caules et inflorescentiam parcissimè obvias glabra, caulibus obtusè quadrangulis erectis simplicissimis parte inferiori foliosis, foliis ambitu ovatis subbipinnatisectis laciniis longis latè linearibus argutè dentatis, cymis densifloris subsessilibus thyrsum longissimum aphyllum basi valdè interruptum supernè laxissimum formantibus, pedicellis calyce brevioribus, bracteolis spathulatis stipitatis latissimè rufescenti-scariosis pedicellos superantibus, calycis glaberrimi laciniis rotundis membranā tenerā scariosā rufā crispulā eis æquilatā marginatis, corollæ brevis purpureæ labio superiori parum porrecto, staminibus inclusis, appendice ovatā, capsulà glabrā ovatā acutā calyce duplò longiori.

Hab. in *Mesopotamiā* inter *Orfa* et *Suerék* Kotschy. N° 57.

Planta 2 1/2 pedalis, thyrsus sesquipedalis. Proxima *S. scariosæ* Boiss. a quā differt laciniis foliorum latioribus, præsertim cymis densioribus sessilibus, calycibus et bracteis rufo nec argenteo-scariosis, capsulà minori acutā nec in rostrum æquilongum attenuatā.

SCROPHULARIA RUBRICAULIS Boiss. in pl. Syr. exs. 1846 (Sect. *Tomio-phyllum Lucidæ*).

Sc. biennis vel perennis infernè glaberrima, caule erecto crasso rubro obtusè angulato infernè ramoso foliosoque, foliis amplis petiolatis ambitu oblongis lyrato-pinnatisectis, laciniis petiolulatis sessili-

busve ovatis grossè et obtusissimè rariùs acutè crenatis superiori majori sæpè tripartitâ basi sæpè decurrenti omnibus obtusis, cymis paucifloris subsessilibus fasciculatim contractis thyrsos terminales rigidos laxos longissimos formantibus, inflorescentiâ totâ glandulis sessilibus valdè obsitâ, pedicellis calyce brevioribus, bracteolis lineari-setaceis pedicellos æquantibus, calycis glaberrimi laciniis ovatis latissimè membranâ rubellâ valdè undulato-crispâ marginatis, corollæ flavescentis labio superiori porrecto lobis obovatis, staminibus inclusis, appendice minimâ rotundâ, capsulâ ovatâ in rostrum longum attenuatâ calyce duplò longiori.

Hab. in *Galilæa* propè *Jenin* et *Banias*, in *Cœlesyriâ* inter *Rascheya* et *Hasbeya*. Legi Maio 1846.

Planta 3-4 pedalis. Râcemi sæpissimè bipedales. Calycis indole *Sc. scariosæ* et *S. Mesopotamicæ* affinis differt racemis longissimis virgatis, floribus fasciculatis, bracteis subulatis nec spathulatis, etc.

SCROPHULARIA HIEROCHUNTINA Boiss. in pl. Syr. exs. 1846 (Sect. *Tomiophyllum Lucidæ*.)

S. parte inferiori glaberrima superiori parcè puberula, biennis vel perennis, caulibus simplicissimis rubris obsoletè quadrangulis infernè foliosis, foliis breviter petiolatis ambitu oblongis bipinnatisectis laciniis oblongis inciso-dentatis foliorum inferiorum latiusculis obtusis superiorum tenuissimis acutis argutè pinnatifidis, cymis contractis breviter pedunculatis thyrsum terminalem strictum angustum valdè interruptum formantibus, bracteis linearibus, bracteolis lineari-setaceis acutis, pedicellis crassis calyce brevioribus, calycis glabri nigricantis laciniis ovatis membranâ rubellâ latâ subundulatâ marginatis, corollæ atrorubræ labio superiori in 2 lacinias rotundas amplas denticulatas partito, appendice rotundâ retusâ, staminibus inclusis, capsulâ ovatâ obtusâ calyce non longiori.

Hab. in humidis propè *Jericho*, *Jerusalem*, *Gaza*. Legi floriferam maio ineunte.

Sesquipedalis, folia sæpè ea *S. filicifoliæ* referentia. Affinis *S. rubricauli* et *S. Mesopotamiæ* sed distincta foliis valdè decompositis, thyrso breviori, appendicis formâ, corollâ atrovioleâ, capsulâ obtusâ.

SCROPHULARIA CATARIÆFOLIA Boiss. et Heldr. (Sect. *Tomiophyllum Lucidæ*).

S. perennis multicaulis tota glandulis stipitatis minutissimis secus inflorescentiam et partes juniores plantæ præsertim copiosissimis puberulo-pruinosa, caulibus quadrangulis infernè foliosis, foliis indivisis breviter petiolatis e basi truncato-subcordatâ oblongis acutiusculis infimis obtusiusculè cæteris acutè dentatis dentibus triangularibus, cymis paucifloris pedunculo stricto longiusculo suffultis paniculam laxam angustè pyramidatam terminalem aphyllam formantibus, pedicellis calyce paulò longioribus, calycis glanduloso-pubescentis laciniis ovatis albomarginatis, bracteis linearibus pedicellum æquantibus, corollæ flavescentis labio superiori parùm producto, appendice reniformi acutiusculâ basi truncatâ.

Sc. nepetæfolia Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846 non Presl.

Hab. in cacumine montis *Karadagh Lycaoniæ* in ruinis ecclesiæ Græcæ veteris cum *S. cryptophila* mixta alt 5000'. Fl. Junio Heldr.).

Sesquipedalis, folia inferiora sesquipollicem longa, thyrsus semipedalis. Affinis *Sc. incisæ* Weinm. et *S. Oliverianæ* d'Urv. a quibus glandulositate, a priori insuper foliis non incis, a posteriori eis acutè dentatis differt. Appendicis forma peculiaris (en forme de pique du jeu de cartes).

SCROPHULARIA LIBANOTICA Boiss. in pl. Syr. exs. 1846. (Sect. *Tomio-phyllum Lucidæ*).

S. perennis multicaulis plùs minùsve glaucescenti-cæsia præter glandulas minimas secus inflorescentiam sæpè sparsas glaberrima, caulibus teretibus vel obsoletè angulatis ascendentibus virgatis simplicibus infernè foliosis axillis superioribus sæpè ramuligeris, foliis inferioribus longiusculè superioribus breviter pedunculatis basi rotundatis vel truncatis oblongis obtusis vel acutiusculis acutiusculè lobato-dentatis vel rariùs incis, cymis pedunculo demùm patulo basi suffultis paucifloris divaricatis thyrsus angustè pyramidatum laxissimum terminalem formantibus, pedicellis calyci æquilongis, bracteis lineari-setaceis brevissimis, floribus parvis, calycis laciniis rotundis albo-marginatis, corollæ labio superiori parùm producto, appendice minimâ ovatâ subretusâ, staminibus exsertis, capsulâ rotundâ obtusâ mucronulatâ calyce paulò longiori.

Sc. Urvillæi Decaisne Flor. Sinaica non Wydl.

Hab. in fissuris rupium montis *Sanctæ Catharinæ* (Schimper), *Libani* suprâ Cedros (Boiss.), *Antilibani* suprâ Zebdani et in monte *Hermone* (Boiss.), montis *Cassii* (Boiss.), in *Tauro Ciliciæ* et in monte *Gara Kurdistanæ* si specimina incompleta, Kotschy n° 378 et 316 huc ritè refero.

A specie præcedenti differt glabritie, foliis profundius dentatis, floribus dimidò minoribus, calyce angustius marginato. Propius accedit ad *Sc. Urvillæi* Wydl cui *Sc. Oliveriana* ut varietas mihi adsocianda videtur sed hæc habet folia breviora magis rotundata obtusa obtusius lobata, flores majores, calyces latius marginatos, stamina vix exserta, appendicem reniformem acutiusculam. — *Sc. heterophylla* Willd est planta cretica nobis ignota; *Sc. heterophylla* Fl. Græc. tab. 603 ob folia pinnatisecta ad *Sc. Olympicam* potius spectare videtur.

Sc. depauperatam cl. Benth in Prodr. Cand. *S. variegatæ* MB. adsociat cui sententiæ non adnuere possum. Præter indumentum et characteres indicatos prior appendicem reniformem transversè latiorē, *Sc. variegata* appendicem linearem habent.

SCROPHULARIA CRASSICAULIS Boiss. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Tomiophyllum Lucidæ*).

Sc. basi suffrutescens multicaulis glaberrima, caulibus crassis medullosis teretibus striatis rectis parcè foliosis a basi ramosis ramis strictis lateralibus junceis sterilibus parcè foliosis, foliis integerrimis obovatis vel lineari-spathulatis linearibusve obtusis basi subattenuatis floralibus angustè linearibus acutis, cymis infimis 3 cæteris 1 floris pedunculis crassis strictis suffultis thyrsus breviter paniculatum pauciflorum terminalem formantibus, pedicellis crassis calyce subbrevioribus, bracteis e basi latiori lineari-setaceis brevibus, floribus magnis, calycis nigricantis laciniis latissimè albo-membranaceis, corollæ purpureæ labio superiori parùm producto, appendice latè reniformi, antheris inclusis, capsulâ rotundâ obtusissimâ longè mucronatâ calycem excedenti.

Hab. in valle *Talagon* montis *Elburs* Kotschy. N° 523.

Sesquipedalis, folia longiora sesquipollicaria 2 1/2 lineas lata infima sæpè multò breviora, superiora angustiora. Flores et capsulæ e maximis generis. Species distinctissima facie *Centranthi*.

SCROPHULARIA PRUINOSA Boiss. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846 (Sect. *Tomiophyllum Lucidæ*).

Sc. biennis? secūs folia et caulis partem inferiorem minutissimè et densè calcareo-punctata pruinoso-glaucescens supernè glaberrima, foliis ferè omnibus radicalibus rosulatis minutis lyrato-pinnatipartitis brevissimè petiolatis subtùs elevato-nervosis laciniis lateralibus subbinis oblongis dentatis terminali multò majori oblongà lobato-incisà lobis acutè denticulatis erispulis, caule simplicissimo basi 1-2 folia sessilia lanceolata acuta infernè incisa argutiùs denticulata gerenti paulò suprà basin in thyrsum angustum elongatum laxum abeunti, cymis 3-5 floris pedunculo brevi erecto-patulo suffultis, pedicellis calyci æquilongis, bracteis linearibus pedicello brevioribus, calycis laciniis rotundis membranà albidà undulatà denticulatà lacerà latà cinctis, corollà calycem vix excedenti purpurascenti labio superiori parùm porrecto, appendice ovato-oblongà obtusà, staminibus breviter exsertis, capsulà globosà obtusà longè mucronatà, calycem parùm excedenti.

Hab. in schistosis montis *Elburs* propè *Derbent* Kotschy. N° 38.

Planta ferè pedalis, folia cum petiolo vix sesquipollicem longa 6 lineas lata. Species indumento calyceque distinctissima propè *S. Olympicam* collocanda.

SCROPHULARIA XANTHOGLOSSA Boiss. in pl. Syr. exs. 1846 (Sect. *Tomiophyllum Lucidæ*).

Sc. basi suffrutescens multicaulis glabra caulibus angulato-striatis ascendentibus infernè foliosis paulò suprà basin in thyrsum pyramdatum abeuntibus, foliis decompositis bi vel tripinnatisectis lacinulis foliorum inferiorum minutis dentiformibus superiorum elongatis lanceolatis linearibusve acutis, cymis divaricatim bifidis pedunculo erecto-patulo rigido suffultis, floribus distantibus brevissimè pedicellatis, bracteis subulatis pedicello æquilongis, calycis laciniis ovatis latissimè albo-marginatis membranà hyalinà denticulatà, corollæ atropurpureæ labio superiori maximo basi valdè strangulato in lobos rotundos subdenticulatos bipartito, staminibus longè exsertis, appendice magnà orbiculatà flavà, capsulà breviter ovatà mucronatà calycem vix excedenti.

Hab. circà *Hierosolymam* frequens ub eam floriferam fine April. legi.

Species habitu similis formis valdè pinnatisectis *Sc. caninæ* sed ab eis sicut a *S. multifida* W., Benth. et speciebus affinibus labio superiori corollæ valdè strangulato maximo, appendice maximâ luteâ lineæ $3\frac{1}{4}$ latâ discrepans.

SCROPHULARIA MYRIOPHYLLA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846 (Sect. *Tomtophyllum Lucidæ*).

S. perennis multicaulis glaberrima nigrescens, caulibus pumilis ascendentibus teretibus simplicibus infernè foliosis, foliis breviter petiolatis ambitu oblongis tenuissimè tripinnatisectis lacinulis minutissimis, cymis breviter pedunculatis paucifloris thyrsus angustè paniculatum brevem terminalem formantibus, pedicellis calyce brevioribus, bracteis lineari-setaceis brevibus, floribus parvis, laciniis calycis membranâ albâ latiusculâ acutè denticulatâ cinctis, corollæ atropurpureæ subelongatæ labio superiori brevissimo, antheris subexsertis, appendice latè reniformi.

Hab. in regione superiori montis *Gheidagh Tauri Isaurici* (Heldr.). Fl. Julio.

Foliis et habitu *Sc. Hoppti* simillima quæ distinguitur foliis minùs tenuiter dissectis, corollæ labio superiori valdè elongato, staminibus longè exsertis, appendice lineari-lanceolatâ, calyce margine integro.

SCROPHULARIA BENTHAMIANA Boiss. (Sect. *Caninæ*?).

S. suffrutescens glaberrima glauca, caulibus teretiunculis subaphyllis ferè a basi patulè et divaricatim ramosissimis intricatis, foliis sparsis indivisis lineari spathulatis inferioribus in petiolum attenuatis superioribus sessilibus omnibus integris vel apice 2-3 denticulatis, ramulis floriferis sæpiùs abortu simplicibus rariùs bifidis, floribus minimis sparsis alternis subsessilibus, calycis laciniis rotundis angustè albomarginatis, corollâ....., capsulâ globosâ parvâ mucronulatâ calyce duplò longiori.

Hab. in *Persia* Aucher. N° 5061 et 5062, ad radices montes *Demavend* Kotschy. N° 630.

Planta habitu et floribus minimis *Sc. deserti*, *Sinicae*, et *Syriacæ* Bth. affinis ab eis foliis subintegrâ distincta, ob corollam adhuc ignotam inter *Lucidas* et *Caninas* dubia.

Ad *Sc. farinosam* Boiss. anno 1845, evulgatam ut synonymon adducenda est *Sc. longiflora* Bth. seriùs in Prod. Cand. descripta.

LINARIA LONGIPES Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846 (Sect. *Cymbalaria*).

L. glaberrima perennis, caulibus teneris prostratis filiformibus elongatis, foliis petiolo eis multoties longiori suffultis inferioribus orbiculatis basi cordatis infimis integerrimis cæteris 3-5 lobatis lobis latis obtusissimis muticis, pedunculis petiolos non æquantibus, calycis glabri minutissimi laciniis oblongis obtusis, corollæ pallidè violaceæ striatæ palato flavo, labio superiori brevi ad medium usque bifido, calcare recto corollâ dimidiò breviori.

Hab. ad muros et rupes circà *Adalia* Pamphyliæ (Heldr.). Fl. Marte.

Habitu et florum ut et foliorum magnitudine similis *L. cymbalariae* pro quâ primùm habuimus sed petioli longiores sæpè tripollicares, foliorum lobi minùs profundi obtusissimi, calycis laciniae lineæ tertiam partem tantùm longæ nos eam distinctam esse speciem suadent. *L. microcalyx* differt indumento foliisque minoribus.

LINARIA MICROCALYX Boiss. var. *acutiloba* Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.

Foliâ subtriloba lobis in foliis superioribus sæpiùs acutis. Cæterùm omnia speciei.

Hab. ad rupes promontorii *Alaya* Pamphyliæ Heldr. Fl. Aprili.

LINARIA FLORIBUNDA Boiss. in pl. Syr. exs. 1846 (Sect. *Elatinoides*).

L. perennis tota pilis densis brevibus patulis cinereo-pubescentibus basi suffrutescentibus, caulibus filiformibus prostratis basi nudis dein subfariam ramosissimis, ramis a basi floriferis spicas foliis intermixtas densas cylindricas elongatas formantibus, foliis elliptico-linearibus acutiusculis breviter petiolatis floralibus corollas superantibus omnibus integerrimis vel supremis rariùs basin versùs denticulo unico auctis, floribus axillaribus pedicello capillari calyce breviori suffultis, calyce hispidulo ad basin usque in lacinias lanceolato-setaceas partito, corollæ flavæ extùs hirtæ labio superiori vix longiori

breviter bilobo inferiori subæqualiter trilobo, calcare tenui uncato-recurvo acuto corollæ subæquilongo, capsulâ....

Hab. in agris derelictis planitie Amalecitanæ ad meridiem urbis Gaza sitæ. Fl. Mart-April (Boiss.).

Caules cæspitosi ex collo numerosissimi expansi ramosissimi, spi-cæ densæ sæpè semipedales foliis intermixtæ, folia 5-6 lineas longa 1 1/2-2 lata, corollæ eâ *L. Egyptiacæ* ferè duplò major. Species distinctissima propè *L. scariosam* Desf. collocanda.

LINARIA CÆLESYRIACA Boiss. in pl. Syr. exs. 1846 (Sect. *Linariastrum*).

L. perennis erecta glabra multicaulis, caulibus erectis elatis densè et strictè foliosis parte superiori rarò simplicibus sæpiùs ramosissimis ramis fastigiatas strictis, foliis latè lineari-lanceolatis acutissimis rigidulis parallelè multinerviis, rameis multò minoribus abbreviatis lanceolatis, floribus in spicas primùm densissimas dein elongatas dispositis, pedicello calyci æquilongo bractea oblongo-lineari æquilongâ stipato ut inflorescentia tota subglanduloso, calyce minimo parcè glanduloso-puberulo laciniis oblongo-linearibus obtusis angustissimè alboniarginatis, corollæ flavæ glabræ palato aurantiaco puberulo, calcare recto calyce vix longiori, capsulâ ovatâ calyce paulò longiori, seminibus nigris concavis lævibus marginatis.

Hab. in agris derelictis *Cælesyriæ*. Legi Julio 1846.

Planta bipedalis, folia caulina bipollicaria 3-4 lineas lata, calyx florifer vix sesquilineam longus, corollæ 5 lineas longa, calcar vix 2 lineas longum. Habitus *L. fastigiatæ* Chav. a quâ differt foliis non ovato-lanceolatis, calcare multò longiori. *L. Aucheri* Boiss. foliorum fornâ affinis differt eis angustioribus, calcare corollam subæquanti tenui, corollæ palato concolori. *L. Kurdica* differt floribus valdè dissitis, foliis angustis, calcare corollam æquante.

LINARIA MONOCHROMA Boiss. et Heldr. (Sect. *Linariastrum*).

L. perennis glaberrima caulibus ascendentibus basi denudatis dein foliosis elatis virgatis simplicibus vel supernè paniculato-ramosis, foliis obscurè virentibus strictis lanceolatis acutis rameis multò minoribus linearibus, floribus in spicam longam densè confertis pedicello calyce subbrevisiori ut inflorescentia tota glaberrimo suffultis,

bracteis lineari-setaceis pedicellis longioribus, calycis minimi laciniis lineari-setaceis acutis, corollâ pallidè sulphureâ palato concolori hirsuto calcare tenui acuto corollæ æquilongo, capsulâ globosâ calyci æquilongâ, seminibus pallidis triquetris facie rugosissimis.

L. genistifolia Mill. var. pl. Anat. exs. 1846.

Hab. in campis *Pisidiæ* et *Isauriæ* rara, circâ *Beycheher*, *Egirdir*, *Koniah*. Fl. Junio (Heldr.)

Planta 2-3 pedalis. Folia majora sesquipollicaria 2-4 lineas lata, calyx florifer lineam unam, corolla cum calcare 7-8 lineas longa. Hanc primum pro varietate *L. genistifoliæ* habuimus sed differt floribus in spicas densas nec laxas dispositis brevius pedicellatis, calycis minoris laciniis multò angustioribus, palato corollæ concolori.

LINARIA LINEOLATA Boiss. in Kotschy pl. exs. Pers. bor. 1846. (Sect. *Linariastrum*).

L. perennis glaucescens parte inferiori glaberrima, caulibus erectis elatis tenuiter virgatis simplicibus vel supernè parcè ramulosis, foliis densis strictis longissimis angustissimè linearibus acutiusculis, racemo terminali denso oblongo fructifero elongato, pedicellis calyce triplò brevioribus, bracteis oblongis pedicello longioribus, calycis laciniis lato-linearibus acutiusculis margine angustissimè membranaeis, corollæ glabræ lutescentis violaceo-lineolatæ palato concolori hirsuto, calcare hirsuto corollâ vix breviori, capsulâ ovato-rotundâ, seminibus....

Hab. in fauce *Dudera* montis *Elburs*. Kotschy pl. Pers. bor. n° 268.

Variat pedicellis calycibusque glaberrimis vel lanâ crispulâ brevi obsitis, caules 1 1-1½ pedales, folia 1 1½-2 pollicaria lineam dimidiam lata, calyx sesquilineam, corolla 8-9 lineas longa. Species pulchra cujus semina non vidi sed quæ videtur præsertim affinis *L. strictæ* foliis brevioribus, floribus pedicello calyci æquilongo vel longiori suffultis, calyce duplò longiori calcare corollam superanti tamen diversæ.

LINARIA ICONIA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846 (Sect. *Linariastrum*).

L. glaberrima multicaulis, caulibus ascendentibus vel decumbentibus ramosis densiusculè foliosis brevibus, foliis linari-subulatis acu-

tiusculis, floribus in spicas breves laxas dispositis, pedicellis strictis calyce brevioribus, bracteis setaceis pedicellos æquantibus, calycis laciniis lineari-setaceis acutis albomarginatis, corollæ violacæ palato aurantiaco-fulvo, calcare subulato recurvo corollæ æquilongis, capsulâ ovatâ calycem non superanti, seminibus oblongo-curvatis subreniformibus acutè angulatis reticulatis.

Hab. in arenosis planitie *Kontah* (Heldr.)

Foliis, florum magnitudine affinis *L. corifoliæ* sed distincta caulibus spicisque magis abbreviatis, floribus brevius pedicellatis, calcare longò subulato recurvo nec brevi conico recto, etc.

LINARIA MODESTA Boiss. (Sect. *Linariastrum*).

L. anna glaberrima, caule nano erecto folioso a basi parcè ramuloso, foliis infimis oblongis cæteris lanceolatis acutiusculis, floribus 2-3 secus ramulos laterales et terminalem subsessilibus strictis, bracteis linearibus calycem æquantibus, calycis laciniis oblongo-linearibus acutiusculis, corollæ minimæ calyce ferè occultatæ labiis brevibus violascentibus, palato hirtò aurantiaco, tubo flavo, calcare corollâ plus duplò breviori, capsulâ calyce breviori, seminibus oblongo-reniformibus punctato-inpressis.

Hab. in arenosis *Arabie petreæ* loco proprio non notato (Boiss.)

Bipollicaris, folia 3-4 lineas longa, calyces 2 lineas longi. Similis speciminibus minimis *L. micranthæ* a quâ differt seminum formâ floribusque sparsis. E descriptione affinis *L. minutifloræ* propè quam collocanda.

LESQUEREUXIA Boiss. et Reut.

Calix tubulosus basi bibracteatus sub 11 nervis inter nervos elevatos membranaceus ultrâ tertiam partem obscure bilabiatus labiis ad basin usque superiori tripartito inferiori bipartito laciniis subæqualibus subfoliaceo-dilatatis latè oblongo-linearibus obtusis. Corolla longè tubulosa bilabiata labiis subæquilongis superiori compresso galeato apice retuso, inferiori breviter trilobo lobis integris intermedio paulò majori. Palatum egibbosum. Stamina quatuor sub galeâ approximata subæqualia. Anthæræ magnæ medifixæ obliquæ biloculares sagittatæ loculis basi discretis muticis subæquilongis. Ovarium compressum

oblongum biloculare multiovulatum. Stylus longus supernè sensim incrassatus apice incurvus. Stigma parvum truncatum subcapitatum. Capsula...

Herba Orientalis perennis facie *Castillejam* vel inter *Labiatas Lallemantiam* vel *Ajugam salicifoliam* referens. — Genus *Euphrasiearum* inter *Rhinantheas* juxtà *Cymbariam* et *Bungeam* collocandum a priori corollà tubulosà nec campanulatà, palato egibboso, staminibus æquilongis, antheris muticis, calycis valdè nervosi laciniis foliaceis; a posteriori galeà retusà non acuminatà calyce quinque nec quadripartito distinctum. Dolemus fructum seminaque nobis adhucdum ignota esse. Dicavimus cl. et amicis. L. Lesquereux botan. peritissimo qui librum classicum de naturà et formatione paludum torfaceorum scripsit atque de muscologià Helveticà et Boreali-Americànà optimè meritis est.

LESQUEREUXIA SYRIACA Boiss. et Reut.

L. perennis tota breviter et patulè puberula siccitate nigrescens. Caules virgati teretes erecti 1 1/2-2 pedales a basi foliosi supernè oppositè et parcè ramosi paniculati rariùs simplices, folia trinervia sessilia basi subattenuata oblongo-lanceolata obtusiuscula integerrima, inferiora 1 1/2-2 pollices longa 2-6 lineas lata, floralia calyces superantia elliptico-linearia acutiuscula. Axillæ inferiores fasciculos foliorum minorum edentes. Flores oppositi in axillis foliorum superiorum sessiles erecti stricti intervallo foliorum paulo longiores spicas semipedales et ultrà rectas longas terminales formantes. Bracteæ ad calycis basin angustæ lineares ejus tubum æquantes. Calycis valdè pubescenti-visciduli tubus sex lineas longus elevato-costatus inter costas angustè membranaceus, laciniæ 3-3 1/2 lineas longæ lineam unam ferè latæ, ea labii inferioris paulò longiores angustioresque. Corolla purpurea 12-14 lineas longa angusta parte tertià suà exserta tubo in limbum vix ampliato labio superiori pubescenti inferiori glabro. Antheræ lineam longæ faucem non superantes.

Hab. in rupestribus dumosis vallis inferioris *Orontis* in vià quæ secùs fluvium a *Suadiâh Antiochiam* ducit. Planta serotina florere incipiebat fine Junii (Boiss.).

PEDICULARIS PYCNANTHA Boiss. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Verticillatæ erostres*.)

P. humilis, collo squamis lanceolatis fusciscentibus vestito, foliis radicalibus ambitu lanceolatis in petiolum attenuatis pinnatipartitis laciniis triangulari-lanceolatis acutissimis acutè denticulato-lobatis a medio ad basin et apicem folii diminutis, costâ folii latâ subdentatâ, caule foliis æquilongo suprâ medium verticillatim 3-4 phyllo, foliis caulinis longis lanceolatis acuminatis profundè pinnatilobatis lobis breviter triangularibus, spicâ densissimâ ovatâ oblongâve, bracteis lanceolatis acutis calyces æquantibus margine ciliatis integris infimis rariùs dente laterali irregulariter auctis, calyce papillis albis patulis crispis parcè lanato ovato subinflato albido nigrescenti-nervoso dentibus breviter triangularibus acutis integris, corollâ pallidè carneâ glabrâ subhorizontali tubo longiusculè exserto, galeâ lineari rectâ obtusissimâ prorsùs edentulâ basi subangustatâ, labii galeâ brevioris lobis lateralibus latis inferiori subrotundo basi valdè strangulato.

Hab. in monte *Totschal* propè *Teheran* ad nives Kotschy pl. exs. Pers. bor. N° 166.

Folia radicalia 3-4 pollicaria versùs medium pollicem ferè lata, folii costa media 2 lineas lata, folia caulina sesquipollicaria 3-4 lineas lata. Spicæ 1 $1\frac{1}{2}$ -2 pollices longæ. Calyx 4 lineas, corolla 8 lineas longa. Species pulchra distinctissimaque.

VERONICA LEOCARPA Boiss. (Sect. *Chamædrys Pentasepalæ*).

V. perennis glabra, caulibus ascendentibus elatis sublente puberulis rigidis, foliis omnibus sessilibus a basi subcordatâ oblongis acutiusculis regulariter dentatis dentibus brevibus acutis ascendentibus, racemis oppositis ex axillis supremis 3-5 rectis longis virgatis, pedicellis erectis capsulâ subbrevioribus basi bracteolâ lineari eis æquilongâ suffultis, calycis laciniis linearibus acutis capsulam æquantibus, corollâ carneâ, capsulâ nitidâ brevissimè et sinu acuto oboordatâ margine subincrassatâ faciebus nervoso-reticulatâ.

Hab. in regione montanâ nemorosâ jugi *Cassii Syriæ* borealis Legi fructiferam Junio.

Caules pedales, folia pollicem aut paulò ampliùs longa, sex lineas lata, racemi semipedales. Affinis *V. latifoliæ* a quâ sat mihi differe

videtur glabritie foliorum et inflorescentiæ, præsertim capsulis pedunculo breviori axi adpresso subincrassato suffultis obsoletius emarginatis margineque manifestè incrassatis. Flores quorum tantum vestigia vidi carnei sunt et illis *V. latifoliæ* minores esse videntur.

VERONICA REUTERIANA Boiss. (Sect. *Veronicastrum annuæ*).

V. annua nana parcè glandulosa puberula a basi ramosa, foliis paucis minimis ovato-oblongis integris breviter petiolatis, floralibus lineari-subspathulatis obtusis basi attenuatis pedicello æquilongis, pedicellis fructiferis patulis apice sursum recurvis calyce triplò longioribus crassiusculis capsulæ æquilongis, calycis laciniis ovato-oblongis obtusis capsulâ dimidiò brevioribus, capsulâ margine parcè glandulosâ ferè ad basin usque bipartitâ loculis obovatis ferè divergentibus, seminibus in utroque loculo 4-5 oblongis utrinquè convexulis, stigmate loculis dimidiò breviori.

Hab. circâ *Diarbekir*, Kotschy pl. Mesop. N° 240.

Bipollicaris, racemi pollicares. Affinis *V. acinifoliæ*, *V. Syriacæ* et *V. perpusillæ*; prior differt foliis latis dentatis, racemis longis angustis foliatis, pedicellis brevibus erecto-patentibus, calyce capsulâ semibifidâ vix breviori; *V. Syriaca* pedicellis capillaribus elongatis styloque longissimo longius ab eâ distat, ambo quoque loculos 7-8 spermos nec 4-5 spermos habent. *V. perpusilla* deniquè capsulâ bipartitâ quoque donata habet pedicellos incurvos, calycem capsulæ æquilongum, capsulas dimidiò minores.

V. Elbursensis Boiss. in pl. Pers. bor. Kotschy 1846 sub N° 100 a *V. bilobâ* non differt.

VERONICA RUBRIFOLIA Boiss. (Sect. *Omphalospora*).

V. annua minutissima tota pilis glandulosis patulis tenuissimis sub lente puberula, radice filiformi simplici, foliis paucis ad collum plantæ minutis ovatis subpetiolatis integerrimis subtus rubris, racemis 1-2 brevissimis radicalibus, pedicellis patulis apice sursum recurvis calyci æquilongis, bracteis lineari-spathulatis pedicello sublongioribus, calycinis laciniis oblongis obtusis capsulam æquantibus, corollâ carneâ calycem æquantî, capsulâ parcè glandulosâ ovato-rotundâ apice brevissimè emarginatâ stylo emarginaturâ longiori superatâ, seminibus oblongis concavis.

Hab. circà *Schah-Neschin* in monte *Elburs* propè *Derwent* Alt. 7000' - 8000'. In monte *Kuh Daëna Persiæ australis* Kotschy pl. Pers. austr. N° 717 a.

Planta $1\frac{1}{2}$ -1 pollicaris. Folia 3-4 lineas longa. Racemus pauciflorus. Capsula vix $1\frac{1}{4}$ lineas diametro lata. Propè *V. præcocem* collocanda a quâ notis datis longè differt.

VERONICA VISCOSA Boiss. (Sect. *Veronicastrum annuæ*).

V. annua nana, caule subnullo, foliis minutis oblongis obtusè crenatis obtusis brevissimè petiolatis, racemo simplici aut basi subramoso, brevissimo toto patulè et densissimè villosoglanduloso rufescenti, pedicellis capsulâ brevioribus patulis extremitate sursùm recurvis, bracteis oblongo-lanceolatis pedicello sublongioribus, calycis laciniis ovato-ellipticis utrinquè attenuatis acutis capsulam æquantibus, capsulâ glabrâ ad medium usquè sinu acuto bilobâ loculis divaricatis obtusis reticulato-nervosis, stylo sinu æquilongo, seminibus in loculo quatuor planis latè marginatis ovatis.

Hab. in regione alpinâ *Libani* in arenosis (Boiss.). Fl. Julio.

Planta 1 $1\frac{1}{2}$ pollicaris, folia inferiora tres lineas longa. Capsula 2 $1\frac{1}{2}$ lineas lata. Propè *V. vernam* collocanda a quâ foliis indivisis, racemis brevissimis, capsulâ majori, sepalis latis, seminibus duplè majoribus differt.

Obs. *Ver. Cariensis* Boiss. Diagn. IV. ex cl. Bentham est *V. cuneifolia* Don. mihi tunc non nota.

LABIATÆ.

THYMUS SYRIACUS Boiss. (Sect. *Serpyllum*).

Th. fruticosus dumosus, ramis numerosis simplicissimis erectis albidis sub lente hirsutis, foliis distantibus rigidis angustè lineari-lanceolatis patentibus utrinquè attenuatis acutiusculis glanduloso-punctatissimis præter cilia pauca versùs basin obvia glaberrimis, floribus in capitula terminalia dense ovata confertis, bracteis oblongis acutis flores æquantibus sub lente brevissimè et densè hirtellis punctatissimis multinerviis, calycis breviter et patulè hirtelli viridis glanduloso-punctati labio superiori amplo oblongo apice minutissimè

tridenticulato inferiori in dentes setaceos ciliatos diviso, corollæ pallidè carneæ parcè hirtulæ glanduloso-punctatæ tubo breviter exserto.

Th. lanceolatus, β *angustifolius* Blh. in Dc. Prodr.

Hab. in sicùs *Cælesyriæ* propè *Balbeck*, circà *Aleppum* (Boiss.). In *Mesopotamiâ* Kotschy. N° 428.

Caules lignosi 3-4 pollicares ramos erectos dumosos 6-9 pollices longos edentes. Folia 5-7 lineas longa lineam unam lata, capitula magnitudinis nucis avellanæ. Calyx post anthesin ferè 3 lineas longus.

A *Th. lanceolato* Desf. Africæ borealis præter formam foliorum notis pluribus mihi discrepare videtur. Magis affinis *Th. striato* DC Prodr.

— *Th. zygi*. Fl. Græca non L. sed elatior, rami rigidi, folia patula breviora, bractæ non attenuato-acuminatæ, calycis labium superius obsolete brevissimè nec longè denticulatum.

Thymi species ex montibus inter *Beychehr* et *Koniah* sub *Th. striati* nomine in pl. Heldr. Anat. 1846 distributa est *Th. zygioides* Grisebach.

MICROMERIA HISPIDA Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. et Dc. Prodr. XII, pag. 215 (Sect. *Piperella*).

M. suffrutescens tota densè et patulè hispida grisea, caulibus abbreviatis, foliis parvis sessilibus ovalis acutiusculis margine revolutis, cymis 1-3 floris axillaribus pedunculo folio breviori suffultis, bracteolis setaceis pedicellos subæquantibus, calycis cylindrici densè hispidi dentibus subulato-setaceis tubo triplò brevioribus, fauce pilosulâ, corollæ tubo breviter exserto.

Hab. in rupestribus submontosis *Cretæ*, inter *Maglia* et *Kainou-rochorio* Eparchiæ *Mirabello* (Heldr.). Aprili, 1846.

Folia et inflorescentia pauciflora *M. Sphacioticæ* a quâ abundè differt indumento totius plantæ multò copiosiori, ramis crassioribus, calycis 2 lineas ferè longi dentium proportionè diversâ. Flores magnitudinis eorum *M. Græcæ* a quâ caulibus abbreviatis, foliorum formâ, indumenti naturâ, cymis paucifloris differt.

MICROMERIA SPHACIOTICA Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1847, et Dc. Prod. XII, pag. 220 (Sect. *Piperella*).

M. basi suffrutescens diffusa, ramis tenuibus filiformibus flexuosis patulè hirsutis prætereaque pube brevissimâ glandulosis, foliis par-

vis sessilibus ovatis acutis margine subrevolutis glandulosis hirsutis viridibus subtus nervosis, cymis 1-3 floris axillaribus oppositis pedunculo folio breviori suffultis, bracteis setaceis pedicello dimidiò brevioribus, calycis parvi patulè hispiduli ovato-cylindrici dentibus æqualibus setaceis tubo dimidiò brevioribus, fauce subnudà, corollæ tubo incluso.

. Hab. in rupestribus regionis sempervirentis *Cretæ* in fauce *Ara-tana* provinciæ *Sphakia* (Heldr.). Fl. Jul. 1846.

Caules 3-4 pollicares tenuissimi intricati flexuosi patulè hirsuti, folia 1 1/2-2 1/2 lineas longa 1-2 lata, calyces lineam unam longi, tota planta pallidè virens. Affinis *M. parvifloræ* et *M. microphyllæ* a priori hispiditate, foliorum formà, a posteriori caulibus tenuissimis, cymis paucifloris, floribus minimis distincta.

MICROMERIA XYLORRHIZA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846 et DC. Prodr. tome XII, pag. 217. (Sect. *Piperella*).

M. rhizomate lignoso atrobrunneo, collo multicipiti, caulibus nanis erectis cæspitosis densè foliosis sæpè parte superiori ramulo auctis velutinis, foliis sessilibus ovatis vel oblongo-linearibus margine revolutis obtusis utrinquè pubescenti-griseis, floribus in axillis superioribus solitariis rariùs 2-3 nis breviter pedunculatis folia vix excedentibus, bracteolis linearibus pedunculos superantibus, calycis conico-cylindrici patulè hirsuti nervosi dentibus subulatis tubo triplò brevioribus fauce villis albis clausà, corollæ hirsutæ tubo incluso.

Hab. in fissuris rupium *Tauri Pisidici* et *Lycaonici* alt. 5000/-6000' in monte *Boudroun* et monte *Anemas* Heldr. Fl. Aug.

Rhizoma lignosum cortice nigro vestitum inter saxa sæpiùs compressum tortuosum edens cæspites densos caulibus 1-2 pollicaribus densè foliosis formatos. Folia 2-4 lineas longa 1 1/2-2 lata. Flores inter folia superiora suboccultati breviter pedunculati sæpiùs solitarii 2 lineas circiter longi. Species distinctissima propè *M. approximata* collocanda.

MICROMERIA NUMMULARIFOLIA Boiss. in pl. Syr. exs. 1846 (Sect. *Piperella*).

M. basi suffrutescens nana densè cæspitosa tota pilis longis patulis albis in parte superiori plantæ copiosioribus molliter hirsuta, caudi-

culis procumbentibus, ramis filiformibus rubellis ascendentibus, foliis sessilibus integerrimis ovatis obtusiusculis basi minutè cordatis inferioribus distantibus, floralibus diminutis inter se approximalis calyces æquantibus, floribus solitariis axillaribus oppositis pedicello calyce breviori suffultis racemos terminales oblongos basi laxos apice confertos formantibus, calyce longè et molliter albo-hispido glanduloso-punctato dentibus tubo basi æquali subduplò longioribus e basi lenceolatà setaceis æqualibus apice subincurvis, corollà purpureà hirtulà calycem breviter superanti.

Hab. in rupestribus siccis ad basin rupium calcarearum *Libani* supra pagum *Eden* (Boiss.). Fl. Julio.

Rami 2-4 pollicares tenuissimi, folia 3-4 lineas longa 2 1/2-3 lata, calyx 2 1/4 lineas longus, corolla tres lineas longa. Species pulchella habitu *Calamintham Corsicam* Bth. referens sed characteribus omninò *Micromeria* adnumeranda.

MICROMERIA LIBANOTICA Boiss. (Sect. *Pseudomelissa* Bth.).

M. basi fruticulosa multicaulis totu indumento tomentoso densissimo brevi canescens, caulibus gracillimis simplicibus pumilis erectis, foliis sessilibus parvis ovatis basi rotundatis apice subangustatis obtusis vel acutiusculis, floralibus diminutis summis ad bracteas lineares brevissimas reductis, cymis axillaribus brevissimè pedunculatis densiusculè 5-7 floris inferioribus folia paulò superantibus verticillastros remotos formantibus, pedicellis capillaribus, bracteolis brevissimè setaceis, calyce breviter hirtò tubuloso-obconico basi æquali dentibus 3 inter se æqualibus brevibus triangularibus acutis tubo quadruplò brevioribus, corollæ roseæ hirsutæ tubo breviter exserto.

Hab. in *Libano* suprâ *Cedros* (Labill. ! Boiss.).

Planta fragillima breviter et molliter cano-grisea, caules numerosissimi semipedales, folia 4-5 lineas longa 3-4 lata. Racemi 3-4 pollicares basi infernè foliati, calyx sesquilineam, corolla 2 1/2 lineas longa. Pulchra species propè *M. marifoliam* Bth. collocanda.

CALAMINTHA ORIGANIFOLIA Boiss. (Sect. *Clinopodium*).

C. basi suffrutescens, caudiculis prostratis nudis, caulibus ascendentibus remotè foliosis flexuosis glabris vel sub lente minutissimè hirtulis, foliis subsessilibus ovato-rotundis obtusis subtùs elevato-

nervosis margine subrevolutis sub lente brevissimè hirtulis glanduloso-punctatis, verticillastris densè multifloris subsessilibus remotis, foliis floralibus oblongis petiolulatis verticillo multò minoribus, bracteolis lineari-lanceolatis calyces non æquantibus, calycis valdè glanduloso-punctati tubo sub lente brevissimè hirtulo bilabiato labiis æquilongis ciliatis superiori ad medium usquè tridentato dentibus triangularibus acutis, inferiori ad basin usquè in dentes e basi lanceolatà subulatos fisso, fauce barbatà, corollæ tubo calycem paulò superanti.

Clinopodium organifolium Labill. Dec. 4 tab. 9 (calycis dentibus malè triangularibus exhibitis). — *Micromeria* ? *organifolia* Bth. in Dc. Prodr.

Hab. in *Libano* (Labill. Pestalozza!).

Var. *velutina* Boiss. et Heldr. — Tota planta velutino-grisea, folia minùs nervosa margine vix revoluta, floralia verticillastris paulò breviora, labii inferioris calycis dentes a basi subulati, corolla paulò longiùs exserta.

Cal. glomerulosa Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. Dc. Prodr. XII, pag. 234.

Hab. inter lapides deciduos montis *Davros Dagh* Pisidiæ suprà *Isbarta*. Alt. 8000' (Heldr.). Aug. 1846.

Caudiculi subterranei elongati corticosi, caules procumbentes basi nudi 6-10 pollicares, folia 3-4 lineas longa 3 lata. Verticillastri 1-2 pollices distantes. Tota planta valdè odora. Hanc ut speciem propriam primùm habueramus sed notæ quibus a plantà Libanoticà differt nobis non sat graves esse videntur.

CALAMINTHA STAMINEA Boiss. (Sect. *Clinopodium*).

Micromeria staminea Boiss. et Hohenacher. Diagn. pl. br. N° 5.

Hab. in *Kurdistanà* (Kotschy).

Hæc species quamvis calyce obscurè bilabiato donata propter affinitatem cum specie sequenti et *C. organifolid* ad *Calaminthas* absque dubio transferenda est.

CALAMINTHA FLORIDA Boiss. (Sect. *Clinopodium*).

C. perennis, caulibus basi nudis corticosis ascendentibus dein erectis puberulis, foliis subsessilibus ovatis obtusis virescentibus

glandulosis brevissimè hirtulis, verticillastris 2-4 multifloris subsessilibus remotis, foliis floralibus oblongis verticillastro brevioribus, bracteolis linearibus acutis calyce triplò brevioribus, calycis hirsuti valdè glanduloso-punctati subincurvi bilabiati labiis æquilongis superiori ad medium usquè tridentato dentibus triangularibus acutis inferiori ad basin usquè in dentes subulatos diviso, fauce villosà, corollæ tubo calyce sesquolongiori, staminibus longè exsertis.

Hab. in monte *Tauro Ciliciæ* Kotschy. N° 478.

Affinis speciei præcedenti quæ differt indumento totius plantæ brevissimo pruinoso, foliis majoribus, verticillastris paucifloris numerosioribus magis approximatis et præsertim calycis elongati vix bilabiati dentibus omnibus subulatis rectis nec inferioribus auticè porrectis.

CALAMINTHA PAMPHYLICA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846 et Dc. Prodr. XII, p. 227. (Sect. *Calamintha*).

C. perennis, caulibus prostratis ascendentibusque tenuibus fragilissimis basi nudis filiformibus patulè villosis, foliis petiolatis triangulari-ovatis basi truncatis subcordatis acutiusculè vel obtusè crenato-dentatis acutis utrinquè sed paginà inferiori copiosius griseo-velutinis, cymis subtrifloris ex axillis superioribus ortis pedunculo petiolo subæquanti suffultis, bracteolis linearibus pedicellos superantibus, calycis tubulosi elongati parçè hispidi obscurè bilabiati dentibus omnibus subæqualibus a basi triangulari acuminatis, labii inferioris subrecurvis, corollæ tubo calyce duplò longiori, staminibus non exsertis.

Hab. ad rupes calcareas montiam Pamphyliæ orientalis, regio superior montis *Ghibelleis* suprà *Alaya*. Fl. Aprili (Heldr.)

Caules basi filiformes repentes dein erecti fragillini parçè ramosi 3-6 pollicares, folia circiter 4-lineas longa 4-5 lineas basi lata petiolo eis subæquilongo suffulta, cymæ ex axillis supremis oriundæ, calyx 4 lineas, corolla 9 lineas longi. Juxtà *Cal. grandifloram* collocanda habitu et formà foliorum distinctissima.

CALAMINTHA INCANA Boiss. et Heldr. in Dc. Prodr. XII, p. 226. (Sect. *Calamintha*).

C. perennis tota pilis albis crispulis brevibus densè albo-tomentosa, caulibus basi procumbentibus demùm induratis dein ascendentibus

patulè ramosissimis, foliis parvis brevissimè petiolatis orbiculatis integerrimis vel obsoletissimè subrepandis subtùs elevatim lineato-nervosis, floralibus sensim diminutis, verticillastris subsextifloris subremotis racemos subsecundos laxos longos formantibus, pedicellis inæqualibus calyce longioribus folia floralia æquantibus superantibusve, calycis breviter hirsuti vix ad tertiam partem bilabiati nervoso-striati labio superiori tridentato patulo-subrecurvo dentibus brevissimis triangularibus, inferioris vix longioris dentibus subincurvis lanceolato-subulatis, fauce intùs villosà, corollæ pubescentis calyce 2 1/2 plò longioris labio superiori roseo emarginato inferiori pallido latè trilobo lobis rotundatis.

Thymus incanus Fl. Græca tab. 577. — *Melissa Cretica* Russell Aleppo ex Benth. — *Melissa? incana* Bth. Labiat.

Hab. circà *Athenas* (Spruner, Heldreich), in *Syrià* Russell ex Bth.

Caules procumbentes 1 1/2 pedales a basi ramosissimi infernè demùm lignosi cortice tenui pallidè rufescenti in lacinias secedenti obsiti. Folia majora diametro 3-3 1/2 lin. lata ea *Origani majoranæ* referentia. Calyces fructiferi 1 1/2 lineas longi. Species distinctissima inter sectiones *Calamintham* et *Acinos* subdubia.

CALAMINTHA SPRUNERI Boiss. (Sect. *Calamintha* Bth.)

C. perennis, caulibus ascendentibus patulè et longè ramosis albo-hispidis ramis breviter et adpressiusculè canescentibus, foliis petiolatis caulinis oblongis obtusissimè crenulatis hirsuto-canescentibus rameis multò minoribus ovatis vel ovato-spathulatis brevissimè velutino-cinerascentibus integris, pedunculis 1-3 floris petiolo vix longioribus, pedicellis capillaribus calyce brevioribus, calyce brevi fructifero recto tubo cylindrico labii superioris dentibus brevissimis semper rectis e basi ovatà abruptè attenuatis, inferioris multò longioribus subulatis adpressiusculè et parcè ciliatis, corollæ carneæ hirtulæ tubo calyce subduplò longiori, acheniis rotundatis subcompressis.

Hab. in *Græcià* circà *Athenas* undè amiciss. Spruner sub nomine *Th. nepetæ* misit.

Caules proceri ramis lateralibus semipedalibus longioribusque. Folia caulina 15-16 lineas longa 8-9 lata, ramealia multò minora. Flores et calyces magnitudinis eorum *C. Nepetæ* cui inter omnes propiùs accedit sed quæ differt foliis caulinis multò minoribus omni-

bus deltoideis, cymis multifloris, dentibus calycinis superioribus triangulari-lanceolatis.

CALAMINTHA SUAVEOLENS Boiss. (Sect. *Acinos*).

C. perennis tota indumento molli patulo denso canescens, radice lignosâ multicipiti, caulibus ascendentibus elongatis subsimplicibus strictis virgatis suprâ medium floriferis, foliis breviter petiolatis ellipticis vel elliptico-linearibus rigidis nervosis basi attenuatis acutis submucronatis parcè et remotè denticulatis, floribus 6-9 breviter pedicellatis strictis verticillastra numerosa approximata folia floralia subsuperantia formantibus, calyce patulè hirsuto basi gibbo rectiusculo dentibus labii superioris et inferioris omnibus subæquilongis a basi paulò latiori subulatis rectis tubo quadruplò brevioribus, corollæ roseæ hirsutæ calyce duplò longioris tubo sursùm inflato.

Thymus suaveolens Sibth. Prodr. Fl. Græcæ I, p. 420. *Cal. Patavina* var. *acuminata* Bth. in DC. Prodr. ex parte non Grisebach.

Hab. in montibus Græciæ, *Parnassus* ad *Arachova* (Spruner!) *Táygetus* loco *Lakkomata* dicto suprâ *Anavryti* (Heldreich), *Olympus Thessaliæ* (Aucher N° 1641).

C. Patavina cui nostra planta hucusque ut varietas relata fuit summopere differt caulibus minùs strictis durisque, foliis ovato-subdeltoideis glabriusculis, verticillastris remotis, calycis dentibus superioribus eis labii inferioris duplò latioribus nec eis subsimilibus. Descriptio Sibthorpii et locus ab eo indicatus optimè conveniunt. *Acinos acuminatus* Friw. ex descriptione alia species esse videtur.

DORYSTÆCHAS Boiss. et Heldr.

Calyx florifer breviter campanulatus 10 nervis bilabiatus labio superiori paulò longiori indiviso rotundato ovato inferiori bipartito dentibus triangularibus acutis, fructifer valdè auctus elongatus ellipticus ore clausus. Corolla tubo exserto exannulato fauce vix ampliata, labium superius paulò brevius breviter bilobum inferiùs trilobum lobis lateralibus planis inferiori convexo. Stamina duo, filamenta recta parallela subdistantia. Antheræ vix exsertæ biloculares ferrum equinum referentes loculis oblongo-linearibus subincurvis basi tan-

tum inter se et filamento adnatis. Stylus bifidus. Carpidia oblongo-linearia acuta. Suffrutex Anatolicus totus griseo-tomentosus glandulosissimus foliis lanceolatis hastatis, verticillastris in spicas longas terminales approximatis.

Pulchrum singulareque genus primâ fronte etsi flores minimi sint foliis et habitu *Salviam* referens sed staminum characteribus et absentia connectivi ab eis ut et a totâ *Monardearum* tribu distinctissimum, juxta *Perowskiam* et *Meriandram* quæ connectivo brevissimo gaudent collocandum. Calycis forma, staminumque directio quamdam affinitatem cum Satureineis quoque indicant.

DORYSTÆCHAS HASTATA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. DC. Prodr. XII, p. 261.

Suffrutex semipedalis vel longior. Caules lignosi nudî cortice griseâ vestiti pennâ anserinâ crassiores ascendentes subtortuosi supernè ramosi. Rami juniores griseo-tomentosi abbreviati 3-8 pollicares infernè foliosi. Folia breviter tomentella facie superiori-eximie rugulosa griseo-virescentia inferiori canescentia lanceolato-hastata a basi latiori ad apicem sensim attenuata obtusa basi cordata auriculis divaricatis triangularibus obtusis obtusè denticulato-crenata petiolo eis 2-3 plò breviori suffulta 1 1/2-2 1/2 pollices longa basi 8-15 lineas lata. Folia floralia ad verticillorum basin omninò dissimilia sessilia acutiuscula lanceolato-linearia integerrima flores inferiores æquantia vel superantia cæteris floribus breviora. Verticillastris 10-15-flori numero 15-20 inter se distincti sed approximati spicam tenuem cylindricam 2-4 pollicarem terminalem formantes. Bracteæ nullæ. Flores minimi arcuè congesti sessiles. Calyces pilis albis brevibus hirsuti prætereâque glandulosissimi floriferi sesquilineam tantum longi campanulati bilabiati labiis tubo vix duplò brevioribus superiori latiori ovato-rotundato inferiori vix breviori bipartito lobis triangularibus acutis, fauce nudâ. Calyx fructifer accrescens elliptico-cylindricus basi subattenuatus ore labiis conniventibus clausus 4-5 lineas longus. Corolla 2 1/2 lineas longa glabra punctis glandulosis valdè aspersa e sicco alba vel pallidè carnea calyce duplò longior, tubus breviter exsertus, labium superius rectum longitudinaliter subplicato-convexum breviter bifidum lobis rotundatis, labium inferius trilobum lobis lateralibus ovatis planis intermedio paulò longiori convexo. Filamenta

ad 2½ usque corollæ adnata. Antheræ vix exsertæ loculis longitudinaliter hiantibus basi adnatis cæterum liberis subdivergenti-curvatis. Stylus inclusus. (Adest forma fæminea vel sterilis corollis omnibus staminibus orbatis stylis exsertis tubo corollino e calyce non exserto.) Achenia angusta e basi latiori attenuata acuta lineam longa. Spica fructifera propter calyces elongatos axi strictè adpressos densa compacta. Tota planta gratissimè odora.

Hab in *Lyciâ* interiori propè *Almalu* (Pestalozza), in glareosis ad rivulos montis *climax* propè *Kourmalu* in *Pamphyliâ Lyciæ* finitimâ Heldr. Maio 1843.

SALVIA RUBIFOLIA Boiss. (Sect. *Eusphace*).

S. caulibus basi suffrutescentibus dein herbaceis elongatis procumbentibus quadrangulis patulè et longè ut et petioli pilis albis sparsis hispidis, foliis longè petiolatis viridibus trisectis segmentis petiolulatis ovatis oblongisve obtusis obtusè crenatis terminali duplò majori basi sæpè cordato, infimis minoribus rugulosis aliquandò pinnatis bijugis segmentis inferioribus minimis, omnibus subtùs ad nervos breviter papillosis glanduloso-punctatis, petiolis et costâ mediâ foliorum inferiorum sæpè complanatis, foliis floralibus oblongo-lanceolatis acutis inferioribus petiolos æquantibus, floribus brevissimè pedicellatis in verticillastra ramosa 4-6 flora dispositis, calyce tubuloso-campanulato pilis longis albis patulis hispido præterea glanduloso-punctato labio superiori bi inferiori tridentato dentibus æquilongis e basi triangulari subulato aristatis subpungentibus, corollâ cærulescenti calyce duplò longiori.

Hab. in rupestribus umbrosis *Antilibani* circà *Rascheya* et alibi ubi floret Maio ineunte (Boiss.)

Caules sæpè bipedales, petioli bipollicares, foliorum segmentum superius pollicem vel sesquipollicem longum latumque. Calyx 10-12 lineas corolla sesquipollicem et ampliùs longa. Affinis *S. trichoclada* et *S. pilifera*; prior differt indumento ramorum aspero substrigoso, calycis brevis 6-7 lineas tantùm longi labio superiori minutè tridentato; posterior habet ramos teretes glabros, calycem breviter papillosum dentibus brevissimis acutis nec aristatis.

SALVIA BENTHAMIANA Boiss. in Dc. Prodr. XII, pag 269. (Sect. *Eusphace*).

S. perennis suffruticosa ramis ascendentibus infernè glabris supernè puberulis ciliatisque, foliis pinnatisectis 1 rariùs bijugis segmentis viridibus minutè puberulis elevato-lineatis rugosulisque terminali multò majori oblongo vel obovato denticulato longè cuneato petiolulato lateralibus linearibus, petiolo longè ciliato basi dilatato, verticillastris 4-6 floris in racemum densiusculum approximatis, foliis floralibus oblongis acuminatis inferioribus calyces superantibus supremis brevioribus subcoloratis, calycis rubelli nervosi breviter hirtoglandulosi labiis æquilongis superiori acutè tridentato dente medio minimo, inferiori dentibus lanceolatis acuminatis, corollà flavescenti calyce vix duplò longiori.

S. Kotschyi Bth. mss. non Boiss. Diagn. VII.

Hab. in *Tauro Ciliciæ* (Kotschy N° 437) et *Tauro Isaurico* in collibus ad meridiem urbis *Karaman* sitis (Heldr.)

Rami 1½-1 pedales, segmentum superius foliorum 1½-1 pollices longum. Racemus 2-4 pollicaris densiusculus quâ notâ soli *S. suffruticosæ* M. et A. foliis cæterum diversissimæ affinis est.

SALVIA PISIDICA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. DC. Prodr. XII. p. 269 (Sect. *Eusphace*).

S. perennis suffruticosa ramis basi prostratis radicanibus dein ascendentibus patulè hirtulis, foliis trisectis rariùs infimo alterutro parvo pinnatisecto bijugo, segmentis sessilibus longè oblongo-cuneatis lanceolatisve apice crenato-dentatis lateralibus angustioribus omnibus utrinquè pube brevi subtùs copiosiori canescentibus, petiolis folio subæquilongis basi dilatatis longè ciliatis, verticillastris 3-5 floris distinctis in racemum laxiusculum dispositis, foliis floralibus ovatis acuminatis calyce brevioribus, inflorescentia totâ glanduloso-pilosa, calycis campanulati præter glandulositatem setoso-hirsuti nervosi labio superiori paululùm breviori tridentato dente intermedio minutissimo, inferioris dentibus lanceolatis acuminatis, corollà violaceâ calyce duplo longiori.

Hab. in collibus tophaceis *Pisidiæ* propè *Bouldour* (Heldr). Fl. Maio.

Rami semipedales, segmentum superius folii vix 1½ pollicem longum, verticillastri 4-6 in racemum 3-4 pollicarem approximati. Calyx et flores magnitudinis eorum *S. incarnatæ*. Foliorum formâ et ciliis *S. Benthamianæ* affinis sed segmenta minora vix inter se inæqualia et inflorescentia diversissima. Affinis quoque *S. Cedronellæ* ramis virgatis glabritie foliorum calycibusque distinctæ; accepi ex Lyciâ propè *Elmalu* a cl. D^r Pestalozza formam pumilam foliis 2-3plò minoribus.

SALVIA POTENTILLÆFOLIA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. DC. Prodr. XII p. 270 (Sect. *Eusphace*).

S. perennis suffruticosa, ramis ascendentibus supernè brevissimè puberulis, foliis trisectis segmentis sessilibus oblongo-cuneatis supernè denticulatis utrinquè adpressè incanis subæqualibus vel intermedio paulò majori, petiolo basi dilatato parcè et longè setoso, verticillastris bifloris remotis in racemum laxum dispositis, foliis floralibus oblongo linearibus pedicellos florum non superantibus, calycis glandulosissimi nervosi labio superiori paululum breviori tridentato dente intermedio minimo, inferioris dentibus lanceolatis acuminatis, corollâ violaceâ calyce triplò longiori.

Hab. in valle «speluncarum» dictâ *Tauri Isaurici* suprâ *Ermenek* (Heldr. Junio 1845).

Rami semipedales, folia eis *S. Pisidicæ* similia segmento medio 3-5 lineas longo. Flores inter affines maximi 18 lineas longi eos *S. Candelabri* vel *ringentis* æquantes.

SALVIA RASCHEYANA Boiss. in pl. Syr. 1846 (Sect. *Hymenosphace*).

S. basi suffrutescens ramis humilibus erectis infernè villosulo-viscidis parte floriferâ glabrescentibus, foliis parvis pinnatis unijugis tenuiter rugulosis viridibus breviter pubescentibus petiolo viscido suffultis, segmentis lateralibus minutissimis oblongis sessilibus terminali oblongo basi rotundato omnibus crenulatis, floribus in verticillastria subsexflora remotiuscula dispositis breviter pedicellatis, foliis floralibus ovatis vel oblongis minimis, calyce pilis sparsissimis apice glandulosis obsito post anthesin subaccreto nervoso-reticulato membranaceo breviter bilabiato labio superiori rotundato minutissimè 3-5

denticulato inferiori paulò breviori trilobo lobis ovatis mucronulatis, corollæ cærulescentis calyce sesquolongioris tubo breviter exserto, limbo parvo.

Hab. in *Antilibano* suprâ *Rascheya*. Legi Maio ineunte.

Semipedalis, foliorum segmentum superius vix pollicare, calyx fructifer 7 lineas longus. Racemus verticillastris 3-7 constans. Species transitum inter *Eusphaceas* et *Hymenosphaceas* præbens, inter utramque sectionem media.

SALVIA PINARDI Boiss. (Sect. *Hymenosphace*).

S. basi suffrutescens multicaulis, caulibus erectis subsimplicibus parte foliosâ brevissimè tomentellis floriferâ glabris, foliis petiolo eis æquilongo suffultis parvis utrinquè sed subtùs copiosius pilis brevibus stellatis canescentibus vel canis tenuiter rugulosis ovatis vel oblongis obtusis basi cordatis tenuiter crenulatis, foliis intermediis sæpè segmentis binis parvis sessilibus oblongis auctis, floralibus inferioribus oblongo-spathulatis basi attenuatis apice denticulatis verticillos æquantibus cæteris brevioribus albo-membranaceis, floribus in verticillastra subsexflora dispositis breviter pedicellatis, calycis albo-papyracei glabri fructiferi labio superiori latiori paulòque longiori obsoletissimè et obtusè repando-trilobo inferiori ad medium usque bilobo labiis ovatis obtusis sæpè mucronulatis utroque reticulato-venoso, corollæ intensè cæruleæ calyce vix longioris limbo minuto.

Hab. in *Antilibano* inter *Rascheya* et *Damascus*. Legi Maio 1846.

Hæc species quam priùs ut *S. cryptantha* habueram ab eâ certe differt caulibus procerioribus sæpè pedalibus, foliis crassius rugosis sæpè pinnatis segmento superiori latiori basi profundius cordato, verticillastris omnibus distantibus nec in spicam confluentibus, calyce glabro nec ad nervos scabro vel pilis sparsis hirsuto, corollâ cæruleo-violaceâ nec albidâ. *S. molucella* calycibus violaceis, corollis longè exsertis, etc., magis differt.

SALVIA XANTHOCEILA Boiss. in Kotschy pl. exs. Pers. bor. 1846. DC. Prodr. XII p. 284 (Sect. *Æthiops*).

S. tota patulè glanduloso-pilosa, caule herbaceo humili erecto, foliis ovatis basi subcordatis acutiusculè lobato-dentatis utrinquè ad-

pressè lanatis inferioribus petiolatis, caulinis sessilibus, floralibus rotundato-ovatis breviter acuminatis submembranaceis calyce paulò brevioribus, verticillastris 6-8 floris distinctis in paniculam brevem pyramidatam dispositis, calycis campanulati longè pilosi bilabiati dentibus omnibus latis triangularibus breviter aristatis intermedio labii superioris breviori, corollæ calice duplò longioris labio superiori elongato parùm incurvo.

Hab. in rupestribus montis *Elbrus Persiæ borealis* propè *Passgala* (Kotsch. N° 128), in provinciâ *Aderbidjan* (Aucher N° 8215).

Planta 7-10 pollicaris, folia radicalia 1½-2 pollices longa petiolo eis æquilongo vel longiori suffulta, caulina 2-4, paniculæ rami 2-3 pollicares. Flores magnitudinis eorum *S. verbascifoliæ*. Corollæ labium superius e cl. Kotschy sulphureum inferius album. Affinis habitu et formâ foliorum *S. frigidæ* a quâ differt floribus plùs duplò majoribus, calycis dentibus brevibus dilatatis.

SALVIA PERSEPOLITANA Boiss. (Sect. *Æthiopis*).

S. caule humili pyramidato-paniculato ut et petioli papillis patulis albis glandulisque pedicellatis intermixtis hirsuto, foliis radicalibus petiolo eis longiori suffultis ovatis oblongisve basi rotundatis vel subcordatis eroso-dentatis obtusis rugulosis vel lævibus ad nervos parcè papillosis, caulinis inferioribus sessilibus, bracteis membranaceis albovirentibus cucullatis ovato-rotundis breviter acuminatis calyces æquantibus margine ciliatulis, floribus brevissimè pedicellatis in verticillastra 4-6 flora subcontigua dispositis, calyce breviter campanulato longitudini suæ æquilato parcissimè papilloso ad nervos glanduloso vix ultra tertiam partem bilabiato labiis æquilongis superiori minutè tridentato dentibus triangularibus aristulatis quorum intermedius brevior, labio inferiori ad basim usquè bipartito labiis triangularibus mucronatis, corollæ lilacinæ calyce sesquilateralis tubo breviter exserto.

S. Reuteriana in Kotschy pl. Pers. Austr. et DC. Prodr. ex parte non Boiss.

Hab. ad rupes propè ruinas *Persepolis* Kotschy N° 279, circa *Is-pahan* Aucher N° 8213.

Planta odorem suavissimum spirans, a me ipso primum cum simili *S. Reuteriana* confusa, sed hæc (cujus typus est Aucher N° 8208) longè

differt calycis tubo longè tubuloso-campanulato 10-11 lineas nec 6 lineas longo, labiis angustè lanceolatis brevissimè triangularibus. *S. Persepolitana* magis affinis est *S. sclareæ* sed ab eà optimè distinguitur verticillastris densis, calycis dentibus non longè spinosis; inter affines corollà lilacinà et calyce æquilato ac longo insignis est.

SALVIA HIEROSOLYMITANA Boiss. (Sect. *Plethiosphace*).

S. caule quadrangulo rubello papillis brevissimis sparsis spinuliformibus retrorsis ad angulos asperulo cæterum glabro supernè paniculato-pyramidato, foliis radicalibus petiolo adpressè subpapilloso eis longiori suffultis rugulosis utrinquè parcè aculeolato-papillosis ovatis obtusis basi cordatis grossè lobatis lobis irregularibus rotundatis crenulatis, caulinis subbinis minutis sessilibus acutis, floralibus minutissimis ovato-oblongis acuminatis pedicellos florum vix superantibus, floribus in verticillastos subsextos distantes numerosos dispositis, calycibus brevissimè pedicellatis campanulatis glanduliferis nigro-nervosis apice nigricantibus labio superiori in tres dentes minutos subulatos recurvos fisso, inferioris lobis triangularibus setaceo-acuminatis, corollæ atrorubentis tubo e calyce exserto labio superiori elongato incurvo glanduloso-puberulo, staminibus exsertis.

Hab. in rupestribus frigidis circà *Hierosolymam* frequenter (Boiss.)
Fl. Aprili.

Folia 3 pollices circiter longa 2-2 1/2 lata petiolo 3-4 pollices longo suffulta. Calyx 4 1/2 lineas longus. Corolla pollicaris. Habitus omnino et magnitudo florum *S. pratensis* a quà differt foliis latioribus rugosioribus magis lobatis longius petiolatis, calycibus longiùs aristatis, colore corollæ, labio superiori incurvo nec valdè falcato. *S. virgata* floribus dimidiò minoribus aliisque notis longiùs distat.

SALVIA JUDAICA Boiss. (Sect. *Hemisphace*).

S. tota indumento papillis brevissimis sparsis constanti asperula, caulibus quadrangulis supernè paniculato-ramosis ramis elongatis strictis, foliis suprà bullatis subtùs ob nervos elevatos scabridos albos reticulato-rugosis radicalibus petiolatis ambitu oblongis lyrato-pinnatipartitis lobis inferioribus oblongis ovatisve sæpè basi confluentibus terminali majori ovato omnibus obtusis crenatis, caulinis sessilibus basi cordatis ovatis valdè rugosis, bracteis membranaceis ru-

bellis oblongis acuminatis pedicellos vix superantibus, verticillastris 6-12 floris, pedicellis brevibus deflexis, calycibus breviter papillari-scabris vix ad tertiam partem bilabiatis labio superiori tridentato dentibus lateralibus triangularibus acutis intermedio minuto ovato rotundato mutico, labio inferiori acutè bilobo lobis aristatis, corollæ calyce sesquilingioris tubo incluso.

Hab. in montibus circà *Hierosolymam* (Boiss.) Fl. Aprili.

Sesquipedalis, folia radicalia cum petiolo 4 5 lineas longa, segmentum terminale sesquipollicare. Flores magnitudinis eorum *S. napifolia* a quâ differt petiolis et caulibus non pilis patulis sed papillis oculo nudo non perspicuis scabridis, foliis præsertim superioribus valdè reticulato-nervosis rugulosis, calycibus scabris nec hirtis, foliorum segmento superiori aliis non multoties majori basi vix cordato. *S. Peloponnesiaca* foliorum formâ melius congruens differt indumento longo adpresso verticillastrisque multifloris.

Obs. Planta in Heldr. pl. exs. Cret. sub *S. calicinâ* distributa est *S. pomifera* foliis oblongo-lanceolatis margine undulatis floribusque majoribus, etc., distinctissima.

S. Shiellii Boiss. Diagn. V. ex cl. Benth. in DC. Prodr. XII, p. 274 a *S. hydrangeâ* DC. specificè non differt.

NEPETA LEUCOSTEGIA Boiss. et Heldr. (Sect. *Pycnonepeta* Bth.).

N. pube brevissimâ adpressissimâ pulverulentâ plûs minûsve canescens, caulibus numerosis ascendentibus simplicibus vel infernè ramulosis, foliis petiolatis ovato-oblongis basi valdè cordatis obtusiusculis rotundato-crenatis auriculis rotundatis, verticillastris parvis densissimis submultifloris omnibus distinctis inter se distantibus racemum longum formantibus, bracteis oblongo-linearibus acuminatis tomentellis calyces subæquantibus secûs lineam dorsalem pallidè virentibus cæterùm albo-membranceis, calycis brevissimè tomentelli ore æquali dentibus rectis aristatis, corollâ pallidâ calyce duplò longiori, carpidiis tuberculatis.

N. Sibthorpii Benth. in DC. Prodr. ex parte.

Hab. in rupestribus *Pisidiæ* propè *Egirdir* et *Bouldour* (Heldr.), in *Tauro Ciliciæ* Kotschy N° 438.

A. *N. Sibthorpii* Bth. e Græciâ meo sensu optimè distincta indumento multò breviori pulverulento, foliis brevioribus 9-10 lineas tan-

tum longis inprimis verticillastris minoribus magis compactis omnibus inter se distinctis nec confluentibus, bracteis ferè dimidiò minoribus nec longè aristatis, corollæ tubo longiùs exserto.

NEPETA ISAURICA Boiss. et Heldr. in DC. Prodr. XII, p. 378. (Sect. *Pycnonepeta*).

N. rhizomate sublignoso, caulibus numerosissimis cæspitosis intricatis ascendentibus brevibus fragilibus, foliis parvis triangulari-ovatis basi truncato-subcordatis crenatis obtusiusculis utrinquè brevissimè pulverulento-tomentellis canescentibus subtùs rugulosis, verticillastris multifloris in spicam ovatam basi interruptam terminalem approximatis, bracteis angustè linearibus acutis rigidis calyce vix brevioribus, calycis hirsuti ore vix obliqui dentibus lanceolatis acutis tubo æquilongis, corollà calyce subduplò longiori, acheniis tuberculatis.

Hab. in saxosis *Tauri Isaurici* in monte *Gheidagh* (Heldreich).

Cæspites intricati e caulibus sterilibus foliosis brevissimis aliisque velutis exsiccatis constantes. Caules floriferi 3-5 pollicares. Folia 4-5 lineas tantum longa. Spica terminalis 1½-1 1½ pollicaris verticillastro inferiori sæpè subdistanti. Affinis formis nonnullis *N. Italicæ* a quâ differt staturâ minimâ, verticillastris in spicam brevem confluentibus.

NEPETA SCORODONIA Boiss. et Heldr. (Sect. *Pycnonepeta*).

N. tota brevissimè velutina pulverulento-cana basi suffrutescens, caulibus ascendentibus, foliis minutis petiolatis oblongis obtusis basi cordatis rotundato-crenatis, floralibus acutiusculis inferioribus verticillos æquantibus superioribus minutissimis, verticillastris parvis densissimis subsessilibus remotis supernè subcontiguïs racemum terminalem laxum formantibus, bracteis angustè linearibus tubo calycino brevioribus, calycis albotomentelli ore vix obliquo dentibus rectis æqualibus angustè lanceolatis tubo subbrevioribus densè ciliatis, corollà calyce duplò longiori, seminibus tuberculatis.

Hab. in saxosis *Tauri Isaurici* in monte *Gheidagh* suprâ *Alaya* alt. 8000' ubi eam cl. Heldr. cum *N. Isauricâ* mixtam legit.

Caules ferè pedales, folia majora 8 lineas longa 4 lata. Verticillastri 3-9 avellanâ minores racemos 3-4 pollices longos formantes, calyx

vix ultrà 2 lineas longus. A. *N. Italicà* cui affinis est differt foliis minoribus, indumento pulverulento cano, calycis saltem dimidiò minoris dentibus rectis angustioribus bracteisque abbreviatis nec latè albomarginatis.

NEPETA ANDRICA Boiss. et Heldr. in Dc. Prodr. XII, p. 389 (Sect. *Macronepeta*).

N. caulibus elatis quadrangulis simplicibus glabris, foliis utrinquè viridibus subglabris omnibus breviter petiolatis ovatis vel ovato-oblongis cordatis utrinquè grossè crenatis crenis inferiorum rotundatis superiorum acutiusculis, verticillastris paucifloris breviter pedunculatis distinctis in racemum brevem laxiusculum terminalem approximatis, bracteis setaceis pedicellos florum vix superantibus, calycis breviter pruinoso-papillaris ore obliquo, dentibus triangulari-lanceolatis acuminatis, corollà calyce triplò longiori, acheniis lævibus.

Hab. in cacuminibus montis *Gheidagh Tauri Isaurici* (monte *Andrico* veterum) alt. 6000' cum *N. concolori* mixta.

Caulis 1-1 1/2 pedales, folia eis *N. concoloris* similia sed minora magis elongata. Verticillastri 3-3 in racemum 2-3 pollicarem approximati. Corolla pollicaris. A. *N. concolori* corollæ longitudine, racemo abbreviato statim dignoscenda, valdè affinis *N. pycnanthæ* Bth. e Tauro Ciliciæ oriundæ a quâ verticillastris paucifloris, acheniis lævibus nec tuberculatis differt.

NEPETA CILICIA Boiss. in Dc. Prodr. XII, p. 388 (Sect. *Macronepeta*).

N. caulibus elatis quadrangulis simplicibus pubescentibus, foliis utrinquè puberulis ovatis petiolatis cordatis obtusè et grossè crenatis, verticillastris paucis paucifloris subsessilibus racemum brevem terminalem formantibus supremis confluentibus, bracteis setaceis hispidis calyce multoties brevioribus, calycis densè papilloso-hirti ove valdè obliqui dentibus breviter triangularibus acutis, corollà calyce quadruplò longiori, acheniis tuberculatis.

Hab. in *Tauro Cilictio* Kotschy pl. exs. N° 460 ex parte (mixta cum *N. pycnanthæ* Bth.), in *Libano* suprâ *Cedros* et in cacumine *Hermonis* (Boiss.).

Pedalis, folia eis speciei præcedentis similia, racemi 2-3 pollicares, corolla pollicaris et ultrà. *N. pycnanthæ* quâcum crescit simillima tamen dignoscitur verticillastris 5-8 floris nec multifloris et præsertim calyce papillis multò longioribus et densioribus obsito dentibus breviter triangularibus nec lanceolatis acuminatis, corollâ proportionè calycis tertiâ parte longiori. Attamen ulteriùs in locis natalibus comparanda.

NEPETA PISIDICA Boiss. et Heldr. (Sect. *Macronepeta*).

N. perennis, caulibus basi decumbentibus fruticulosus dein ascendentibus quadrangulis sub lente retrorsum scabridulis basi foliosis superne denudatis, foliis parvis petiolatis viridibus sub lente papillis brevissimis hirtulis basi truncatis vel subcordatis oblongis obtusis obtusiusculè crenatis, verticillastris 3-5 paucifloris breviter pedunculatis inter se distantibus, foliis floralibus oblongis vel linearibus acutis pedunculos vix æquantibus, bracteis setaceis minimis, calycis violacei breviter papilloso glandulosique ore obliquo dentibus breviter triangulari-lanceolatis, corollâ calyce triplò longiori, acheniis tuberculatis.

Hab. in saxosis montis *Boudroun Pisidiæ* (Heldr.). Alt. 5000'.

Caules pedales, folia majora 7-8 lineas longa basi 6 lineas lata, verticillastri 2-6 flori. Calyx 4 lineas longus, corolla cærulea ferè pollicaris. Affinis *N. pycnanthæ* et *Ulictæ* a quibus differt foliis triplò minoribus basi non profundè cordatis, caulibus tenuioribus, verticillastris paucifloris, bracteolis minutissimis.

NEPETA CONCOLOR Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs 1846 et DC. Prodr. 386 (Sect. *Cataria*).

N. caulibus elatis quadrangulis glabris præter ramulum floralem unum alterutrumve simplicibus, foliis utrinquè viridibus concoloribus glabris vix subtus lente parcè papillari-hirtis breviter petiolatis superioribus sessilibus omnibus ovatis basi cordatis grossè et obtusè crenato-lobatis, verticillastris paucifloris breviter pedunculatis racemum elongatum formantibus inferioribus remotissimis supremis confluentibus, bracteis setaceis calyce multò brevioribus, calycis hirsuti cærulescentis ore obliquo dentibus a basi triangulari lanceolato-acu-

minatis, corollis calyce duplò longioribus fauce inflatà, acheniis magnis, lævibus.

Hab. in rupestribus *Tauri Isaurici* in cacumine occidentali montis *Gheidagh* (Heldr.) Fl. Julio.

Caules 1 1/2-2 pedales, folia inferiora ferè bipollicaria pollicem et ampliùs lata crenis utrinquè 8-10. Racemi semipedales et ultrà, corolla ferè sex lineas longa. Folia et habitus *N. longifloræ*, *macrostiphontis* et *pycnanthæ* a quibus corollà multò minùs exsertà differt. Propè *M. grandifloram* collocanda quæ differt foliis oblongis, verticillastris longè pedunculatis, racemis abbreviatis confertis, calyce velutino, etc. Forsan meliùs inter *Macronepetas* propè *N. lamifoliam* collocanda.

NEPETA PERSICA Boiss. (Sect. *Macronepeta*).

N. tota viridis molliter hirsuta valdè viscida, caulibus quadrangulis rectis foliosis infernè sæpè ramosis, foliis ovato-rotundis obtusissimis basi cordatis utrinquè 8-9 crenis rotundatis instructis infimis petiolo æquilongo suffultis superioribus subsessilibus, floralibus inferioribus verticillos æquantibus supremis oblongo-linearibus brevissimis, verticillastris multifloris densis brevissimè pedunculatis inferioribus subdistantibus cæteris contiguis racemos laxos parùm elongatos formantibus, bracteis lineari-oblongis pedicellos vix superantibus, calycis valdè visciduli hirtuli oblongi recti ore vix obliquo dentibus breviter lanceolatis rectis acutiusculis tubo brevioribus, corollæ calyce 2 1/2 plò longioris tubo incurvo ferè ad mediam partem usquè exserto, acheniis tuberculatis.

Hab. in *Persia* australi ad *Schiraz* et *Persepolin* Kotschy pl. exs. Pers. austr. N° 908, 308 et 404, in *Persia* boreali Kotschy pl. Pers. bor., N° 258, in monte Elbrus propè *Derbent*, in *Persia* loco non notato Aucher. N° 5137.

Hucusque hanc plantam pro formà *N. septemcrenatæ* Ehreimb. habui quacum characteres communes habet sed a quâ notis gravioribus certè differt. Indumentum longius, foliorum crenæ multò numerosiores. Racemi breves verticillastris multifloris nec longi tenues rigiduli verticillastris paucifloris. Calyces *N. septemcrenatæ* cylindrici sunt fructiferi tres lineas longi subincurvi ore obliqui dentibus subrecurvis, in *N. Persica* autem vix 2 1/2 lineas longi oblongi recti dentibus rectissimis.

NEPETA MARRUBIODES Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846 et DC. Prodr. XII, p. 387 (Sect. *Orthonepeta*).

N. tota molliter velutina canescens, caulibus basi ascendentibus ramosis elatis, foliis sessilibus ovatis cordatis obtusis obtusiusculè crenatis, verticillastris multifloris numerosis sessilibus omnibus distinctis inferioribus remotis in racemum longum dispositis, bracteis setaceis hirsutis calyce brevioribus, calycis pilis albis hirsuti ore recto dentibus strictis angustè lineari-setaceis tubum æquantibus acutis, corollæ albidæ tubo calyce breviori, acheniis apice tuberculatis.

Hab. in regione inferiori montis *Karadagh Lycaoniæ* suprâ ruinas urbis *Larenda* (Heldr.). Junio floret.

Caules validi 1-1½ pedales ramosi, folia inferiora sæpè bipollicaria sesquipollicem lata. Verticillastri numero 6-12. Corolla circiter 3 lineas longa. Affinis *N. nudæ*. L. a cujus varietatibus differt indumento velutino molli, foliis majoribus latioribus ovatis nec oblongis, dentibus calycis angustioribus tubo corollino longioribus.

Obs. I. *Nepeta erodifolia* Boiss. Diagn. V, est *Lallemantia Royleana* Bth. in DC. Prodr.

Obs. II. *Melissa teucrioides* Boiss. Diagn. VII. *Nepetis* adnumeranda est et est *N. lasiocephala* Bth. in DC. Prodr.

Obs. III. *Sestinia* Boiss. Diagn. V, ex cl. Bth. in DC. Prodr eadem est cum. *Hymenocrater* P. M. et ideò *Sestinia calycina* Boiss. *Hymenocrater calycinus* Benth. in DC. Prodr. nuncupanda.

SCUTELLARIA GLECHOMOIDES Boiss. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846 et DC. Prodr. XII, p. 421 (Sect. *Stachymacris*).

Sc. perennis caulibus parte inferiori filiformibus nudis longè repentibus subterraneis parte foliosâ incrassatis brevibus viscido-hirsutis, foliis petiolatis ovato-rotundis basi rotundatis obtusè crenatis obtusis utrinquè adpressè hirsutis subtus nervis albis elevatis percursis rugulosis, racemo terminali ovato 4-5 floro, bracteis nigricantibus oblongis obtusis villosis calyce florifero quadruplò longioribus, corollæ violaceæ tubo longè exserto calyce multoties longiori.

Hab. in alpibus *Persiæ borealis*, mons *Elamout* Aucher N° 5188, mons *Totschal* propè *Teheran* ad locum *Derja-i-jach* Kotsch. pl. Pers. bor. N° 868.

Caudiculi subterranei repentes 4-6 pollices longi parte exteriori foliosâ vix pollicari 2-4 paria approximata foliorum ferentes, folia 4-6 lineas longa 3-5 lata. Bracteæ et calyces folia superiora non superantes. Corollæ longè exsertæ subpollicares. Species distinctissima nulli affinis.

TAPEINANTHUS Boiss.

Calyx campanulatus obscure 10 nervis ore obliquus obscure bilabiatus dentibus subæqualibus breviter triangularibus acutis duobus superioribus aliquantulum brevioribus; calyx fructifer paululum auctus æqualis fauce nudus. Corollæ tubus longè exsertus exannulatus fauce vix et sensim ampliatus, limbus parvus bilabiatus labiis æqualibus superiori lanceolato-lineari subplano apice breviter bifido, labio inferiori trilobo lobis planis lateralibus triangulari-ovatis intermedio latiori oblongo integro. Stamina quatuor fertilia, filamenta recta parallela breviter sub labio superiori approximata inferiora paulò longiora. Antheræ biloculares loculis confluentibus subuniloculares oblongæ filamentis dorso medio inter loculos affixæ. Stylus bifidus. Nuculæ oblongæ facie internâ subcarinatæ basi subangustatæ. Herbula Persica, annua, nana, odore ingrato, caule simplici, floribus axillaribus solitariis breviter pedunculatis. — Genus inflorescentiâ simplicissimâ notabile habitu et calycibus Odontitem potius quam Labiatam referens, quoad affinitatem subdubium. Propter stamina inter se approximata sub labio superiori parallela in tribu *Stachydearum* et subtribu *Marrubiearum* eam militare autumo, cæterum nulli generi subtribus propius affine. Nerven ex. *ταπεινός*, *humilis*, oriundum.

TAPEINANTHUS PERSICUS Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846. DC. Prodr. XII, p. 436.

Plantula annua tota pube brevissimâ glandulosâ viscidula sordidè virens. Radix simplex filiformis. Caulis pollicaris simplex. Folia lanceolata vel oblongo-lanceolata basi in petiolum brevissimum attenuata apice angustata obtusa integra vel parte superiori irregulariter et obsolete denticulata uninervia 6-10 lineas longa 2-3 lata, superiora

sensim angustiora et minora. Flores bini oppositi in omnibus axillis foliis superati pedunculo calyce breviori suffulti. Calyx breviter et densè papilloso-viscidus florifer angustior 2 1/2 lineas longus ore obliquè truncatus obscurè bilabiatus. Dentes bini superiores inter se fissurâ minùs profundâ separati quam dentes cæteri, sublongiores, omnes breviter triangulares tubo sextuplò breviores. Calyx fructifer dilatatus saccatus tres lineas longus 2 1/2 latus regularis apertus dentibus inter se æqualibus latioribus tubo tantùm triplò brevioribus. Corolla (ex cl. Kotschy) alba roseo marginata circ. 3 lineas longa; tubus rectus calyce duplò longior; labium superius extùs hirtum sesquilineam longum subconcavo-planiusculum apice truncatum rotundato-bilobum; inferius porrectum trilobum. Filamenta paulò infrâ faucem inserta. Antheræ et stylus ad basin labii superioris faucem non superantes. Achenia pro plantæ minutie magna ferè sesquilineam longa calycem implentia oblonga compressione mutuâ subtriquetrâ latere interiori carinata basi attenuata supernè obtusa lævia.

Hab. in arenosis *Persiæ* propè *Teheran* Kotschy pl. Pers. bor. N° 18. Fl. Aprili.

SIDERITIS HOLOLEUCA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. DC. Prodr. XII, p. 438 (Sect. *Empedoclea*).

S. tota densissimè et adpressissimè pannosa nivea basi suffrutescens, caulibus supernè trichotomè corymboso-paniculatis, foliis subrotundo-ovatis minutè et obsoletè crenulatis basi rotundatis inferioribus petiolo eis æquilongo superioribus brevissimo suffultis, verticillastris solitariis vel binis capitulos terminales globosos parvos formantibus, foliis floralibus connatis urceolum brevem truncatum obsoletè et obtusè biacuminatum calycibus dimidiò brevioribus formantibus, calyce niveo dentibus brevissimis triangularibus obtusis, corollæ extùs pannosæ tubo brevissimè exserto limbo minimo labiis æquilongis.

Hab. in rupestribus calidissimis vallis *Djoksu Tauri Isaurici* inter *Karaman* et *Ermenek* alt. circ. 3000' Jun. 1843 (Heldr.).

Caulis pedales infernè ramosi ramis inferioribus sterilibus foliosis. Folia diametro 9-12 lineas lata longaque, rami floriferi supernè bis vel ter trichotomi capitulo trichotomiæ supremæ brevius pedunculato, capitula nuce avellanâ minora, calyces tres lineas longi. Species distinctissima.

SIDERITIS LYCIA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. DC. Prodr. XII, p. 438 (Sect. *Empedoclea*).

S. suffrutescens caulibus ascendentibus basi ramosis, ramis erectis simplicibus elatis tenuibus infernè densè foliosis, foliis niveo-pannosis parvis spathulatis obtusis basi breviter in petiolum attenuatis, axillis gemmiferis, foliis caulinis superioribus remotis lanceolatis acutis virescentibus, floralibus canaliculatis rigidis nervosis oblongo-lanceolatis acuminato-spinosis subrecurvis floribus duplò longioribus, verticillastris remotis, calycis strictè tubulosi basi densè albo-lanati supernè virescentis dentibus lanceolatis acutis muticis tubo paulò brevioribus, corollæ tubo incluso, limbi labiis æquilongis inferioris lobo intermedio duplò latiori.

Hab. in saxosis *Lyciæ* suprâ portum *Tcherali* (Heldr.). Fl. Maio.

Species pulchra foliis *S. sericeam* Pers. referens. Caules 1-1 1/2 pedales, folia secùs partem inferiorem ramorum copiosa 6-7 lineas longa apice 4-5 lineas lata, floralia patula recurva dura longiora. Verticillastri 1-2 pollices inter se distantes in racemos laxissimos 6-9 pollicares dispositi. Calyces basi tantùm bracteis occultati tubulosi 4 lineas longi. Ab omnibus affinibus foliorum indole et calycibus strictis diversa.

SIDERITIS ERYTHRANTHA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. DC. Prodr. XII, p. 438 (Sect. *Empedoclea*).

S. tota adpressè griseo-lanata basi suffrutescens, caulibus basi ramosis ascendentibus, ramis virgatis erectis supernè strictè ramulosis canis, foliis utrinquè rugosis virescenti-griseis oblongis obscurè denticulatis infimis breviter petiolatis obtusiusculis cæteris subsessilibus acutiusculis, floralibus breviter ovatis obtusè acuminatis calyce brevioribus, verticillastris paucifloris remotis racemos laxos formantibus, calycis griseo-lanati breviter campanulati dentibus triangularibus acutis tubo brevioribus, corollæ intensè purpureæ extùs griseo-tomentosæ tubo breviter exserto, limbi parvi labio superiori paulò longiori acutè bifido, inferioris trilobi lobo intermedio aliis longiori latiorique.

Hab. in rupibus *Tauri Pamphyli* inter *Marla* et *Adalia* alt. circ. 4000' (Heldr.) Fl. Julio.

lineas lata. Verticillastri parvi numero 6-7, inferiores pollicem inter se sæpè remoti. Calyx tres lineas tantùm longus. Species pulchra verticillorum parvitate *S. Sipyleam* referens sed ab eà abundè distincta foliis rugosis ovatis nec lanceolatis, verticillastris remotis, corollæ subxsertæ colore, etc.

SIDERITIS CONDENSATA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. DC. Prodr. XII p. 439 (Sect. *Empedoclea*).

S. tota lanà griseà adpressà rarà demùm secedenti araneosà sordidè virens, caulibus erectis elatis supernè parcè ramosis, foliis rigidis oblongo-lanceolatis acutè serrulatis sæpè margine subspinulosis rugosis infimis breviter petiolatis obtusiusculis, caulinis sessilibus acutis, floralibus cordato-subrotundis longè ciliatis integris abruptè et tenuiter acuminatis flores æquantibus vel vix superantibus, verticillastris paucifloris in racemos densos oblongos compactos condensatis, calycis densè hirsuti ad tertiam partem usquè vix fissi dentibus triangularibus acutis, corollæ tubo incluso, limbi minimi labiis æqualibus, inferioris lobo intermedio latiori crenulato.

Hab. in Tauro Pamphyliæ inter Marla et Adalia in fruticetis alt. circ. 1000' (Heldr.) Fl. Julio.

Caules subbipedales. Folia majora 1 1/2-2 pollicaria 5-7 lineas lata. Racemi compacti 1-2 pollicares in caule solitarii vel 2-3 rariùs quini. Calyx 4 lineas longus. Species verticillastris paucifloris in spicas breves condensatis, calyce breviter dentato distincta.

SIDERITIS TAURICA MB. var. *procumbens* Boiss. et Heldr.

Tota lanà griseà araneosà vestita. Caules basi procumbentes, verticillastri in spicas terminales basi interruptas condensati.

S. condensata β. *procumbens* B. et H. in DC. Prodr. XII p. 439.

Hab. in Tauro Pamphylico infrà Marla alt. 4000' (Heldr.)

Hæc planta ulterius comparata ad S. Tauricam nec ad S. condensatam referenda est et a typo speciei caulibus procumbentibus, verticillastris magis condensatis differt.

SIDERITIS PISIDICA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. DC. Prodr. XII p. 440 (Sect. *Empedoclea*).

S. basi suffrutescens multicaulis, caulibus basi ascendentibus erectis supernè præsertim longè et patulè hirsutis, foliis adpressiusculè hirsutis lætè viridibus subtùs reticulato-nervosis acutis subintegrissimis inferioribus lanceolato-linearibus in petiolum longum attenuatis, caulinis intermediis sessilibus oblongo-lanceolatis, floralibus cordato-ovatis attenuato-acuminatis muticis verticillastris longioribus calycesque suboccultantibus membranaceis vix nervosis, verticillastris paucis distantibus, calycis campanulati longè hispidi dentibus lanceolatis subspinosi tubo brevioribus, corollæ tubo incluso, limbi brevis labiis æquilongis superiori bifido inferiori trifido lobo intermedio latiori crenulato.

Hab. in rupestribus apricis montis *Boudroun Pistidiæ*. alt. circ. 5000' (Heldr.) Fl. Aug.

Caules pedales, folia formà et naturà ea *Phlomidis herbæventi* referentia sed minora, radicalia 2 1/2 pollices longa 7-8 lineas lata, caulina breviora, floralia 8-9 lineas longa. Verticillastri numero 4-5 inter se sesquipollicem distantes. Calyx 4 lineas longus. Affinis *S. Libanoticæ*, distincta caule subsimplici supernè longe et patulè hispido, racemis brevibus 4-5 pollicaribus nec longissimis inprimis calycis dentibus angustioribus longioribusque.

SIDERITIS STRICTA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. DC. Prodr. XII pag. 441 (Sect. *Empedoclea*).

S. basi suffrutescens multicaulis hirsuta viridis ad folia juniora densè albolanata, caulibus erectis strictis simplicibus, foliis linearibus basi attenuatis acuminatis argutè denticulatis subtùs reticulato-rugosis, floralibus membranaceis integris ovato-cordatis abbreviatis breviter acuminatis concavis calyces ferè occultantibus margine longè ciliatis virentibus reticulatis, verticillastris infimis exceptis subcontiguis in racemum cylindricum approximatis, calycis tubulosi breviter pubescenti viscidi dentibus lanceolatis acutis rectis tubo subdimidiò brevioribus, corollæ tubo brevissimè exserto, limbi parvi labiis æquilongis, labio superiori bifido inferiori tripartito lobo medio latiori integro.

ilici in via inter *Marla* et
eldr.) Fl. Jul.

ulina 1-2 pollicaria 3-4 .

Verticillastri 8-13 race-
as longus. *A. S. Liba-*

iguis, bracteis ampliis

riangulariter lanceo-

et bractearum ner-

differt foliis amplè

exs. 1846. DC.

, foliis petiolo

cuneatis ob-

perantibus,

dunculatis,

i dentibus

n partem

is mon-

lesve,

Kot-

'lidè

lu-

n-

sis rectis tubo triplò brevioribus, corollæ minimæ calycem vix superantis tubo incluso.

Hab. in *Libano* suprâ *Cedros* (Boiss.) Fl. Julio.

Planta ferè pedalis, folia majora 6-7 lineas longa, calyx 3 lineas corolla 4 lineas longi. Affine *M. brachyodonti* et *micrantho*, a priori tomento densiori, foliis floralibus magis rotundatis, calycis dentibus tubi proportionè longioribus, corollâ minimâ, a posteriori glomerulis florum sessilibus tomento calycis magis adpresso dentibus longioribus distinctum.

MARRUBIUM HERMONIS Boiss.

M. totum secùs caules juniores densè albo-floccosum parte superiori adpressissimè tomentosum canescens, foliis ovato-rotundis subcuneatis obtusè crenulatis petiolo eis æquilongo suffultis, floralibus sessilibus breviter petiolatis verticillo paulò longioribus, glomerulis florum densis sessilibus, bracteis subulatis calyces æquantibus, calycis adpressè tomentosi dentibus a basi subulatis rectis tubo triplò brevioribus, corollæ carneæ calyce duplò longioris tubo breviter exserto.

Hab. in regione mediâ montis *Hermonis* suprâ *Rascheya* (Boiss.).

Caules 8-10 pollicares. Folia majora diametro 3 lineas ferè lata, calyx 2 $\frac{1}{4}$ lineas, corolla 4 $\frac{1}{2}$ longi. Affinis præcedenti a quo præter indumenti colorem diversum differt calycis dentibus a basi subulatis, corollâ duplò majori longiùs exsertâ. A *M. brachyodonti* indumento, foliis magis rotundatis, dentibus calycinis longioribus diversum est.

MARRUBIUM FRIWALDSKYANUM Boiss.

M. totum adpressissimè tomentosum pallidè virens, foliis subtùs pallidioribus inferioribus ovato-rotundis basi subcordatis grossè dentatis dentibus ovatis obtusis, floralibus ovato-oblongis brevissimè petiolatis acutiusculis supernè acutè dentatis verticillos longè superantibus, verticillastris sessilibus compactis multifloris paucis remotis, bracteis setaceis tenuiter hirtulis patenti-subreflexis incurvis calyci æquilongis, calycis breviter tomentelli dentibus setaceis hirtulis divergentibus tubo elevatim nervoso vix brevioribus, corollâ albâ tomentellâ calycis dentibus breviori labio superiori brevi inferioris lobis subæqualibus.

Subbipedale, folia inferiora diametro sesquipollicem lata, calycis tubus 3 lineas dentes 3 lineas ferè longi. Affine *M. candidissimo* quod foliorum formà differt et præsertim *M. velutino* Sibth. a quo distinguitur foliis magis profundè grossèque dentatis superioribus angustatis apice acuminato-dentatis, calycis laciniis bracteisque tenuioribus longioribus magis setaceis.

MARRUBIUM POLYODON Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846. DC. Prodr. XII p. 483.

M. caulibus ascendentibus elatis albolanatis, foliis subtus parcè lanatis oblongo-cuneatis breviter petiolatis obtusè crenulatis, floralibus flores superantibus, verticillastris numerosis remotis, bracteis paucis brevissimis setaceis, calycis breviter hirsuti limbo tubo subæquilongo dentibus circiter decem subdilatis irregulariter 2-3 fidis denticulis omnibus spinulosis, corollæ parvæ tubo incluso.

Hab. propè *Derbend* ad radices montis *Elbrus* Persiæ borealis Kotschy pl. Pers. bor. N° 244.

Sesquipedale, folia cum petiolo ferè pollicaria, axillæ foliorum inferiores jam floriferæ. Affine habitu et florum magnitudine *M. cuneato* sed distinctum caule albo-lanato, foliis vix rugosis, calycis dentibus latioribus lobatis.

STACHYS PISIDICA Boiss. et Heldr. (Sect. *Eriostachys*).

St. perennis tota breviter velutino-grisea subsericea, caulibus erectis parcè ramosis, foliis inferioribus longè superioribus breviter petiolatis omnibus ovato-oblongis basi cordatis acutis acutiusculè crenatis, floralibus integris angustè lanceolatis deflexis, verticillastris multifloris distantibus, bracteis setaceis calyce paulò brevioribus, calycis villosi ore obliquo dentibus triangularibus mucronatis superiori longiori retrorsum subrecurvo inferioribus duobus minoribus, corollæ tubo calyce incluso, labiis æquilongis extus densè albo-harbatis.

Hab. in regione superiori montis *Davrosdagh Pisidiæ alt. 6000'* (Heldr.) Fl. Aug.

Caules vix pedales. Folia 1 1/2 pollices longa. Calyx 4 lineas, corolla 5 lineas longi. Valdè affinis *St. Alpina* a quâ eam specificè dif-

ferne autumo foliis floralibus parvis infimis exceptis verticillastro brevioribus, calycis dentibus sensim attenuatis nec obtusiusculis mucronatis, corollæ labiis extus densè longèque setosis, indumento partis superioris plantæ non viscido.

SIDERITIS CASSIA Boiss. in pl. Syr. exs. 1846 (Sect. *Eriostachys*).

S. perennis, caulibus ascendentibus parcè et breviter hirtis simplicibus vel supernè parcè ramosis, foliis angustè oblongis obtusis basi rotundatis breviter petiolatis suprà glabrescentibus tenuissimè rugulosis subtùs adpressè canescenti-cinereis, verticillastris densifloris foliis floralibus deflexis suffultis inferioribus remotissimis summis in recemum oblongo-cylindricum confertis, bracteis subulatis lanà occultatis calyce multò brevioribus, calycis longè albolanati intùs villosi dentibus patulis lanceolatis aristato-acuminatis æqualibus tubo brevioribus, corollæ roseæ valdè hirsutæ tubo calyce breviori intùs pilosè et obliquè annulato.

Hab. in regione sylvaticà inferiori montis *Cassii Syriæ borealis* (Boiss.). Fl. Jun.

Bi-tripedalis, folia inferiora bipollicaria 8-9 lineas lata, calyx 6 lineas longus, corolla vix 7 lineas longa. Affinis *S. Italicæ* a qua sat differre videtur foliis suprà glabrescentibus, verticillastris superioribus in racemum confertis, calycis dentibus multò longiùs aristatis.

STACHYS GARANA Boiss. (Sect. *Eriostachys*).

S. perennis basi suffrutescens, caulibus erectis quadrangulis basi simplicibus supernè breviter ramosis in paniculam brevem condensatam abeuntibus, foliis surculorum juniorum minutis angustè oblongis integris valdè albolanatis caulinis rugulosis oblongo-lanceolatis acutiusculis in petiolum brevissimum attenuatis suprà glabrescentibus subtùs adpressè canescentibus, superioribus angustè linearibus, verticillastris in racemos ovatos vel oblongos densos breviter pedunculatos foliis floralibus eis multò brevioribus suffultos congestis, bracteis oblongis acutis brevissimis, calycis brevis densè albo-tomentosi dentibus lanceolatis breviter pungenti-aristatis recurvo-patentibus tubo brevioribus, corollæ carneæ tubo calyce subbreviori.

Hab. in lapidosis montis *Gara Kurdistanicæ* Kotschy pl. Alep. Kurd. N° 413.

Planta 2 1/2 pedalis, folia inferiora 2 1/2 pollices longa 6-8 lineas lata, panicula corymboso-paniculata, capituli 1-4 1/2 pollices lati breviter pedunculati. Calyx 4 1/2 lineas longus. Species inflorescentiâ, bractearum formâ, calyce a *S. Italica* et *Cretica* eximie distincta.

STACHYS VITICINA Boiss. (Sect. *Eriostachys*).

St. perennis, tota tomento brevi denso canescens, caulibus quadrangulis erectis supernè ramosissimis pyramidato-paniculatis, foliis inferioribus brevissimè petiolatis e basi truncato-subcordatâ oblongo-lanceolatis obtusis vix rugosis supernè virentibus superioribus subsessilibus oblongis rugosulis, verticillastris parvis compactis multifloris foliis floralibus oblongo-linearibus eis subæquilongis suffultis ad ramulorum apicem 5-7 subcontiguâ racemos breves subinterruptos formantibus, floribus parvis, calycis adpressè hirsuti dentibus breviter triangulari-lanceolatis acutis tubo brevioribus, fauce albo-hirsutissimâ, corollæ roseæ hirtæ tubo exannulato limbo brevissimè exserto labio superiori recto brevi oblongo-lineari subcompresso integro.

Hab. in Syria boreali propè Seleucium, Suadieh. Antiochiam (Boiss.), (Aucher, N° 328 et 1712).

Tripedalis, folia inferiora 2 1/2-3 pollices longa pollicem lata. Racemi floriferi 1 1/2-2 pollices longi, calyces vix 2 1/2 lineas longi. Flores illis *S. Germanicæ* dimidiò minores. Species distinctissima habitu et florum minutie *Vitidis agni casti* inflorescentiam referens, a *S. spectabili*, *S. salvæfoliâ* et *S. Garamâ* cujus inflorescentiam habet verticillastris compactis, floribus minimis, dentibus calycinis abbreviatis minimè acerosi, corollâ vix exsertâ faciliè distinguenda.

STACHYS GRÆCA Boiss. et Heldr. (Sect. *Eriostachys*).

St. perennis, caulibus simplicibus quadrangulis ascendentibus petiolisque pilis longis deflexis hispidis, foliis oblongo-ellipticis obtusis basi rotundatis rotundato-crenatis inferioribus petiolo eis æquilongis suffultis, floralibus sessilibus basi subcordatis verticillos plerumquè superantibus, omnibus adpressè hirsutis canescentibus, verticillastris plurifloris valdè distantibus racemum terminalem simplicem laxissimum formantibus, bracteis lineari-subulatis calyce paulò brevioribus,

calycis breviter pedicellati longè et adpressiusculè hirsuti dentibus rigidis lanceolatis breviter pungenti-mucronatis tubo sesquibrevioribus, fauce parcè hispidà, corollæ roseæ extùs longè albo-barbatæ tubo incluso basi subobliquè et parcè annulato-piloso, labio superiori longo profundè bilobo.

St. Heraclea Bory et Chaub. Fl. Pélop. — Heldreich, Spruner, pl. exs. non L.

Hab. in agris, vineis, fruticetis *Peloponnesi* ad *Argos*, in monte *Ithome Messeniæ* (Heldr.), monte *Malevo Argolidis* et *Delphi Eubeæ* (Sprun.)

Pulchra species habitu *S. heracleam* et *S. Salvæfoliam* Ten-*Italicam* Mill. omninò referens a priori floribus duplò majoribus, a posteriori indumento non sericeo, ab utrâque labio superiori corollæ multò magis porrecto profundè bilobo nec integro statim dignoscenda.

STACHYS CILIARIS Boiss. (Sect. *Eriostachys*).

S. perennis caulibus erectis quadrangulis simplicibus petiolisque ciliis longis rigidis patulis basi subbulboso-incrassatis hispidis, foliis iisdem pilis sed rarioribus brevioribus adpressiusculis obsitis virescentibus oblongis obtusis minutè crenulatis basi rotundatis inferioribus longè petiolatis, floralibus ex basi ovatà attenuato-acuminatis inferioribus verticillos superantibus, verticillastris plurifloris axillariibus valdè distantibus racemum laxissimum terminalem formantibus, bracteis oblongis petiolulatis acutis paucis calycem subæquantibus, calyce pedicellato viridi parcè et patulè setoso dentibus ovatis nervosis rigidis tubo dimidiò brevioribus in mucronem brevem pungentem abeuntibus, corollæ roseæ tubo incluso recto intùs obsolete annulato-piloso, labio superiori extùs valdè hirsuto recto brevi integro rotundato, inferioris longioris lobis lateralibus brevibus latis.

Hab. in regione sylvaticà inferiori monti *Cassti Syriæ* borealis (Boiss.).

Sesquipedalis, folia inferiora 3 pollices longa 1½ pollices lata. Verticillastris 6-7 racemum semipedalem formantes. Calyx fructifer spinosus 4½ lineas longus. Corolla 6-7 lineas longa. Species *S. heracleæ* quoquè affinis ab eà distincta caulibus et foliis ciliis rigidis basi subbulbosis nec molliusculis hirsutis, calyce magis spinoso, co-

ronæ tubo non exserto nec curvato, inferiori multò angustiori etc. Affinis quoque *S. Libanoticæ* quæ differt calycibus duplò longioribus, dentibus longè spinosis.

STACHYS ALEURITES Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. DC. Prod. XII, p. 472 (Sect. *Eriostachys*).

S. perennis secùs partes juniores et folia lanà adpressissimà araneosà obsita glaucescens demùm glabrescens, caulibus elatis virgatis quadrangulis fistulosis simplicibus vel infernè parcè ramosis, foliis paucis remotis longè petiolatis ovalis acutis basi cordatis grossè et acutiusculè crenatis, superioribus et floralibus oblongo-lanceolatis vel lanceolatis acuminatis, verticillastris multifloris inferioribus inter se valdè distantibus foliis floralibus eis æquilongis stipatis superioribus basi nudis approximato-subconfluentibus, bracteis numerosis lanceolatis acuminatis calyces subæquantibus, calycis adpressissimè albo-araneosi cani dentibus subæqualibus e basi triangulari acuminato-setaceis rectis tubo æquilongis, corollæ (e sicco flavidæ) tubo intùs rectiusculè annulato dentibus calycis breviori, labio superiori breviori crenulato adpressè hirsuto.

Hab. ad rupes maritimas *Pamphylia* propè *Adalia* (Heldr.). Fl. Maio.

Caulēs 2-3 pedales basi ferè crassitie pennæ anserinæ supernè præsertim remotissimè foliosi, folia formà suà ea caulium steriliūm *Galeobdolonis lutei* referentia sed minora petiolo sæpè pollicari suffulta, inferiora sesquipollicem longa. Verticillastri 4-5 terminales racemum nudum 4-5 pollicarem formantes. Calyx campanulatus 4 lineas longus, corolla 5 lineas longa. Species in sectione *Eriostachyde* anomala, habitu *S. distantem* Bth. referens sed hæc a nostrâ differt foliis minùs cordatis, verticillastris valdè paucifloris, bracteis nullis vel minimis, calycis dimidiò minoris dentibus triangularibus, corollæ tubo calyce subduplò longiori.

STACHYS BOMBYCINA Boiss. (Sect. *Stachyotypus*).

St. tota lanà crispà adpressà densà bombycinà albicans, caulibus suffrutescentibus prostratis, ramis numerosis ascendentibus elongatis subteretibus bombycinis simplicibus parcè foliosis supernè nudius-

culis, foliis parvis ovatis oblongisve basi rotundatis vel subcordatis petiolo eis æquilongo suffultis obtusè obtusè crenato-dentatis, superioribus acutis integris, verticillastis 1-3 terminalibus distantibus multifloris densis foliis floralibus oblongo-lanceolatis acutis eis brevioribus suffultis, bracteis oblongis acuminatis calyce brevioribus, calycis densè et longè lanati dentibus lanceolatis longè et tenuiter mucronatis tubo æquilongis, corollæ minutæ albidæ tubo dentibus calycis breviori, limbi parvi labiis brevibus superiori retuso.

Hab. in *Syriâ*. Comm. cl. D^r Pestalozza.

Rami pedales longioresque ut tota planta valdè lanati, folia 6-7 lineas longa, verticillastri nuce avellanà majores bombyce ferè occultati. Calyx florifer tres lineas longus fructifer major. Species *St. aleuriti* et *S. distant* affinis ab utrâque indumento densè bombycino, foliis obtusè crenatis, dentibus calycis longè subulato-attenuatis rectis nec subrecurvis corollam subæquantibus distincta.

STACHYS DIVERSIFOLIA Boiss. in pl. Syr. exs. 1846 (Sect. *Stachyotypus*).

St. perennis, caulibus suffruticosis prostratis ramos steriles foliosos breves aliosque floriferos quadrangulos tenues ascendentes simpliciusculos glabros edentibus, foliis ramorum sterilium petiolo longo gracili flexuoso longè et adpressè setoso basi dilatato suffultis ovatis vel ovato-oblongis apice rotundatis integerriimis basi breviter cuneatis rotundatisve suprâ viridibus glabrescentibus subtus adpressè setulosus pallidioribus, foliis ramorum fertilium glabriusculis infimis oblongo-linearibus in petiolum attenuatis cæteris sessilibus longis angustè linearibus acutis, floralibus brevissimis angustissimis, floribus in axillis superioribus solitariis sessilibus oppositis sæpè abortivis sæpè ad ramuli apicem terminalibus 3-4 congestis racemos virgatos macros terminales formantibus, bracteis lineari-setaceis calyci æquilongis, calycis glabri viridis visciduli dentibus a basi lanceolatâ subulatis pungentibus tubo æquilongis, corollæ pallidè carneæ extus hirtæ tubo incluso intus obsoletè annulato limbo brevi labio superiori integro.

Hab. in dumosis regionis montanæ in viâ inter *Latakiah* et *Aleppum* loco 6-7 leuceis a priori distant. Legi florif. fine. Junii 1846.

Folia inferiora 10-13 lineas longa 6-8 lata petiolo eis æquilongo vel longiori suffulta, caulina superiora sesquipollicaria 2-3 lineas lata.

Rami sesquipediales virgati supernè glabri visciduli parçissimè flori-
feri. Calyx florifer 2 $1\frac{1}{2}$ lineas longus. Ex affinitate *St. distantis* sed
characteribus datis distinctissima.

STACHYS HYDROPHILA Boiss. (Sect. *Stachyotypus*).

St. perennis tota patulè et tenuiter hispida, caulibus teneris sulca-
tis longis decumbentibus, foliis amplis teneris ovalis cordatis acutis
rotundato-crenatis petiolo eis breviori suffultis, floralibus infimis cre-
natis breviter petiolatis flores multò superantibus, superioribus ob-
longis substipitatis integris breviter acuminatis calyces subæ quanti-
bus, verticillastris subquadrifloris distinctis racemum longum laxum
formantibus, bracteis nullis, calyce sessili viridi breviter campanu-
lato hirtulo viscidulo dentibus triangularibus aristatis tubo paulò bre-
vioribus, corollæ albidæ viscido-hirtæ tubo non exserto labio supe-
riori integro inferioris lobo intermedio magno rotundato.

Hab. in umbrosis ad rivulos et sepes suprâ urbem *Tripoli Syrtæ*
(*loco la Dervicherie*) dicto. Fl. Junio (Boiss.).

Caulis 2-3 pedales, folia inferiora 3-4 pollices longa 3 lata. Verti-
cillastri 7-10 racemum semipedalem formantes. Calyx florifer 4 li-
neas longus latus brevis. Affinis *S. sylvaticæ* quæ egregiè differt fo-
liis minoribus magis acuminatis, caulibus rectis, foliis floralibus lan-
ceolatis longè setaceo-acuminatis, calycis laciniis angustè lanceo-
latis subrecurvis, corollæ intensè rubræ tubo exserto, limbo formæ
diversæ, etc. Ad *S. circinnatum* et *S. Pinardi* quoque accedens.

**STACHYS MESSENIACA Boiss in DC. Prodr. XII, p. 475 (Sect. *Sta-
chyotypus*).**

St. tota molliter et patulè hispida viridis, caulibus basi vix suffru-
tescentibus ascendentibus simplicibus vel parçè ramosis, foliis ob-
longis obtusiusculis cordatis obtusè crenatis inferioribus breviter
petiolatis superioribus sessilibus, floralibus integris acutiusculis ver-
ticillis inferiores æquantibus dein brevioribus, verticillastris nume-
rosis 2-6 floris omnibus distinctis approximatis racemum terminalem
elongatum laxum formantibus, bracteis setaceis minimis paucis, ca-
lycis hirsuti campanulati dentibus triangulari-lanceolatis mucronatis
tubo brevioribus inferioribus duobus paulò brevioribus angustiori-

busque, corollæ tubo calycem æquanti intus annulato recto, labio superiori parcè hirsuto inferiori duplò longiori.

St. Tournefortii Bory et Chaub. Fl. Pélop. non Poirét.

Hab. in Messeniâ circà *Pylos*, *Navarin*, *Androuvîsta* (Guerin, Despreaux in herb. Fauché).

Caules circiter pedales, folia formâ et colore ea *Teucrit scorodoniæ* planè referentia pollicaria vel paulò longiora 7-9 lineas lata. Verticillastri 8-10 racemum 3-4 pollicarem formantes. Corolla magnitudinis *St. circinnatæ* flavida intus purpureo-maculata. Calyx 4 1/2 lineas longus. Species affinis *St. circinnatæ* et *St. Pinardi* ab utrâque indumento non sericeo foliis minoribus breviter petiolatis minùs rotundatis, corollæ tubo calyce non longiori, caulibus firmis nec herbaceis fragilibus discedens. *St. mollissima* quoque affinis mihi ex icone Wildenowii tantum nota differt bracteis longis calyces æquantibus, floribus multò majoribus, calycibus magnis 6 lineas longis ultrà medium fissis dentibus æqualibus. *St. Tournefortii* Poirét ex icone Tournefortianâ tantum mihi nota diversissima est,

STACHYS SPRUNERI Boiss. DC. Prodr. XII, p. 488 (Sect. *Stachyotypus*).

St. basi suffrutescens tota patulè et sparsim hispida viridis, ramis simplicibus vel parcè ramosis erectis rigidis pumilis acutè quadrangulis, foliis infimis oblongis basi cuneatis brevissimè petiolatis obtusis cæteris ellipticis vel lanceolato-linearibus sessilibus utrinquè attenuatis acutis argutè serratis omnibus subtus valdè rugosis, floralibus acuminatis flores superantibus, verticillastri 2-6 floris in spicam brevem ovatam laxam basi sæpiùs interruptam dispositis, bracteis nullis, calycis viridis longè hirsuti campanulati dentibus triangulari-acuminatis spinosis rectis tubo dimidiò brevioribus, corollæ tubo curvato calycem æquanti intus obliquè annulato, labio superiori penicillato-lanato, inferiori duplò longiori.

Hab. ad radices montis *Parnes Atticæ* ubi Maio floret (Spruner, Boiss., Heldr.) sub *St. Swainsoni*.

Caules 1 1/2 pedales vel paulò longiores, folia intermedia 1-2 pollicaria 3-4 lineas lata. Racemus bipollicaris, calyces ferè 5 lineas longi, corolla albida vel flavescens. Hucusque confusa cum *St. Swainsoni* Bentham que nunc nobis nota egregiè differt indumento molli,

foliis omnibus ovatis obtusis basi rotundatis obtusè crenatis. *St. patula* Grisebach e descriptione omninò aliena est habitu *St. virgatam* Bory et Ch. referenti, caule elato patulè ramoso, foliis integerrimis vel apice tantùm sub serratis, dentibus calycinis tubum æquantibus recurvo-patentibus nec rectis.

STACHYS ARGOLICA Boiss. (Sect. *Stachyotypus*).

St. basi suffrutescens tota patulè hispida viridis, caulibus numerosis basi prostratis ascendentibus brevibus, foliis petiolatis oblongis basi rotundato-cuneatis crenatis obtusis subtùs rugosis superioribus sessilibus, floralibus acutiusculis verticillos superantibus, verticillastris 6-10 in racemum oblongum basi sæpè interruptum condensatis, bracteis nullis vel minimis, calycis hirsuti glandulosi campanulati dentibus subinæqualibus triangularibus breviter mucronatis rectis tubo paulò brevioribus, corollæ tubo recto calyci æquilongo intùs obliquè annulato, labio superiori supernè barbato, inferiori duplò longiori.

Hab. in rupibus propè *Naupliam* (Sprun., Boiss.). Fl. Maio.

Caules cæspites e fissuris rupium oriundos formantes basi prostrati 6-8 pollicares, folia 9-10 pollices longa 5-6 lata, calyces 4 lineas longi, corolla pallidè carnea. Ferè intermedia inter *St. Spruneri* a quâ longiùs differt et *St. Swainsoni* cui valdè affinis est; ab eà distincta indumento rariori non sericeo, foliis majoribus rugosioribus, calycis visciduli dentibus brevius mucronatis inæquilongis. — *St. canescens* Bory et Ch. quoque ex icone affinis differt foliis acutissimis, caule erecto.

Obs. *St. Scyronica* Boiss. Diagn. V, est tantùm forma minor magis sericea *S. Swainsoni* cui adjudenda est.

STACHYS CITRINA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. DC. Prodr. XII, p. 490 (Sect. *Stachyotypus*).

St. suffruticosa tota indumento denso molli vestita grisea, foliis ferè omnibus ad basin ramorum approximatis ellipticis obtusis basi in petiolum subæquilongum attenuatis integris vel minutè crenulatis rugosis, ramis floriferis humilibus scapiformibus nudis vel uno pari foliorum minorum angustiorum subsessilium donatis, verticillastris paucis in capitulum terminalem ovatum vel rotundum simplicem vel

basi interruptum condensatis, foliis floralibus ellipticis obtusis inferioribus verticillastro longioribus cæteris brevibus, bracteis paucis lineari-setaceis calyce brevioribus, calycis hirsuto-campanulati dentibus inter se æqualibus triangularibus acutis tubo quintuplò brevioribus, corollæ citrinæ extûs hirsutæ tubo calyce incluso intûs annulo recto instructo.

Hab. in rupestribus alpinis montis *Anemas Lycaoniæ* et montis *Gheidagh Tauri Isaurici*. Alt. 6000'-7000' (Heldr.). Fl. Aug.

Suffruticulus caudicibus prostratis cæspitosis, folia 1-1 1/2 pollicaria 6-7 lineas lata pannosa. Caules basi exceptâ subnudi 3-5 pollicares. Capitulum densum 9-12 lineas longum sæpè verticillastro inferiori subremoto auctum. Calix 4 lineas, corolla 6 lineas longi. Pulchra species propè *S. rupestrem* et *S. pumilam* collocanda ab eis indumento pannoso, calycis dentibus brevissimis, etc., distincta.

Obs. Ex observatione meâ in loco natali *St. pumila* Russell in collibus propè *Antiochiam* abundè crescens quoad indumentum, calycis laciniarum longitudinem mirè variat et huic meo sensu *St. floribunda* Month. et Aucher ut varietas calycinis dentibus abbreviatis adnumeranda est.

STACHYS MACROSPERMA Boiss. in pl. Syr. exs. 1846 (Sect. *Olistia*).

S. annua, caule crasso quadrangulo simplici vel infernè parcè ramoso papillis brevibus sparsis striguloso supernè ut inflorescentia tota patulè hispido viscidulo, foliis oblongis obtusè crenatis inferioribus basi rotundatis breviter petiolatis obtusis floralibus conformibus a basi latiori attenuatis acutis oblongis vel lanceolatis verticillos superantibus, verticillastris 4-6 floris remotiusculis racemos rectos laxos elongatos formantibus, bracteis nullis, calycis ampli campanulati rufescentis hirsuti visciduli dentibus e basi latè triangulari lanceolatis mucronatis subrecurvis, corollæ purpureæ extûs hirsutæ tubo incluso labio superiori crenulato, inferioris longioris lobo intermedio lato retuso, seminibus magnis.

Hab. in pinguibus *Galileæ et Judææ*, in viâ inter *Ramla* et *Hierosolymam* ad radices montium, in planitie *Esdraëlon* (Boiss.). Floret vere.

Planta 1-1 1/2 pedalis, caules ramique pro plantæ magnitudine crassi, folia inferiora 2 pollices longa ferè pollicem lata. Calyx fructifer amplus 7 lineas longus. Species distinctissima affinis *S. spinulosæ*

a quâ foliis inferioribus non ovato-rotundis cordatis, calycis dentibus elongatis acuminatis nec brevissimis obtusiusculis, corollæ colore etc. differt. *S. Arabica* Horn. quam non vidi et quæ calycibus magnis meæ speciei probabiliter affinis est ex descriptione ab eâ recessit foliis basi cordatis, dentibus calycis ovatis acutis subspinosis.

STACHYS NEUROCALYCINA Boiss. in pl. Syr. exs. 1846 Sect. *Olisia*).

St. annua a basi ramosa, ramis quadrangulis diffusis glabellis rubellis, foliis glabris oblongis obtusè crenatis infimis petiolo brevi papilloso-ciliato suffultis, floralibus oblongo-ellipticis obtusis basi attenuatis obsoletè dentatis flores æquantibus, verticillastris 4 floris distinctis inter se distantibus racemos laxissimos rectos formantibus, bracteis nullis, calyce sessili breviter et parcè papillari viridirubello nitido elevatim nervoso inter nervos reticulato dentibus rigidis oblongis nervosis rectis margine asperis apice abruptè et breviter mucronatis pungentibus, tubo intùs glabro, corollæ purpureæ hirtæ tubo incluso labio superiori brevi integro inferioris lobo intermedio latissimo truncato retuso.

Hab. in aridis siccis ad montem *Carmelum* et circâ *Naplouse Palestinæ* (Boiss.). Fl. vere.

Caules erecti vel diffusi 8-10 pollicares ferè a basi floriferi, folia inferiora vix pollicem longa 4-5 lineas lata, calyx fructifer ferè tres lineas longus. Habitus *Sideritidis purpureæ* sed vera *Stachys*; affinis *S. Satureioidi*, *S. burgsdorffioidei* et *S. ramosissimæ* a quibus calycis tubo intùs glabro nec longè albopiloso, dentibus nervoso-reticulatis latis abruptè aristulatis differt.

STACHYS BURGSDORFFIOIDES Bois. (Sect. *Olisia*).

St. annua breviter pubescens viscidula, caulibus ramosis, foliis oblongo-linearibus basi longè angustatis obtusis remotè denticulatis subtrinerviis, floralibus linearibus integris flores superantibus, verticillastris numerosis 4-6 floris omnibus distantibus, calycis tubulosi hirsuti hispiduli dentibus a basi triangulari subulato-spinosis demùm subincurvis tubo triplò brevioribus, fauce albo-pilosissimâ, corollæ rubræ hirtulæ tubo dentibus calycinis vix longiori exannulato.

St. Satureioides var. *burgsdorffioides* Bth. in DC. Prodr.

Hab. in *Syriâ* propè *Antab* (Aucher N° 1698), in *Mesopotamiâ* inter *Suerek* et *Diarbekir* (Kotschy).

Caules a 2 pollicibus ad pedem dimidium longi, folia 9-12 lineas longa basi in petiolum angustata 4 lineas lata. Verticillastri 4-12 racemum sæpè semipedalem formantes. Calix 2 $1\frac{1}{2}$ lineas corolla 4 $1\frac{1}{2}$ lineas longi. Pluribus speciminibus observatis eam a *S. Satureioides* distinctam autumo. Hæc differt foliis integerrimis semper angustè linearibus, pubescentiâ brevissimâ, verticillastris superioribus confertis, calycibus 3 $1\frac{1}{2}$ lineas longis, tubo corollino calyce subduplò longiori, fauce valdè ampliata.

LAMIUM TRUNCATUM Boiss. (Sect. *Lamiopsis*).

L. perenne caulibus diffusis simplicibus laxè foliosis, foliis petiolo longissimo patulo suffultis teneris viridibus sub lente parcissimè et adpressissimè setulosis ovato-oblongis obtusis basi truncato-subcordatis utrinquè profundè 9-13 crenato-lobatis lobis magnis ovatis obtusis, floribus subsenis sessilibus in capitulum terminalem foliis axillaribus brevioribus, bracteis subulatis calycino tubo brevioribus, calycis adpressè hirtuli laciniis patentibus lanceolatis longissimè setaceo-acuminatis tubo duplò longioribus inferioribus brevioribus, corollâ roseâ calycinis dentibus duplò longiori extùs hirtâ tubo intùs basi annulato annulo supernè tantùm piloso, labio superiori valdè albo-hirsuto integro apice truncato, inferioris lobis lateralibus longissimè setaceo-acuminatis intermedio basi valdè strangulato pendulo ovato-retuso, fauce ampliata, antheris hirsutis.

Hab. in rupestribus umbrosis ad *Banias Galileæ*. Legi Maio 1846.

Caules sesquipediales, petioli inferiores 3-3 $1\frac{1}{2}$ pollices, folia tres pollices longa 2 pollices basi lata. Calyx 7 lineas longus, corolla 14-15 lineas longa. Habitus *L. striati*. Species foliis longè petiolatis, labio superiori truncato-subquadrato, inferioris lobis lateralibus longè setaceis distinctissima.

LAMIUM FILICAULE Boiss. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846. DC. Prodr. III. pag. 807 (Sect. *Lamiopsis*.)

L. perenne, caulibus filiformibus subterraneè repentibus parte exsertâ brevissimis foliorum 1-3 paria ferentibus hirsutis, foliis infimis longiusculè cæteris breviter petiolatis utrinquè adpressè villosis griseis parvis rotundato-reniformibus cordatis rotundato-crenatis, verticillastris numero 1-2 quadri vel sexfloris, bracteis paucis linearibus

minimis, calycis hirsuti dentibus latè triangularibus brevibus mucronatis patulis, corollæ calyce triplò longioris tubo recto intùs annulato, galeà hirsutà integrà, labii inferioris lobis lateralibus in appendicem subulatam abeuntibus, antheris hirsutis.

Hab. in monte *Tostchal* propè *Teheran* ad lacum *Derja-i-jach* Kotschy pl. Pers. bor. Floret Julio.

Caules parte exsertà 1-2 pollicares, folia diametro 4-6 lineas lata, calyx 4 lineas longus. Corolla flaves cens 9-10 lineas longa. Affine *L. vestito* Bth. quod foliis amplioribus, calycinis dentibus longè subulatis distinguitur. Hoc *L. vestitum* a *L. tomentoso* Willd. C. A. Meyer Enum. pl. Caucas. vix specificè differt.

Obs. *Lanium erythrotrichum* Boiss. Diagn. V. ad *Wiedemannia* genus referendum et est *W. erythrotricha* Bth. DC. Prodr. XII pag. 803.

LAGOCHILUS KOTSCHYANUS Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846. DC. Prodr. XII p. 813.

L. totus hirtò-puberulus caulibus albidis simplicibus aut basi subramosis, spinis axillaribus rectis puberulis folio paulò brevioribus, foliis ovato-cuneiformibus ad basin usquè tripartitis partitionibus angustè linearibus margine revolutis omnibus 2-3 fidis lobis in mucronem spinulosum attenuatis, calycis tubo ovato lanato dentibus longè elliptico-linearibus basi attenuatis spinoso-mucronatis glabris tubo plùs duplò longioribus, galeà indivisà.

Hab. propè pagum *Asadbar* in parte occidentali montis *Elbrus* Kotschy pl. Pers. bor. N° 459.

Caules semipedales, spinæ sex lineas longæ; calycis tubus 2 1/2 lineas longus, lacinia 6-7 lineas longæ. Valdè affinis *L. Aucheri* a quo differt foliis magis dissectis, calycis tubo lanato laciniis non ut in eo angustè linearibus in mucronem attenuatis sed basi angustatis ellipticis apice obtusiusculis mucronatis.

BALLOTA DAMASCENA Boiss. in pl. Syr. exs. 1846. (Sect. *Beringeria*).

B. basi suffruticosa multicaulis caulibus herbaceis lanà albà adpressà densè bombycinis simplicissimis erectis flexuosis parcè foliosis, foliis brevissimè petiolatis tomento griseo subflavido denso ve-

stilis orbiculari-cordatis parvis obtusissimè crenulatis, verticillastris 2-3 remotissimis multifloris ad axillas foliorum floralium conformium deflexorum eis breviorum sitis, bracteis angustè oblongo-spathulatis acutiusculis calyce brevioribus, calycis densè tomentosi limbo patenti tubo duplò breviori brevissimè 10-12 crenato crenis minutissimè spinulosis, corollæ roseæ valdè hirsutæ tubo incluso labio superiori longo recto angustè lineari apice bifido inferioris lobo intermedio latè emarginato.

Hab. in collibus calidis ponè pagum *Salhie* propè *Damascum*. Legi floriferam Maio.

Vix pedalis, folia diametro 6-7 lineas lata, verticillastri magnit. nucis parvæ, calycis tubus 2 $\frac{1}{2}$ lineas longus limbus diametro 2 $\frac{1}{2}$ -3 lineas circiter latus. Pulchra species caulibus densè bombycinis insignis.

BALLOTA LARENDANA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. DC. Prodr. XII p. 519. (Sect. *Beringeria*).

B. tota molliter et patulè hirsuta, caulibus basi prostratis ramosis, foliis amplis cordatis rotundatis grossè et rotundatim crenatis petiolatis subtùs magis canescentibus, floralibus minoribus breviter petiolatis verticellis paulò longioribus, verticillastris multifloris approximatis, bracteis linearibus acutis calyce subtriplò brevioribus, calycis breviter tomentosi grisei limbo patulo tubo quadruplò breviori dentibus decem triangularibus acutis, corollæ tubo incluso labio superiori valdè hirsuto.

Hab. ad ruinas urbis antiquæ *Larenda* in *Lycaonià* ad radices montis *Karadagh* (Heldr), Fl. Julio.

Caules pedales a basi ramosi, folia majora diametro sesquipollinaria; verticillastri minùs floribundi eis *B. hispanicæ* cui affinis est et a quà foliis rotundatis, bracteis brevissimis, calycis dentibus non subulatis distinguitur. *B. Aucheri* quoque affinis differt calyce 16 dentato aliisque notis.

PHILOMIS ARMENIACA Willd. var. *brachyodon*. Boiss.

Folia ovata obtusa valdè cordata. Indumentum plantæ cano-flavescens pannosum. Caules simplices pumili. A formâ vulgatiore speciei

differt dentibus calycinis ovatis vel oblongis brevibus obtusissimis ut in *Ph. Nissolii*.

Hab. in Palæstinâ inter *Hierosolymam* et *Jericho*. Boiss.

PHLOMIS SYRIACA Boiss. (Sect. *Gymnophlomis*).

P. basi suffrutescens tota indumento pannoso adpressissimo tenui griseo vel flavido tomentosa, caulibus paniculato-ramosis, foliis radicalibus longè petiolatis basi truncato-subcordatis oblongo-linearibus vel latè linearibus obtusis, caulinis oblongis in petiolum brevem attenuatis, verticillastris 4-6 floris parùm distantibus foliis floralibus latè linearibus obtusis eis æquilongis suffultis, calycis densè tomentosi angulati dentibus brevibus latis ovatis muticis, corollæ tubo incluso galeâ hirsutissimâ apice minutè tridentatâ, inferioris lobis lateralibus ferè obsoletis intermedio latè bilobo.

Hab. in collibus siccis circa *Aleppum* et *Antiochiam* (Boiss.) Fl. Julio.

Folia radicalia petiolo 2-3 pollices longo suffulta 3-8 pollices longa 7-9 lineas lata. Panicula omninò *Ph. Nissolii* a quâ ut *Ph. lanceolata* a *Ph. Armeniacâ* foliorum formâ, indumento adpresso nec floccoso crasso distinguitur.

PHLOMIS CHRYSOPHYLLA Boiss. in pl. Syr. exs. 1846. (Sect. *Dendrophlomis*).

Ph. fruticosa tota indumento brevissimo tomentoso foliorum juniorum aureo reliquarum partium griseo-flavido tenuiter pannosa, foliis breviter ovatis cordatis obtusissimis subtus valdè nervoso-reticulatis floralibus oblongo-spathulatis obtusis verticillos superantibus, verticillastris solitariis vel binis multifloris sessilibus densissimis remotis, bracteis angustè linearibus rigidis duris subpungentibus calyce paulò brevioribus, calycis stricti densè aureo-pannosi valdè sulcati acutè angulati truncati angulis in denticulos spinulæformes minutos abeuntibus, corollæ intensè aureæ tomentosæ labio superiori amplo valdè curvato extremitate obsoletè tridentato, inferioris intermedio lobo emarginato.

Hab. in regione inferiori *Hermonis* suprâ *Rascheya* et in *Antilibano* propè *Zebdani* (Boiss.) Fl. Jul.

Suffrutex 5-6 pedalis, folia juniora parva, majora 1 1/2-2 pollices longa, calyces 6 lineas longi. Affinis *Ph. aureæ* a qua indumento adpresso tenuiori non floccoso, foliis brevioribus latioribus, bracteis angustissimis, calycis brevioris truncati dentibus dimidiò brevioribus spinuliformibus egregiè differt.

Obs. *Ph. cymifera* Boiss. Diagn. VII ut cl. Benth. rectissimè observavit nihil est nisi *Ph. Persica* Boiss. in Diagn. N° V, ex specimine incompleto descripta.

EREMOSTACHYS GLABRA Boiss. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846. DC. Prodr. XII p. 548.

E. glaberrima, caule elato albicanti simplicissimo, foliis radicalibus longè petiolatis oblongo-lanceolatis acutis profundè et rotundatim crenato-lobatis basi breviter cuneatis vel truncato-subcordatis lobis inferioribus profundioribus, foliis caulinis paucis brevioribus subsessilibus, floralibus cuneato-subspathulatis apice spinulosis 3-4 dentatis flores subsuperantibus vel æquantibus, verticillastris paucifloris numerosis remotis, bracteis setaceis rigidis calyce dimidio brevioribus, calycis glabri rigidi membranacei dentibus 5 brevibus teneris truncato-retusis subquadratis ciliatis dorso in spinam setaceam eis duplò longiorè abeuntibus, corollæ tubo incluso.

Hab. in monte *Elbrus* propè pagum *Passgala* Kotschy pl. Pers. bor. N° 290.

Caules bipedales pennà anserinà tenuiores, folia radicalia petiolo 2-3 pollicari suffulta 3-5 pollicaria 12-15 lineas lata. Verticillastri numero 4-9 inter se 1-3 pollices distantes subsexflori, calyces 6-7 lineas longi, spinæ loborum 2 lineas longæ. Species distinctissima inter *Phlomidem* (Sect. *Phlomidopsis*) et *Eremostachydem* intermedia sed huic generi propter affinitatem cum *E. gymnocalyci* adsocianda.

TEUCRIUM PESTALOZZÆ Boiss. (Sect. *Teucris*).

T. suffruticosum, caulibus procumbentibus tortuosis lignosis, ramis pumilis erectis densè foliosis ramulosis, ramulis sub lente minutissimè et adpressè puberulis, foliis rigidis duris utrinquè glabriusculis oblongo-linearibus linearibusve basi attenuatis sessilibus obtusis suprà nitidis subtùs albidis margine valdè revolutis nervo medio elevato

percursis, floralibus oblongis acutis pedunculos superantibus, floribus binis oppositis pedunculis tenuissimis calyci subæquilongis suffultis subunilateralibus racemum brevem laxiusculum formantibus, calyce parçè et brevissimè sub lente pilosulo ad medium usquè in dentes triangulares acutos subpungentes partito, corollà subtùs præsertim adlobum intermedium elongatum densè albo-barbatà.

Hab. in *Lycià* propè *Elmalu*. Comm. cl. D^r Pestalozza.

Rami in meo specimine 3-5 pollicares, folia 6-8 lineas longa 1-1 1/2 lata. Calyces fructiferi demùm 3 lineas longi. Affine *T. brevifolio* et *T. Cretico* quæ differunt foliis in specie priori oblongis, in posteriori multò longioribus subtùs canis, calyce tomentoso, corollis breviter tomentellis vel glabriusculis.

TEUCRIUM NIVALE Boiss. (Sect. *Teucri*).

T. totum crispulè pubescens, rhizomate lignoso multicauli, caulibus pumilis simplicibus, foliis sessilibus ambitu rotundatis bipinnatisectis laciniis tenuiter linearibus confertis, floribus solitariis pedunculis oppositis folia floralia non superantibus calyce subduplò longioribus suffultis racemos terminales foliosos breves formantibus, calycis canescentis dentibus angustè lanceolatis acutis tubo æquilongis, corollæ calyce triplò longioris lobis lateralibus acutis.

Hab. in cacumine montis *Gebel es Scheick (Hermon)*. Boiss. alt. circ. 9000'. Fl. Julio.

Caules semipedales stricti, folia 5-6 lineas longa, pedunculi 4-5 lineas longi. Affine *T. Orientali* a quo differt rhizomate lignoso, caulibus simplicibus nec paniculatis, laciniis foliorum magis strictis, pedunculis 4 nec trifloris folio florali subbrevioribus, indumento crispulo.

TEUCRIUM SINAICUM Boiss. (Sect. *Polium*).

T. fruticosum ramosissimum ramis strictis patulè et densè hirsutis, foliis sessilibus oblongo-linearibus obtusis supernè crenulato-plicatulis margine revolutis hirsuto-tomentosis griseis, floribus in capitula globosa terminalia densa foliis eis brevioribus stipata condensatis, calycis breviter companulati dentibus subæqualibus brevissimis triangulari-ovatis, corollæ labio inferiori oblongo elongato.

T. polium var. *pilosum* Decaisne Flor. Sinaïca in Ann. Sc. Nat.

Hab. in montibus *Sinaiticis Arabiæ* (Bovè, Schimp., Boiss.).

Meo sensu et vivum observatum a *T polii* varietatibus planè diversum caulibus fruticosis ferè pedalis, ramis erectis patulè hirsutis nec adpressè albo-tomentosis, capitulis solitariis nec conglobatis, labio corollæ provectori.

AJUGA PALÆSTINA Boiss. (Sect. *Chamæpitys*).

A. perennis basi suffrutescens, caulibus diffusis ramosis patulè lanatis, foliis radicalibus lineari-spathulatis obtusè et brevissimè dentatis, caulinis et floralibus strictis brevibus ad medium usquè in lacinias lineares breves obtusas tripartitis omnibus adpressiusculè hirsutis canescentibus, verticillis folia floralia æquantibus bifloris racemos longos infernè laxos parte superiori densos formantibus, calyce sessili brevissimo densè et breviter canescenti ad tertiam partem usquè in lobos breviter triangulares acutos fissio, corollà aurantiaco-flavà hirsutà calyce plus triplò longiori tubo exserto, lobo inferiori labii ovato-rotundo basi strangulato viridi purpureo-punctato.

Hab. in collibus circà *Hierosolyman* et *Damascum* (Boiss.).

Planta 4-6 pollicaris, folia floralia intermedia circiter sex lineas lata, calyx 2 lineas corolla 6-7 lineas longi. Ab *A. Chia* differt foliis strictis minùs profundè trisectis laciniis brevioribus, lobo inferiori corollæ latiori punctato, lobis calycinis brevioribus latioribus, fructibus minùs rugosis. *A. tridactylites* differt foliis latioribus cuneato-spathulatis, racemis densis, colore florum, dentibus calycis longioribus.

PLUMBAGINACEÆ.

STATICE ICONIA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. DC. Prodr. XII, p. 661 (Sect. *Limonium Hyalolepideæ*).

St. perennis glabra tota tuberculis centro punctato-depressis scabra, foliis parvis citò evanidis obovatis obtusis in petiolum brevem attenuatis, scapis humilibus a basi ramosissimis, ramis flexuosis inferioribus sterilibus parcè ramulosis lobulis brevibus strictis superioribus corymboso-paniculatis spiculis minutissimis bifloris in spicas breves secundas patulo-scorpioideas densè imbricatis, bracteis infimis hyali-

nis obtusis superiori duplò longiori vix imâ basi herbaceâ cæterum omninò hyalinâ retusâ, calycis tubo brevissimo ad costas et inter eas piloso, limbi tubo longioris obconici lobis enerviis ovatis obtusis crenulatis.

Hab. in salsis planitieï *Koniah* Heldr. Fl. æstate.

Planta semipedalis ramosissima media inter *S. Caspiam* et *S. decipientem* a priori floribus dimidiò minoribus, bracteis ferè omninò hyalinis, tubo calycis brevissimo toto hirsuto, a posteriori scapis humilibus patulè nec strictè ramosis, ramis sterilibus non multifidis tuberculis glabris nec spinulosis obsitis floribusque minoribus diversa.

STATICE GLOBULIFERA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. DC. Prodr. XII pag. 665 (Sect. *Sphærostachys*).

S. perennis glabra glaucescens calcareo-punctata, foliis ad collum densè rosulatis coriaceis ovato-spathulatis obtusis vel retusis mucronulatis angustè et crispulè membranaceo-marginatis in petiolum planum brevem basi dilatà vaginantem infernè attenuatis, scapis elatis erecto-flexuosis subangulatis a medio subdichotomè paniculato-ramosis, spiculis in globulos subsphæricos secùs ramos sessiles inferiores distantes superiores approximatos densissimè congestis, bracteis inferioribus omninò membranaceis rufescentibus planis a basi ovatâ mucronulatis ad basin globuli imbricatis, superiori duplò longiori ovato-rotundâ dorso viridi plicato-subcarinatâ margine et apice latè hyalinâ obtusissimâ flores subæquanti, bracteolis interfloralibus numerosis, calycis tubo insertionè recto breviter obconico toto densè albo-hirsuto; limbo tubo dimidiò breviori recto albo lobis brevibus subrotundis undulato-plicatis, corollâ roseâ calyce vix longiori a basi polypetalâ æstivatione contortâ post anthesin corculatâ, filamentis imâ basi petalorum adnatis, stylis a basi distinctis.

Hab. in salsis hyeme inundatis planitici *Koniah* (Heldr.). Fl. æstate.

Folia 1 1/2 pollices longa 8-9 lineas lata petiolo pollicari suffulta. Scapus ferè pedalis. Globuli florum magnitudinis pisi in paniculâ subsecundâ 15-30. Flores minuti. Calyx vix lineâ unâ longior obconicus.

PLANTAGINACEÆ.

PLANTAGO ARABICA Boiss. in pl. Pinard. Orient. exs. 1847 (Sect. *Psyllium*).

Pl. perennis caulibus suffrutescentibus ascendentibus dumosis cicatricosis nudis apice ramosis, ramis densè foliosis erectis simplicibus, foliis strictis ramo adpressis lineari-triquetris integerrimis obtusiusculis incurvatis hispido-viscidissimis, pedunculis ex axillis superioribus paucis corymbosis hispido-viscidis folia paulò superantibus, spicis ovato-rotundis paucifloris, bracteis ovalis breviter acuminatis calycisque laciniis ovalis anterioribus inter se coalitis posterioribus obsoletè carinatis carinà viridibus omnibus acutiusculis breviter hirtoviscidis, corollæ laciniis ovato-lanceolatis acutis mucronatis fusciscentibus.

Pl. psyllium Unio Itin. pl. exs non L. — *Pl. psyllium* S. *Sinaica* Barnèoud monogr. Plant. — *Pl. Sinaica* Decaisne in DC. Prodr.

Hab. in jugi *Sinaitici* arenosis (Schimper N° 172, Aucher N° 2717), copiosè in valle *Arbain* (Boiss. Pinard).

Planta dumulos densos erectos pedales formans, folia in specimenibus macrioribus 9-18 lineas longa $1\frac{1}{2}$ lineam lata in majoribus autem lineam ferè lata. Pedunculi 1-1 $1\frac{1}{2}$ pollicares. Capitula piso paulò majora 5-7 flora. Nullo pacto cum *Pl. psyllio* aliisque speciebus annuis sectionis confundi potest, *Pl. cynops* autem cui magis accedit præter indumenti viscidii deficientiam optimè a nostrâ distinguitur foliis multò tenuioribus longioribus, pedunculis elongatis, bracteis inferioribus in caudam herbaceam eis æquilongam abeuntibus, laciniis calycinis acutè carinatis, caulibus humilioribus basi procumbentibus. cl. Barnèoud hanc ut varietatem nec ut speciem propriam loco citato habuit, eam igitur sub nomine specifico jam anno 1847 a me proposito descripsi.

CHENOPODIACEÆ.

ATRIPLEX LEUCOCLADA Boiss. (Sect. *Teutliopsis*).

A. perennis basi suffrutescens, caulibus numerosis prostratis vel ascendentibus teretibus ramosis subflexuosis albidis internè glabrescentibus supernè furfuraceo-squamosis, foliis alternis obtusis eodem indumento furfuraceo-squamoso canis subnitentibus infimis minoribus oblongis basi brevissimè cuneatis petiolo brevi insidentibus subintegris cæteris basi latioribus truncatis utrinquè internè obtusè 1-2 dentatis subsinuatisve deltoideo-oblongis sessilibus, summis sessilibus triangularibus, florum glomerulis in racemos graciles demùm elongatos nudos remotiusculè dispositis, perigonio fructifero (juniori) basi breviter cuneato labiis ad medium usquè trilobis lobis obtusissimis rotundatis intermedio paulò majori.

Hab. in desertis *Arabie Petreæ*, valles montis *Sinai* (Bové, Schimper N° 434 sub. *A. rosea*), *Wadi Useit* (Boiss.). Fl. marte. Arabicè vulgò *Burgul* vel *Rocholl*.

Rami 1 1/2 pedales, folia intermedia 6-9 lineas longa 5-6 lata inferiora et superiora decrescentia, racemi sub fine antheseos numerosi terminales 3-4 pollicares. Habitu et foliis valdè affinis *A. diffusæ* Ten. var. *commutatæ* Guss. quæ in maritimis Gallie australis, Hispanie et Italie occurrit et præter dentes foliorum acutiores indumentumque parcius potiùs farinaceum quam tomentello-lepidotum faciliè dignoscitur perigonio triangulari-rhombeo internè albo-cartilagineo apice 3-5 dentato dentibus acutis triangularibus lateralibus brevissimis.

ATRIPLEX LASIANTHA Boiss. (Sect. *Teutliopsis*).

A. annua, caulibus nanis tenuibus albidis internè angulatis sub lente parcè vesiculoso-papillosis vel glabris simplicibus vel parcè ramosis foliosis, foliis oblongis glaucis utrinquè sed subtùs copiosius papillulis vesiculosis canescentibus margine subundulatim repando-denticulatis inferioribus petiolatis obtusis superioribus sessilibus acutiusculis,

glomerulis florum racemulos breves terminales basi subinterruptos foliisque supremis stipatos formantibus, perigonii phyllis extus papillis nigricantibus hirtis, fructu....

Hab. in regione superiori *Libani* suprâ *Cedros* ubi Junii fine eam floriferam legi.

Var. *S. lanceolata*. — Folia lanceolata a basi breviter cuneatâ sæpè utrinquè dente majori acuta acutiora.

Hab. in monte *Kuh-Daëna Persiæ Australis* (Kotschy N° 714 sub. *A. laciniatæ* var).

Species ob fructum ignotum adhucdum imperfectè nota sed inter omnes sectionis racemis ob papillas perigonii nigricanti-hirtis notabilis. Est probabiliter ex affinitate *A. laciniatæ* vel *A. patulæ*. Caules 2-3 pollicares fructiferi probabilissimè longiores, folia 6-8 lineas longa 3-4 lata in varietate β sæpè 12-15 lineas longa. Spicæ floriferæ terminales 5-6 lineas longæ. Ambo formæ habito et characteribus florum optimè congruunt.

ATRIPLEX PERSICA Boiss. (Sect. *Teutliopsis*).

A. fruticosa, ramis tenuibus virgatis teretibus ramulosis epidermide tenui albidâ vestitis apice puberulis internè glabris, foliis indumento adpressissimo canis basi brevissimè cuneatis subtruncatisve breviter petiolatis oblongis obtusissimis integerrimis sæpè deltoideis, racemis fructiferis terminalibus laxiusculis, perigonio fructifero adpressè albo-velutino ovato-orbiculari basi breviter attenuato integro vel obsoletè repando-triangulato angulis obtusiusculis.

Hab. in desertis *Persiæ* Aucher N° 5268.

Habitu, foliorum magnitudine et formâ *A. halimus* referens sed indumento ferè minùs adpresso obsita, racemi fructiferi 1 1/2 pollicares, perigonium fructiferum 3-4 lineas longum 2 1/2-3 latum. *A. halimus* differt fructu transversè latiori reniformi basi subcordato glabro vel parcè hirtulo.

ATRIPLEX PALESTINA Boiss. (Sect. *Obione*).

A. suffruticosa tota indumento denso papilloso cana caulibus diffusis teretibus velutino-papillosis abbreviatis dumosis ramosis ramisque densiusculè foliosis, foliis sessilibus vel subsessilibus basi attenuatis infimis parvis ovatis vel oblongo-spathulatis integerrimis cæteris ob-

longo-linearibus vel lineari-subrhombis integris vel eroso-denticulatis, summis linearibus integris, omnibus obtusis vel acutiusculis, axillis sæpiùs fasciculos foliorum edentibus, florum glomerulis racemos terminales tenues longiusculos interruptos laxos formantibus inferioribus folio suffultis, perigonio fructifero sessili oblongo-rhombeo minuto basi longiusculè et acutè cuneato apice obtuso facie utrâque 3-4 tuberculis validis dentiformibus instructo.

Hab. in incultis *Ægypti* ad *Alexandriam* (Kralik), *Arabiae Petreæ* et *Palestinæ* conterminæ (Boiss.), *Judeæ* inter *Jerusalem* et *Jericho* (Boiss.), ad basin collium *Damasci* (Boiss.)

Caules numerosi ascendentes semipedales, folia majora 9-11 lineas longa circiter tres lata. Racemi fructiferi 3-4 pollicares, fructus 1 1/2 lineas longus lineam unam latus. Radicula lateralis ascendens. Hæc species quæ est forsitan ex parte *A. glauca* DC. Prodr. a speciminibus Hispanicis *A. glauca* verè certè differt caulibus diffusis nec ascendentibus, foliis non ovatis subrotundisve integris sed elongatis lineari-rhombis, fructu oblongo nec subrotundo-rhombeo, sublobato nec trilobato. — Genus *Obione* situ radiculae ab *Atriplice* tantùm discedens mihi saltem quoad sectionem primam DC. Prodr. ab *Atriplice* non satis distinctum videtur.

CHENOLEA ARABICA Boiss.

Ch. suffruticosa, caulibus ascendentibus dein erectis ramosis dumum humilem formantibus ramisque foliosis lanâ albâ brevi vestitis fructiferis subglabrescentibus infimis floralibusque abbreviatis, floribus hermaphroditis in glomerulos densos bombycinos ovatos vel subrotundos ramos spicæformes terminales basi interruptos formantes dispositis, bracteis ovato-oblongis glabrescentibus flores stipantibus eisque subæquilongis, perigonio albo-membranaceo urceolato breviter et obtusiusculè 3 dentato extûs longè et densè albo-bombycino.

Hab. in desertis jugi *Tih Arabiæ petreæ* ubi Martio floret, in declivibus aridis *Judeæ* versùs vallem *Jordani* infrâ *St. Saba* Aprili fructifera (Boiss.).

Caules breves prostrati vel ascendentes dumos semipedales formantes, rami ob indumentum lanatum crassiusculi, folia majora 3-4 lineas longa lineam unam lata. Spicæ florum 2-3 pollicares ex glomerulis densis 5-15 floris 2-4 lineas longis inferioribus valdè distan-

tibus superioribus minoribus confluentibus constantes. Perigonium fructiferum 1 $\frac{1}{4}$ lineas longum ovato-rotundum. Semen horizontale ovatum extremitate radiculari acutiusculum radicula circulari elevata. Planta characteribus generis optimè congruens a specie Canariensi ejusdem generis indumento multò magis lanato, floribus bombycinis nec virescentibus glomerulosis nec per 1-3 in axillis dispositis, spicis crassis nec tenuibus distincta.

CHENOPODINA ASPHALTICA Boiss.

Ch. fruticosa, caulibus erectis patentim ramosis cinerascentibus ramisque tenuibus striato-subangulatis glabris, foliis carnosulis elongatis lineari-filiformibus obtusis in petiolulum obscurè attenuatis, floralibus abbreviatis, floribus 1-3 in axillis sessilibus vel ob pedicellum adnatum ex petiolo folii floralis veluti oriundis bracteolis minutissimis albo-membranaceis stipatis, perigonio fructifero immutato, semine horizontali.

Hab. in *Judæa*, ad littora septentrionalia lacus *Asphaltitis* ubi legi Maio 1846.

Frutex. Caules et rami tenues cortice cinerascenti vestiti subrimoso-striati. Folia 5-7 lineas longa $\frac{3}{4}$ lineæ lata, floralia 2-3 lineas longa. Flores illis *Ch. maritimæ* ferè minores. Species caractere glomerulorum superiorum petiolo adnatorum notabilis, affinis *Ch. dendroidi* quæ differt floribus duplò majoribus, ramis crassioribus etc, et *Ch. physophoræ* quæ habitu et ramis patulis similis est sed quæ eis tuberculatis, perigonio fructifero inflato, foliis longioribus distinguitur.

CAROXYLON LANCEFOLIUM Boiss.

Ch. suffruticosum, caulibus erectis subangulatis junioribus lineis albis viridibusque striatis elongatim et subpyramidatim ramosis, foliis e basi latiori utrinquè plùs minùsve longè decurrenti longè lanceolatis subulato-attenuatis glaucescentibus glabris, floralibus multò angustioribus brevioribusque patentibus vel deflexis, floribus in axillis ramorum solitariis sessilibus numerosis, bracteis folio floralis perigonioque multò brevioribus triangulari-lanceolatis acutiusculis, perigonii foliolis oblongo-triangularibus obtusis margine membranaceis, fructùs alis patentibus amplis subinæqualibus subrotundis margine crenato-dentatis adpressè plicato-striatis.

Salsola lancifolia Boiss. Mss.

Hab. ad littora septentrionali lacùs *Asphaltitis* in *Judæa* (Boiss).

Planta 1 1½ pedalis, caules ramique rigidi multiflori, folia plana carnosula longè attenuata acutissima 1-1 1½ pollicaria basi 1-2 lineas lata, floralia 1 1½ lineas longa. Bracteæ perigonio subdimidiò breviores, perigonii fructiferi alæ 1 1½-2 lineas latæ. Species affinis *C. acutifolio* Moq.-*decurrenti* J. et Sp. quod differt ramis tenuioribus magis elongatis, foliis brevioribus breviter attenuatis superioribus oblongis vel ovatis, ramis longioribus tenuioribus remotiusque floriferis, alis fructus sæpè duplò latioribus. Nectarium cyathiforme in nostrâ specie valdè obscurum.

POLYGONACEÆ.

POLYGONUM LIBANI Boiss. (Sect. *Avicularia*).

P. glabrum perenne, radice verticali durâ ad collum suffrutescenti, ramis brevissimis prostratis foliis ochreisque densè imbricatis omnino tectis, foliis carnosulis pallidè virentibus elliptico-linearibus obtusiusculis mucrone albedo facilè evanido instructis basi attenuatis facie superiori enerviis subtùs basin versùs crassè uninerviis margineque subrevolutis, ochreis niveis ventricosis ovatis enerviis apice 4-5 fimbriato-laceris folio tertiâ vel dimidiâ parte brevioribus, floribus solitariis axillaribus sessilibus ochreis occultatis, ochreolâ campanulatâ florem includenti perigoniumque æquanti vel subsuperanti profundè fimbriatâ, perigonii albedo-virescentis ultrâ medium lobati lobis exterioribus duobus acutiusculis cæteris obtusis, acheniis . . .

Hab. in cacuminibus excelsis *Libani* in jugo *Makmel* dicto et *Anlibant* in monte *Hermone* rarum. Legi floriferum Julio 1846.

Rami in meis speciminibus pollicares cæspites parvos formantes, folia circiter tres lineas longa latiora supernè vix unam lineam lata. Ex affinitate *P. Kotschyani* Boiss.-*thymifolii* J. et Sp. et *P. radicosi*, ramis abbreviatis et floribus solitariis ab eis statim dignoscendum, facie non absimile *P. paronychioidi* P. et M. quod differt foliis elongatis apice attenuatis, ochreis lanceolatis folia æquantibus aliisque notis.

RUMEX ELBURSENSIS Boiss. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846 (Sect. *Lapathum*).

R. caule erecto striato infernè folioso simplici supernè in paniculam elongatam spiciformem depauperatam laxiusculam abeunti, foliis petiolo eis paulò breviori supernè plano vel basin versùs subcanaliculato infernè convexo striato suffultis oblongo-lanceolatis acutiusculis basi inæqualibus vel breviter cuneatis vel rotundato-subtruncatis teneris viridibus, caulinis breviter petiolatis, floralibus paucissimis lanceolato-linearibus ad basin verticillorum inferiorum sitis, pedunculis fructiferis deflexis perigonio sesqui vel duplò longioribus capillaribus sub perigonio incrassatis, perigonii laciniis interioribus amplis orbicularibus basi truncatis nudis reticulatis acutiusculis circum-circà obsoletè eroso-denticulatis.

Hab. in monte *Elbrus* propè pagum *Passgala* Kotschy pl. Pers. bor. N° 294.

Planta ut videtur 2-2½ pedalis, folia radicalia petiolo 4-5 pollicari suffulta 8-10 pollices longa 2½ lata, panicula angusta ferè pedalis. Valvulæ perigonii 4 lineas diametro latæ. Ex affinitate *R. patientiæ* a quò foliis magis teneris, paniculà depauperatà, valvulis basi non cordatis semper nudis discedit. *R. domesticus* qui quoque valvulis nudis gaudet longe differt foliis firmis margine undulato-crispis, paniculæ foliosæ ramis densè fructiferis, valvulis minoribus basi cordatis etc.

Obs. Planta de quà in Diagn. pl. Or. V. p. 46 sub *R. peregrini* nomine locutus sum est *R. uncatu* Hort.-*hamatus* Trevir. Mea specimina Anatolica Javanicis a cl. Zollinger missis præter valvularum apicem magis abbreviatum simillima sunt. Verum *R. peregrinum* *R.* et Sch. adhucdùm non novi.

RUMEX RAULINI Boiss. (Sect. *Lapathum* L.)

R. glaber, radicis collo crasso subsquamoso nigro, caule erecto angulato-sulcato a basi ipsà pluries dichotomo, ramis elongatis, foliis radicalibus longè petiolatis parvis oblongo-obovatis obtusis basi breviter attenuatis margine tenuissimè undulatis teneris subtùs ad nervos sæpè papillis raris obsitis, floralibus breviter petiolatis lineari-lanceolatis acutiusculis ex unoquoque verticillo singulis eoque

duplò longioribus, verticillis ad omnes dichotomias et secùs ramos inter se remotis, pedunculis fructiferis reflexis duris sub medio articulatis et ibi annulatim inflatis sub fructù iterùm incrassatis eo æquilongis vel paulò longioribus, laciniis perigonii fructiferi interioribus triangularibus valdè reticulato-insculptis utrinquè dentibus 4-6 rigidis validis linearibus apice indivisis vel bifurcis valvulæ latitudine longioribus instructis omnibus graniferis, valvulæ appendice terminali obtusiusculà subdenticulatà, granis oblongis tuberculatis valvulæ dimidiæ æquilongis.

Hab. in insulà *Cretà* nudè retulit cl. V. Raulin.

Planta pedalis, folia radicalia petiolo tripollicari suffulta, 1-1 1/2 pollices longa 9-12 lineas lata. Valvulæ fructiferae 2 1/2 lineas longæ, spinæ marginales sesquilineam aut ampliùs longæ. Affinis *R. divaricato* quem botanici plures pro varietate *R. pulchri* habent ab eo distinctus foliis minoribus basi non cordatis substantiæ tenuioris, ramis erectis nec divaricatis, spinis valvularum multò validioribus longioribusque. In *R. divaricato* et *pulchro* spinæ marginales dimidià latitudine valvulæ breviores sunt. *R. suffocatus* Moris nostræ speciei formà valvularum affinis est planta multò minor acaulis vel subacaulis, verticillis subcontiguis, fructu minori, spinis valvularum latitudine brevioribus.

RUMEX TMOLEUS Boiss. (Sect. *Acetosa*).

R. perennis, radice . . . , caulibus erectis rigidis valdè striato-sulcatis internè foliosis, foliis crassiusculis firmis glaucis obsolete tuberculatis glabris margine tenuissimè et obsolete crispulis oblongo-triangularibus acutis basi hastatis auriculis divergentibus triangulari-acutis indivisis vel lobulo auctis, infimis petiolatis superioribus sessilibus, ochreis margine integris, paniculà terminali thyrsoidèa densissimè multiflorà contractà, perigonii laciniis exterioribus deflexis brevioribus, interioribus parvis ovalis integris basi rotundatis callo minuto disciformi deflexo obsitis.

Hab. in pratis subalpinis pinguibus humidis *Tmoli* propè *Bozdagh* in *Lydià*. Legi fructiferum Junii fine.

Planta bipedalis vel elatior, folia eis *R. acetosæ* paulò majora, panicula semipedalis vel longior ramis strictis omnibus densè floriferis, valvulæ fructiferae eis *R. acetosæ* minores. Ab hac specie cui affinis est glaucescentià, foliis crassioribus, caule robustiori, valvulis mi-

noribus ovalis basi non cordatis sed inprimis paniculâ thyrsoidèa densâ differt; affinis quoque *R. tuberoso* sed præter radices quas non comparare potui *R. tuberosus* habet valvulas majores obtusissimas latiores quam longas basi valdè cordatas, perigonii lacinias exteriores valvulis æquilongas.

RUMEX CRETICUS Boiss. (Sect. *Acetosa*).

R. collo radices in nodum induratum incrassato infernè fibras subclavato cylindricas supernè caules plures procumbentes edenti, foliis viridibus parvis subtùs sub lente obsoletè tuberculatis longiusculè petiolatis hastato-triangularibus obtusis basi truncato-subcordatis auriculis brevibus divergentibus obtusis, paniculâ terminali brevi confertâ, pedunculis capillaribus sub medio articulatis ibique mirè angustatis, lacinii perigonii exterioribus deflexis extremitate dilatatis interiores æquantibus interioribus amænè roseis orbiculatis transversè sublatis obtusissimis basi truncatis vel concaviusculis callo obsoletissimo rotundo instructis.

Hab. in *Cretâ* undè retulit cl. Raulin anno 1845.

Caules in meo specimine semipedales, folia 9-10 lineas longa basi 6-8 lata. Valvulæ fructiferæ 3-3 1/2 lineas latæ. *A. R. intermedio* DC., *R. tuberoso* et *R. triangulari* quibus affinis est statim dignoscitur caulibus procumbentibus filiformibus valvulisque basi non sinu angusto cordatis sed truncatis vel concaviusculis paulò magis latis quam longis. Hoc caractere accedit ad *R. thyrsoidem* caule rigido elato, panicula densâ multiflorâ, valvulis valdè graniferis apice emarginatis distinctum.

PTEROPYRUM GRACILE Boiss. in pl. Kotsch. Pers. bor. 1846. (Sect. *Streptocarya*.)

P. fruticosum ramis novellis tenuissimis elongatis virgatis epidermide lævi albâ vestitis basi patulè ramulosis, foliis paucis ad ramorum partem inferiorem solitariis glaucis carnosulis elliptico vel linearibovatis obtusis aveniis, racemis fructiferis longissimis, pedunculis infrâ medium articulatis apice incrassatis fasciculatis, fasciulis basi 1-2 foliolis minimis linearibus semiteretibus demùm deciduis stipatis, fructibus alis amænè roseis supernè sinu profundo bilobis parte superiori distortâ cum inferiori alternanti, lobis alarum superioribus in-

terioribus ferè triplò minoribus cum eis basi imbricatis omnibus utrinquè valdè emarginatis.

Hab. propè *Sonak* in monte *Elbrus* Kotschy pl. Pers. bor. exs. N° 664.

Racemi fructiferi simplicissimi $1\frac{1}{2}$ -1 pedales quà notà achenioque cum alis 2-2 $1\frac{1}{2}$ lineas tantùm longo a *P. Olivieri* quod ramulos numerosos abbreviatos acheniaqua 3-4 lineas longa habet diversum videtur ; tamen valdè affinis est et forsàn meliora numerosioraque specimina ea in unam eandemque speciem conjungenda esse ulterius demonstrabunt.

THYMELEÆ.

DAPHNE ACUMINATA Boiss. et Hoh. in pl. Kotschy Alep. Kurd. 1843.

D. fruticosa glabra ramis erectis ramosis , ramulis tenuibus rubris nitidis foliosis, foliis lineari-lanceolatis elongatis basi longè attenuatis sessilibus acutis mucronulatis sæpè subincurvis supernè glabris infernè nervo medio prominulo instructis obsoletè reticulato-venosis, floribus 5-7 brevissimè pedunculatis in capitula corymbosa terminalia congestis, perigonio densè et breviter albo-velutino florifero tubuloso laciniis breviter ovatis obtusis tubo triplò brevioribus extùs velutinis intùs glabris luteo-fuscis, perigonio fructifero persistenti oblongo, fructu perigonio incluso adpressè hirtò oblongo-lineari numentaceo sicco.

Hab. in monte *Gara Kurdistanæ* ubi Julio floret. Kotschy N° 323.

Ramuli floriferi ferè semipedales. Folia $1\frac{1}{2}$ -2 pollices longa supenè 2 $1\frac{1}{2}$ lineas lata. Perigonium floriferum 3 lineas circiter longum fructiferum longius diametro $1\frac{1}{2}$ lineas latum. Nux 3 $1\frac{1}{2}$ lineas longa $1\frac{1}{3}$ lineæ lata. Species characteribus fructùs *Chlamydantho* C. A Meyer potiùs adsocianda sed habitu aptiùs propè *D. cnidium* et *D. Caulasicam* inter *Eudaphnes* collocanda ubi reliqui donec characteres generici Thymelearum omninò delimitati fuerint.

SANTALACEÆ.

THESIUM COMPRESSUM Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846. (Sect. *Tribracteata*).

Th. annuum vel bienne glaberrimum, radice verticali cylindricâ simplici, collo multicauli caulibus lateralibus inclinatis intermedio erecto omnibus virgatis infernè parcè ramosis foliosisque paulò suprâ basin in racemos longissimos basi nudos abeuntibus striatis ramorum decurrentiâ acutè 2-3 angulatis compressis, foliis carnosissimis siccitate nigricantibus linearibus erectis apice mucrone obtusiusculo brevi calloso terminatis enerviis, floribus subsessilibus laxissimè racemosis minimis tubulosis inferioribus aliquandò 2-3nis superioribus solitariis omnibus tribracteatis infimorum bracteâ intermediâ longâ folio simili lateralibus minimis, omnium aliorum bracteis squamiformibus lanceolatis acuminatis pedicellum vix superantibus drupâ multoties brevioribus, drupâ erectâ brevissimè pedunculatâ oblongâ inter 5 nervos longitudinales obsoletè reticulatâ perigonio eâ quintuplò breviori minutissimo superatâ.

Hab. in salsis hyeme inundatis planitieï *Koniah* inter urbem et montem *Karadagh* (Heldr.) Fl. Junio.

Caules 3-10 pollicares, folia 6-10 lineas longa lineam ferè lata. Racemi fructiferi laxi sæpè ferè pedales. Flores lineæ 3/4 longi drupa vix lineâ unâ longior. Bractea intermedia infimis floribus exceptis lineam dimidiam vix longa, laterales dimidiò breviores. Species characteribus distinctissima propè *Th. humile* collocanda.

ARISTOLOCHIEÆ.

ARISTOLOCHIA PÆCILANTHA Boiss.

A. radice tuberosâ oblongâ, caulibus numerosis simplicibus erectis flexuosis striatis hirtis, foliis infimis 1-2 ad squamas sessiles ovatas

acuminatas reductis cæteris breviter utrinquè setulos hirtis triangulari-oblongis obtusis basi profundè cordatà medium versùs in petiolum folio dimidiò breviorum hirtum breviter attenuato-cuneatà, auriculis rotundatis intùs recurvatis a petiolo utrinquè sinu rotundato separatis, floribus ad omnes axillas inferiores solitariis pedunculo hirtò petiolum æquanti apice recurvo suffultis, ovario lineari-clavato densè velutino-hirtò pedunculo 2 1/2 plò breviori, perigonii extùs hirti tubo labio subæquilongò suprà basin ovatam abruptè constricto cylindrico supernè subdilato semicirculariter recurvo, labio oblongo triangulari obtuso basi cordato in 2 auriculas concavas oblongas obtusas ejus dimidiæ longitudini subæquilongas productò intùs glabro virescenti-flavido maculis atropurpureis versùs tubi ingressum frequentioribus ibique in unam confluentibus eleganter picto, fructu oblongo magno.

Hab. in herbidis vallium *Samaritæ* in tribù *Ephraïm*, ad bases *Antilibani* circà *Rascheyà*. Legi floriferam maio ineunte.

Caules 1 1/2-1 pedales. Folia petiolo 9-12 lineas longo suffulta demum 2-3 pollices longa basi 1 1/2-2 lata marginibus lateralibus concavis. Flores magni labio sesquipollicem longo basi ferè pollicem lato. Fructus 2 pollices longus pollicem latus. Species pulchra affinis *A. hirtæ* quæ differt foliis pro longitudine latioribus multò brevius petiolatis auriculis latioribus brevioribus versùs petiolum non recurvatis, pedunculis petiolo longioribus, corollæ labio acuto basi breviter auriculato intùs concolori setis albidis longis crispulis obsito.

ARISTOLOCHIA SCABRIDULA Boiss.

Ar. radice....., caulibus erectis simplicibus striatis flexuosis setulis rubellis patulis sparsis brevissimis scabridis, foliis infimis squamæformibus oblongis obtusis cæteris utrinquè sed subtùs densius minutissimè tuberculato-scabridis subtùs distinctè nervosis petiolo eis subtriplo breviori suffultis oblongis obtusissimis cordatis, auriculis latis rotundatis sæpè versùs petioli insertionem flexis ab eo utrinquè sinu obtuso separatis nervo medio folii subquintuplo brevioribus, pedunculis in axillis inferioribus solitariis petiolo subdimidiò brevioribus valdè ciliato-scabridis apice recurvis in ovarium densè ciliato-scabridum lineari-clavatum eis æquilongum subdilatis, perigonii extùs sparsissimè setuloso-scabridi tubo labio subæquilongò suprà basin ovatam abruptè constricto cylindrico semicirculariter cur-

vato, labio oblongo-triangulari a basi latiori cordatâ sensim attenuato obtuso subretuso basi in auriculas binas rotundatas eo triplò breviores producto intus glaberrimo rubro maculis atropurpureis picto, fructu.....

Hab. in *Antilibano* juxta *Zebdani* ubi legi floriferam maio 1846.

Caules pedales, folia majora bipollicaria basi 15-18 lineas lata secus margines laterales convexa irregulariter crenata, petioli 8-10 lineas longi. Labium ferè 15 lineas longum basi 6-7 lineas latum. A specie præcedenti cui affinis est differt indumento magis scabrido, foliis minoribus pro longitudine latioribus, pedunculorum cum petiolo et ovario proportionè, floris minoris rubello-fuscescentis labio supernè magis angustato. An hujus tamen varietas?

URTICÆ.

PARIETARIA MULTICAULIS Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.

P. perennis, rhizomate suffruticoso caules numerosos crassiusculos rigidos erectos foliosos simplices puberulos striatos edenti, foliis alternis ovatis breviter acuminatis basi rotundatis vel subcuneatis lætè virentibus pellucido-punctatis penninerviis utrinquè minutè tuberculato-scabris tuberculis facie inferiori secus nervos vel paginam totam setulas pellucidas elongato-conicas brevissimas incurvas edentibus, petiolis brevissimis, floribus omnibus hermaphroditis ad foliorum axillas in apice pedunculi brevissimi dichotomi sessilibus ternis unoquoque 2-5 bracteato, bracteis basi inter se coalitis viridibus ovatis acutis hirtis-scabris perigonio subbrevioribus non accrescentibus, perigonio campanulato virenti a medio 4 fido laciniis triangularibus acutis hirtis stamina æquantibus, perigonio fructifero basi membranaceo rubello vix elongato, nuce virenti ovatâ acutâ.

Hab. in faucibus montium tophaceorum propè urbem *Bouldour Pistidiæ* (Heldr.). Floret maio.

Caules numerosi 6-9 pollices longi, folia majora 7-8 lineas longa 5-6 lata petiolo 1-2 lineas longo suffulta. Flores magnitudinis eorum *P. diffusæ* et *P. erectæ* a quibus differt caulibus crassioribus rigidioribus, foliis non longiusculè petiolatis, ovatis nec oblongis vel lanceolatis, scabridis nec hirtis penni nec triplinerviis. Flores insuper

omnes hermaphroditi sunt nec intermedii fœminei, nux viridescens nec nigra nitida. *P. Cretica* bracteis fructiferis accrescentibus egregiè differt. Perigonium fructiferum in nostrâ specie vix elongatur et circiter lineam unam longum remanet.

EUPHORBIACEÆ.

BUXUS LONGIFOLIA Boiss.

B. suffrutescens, ramis glabris densè foliosis ramulosis virentibus petiolorum basi utrinquè decurrenti lineis elevatis percursis, foliis elliptico-linearibus obtusis in petiolum brevissimum glaberrimum attenuatis lucidis coriaceis viridi-lutescentibus nervo medio suprâ impresso subtilis subelevato albido percursis nervo marginatis suâ longitudine 3-3 1/2 plò angustioribus, perigonii phyllis oblongo-lanceolatis, antheris oblongo-sagittatis, capsulâ magnâ pallidè virenti ovatâ truncatâ rostris apice recurvis eâ paulò tantùm brevioribus superatâ.

Hab. in montibus ad meridiem urbis *Antiochiæ* et inter hanc urbem et montem *Cassium* sitis. Legi fructiferam Junio.

Folia 13-15 lineas longa 4-5 lata. Capsula cum rostris sex lineas et ampliùs longa. Semina nigra nitida 2 3/4 lineas longa. Pulchra species. *B. Balearica* ab eâ differt foliis latis, ramis puberulis, antheris lineari-sagittatis et forsàn quoque fructu quem non novi. *B. sempervirens* foliis ovatis dimidiò minoribus, ramis petiolisque puberulis, perigonii phyllis ovatis, capsulâ dimidiò minori rostris eâ dimidiò brevioribus superatâ distinguitur.

EUPHORBIA CARDIOPHYLLA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1847. (Sect. *Tithymalus*).

E. perennis glabra subglaucescens rhizomate crasso cylindrico apice ramoso multicauli, caulibus erectis tenuibus ferè a basi foliosis jam a mediâ parte longitudinis ramulosis, foliis substantiæ tenuis margine sub lente angustè cartilagineis obscure et minutissimè denticulatis inferioribus et eis caulium steriliùm obovatis vel oblongo-ellipticis basi attenuatis sessilibus caulinis mediis ovato-oblongis vel ob-

longo-ellipticis obtusis brevissimè mucronulatis basi sessili profundè cordatis auriculis rotundatis, ramis axillaribus simplicibus vel bifidis umbellam terminalem triradiatam ferentibus paniculam oblongam laxam formantibus, radiis bifidis, involucri phyllis ovatis involucelli-que phyllis liberis semiorbicularibus obtusissimis paulò magis latis quam longis basi truncato-subcordatis integerrimis, glandulis fusciscentibus transversè ovalis, involucri proprii dentibus purpureis apice truncatis, capsulæ coccis dorso rotundatis verrucis hæmisphærico-depressissimis secùs dorsum carpellorum sitis magnis obsitis, seminibus ovatis lævibus.

Hab. in fruticetis regionis inferioris montis *Solyma Lyciæ* infrà *Kartsibahir* (Heldr.) Fl. initio Mai.

Caules in meis speciminiibus 8-10 pollicares, folia intermedia pollicaria aut paulò longiora 3-6 lineas lata. Affinis *E. condylocarpæ* M. B. cui folia et involucella ferè eadem sed in quâ radix tuberosa globosa caulem solitarium edit, margo foliorum regulariter et oculo nudo serrulatus est dentibus ascendentibus, capsula tandem verrucis conico-cylindricis densè obsita est.

EUPHORBIA CASSIA Boiss. in pl. Syr. exs. 1846. (Sect. *Tithymalus*).

E. perennis glabra basi suffrutescens multicaulis, caulibus tenuibus erectis virgatis rigidis foliosis simplicibus ramo florali uno alterutrove auctis, foliis erectis strictis parvis approximatis inferioribus oblongospathulatis obtusis in petiolum brevem longè attenuatis superioribus lineari-lanceolatis utrinquè attenuatis apice acutè mucronatis, omnibus a medio supernè remotè serrulatis serraturis ascendentibus, umbellâ terminali triradiatâ vel biradiatâ radiis inæqualibus sæpè brevissimis rariùs simplici minimâ triflorâ, involucri phyllis foliis superioribus simillimis ternis linearibus acutis radios plerumquè æquantibus, involucellis triangulari-ovatis breviter acuminatis integris basi breviter cuneatis subpetiolatis, glandulis flavis transversè ovalis, involucelli proprii dentibus albis triangulari-ovatis ciliatis, capsulæ coccis lævibus dorso rotundatis, seminibus griseis vel flavovirentibus areolis subrotundis depressis nigris foveolatis.

Hab. in jugis umbrosis *Cassii* in regione inferiori secùs viam quâ a *Laodiceâ* ad *Suadièh* itur circâ pagum *Cassab* frequenter sed ubiquè sparsa (Boiss.) Floret Junio ineunte.

Caules pedales, folia intermedia 7-9 lineas longa 1 1/2-2 lata versus apicem caulis eundo angustata abbreviata acutata versus basin abbreviata obtusata. Umbellæ magnitudine valdè inæquales radiis rarò 1 1/2-2 pollicaribus sæpius brevissimis donatæ sæpissimè subsessiles trifloræ minutæ. Involucelli phylla 2 1/2-3 lineas longa lataque breviter acuminata. Capsulæ minutæ. Semen vix lineam unam longum areolis nigris subrotundis foveolatum. Species habitu peculiari donata inter *Tithymalos* subsectionis *E. helioscopiæ* collocanda in quâ solum *E. microsciadiæ* Boiss. approximanda est a quâ habitu et characteribus cæterum longè distat.

EUPHORBIA CYBIRENSIS Boiss. Diagn. VII. p. 89.

Hæc ejus descriptioni adde. Planta annua. Folia caulina obovata obtusa mucronulata vel acutiuscula parte superiori margine acutè serrulata serraturis ascendentibus. Involucelli phylla basi subcordata subrotunda sæpè transversè sublatis obtusa mucronulata sub lente obsoletè denticulata. Ovaria glandulis aculeiformi-cylindricis apice abruptè in setam albam sæpè evanidam abeuntibus obsita. Capsula sphaerica ferè exsulca stylo æquilongo ad medium usquè trisecto superata iisdem glandulis sparsis cylindricis aculeiformibus plus minus obsita in dichotomiis inferioribus præsertim serò difficilèque dehiscens. Semina oblonga fuscescentia lævia.

Hab. in *Cartâ* (Boiss.), *Pamphyliâ* propè *Kourmalu* in incultis (Heldr.), *Palæstinâ* in umbrosis propè *Naplouse* et ad radices *Antilibani* propè *Rascheya* (Boiss.).

Var. β *acutifolia* — Major, folia obsoletius serrulata involucraque oblongo-lanceolata apice attenuata acuta. Involucelli phylla triangulari-deltaidea acuta. Capsula facilius dehiscens stigmate eâ breviori infrâ medium trifido superata.

Hab. in regione inferiori montis *Cassii Syriæ* borealis undè eam e seminibus relatis colui.

Species quoad foliorum et involucellorum formam, capsulam magnitudine variam in plantâ Pamphylicâ paulò minorem in Syriacâ autem 2 lineas latam variabilis, distinctissima capsulis sphaericis glandulis tenuiter cylindricis in setam abeuntibus obsitis ad dichotomias inferiores subindehiscens more *E. akenocarpæ* et *E. microsphaeræ* quibus adsocianda est.

EUPHORBIA DUMOSA Boiss. in pl. Syr. exs. 1846 (Sect. *Tithymalus*).

E. perennis glabra, caule juniore ad collum tuberoso-incrassato adulto fruticoso dumoso, ramis numerosis fruticosis erectis parte inferiori nudis cinerascens laevibus supernè foliosis, foliis oblongis utrinquè attenuatis acutis integerrimis utrinquè concoloribus brevissimè petiolatis, umbellà terminali quinque-radiatà radiis aequalibus bis trifidis, involucri phyllis radio brevioribus ovato-oblongis deflexis, involucelli obovatis obtusissimis basi breviter cuneatis, glandulis flavis transversè ovatis, involucelli proprii dentibus pilosissimis, capsulae sphaericae obtusè tricoccae verrucis sparsis breviter conicis, seminibus rufis ovatis laevibus, arillo subgloboso ceraceo.

Hab. in collibus calidis *Syriae* littoralis circa *Berythum* et *Tripolim* frequens (Boiss.). Fl. Maio.

Frutex 2-3 pedalis caulibus ramisque erectis dumum densum formantibus. Folia circiter 8-10 lineas longa 2 1/2-3 lata. Radii umbellae 1 1/2-2 pollicares. Species affinis *E. fruticosae* Biv. quae ab eà distinguitur ramis brevioribus parte nudà cicatricoso-scabris nec laevibus, foliis lineari-lanceolatis acutioribus longioribus nervo medio albido percursis, umbellà breviradiatà, involucro radios aequanti, involucellis ovatis acutiusculis, capsulis paulò majoribus verrucis cylindricis crebrè obsitis.

EUPHORBIA HIEROSOLYMITANA Boiss. in pl. Syr. exs. 1846. (Sect. *Tithymalus*).

E. perennis basi suffrutescens dumulosa ramis numerosis tenuibus virgatis erectis foliosis ferè herbaceis simplicibus, foliis omnibus obovatis apice rotundatis mucronulatis basi subangustatis sessilibus integerrimis, umbellis quinquerradiatis radiis aequalibus bis bifidis involucrum multò superantibus, involucris involucellisque foliis similis obtusissimis muticis, involucelli proprii extùs hirtuli dentibus albo-pilosissimis, capsulae sphaericae coccis obtusis infernè sparsim supernè densius verrucosis verrucis crassiusculis elongato-conicis, seminibus ovatis laevibus, axillo depresso.

Hab. in *Judaea* circa *Hierosolymam* praesertim circa tumulos antiquos *Regum* et *Judicum* dictos (Boiss.), in *Palaestina* quoque. Aucher N° 2035.

Suffrutex sesquipedalis, folia 5-6 lineas longa 3-3½ lata, radii umbellarum ferè bipollicares. Capsula diametro 2 ½ lineas lata. Affinis speciei præcedenti ab eâ distinguitur staturâ humiliori, ramis magis herbaceis tenuioribus, foliorum formâ, capsulâ densius longiùsque verrucosâ. Ulterius tamen in locis natalibus cum eâ comparanda

EUPHORBIA NOTADÆNIA Boiss. et Hohen. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846 (Sect. *Tithymalus*)

E. perennis ramis virgatis striatis elatis foliosis, foliis glabris virenti-flavescentibus lanceolato-linearibus utrinquè attenuatis sessilibus acutis margine angustè cartilagineo breviter serrulatis serraturis ascendentibus, ramis ex axillis superioribus apice subtrifloris umbellæque breviter quinqueradialâ radiis trifidis paniculam brevissimam paucifloram formantibus, involucri phyllis ellipticis utrinquè acutis, involucelli phyllis ovato-rotundis obtusis mucronulatis integris, involucelli proprii glabri dentibus albo-velutinis, glandulis transversè ovatis flavis, capsulâ rotundâ sparsim et longè albopilosâ secùs dorsum coccarum verrucis crassis hemisphærico-conicis basi confluentibus biserialibus aspersâ secùs sulcos lævi, seminibus ovatis lævibus.

Hab. in monte *Elbrus Persiæ* borealis propè *Derbend*. Kotschy N° 420.

Caules in meo specimine semipedales. Folia inferiora bipollicaria 4-5 lineas lata versùs caulis apicem decrescentia. Panicula 4-5 pollices longa ovata. Radii umbellæ terminalis sesquipollicares. Capsula 2 lineas lata. Habitus *E. ceratocarpæ* Ten. quæ differt foliis integerrimis, paniculâ ampliori, capsulis glabris. Affinis quoque *E. procera* ab omnibus formis cujus serraturis foliorum multò minùs acutis capsulæque verrucosâ nec punctatâ facilè dignoscitur.

EUPHORBIA KOTSCHYANA Fenzl. var. *thyrsoidea* Boiss.

A typo speciei differt inflorescentiâ ob ramos laterales floriferos abbreviatos thyrsoideâ nec corymboso-paniculatâ. Umbellæ rami abbreviati pollicares. Involucella minora majori diametro 8 lineas lata.

Hab. in *Caramaniâ* (Pestalozza).

EUPHORBIA POLYCAULA Boiss. et Hohenack in Kotschy pl. Pers. bor,
1846 (Sect. *Esula*).

E. perennis rhizomate crasso cylindrico apice ramoso caules plures cylindricos breves simplices infernè nudos cicatricosos supernè foliosos edenti, foliis glaucis sub lente densè et minutissimè punctulatis integerrimis nervo marginatis margine basin versùs tenuissimè scabrido-ciliatulis cæterum glabris caulium sterilium infimisque caulium floriferorum densè confertis lineari-lanceolatis obtusiusculis mucronulatis a parte superiori latiori sensim et longè attenuatis, caulinis superioribus magis sparsis abbreviatis obovatis vel obversè oblongis basi cuneatis obtusissimis, umbellâ terminali 10-12 radiatâ radiis simplicibus involucro deflexo vix longioribus, involucris phyllis obovatis, involucelli ovatis obtusis, involucelli proprii dentibus ovatis albo-ciliatis, glandulis flavis transversè oblongis margine inferiori obsoletè concavis emarginatis, ovario glabro lævi, capsulâ . . .

Hab. in parte occidentali montis *Elbrus* propè *Asadbar* in *Persia* boreali. Kotschy N° 436. Fl. Julio ineunte.

Rhizoma crassitie digiti. Caules basi pennâ anserinâ paulò tenuiores semipedales. Folia biformia inferiora 12-15 lineas longa 2 1/2-3 lineas lata, intermedia circiter 5 lineas longa. Umbellæ radii 7-8 lineas longi. Species imperfectè tantùm ex statu juniore tantùm nota habitu *E. sylvaticam* vel *E. characiam* referens sed omnibus partibus minor et involucelli phyllis liberis ab eis longè discedens; naturalius propè *E. saxatilem* et ob umbellam multiradiatam juxtâ *E. Nicæensem* collocanda, ab eis glandulis vix emarginatis inter eas *Tithymali* et *Esulæ* mediis, involucellisque basi non cordatis præter formam foliorum distincta.

EUPHORBIA CHEIRADENIA Boiss et Hohen. (Sect. *Esula*).

E. perennis glaberrima glaucescens, caulibus e rhizomate suffrutescenti numerosis erectis teretibus simplicibus foliosis, foliis infimis minoribus obovatis cæteris oblongo-ellipticis acutis infernè longiusculè attenuatis omnibus integerrimis rigidulis subcoriaceis, umbellæ terminalis 4-6 radiatæ radiis flavidis apice brevissimè trifidis, involucri radiis ferè dimidiò brevioris phyllis ovatis obtusis mucronulatis, involucelli phyllis flores occultantibus transversè ovatis basi truncatis

obtusissimis muticis, involucelli proprii glabri dentibus ovatis obtusis dentatis albo-ciliatis, glandulis transversè ovatis oblongisve margine inferiori truncatis palmatimque in 4-8 cornua brevia recta apice sæpè denticulata multifidis, ovario glaberrimo, capsulâ.....

E. schizadenia Boiss. et Hohenack. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846.

Hab. in monte *Elbrus Persiæ* borealis propè *Passgala*, Kotschy N° 182, in *Mesopotamiâ* circà *Diarbekir*, Kotschy pl. Mus. Imp. Vin-dob. N° 232.

Caules 8-10 pollicares erecti rigidiusculi, folia sesquipollicem longa 3-4 lineas lata in speciminibus humilioribus multò minora. Involu-cellî phylla 6-8 lineas longa 5-6 lata. Flores illis *E. Nicæensis* ferè majores. Umbellæ in speciminibus macrioribus ad radium unicum subtriflorum reductæ. Ex affinitate *E. Nicæensis* et *E. rigidæ* sed præsertim *E. schizoceratis* quæ differt glandularum bicornium cor-nubus palmatim lobatis et notà graviore scilicet ovario densè albo-velutino foliisque multò majoribus internè distinctè trinerviis nec subnerviis.

EUPHORBIA DAMASCENA Boiss. (Sect. *Esula*).

E. perennis glaberrima glaucescens, caulibus e rhizomate suffrutes-centi erectis simplicibus rigidis foliosis crassis supernè ramos florales abbreviatos umbellamque terminalem paniculam parvam ovatam for-mantes edentibus, foliis rigidis lineari-lanceolatis basi attenuatis apice attenuato-acuminatis subpungentibus deflexis, umbellæ radiis 3-8 brevibus apice brevissimè trifidis, involucri radiis 2-3 plò brevioris phyllis ovatis acutis, involucelli phyllis transversè latioribus cor-dato-deltoidæis obtusis mucronatis, involucelli proprii glabri denti-bus obtusis ciliatulis, glandulis aurantiacis semilunaribus bicornutis cornubus subspathulatis obtusè 2-3 denticulatis, ovario glabro, cap-sulâ.....

Hab. in collibus aridissimis ad occasum urbis *Damasci* sitis ubi fine maii florere incipientem legi.

Caules pedales longioresque, folia 15-18 lineas longa 2-3 lata, radii umbellæ 1-1 1/2 pollicares. Habitu et characteribus affinis *E. Schizo-cerati* quæ differt foliis multò latioribus non acuminatis distinctè ner-voxis ovarioque albovelutino. Ab *E. cheiradeniâ* cui quoque accedit præter notam leviozem e glandularum cornubus depromptam differt

foliis formæ omninò diversæ rigidioribus deflexis, caulibus breviter paniculatis nec umbella unicâ superatis.

EUPHORBIA ERYTHRODON Boiss. et Heldr. in pl. Anatol. exs. 1847. (Sect. *Esula*).

Euph. perennis nana, rhizomate crasso cylindrico verticali caules brevissimos procumbentes vel erectiusculos cæspitosos suprà basin cicatricosam nudam densè foliosos simplices edenti, foliis minutis glaucis coriaceis enerviis sub lente tenuissimè punctulatis margineque ciliatulis caulium sterilium lineari-lanceolatis attenuato-acuminatis subpungentibus apice margine subrevolutis densè imbricatis subrosulatis, foliis caulium floriferorum oblongo-ellipticis obtusiusculis, floribus rariùs in umbellam terminalem brevissimè 5-8 radiatam dispositis sæpiùs subsessilibus capitulum densum involucri phyllis numerosis foliis similibus stipatum formantibus, involucelli phyllis violascentibus ovato-subdeltoideis basi subcuneatis mucronatis flores non superantibus, involucelli proprii purpurei glabri dentibus purpureis truncato-denticulatis albo-ciliatis, glandulis purpureis subsemi-orbiculatis ad basin truncatam utrinquè cornu obtuso brevissimo sæpè evanido auctis, ovario breviter et adpressè albovelutino, capsulâ....

Hab. in rupestribus regionis superioris montis *Davros Pisidiæ* alt. 5300' (Heldr.). Fl. fine maii.

Species alpina venusta *E. myrsinitem* quodam modò referens sed omnibus partibus nana. Caules 2-3 pollices longi densè congesti densè foliosi foliis caulium sterilium anno insequenti florentium acutioribus 4-5 lineas longis 1 1/5 latis in mucronem durum 3/4 lineæ longum abeuntibus, cæteris brevioribus pro longitudine latioribus; flores pro plantæ minutie magni rubri in capitulum convexum congesti. Species distinctissima in agmine *E. pumilæ* collocanda.

EUPHORBIA PESTALOTZÆ Boiss. (Sect. *Esula*).

E. suffruticosa glabra humilis basi tortuosa, ramis brevibus erectis simplicibus suprà basin cicatricosam nudam densiusculè foliosis, foliis inferioribus minoribus arctè congestis elliptico-linearibus margine revolutis cæteris obversè oblongis omnibus obtusis subcoriaceis integerrimis glabris glaucescentibus, umbellâ terminali ad flores paucos terminales subsessiles capitatos involucri pentaphyllo cinctos re-

ductà, involucri phyllis ovatis acutiusculis flores vix superantibus, involucelli phyllis semiorbiculatis basi truncatis, involucelli proprii glabri dentibus triangularibus acutis margine ciliatulis, glandulis aurantiacis semilunatis margine inferiori concavo 2 cornubus obtusis brevibus munito, ovario oblongo longè stipitato glabro, stylo longo ad medium usquè in stigmata profundè bifida tripartito.

Hab. in *Caramanîâ* undè specimina dedit cl. D^r Pestalozza.

Suffrutex ut videtur humilis, rami 2-3 pollicares, folia intermedia 3-4 lineas longa 2 lata, inferiora minora angustioraque. Umbellæ terminales sessilifloræ involucri diametro circiter 3 lineas lato cinctæ. Ex affinitate præcedentis a quâ differt foliis non acuminato-pungentibus, involucri pentaphyllo, involucelli proprii dentibus non truncatis, glandulis multò evidentiùs semilunatis, ovario elongato glabro, etc. *E. petrophila* C. AM. habitu quoque nostræ valdè affinis differt involucri phyllis majoribus mucronatis, foliis longioribus acutioribus, glandulæ cornubus ejusdem margini inferiori æquilongis, etc.

EUPHORBIA REUTERIANA Boiss. (Sect. *Esula*).

E. annua glabra glaucescens, caule erecto tereti humili sparsim folioso triradiato radiis ter dichotomis, foliis linearibus brevibus obtusiusculis teneris integerrimis infimis basi brevissimè attenuatis superioribus basi truncatis, involucris triphyllis deflexis foliis similibus linearibus acutis, involucelli phyllis basi cordatis triangulari-deltoides acutis supremis transversè latioribus basi truncatis, floribus minutis, glandulis aurantiacis semiorbiculatis basi truncatis cornubus binis setaceis elongatis subdivergentibus, capsulâ deflexâ brevi glabrâ lævi rotundatâ profundè trisulcâ coccis dorso rotundatis, seminibus albidis foveolis profundis rotundatis insculptis, arillo breviter conico.

Hab. in *Palæstinâ* (Boiss.).

Sempedalis. Folia caulina 5-6 lineas longa sesquilineam lata, involucelli phylla inferiora 3 lineas longa lataque obcordata cætera transversè elongata. Capsula ferè 2 lineas diametro lata. Multis notis *E. Græcæ* B. et Spr. affinis ab eâ sat differre videtur capsulis seminibusque circiter duplò majoribus, hisce brevissimis nec dorso minutissimè verrucosis.

EUPHORBIA GALILÆA Boiss. (Sect. *Esula*).

E. annua, caule humili erecto folioso jam a collo ramoso ramis erectis tenuibus quinqueradiatis radiis elongatis pluriès dichotomis, foliis involucrique phyllis oblongo-lanceolatis basi attenuatis acutis deflexis, ramulis sub involucrellis supremis pilosulis, involucrelli phyllis basi rotundatis inæquilateraliter ovatis brevissimè mucronulatis margine angustè cartilagineis erosulis, floribus minutissimis, glandulis aurantiacis basi truncatis brevissimè bicornutis, capsulà minutissimà ovalà profundè trisulcà coccis dorso rotundatis glabris lævibus, semine ovato albido subtetragono faciebus duabus trifoveolatis cæteris 4 foveolatis, foveolis transversis.

Hab. in planitie *Esdraelon* ubi legi Maio 1846.

Planta *E. falcata* valdè affinis et ab eà ut *E. Reuteriana* ab *E. Græcà* ferè discedens. Caulis semipedalis a basi ramosus ramis eis *E. falcatæ* tenuioribus minùs divaricatis, folia involucrellaque teneriora magis pellucida brevissimè nec longè mucronata, capsulæ coccæ 1½ lineam nec unam lineam longæ, semina vix lineæ partem tertiam superantia ad facies tri et quadrifoveolata nec ut in *E. falcata* 5-6 foveolata.

EUPHORBIA ARVALIS Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1847 (Sect. *Esula*).

E. annua glaucescens, caule crassiusculo a basi ramosissimo ramis divaricatis et multoties dichotomis crassiusculis, foliis paucis ellipticis obtusis, involucrellorum phyllis numerosis obliquè ovatis obtusis mucronulatis basi rotundatis, floribus minutissimis, glandulis lunulatis purpurascenti-aurantiacis breviusculè setaceo-bicornibus, capsulà ovalà lævi profundè trisulcatà coccis dorso rotundatis, semine albido ovato obsoletè tetragono longitudinaliter et grossè vermiculato-insculpto.

Hab. in arvis *Pisidiæ* inter *Isbarta* et *Egirdir* (Heldr.) Fl. maio.

Planta 3-4 pollicaris dichotomè ramosissima ramis erecto-patulis divaricatis, tota foliata involucrellis quorum phylla 4-6 lineas longa 3-3 ½ lata. Capsulæ eis *E. peplo* majores coccis lineam longis. Ab *E. peplo* cui magis accedit distincta caule ramisque incrassatis divaricatis multo ramosioribus, foliis magis carnosis opacisque, capsulà

lævi nec dorso bicarinatâ, seminibus vermiculatis nec serialiter foveolatis.

EUPHORBIA AULACOSPERMA Boiss. (Sect. *Esula*).

E. pumila glabra a basi ramosa ramis umbellæque centralis triradiatæ radiis abbreviatis pluriès dichotomis crassiusculis foliis involucrisque obovatis obtusissimis mucronulatis teneris, involucelli phyllis subinæquilateraliter rhombeo-rotundatis transversè sublatis obtusis, floribus minimis, glandulis aurantiacis semilunatis longè setaceo-bicornutis, capsulis nutantibus lævissimis profundè sulcatis dorso rotundatis, semine ovato utrinquè truncato 6 foveolis longitudinalibus nigris profundis et costis senis rotundatis albis instructo.

Hab. in cultis propè *Hierosolymam* undè specimen unicum relati. Fl. Aprili.

Tripollicaris, folia et involucella inferiora 2 1/2-3 lineas longa lataque. Capsula eà *E. pepli* paulò major. Ei et *E. arvali* affinis ab utrâque statim seminibus profundè sexsulcatis dignoscitur.

AMENTACEÆ.

SALIX ACMOPHYLLA Boiss. Diagn. VII p. 98.

Sequentia adde descriptioni et habitationi. — Flores masculi 4-8 andri. Staminum filamenta basi villosa.

Hab. in monte *Elbrus* propè pagum *Passgala* Maio florifera Kotschy pl. Pers. bor. N° 121 et 788, in *Kurdistanâ* ad rivos propè *Amadiéh* et ad pagum *Gara*, Kotschy pl. Alep. Kurd. In *Syriâ* ad *Aleppum* (Boiss.). Variat foliis 5-6 lineas vel pollicem latis.

SALIX ELBRUSENSIS Boiss. (Sect. *Purpureæ*).

S. ramis virgatis glabris, foliis lanceolatis glaberrimis apice obscure denticulatis utrinquè prominulè venoso-reticulatis, amentis cylindraceis pedunculatis basi bracteatis, capsulis ovato-lanceolatis sessilibus tomentoso-sericeis, stylo brevi, stigmatibus ovatis, squamis

oblongis pallidè rufescentibus apicè fuscosphacelatis parèè villosis, floribus masculis

Hab. secùs rivos in monte *Elbrus* propè *Derbent* Persiæ borealis Kotschy N° 134 (Subs. *purpureæ* L. var. *evulgata*).

Frutex, rami tenues virgati pallidè flavo fuscescentes. Folia breviter petiolata acuta vel longè acuminata adulta utrinquè prominulè venoso-reticulata exsiccatione minimè nigricantia. Amenta alterna (nec subopposita) ramulis 2 lineas longis foliaceis suffulta semipollicaria. Folia 1-2 pollices longa 2-4 lineas lata, floralia circiter semipollicaria integerrima. Affinis *S. purpureæ* differt amentis pedunculatis basi bracteatis, capsulis supernè angustioribus, squamis oblongis pallidè rufescentibus parèè villosis nec ovalis nigrosphacelatis pilosis.

SALIX ZYGOSTEMON Boiss. et Hohen. in Kotschy pl. Pers. exs. 1846 (Sect. *Caprææ*).

S. arborea vel fruticosa ramis virgatis subvitellino-virescentibus junioribus puberulis, foliis ovato-lanceolatis subsericeo-villosis demùm glabratibus leviter crenulato-dentatis, stipulis lineari-lanceolatis curvato-falcatis glanduloso-dentatis, amentis magnis breviter pedunculatis cylindricis basi bracteis oblongo-lanceolatis subtùs villososericeis suffultis, squamis obovato-rotundatis villosis, capsulis tomentosis ovato-lanceolatis breviter pedicellatis, stylo brevi, stigmatibus oblongis patentibus, floribus amentorum masculorum staminibus binis donatis, filamentis ad medium usquè coalitis infernè villosis.

Hab. in monte *Elbrus* propè pagum *Passgala* Persiæ borealis ad cataractas *Ser Abi Schir* dictas, Kotschy.

Arbor? frutex? . Cortex lævis subnitidus. Folia 1-2 pollices longa 4-6 lineas lata, floralia integerrima subtùs sericea 5-6 lineas longa 2 lata. Amenta mascula villosissima sesquipollicaria, fæminea cum stipite 1½-3 pollices longa. Affinis *S. grandifoliæ* sed abundè distincta foliis tenuioribus utrinquè glabratibus, stipulis falcatis, amentis multò majoribus, capsulis breviter pedicellatis.

QUERCUS PSEUDOCERRIS Boiss. (Sect. *Cerris*).

Q. arborea, ramulorum cortice fusco-cinerascenti verruculosà, foliis longè petiolatis ambitu ovalis vel ovato-oblongis profundè et

irregulariter sinuato-pinnatifidis basi inæqualibus suprà glabris subnitidis subtùs tenniter venoso-reticulatis petiolisque pilis brevibus fasciculatis hirtellis, lobis utrinquè 3-4 oblongis integris vel interdùm unidentatis terminali trilobo omnibus apice calloso-apiculatis, gemmis subrotundis, squamis imbricatis ovatis vel interdùm exterioribus præsertim gemmarum terminalium elongato-filiformibus, floribus ignotis, glandibus biennio maturantibus lateralibus subsessilibus vel pedunculo brevi lignoso insidentibus, capsulæ squamis adpressis ovato-lanceolatis obtusis.

Hab. in sylvis partis inferioris montis *Cassii* in *Syriâ*. Legi cum fructibus junioribus Junio.

Arbor mediocris. Folia adulta subcoriacea subtùs pallidiora variè pinnatifido-lobata 2-3 pollices longa 1 1/2 poll. lata petiolo tenui 3-4 lineas longo suffulta. Glandes juniores rotundati magnitudinis pisi. Squamæ adpressæ glabræ. Affinis *Q. cerrî* a quâ squamis capsularum parvis adpressis nec appendice longâ filiformi terminatis squarrosis, gemmarum rotundarum squamis adpressis obtusis sat differt. *Q. castaneæfolia* et *Q. Libani* foliis non pinnatifidis aliisque notis longiùs distant.

QUERCUS BOISSIERI Reuter (Sect. *Gallifera*).

Q. arborea, ramulis junioribus striatis puberulis, foliis longè petiolatis oblongo-lanceolatis glaberrimis subcoriaceis basi attenuatis subtùs glaucescenti-pallescentibus ambitu toto regulariter et profundè sinuato-dentatis dentibus obtusis ascendentibus sinubus subtùs revolutis, gemmarum rotundarum squamis obtusis adpressis, glandibus in axillis foliorum superiorum per 2-4 in pedunculo communi petiolo longiori racemoso-spicatis, cupularum juniorum squamis adpressis lineari-lanceolatis obtusis subpulverulento-velutinis.

Hab. in jugo *Cassio Syriæ* borealis (Boiss).

Arbor mediocris, ramorum cortex lævis pallidè cinnamomea. Folia adulta subcoriacea eleganter penninervia utrinquè acuta 2-3 pollices longa 1 1/2-1 pollicem lata dentibus subovatis 2 lineas circiter longis. Petioli 5-6 lineas longi. Glandes tantùm juniores observati magnitudinis pisi. Affinis *Q. infectoriæ* Olivier differt foliis multò longioribus basi angustatis longius petiolatis ambitu toto regulariter sinuato-dentatis et præsertim fructibus racemoso-spicatis.

QUERCUS PETIOLARIS Boiss. et Heldr. (Sect. *Suber*.)

Q. arborea, ramulis tenuibus elongatis junioribus striatis pulverulento-puberulis, foliis longè et tenuiter petiolatis planis ovato-oblongis basi truncato-subcordatis vel subattenuatis integerrimis vel hinc indè grossè lobato-dentatis junioribus petiolisque pilis brevissimis stellatis pulverulento-puberulis demùm glabratissimis subtus pallidioribus, fructibus sessilibus, cupulæ junioris squamis arcuè adpressis subdeltoideis apice attenuatis pulverulento-sericeis.

Hab. in *Cariâ* (Pinard), in *Pamphylidâ* inter fluvios *Eurymedontem* et *Cestrum* ubi sylvas format (Heldr.).

Rami tenues juniores pulverulenti. Folia valdè variantia nunc integerrima nunc dente uno alterove aucta nunc uno latere vel ambitu toto grossè lobato-dentata oblusa vel acutiuscula 2 vel 2 $\frac{1}{2}$ pollicaria pollicem circiter lata, ramulorum sterilium majora basi cordata lata elliptica aristato-dentata. Petiolus 6-8 lineas longus, glans immatura subrotunda cupulæ immersa magnitudine avellanæ. A *Q. ilice* et *Q. suberi* differt foliis petiolo longiori tenuiorique suffultis adultis utrinquè glaberrimis minus coriaceis et indumento stellato pulverulento.

Doleo hasce tres quercus species imperfectè ex speciminibus junioribus descriptas fuisse.



DIAGNOSES

PLANTARUM ORIENTALIU NOVARUM.

DIAGNOSES

PLANTARUM ORIENTALIU NOVARUM.

N° 13

AUCTORE

E. BOISSIER,

SOC. PHYS. GENEV. SODALI.



NEOCOMI.

TYPIS HENRICI WOLFRATH.

1883.

DIAGNOSES

PLANTARUM ORIENTALIIUM NOVARUM.

AROIDEÆ.

BIARUM SPRUNERI Boiss. (Sect. *Eubiarum*).

B. bulbo depresso ovato, collo membranis albis lanceolatis longè acuminatis vestito, foliis hysteranthiis oblongis obtusis margine undulatis in petiolum eis breviorē vel æquilongum attenuatis, scapo brevissimo inter membranas radicales occultato, spathâ erectâ infernè longè tubulosâ limbo plano tubum ter superantî latè lanceolato-linearî apice breviter acuminato acuto atropurpureo, spadice suprâ partem genitaliferam atropurpureo sensim et paululū clavato-in-crassato subnutanti spathæ subæquilongō, carpellorum spicâ ovato-globosâ ad imam basin spadicis sitâ, stylo rubro carpello subæquilongō, stigmate minuto capitato-depresso, genitalibus rudimentariis solū inter carpella et stamina sitis elongatis albidis basi verticaliter dilatatis deflexo-crispis spatium cylindro staminum triplō longiūs occupantibus, staminibus in cylindrum spadice vix latiorē congestis bilocularibus rimâ transversâ dehiscentibus.

Hab. in collibus apricis *Atticæ* ad *Phalerum* portum ubi duce amiciss. Spruner florere incipientem Maii initio legi.

Folia 2-2 $\frac{1}{2}$ pollices longa 6-10 lineas lata in petiolum eis æquilongum attenuata. Spatha parte tubulosâ 15-16 lineas longa parte apertâ 3-5 pollices longa 7-9 lineas lata. Annulus staminum 3-4 lineas longus. Antheræ utrinquē rimâ dehiscentes rimis ad apicem antheræ

in unam transversam conjunctis et sic anthera profundè transversè bifida et sicut bivalvis valvâ inferiori brevi, superiori longiori in rostrum recurvatum attenuatâ. Planta inter *Biara* et *Ischara* intermedia, a prioribus genitalibus sterilibus suprâ antheras nullis, a posterioribus staminibus poro non dehiscentibus discedens. His notis affine *B. Henseleri* quod differt scapo elongato, spathæ limbo angusto obtuso, spadice filiformi, genitalibus sterilibus sparsissimis.

BIARUM ALEXANDRINUM Boiss. (Sect. *Ischarum*).

B. tubere...., foliis subhysteranthiis angustè linearibus acutis in petiolum attenuatis, scapo basi vaginis albis membranaceis linearibus ei subæquilongis stipato, spathæ virescenti-albidæ parte inferiori clausâ oblongâ supernè in limbum angustè linearem acutum rectum eâ subduplò longiorem abruptè constrictâ intùs violascenti, spadice filiformi atropurpureo supernè subinflexo spathæ subæquilongo, carpellis paucis ad basin spadiceis in spicam ovatam congestis, stigmatè purpureo eis subbreviori stigmatè conico-depresso terminatis, intervallo inter carpella staminaque hisce duplò longiori subnudo cum cilio sterili uno alterutroque, antheris paucis subdistinctis in cylindrum tenuem brevem approximatis bilocularibus poro apicali dehiscentibus.

Hab. in *Ægypto* propè *Alexandriam* undè Novembri florentem misit amiciss. Cadet de Fontenay.

Folium unicum mei speciminis non omninò evolutum bipollicare 2 $\frac{1}{2}$ lineas latum. Scapus bipollicaris. Spatha cum limbo tantum 2 $\frac{1}{4}$ pollices longa. Spadix angustissimus. Antheræ numero 15 20. Species inter *Ischara* florum minutie defectuque ferè toto genitalium sterilius insignis.

ARUM PALESTINUM Boiss. (Sect. *Gigarum*).

A foliis longè petiolatis viridibus crassiusculis oblongis obtusis basi cordato-hastatis lobis lateralibus abbreviatis triangularibus acutiusculis divaricatis, petiolo basi dilatato, scapo petiolis parum breviori, spathâ extùs albovirenti intùs atropurpureâ basi convolutâ supernè latè oblongo-lineari apice abruptè acuminatâ rariùs obtusâ, spadice atropurpureo supernè subclavato-incrassato spathâ paulò breviori,

carpellorum spicà breviter cylindricà a staminibus spatio eà paulò breviori genitalibus sterilibus atropurpureis basi valdè incrassatis patentibus densè stipato sejunctà, antherarum annulo latiusculo densissimo verticillo altero genitalium steriliū atropurpureorum iterū superato.

Hab. ad pedem rupium umbrosarum, circà *Hierosolymam* ubi legi florif. Aprili 1846, in monte *Carmelo* (Boiss.).

Petoli pedales et ultrà, limbus 5-8 pollices longus, 3-4 latus. Spatha 5-7 pollices longa parte convolutà sesquipollicaris. Multis notis affine *Ad. Dioscoridis* quod in Syrià propè *Berythum* legi et cui *A. Syriacum* Blume omni jure referendum esse videtur sed quod a meà specie differt spathà latiori intūs eleganter maculis atropurpureis conspersà nec totà atropurpureà, genitalibus sterilibus albidis longioribus multò tenuioribus, foliis majoribus tenuioribus. An tamen hujus forma?

ARUM RUPICOLA Boiss. (Sect. *Gigarum*).

A. bulbo . . . , foliis longè petiolatis profundè cordatis oblongis hastato sagittatis obtusis acutisve lobis lateralibus deorsum directis parum divergentibus oblongo-triangularibus obtusis acutiusculisve basi aliquandò subangustatis, scapo folia superanti, spathà usquè ad quartam partem inferiorem convolutà dein angustè lanceolatà usquè ad apicem acutum sensim attenuatà tenui membranaceà virenti demum rubellà, spadice luteo demum rubello tenuiter cylindrico spathà paulò breviori, carpellorum spicà ad spadicis basin oblongà a staminibus spatio eà breviori genitalibus sterilibus sparsis e basi dilatatà tenuissimè setosis rubellis flexuosis obsito sejunctà, antherarum spicà breviter cylindricà flavà iterum supernè genitalibus sterilibus paucis sparsis brevibus rubellis superatà.

Hab. in cavis umbrosis rupium *Antilibani* ad septentrionem spectantibus inter *Zebdani* et *Zachle*. Legi floriferum fine Maii.

Foliorum limbus 4-6 pollices longus basi 2-2 1/2 latus. Scapi pedales. Spatha 4-5 pollices longa tubo sex lineas limbo basin versùs 7-8 lineas latus. Species pulchella spathà minutà angustà ab omnibus aliis sectionis distinctissima.

ARUM KOTSCHYI Boiss. et Hohenack. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Gigarum*).

A. bulbo..., foliis longè petiolatis oblongis a basi parùm profundè cordatà ad apicem sensim angustatis acutiusculis auriculis basilaribus brevibus ovalis obtusis rariùs acutis, seapo folia superanti, flore parvo, spathà virenti ad tertiam partem usquè convolutà ovatà dein in limbum lanceolato-linearem acutum rectum angustatà, spadice spathà ferè dimidiò breviori tenuiter cylindrico rubello, spicà carpellorum oblongà ab antheris spatio eà multò breviori genitalibus sterilibus paucis brevibus purpureis e basi dilatatà setosis obsito sejunctà, antherarum spicà minutà subsphæricà rubellà, genitalibus sterilibus iterùm suprà antheras rubellis brevibus.

Hab. in fauce *Dudera* montis *Elbrus Persiæ* borealis Kotschy N° 723.

Folia ea *A. picti* formà omninò referentia sed minora 2 1½-3 1½ pollices longa basi 1 1½ poll. circiter lata. Spatha e minimis generis 2 1½ pollices in meo specimine tantùm longa. Speciei præcedenti affine sed ab eo formà foliorum basi brevissimè cordatorum, partium floralium proportionè faciliè distinguendum.

ARUM HYGROPHILUM Boiss. in pl. Syr. exs. 1846. (Sect. *Gigarum*).

A foliis longè petiolatis hastato-subtrilobis lobis elongatis angustis lanceolatis margine minutè subdenticulato-erosis terminali obtuso vel acutiusculo lateralibus valdè divergentibus sæpè horizontalibus terminali sæpiùs parùm brevioribus sed magis angustatis acumina-tis, scapo petiolis paulò breviori, spathà ultrà tertiam partem usquè convolutà rubellà limbo virenti rubello-marginato lanceolato-lineari apice acuminato, spadice tenuiter cylindricà rubellà spathà tertià parte breviori, carpellorum spicà cylindricà ab antheris genitalibus sterilibus paucis congestis a basi crassà compresso-conicis albis in setam abeuntibus sejunctà, antherarum spicà densà breviter ovatà apice spatio brevi iterùm genitalibus sterilibus tenuiter setosis rubellis longis deflexis superatà.

Hab. ad fossas humidas et rivulos vallis *Antilibani* infrà pagum *Zebdani* frequentissimè. Legi floriferum Maio 1846.

Petoli sæpè pedales sesquipedalesque, foliorum lobus terminalis 3-6 pollicaris basi 1-1 1½ latus, laterales subhorizontales 3-4 pollica-

res vix breviores. Spatha 4-5 pollices longa 6-9 lineas tantum lata. Species insignis. Ab. *A. rupicola* et *A. Kotschyi* quibus floribus parvis accedit foliis subæqualiter et divaricatum trilobis lobis valde elongatis, genitalium sterilius superiorum comâ longâ distinctissima.

ARUM CAETICUM Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1847. (Sect. *Eminium*).

Ar. radice subbulbosâ fibras cylindricas tenues edenti, foliis petiolo limbum non duplò superanti infernè latè vaginanti suffultis triangulari-ovatis cordatis lobis lateralibus triangularibus acutis divergentibus, costâ mediâ crassâ latâ nervos laterales manifestos edenti, scapo petiolis paulò longiori, spathâ suprâ tertiam partem longitudinis convolutâ albidâ oblongâ apice acuminatâ, spadice albido rubellove subclavato-incrassato spathâ paulò breviori, carpellis antherisque spicas duo oblongo-cylindricas subæquilongas subcontiguas genitalibus sterilibus setiformibus albidis paucissimis vel nullis sejunctas formantibus.

Hab. inter saxa montium *Cretæ*, in fauce *Selia* Eparchiæ *Hagio-Vassili* ineunte Aprili et in cacumine montis *Tavoutsi* Eparchiæ *Sitia* fine ejusdem mensis alt. 3000' (Heldr.).

Petoli 4-5 pollicares, folia substantiæ firmæ formâ variantia in specimine e fauce *Selia* semipedalia 3 pollices lata, in speciminibus e monte *Tavoutsi* ferè dimidiò minora. Spatha in priori specimine ferè 9 pollices longa in posterioribus e loco magis alpino ortis tantum 4-5 pollicaria in omnibus longitudinaliter parallelè venosa. Species inter *Eminia* spicis carpellorum staminumque subcontiguis nec ut in aliis speciebus spatio lato genitalibus sterilibus obsito primâ fronte faciliè recognoscenda.

ARUM CRASSIPES Boiss. (Sect. *Dracunculus*.)

Ar. bulbo , foliis petiolo crasso eis duplò vel vix longiori plano-compresso suprâ canaliculato suffultis crassis pedatipartitis ambitu ovatis partitionibus lateralibus duobus costâ basi denudatâ subpetiolulatis basi subhastatis pinnatipartitis laciniis lanceolatis vel linearibus margine undulatis acutis exteriori secùs petiolulum basi longè decurrenti, partitione intermediâ sessili latiori hastato-sagittatâ

laciniis lanceolatis acutis divaricatis, pedunculo petiolis breviori crasso sub flore obconico-incrassato carnosus, spathâ crassâ ferè ad medium usquè convolutâ limbo ovato-oblongo breviter acuminato extûs pallido rubro-punctato intûs atropurpureo valdè sulcato-verrucoso, tubo intûs violaceo-punctato, carpellis uniovulatis spicam oblongam formantibus a spicâ oblongâ minutâ densâ antherarum sejunctis spatîo longissimo albo tenui genitalibus sterilibus sparsis crassis filiformibus valdè elongatis albis obsito, spadice suprâ antheras nudo cylindrico-clavato atropurpureo tuberculis valdè aspero spathâ breviori.

Hab. in desertis ad meridiem *Judeæ* inter *Nackl* et *Gaza* sitis, in vallibus orientalibus *Hermonis* inter *Rascheya* et *Damascus*, in cultis *Libani* superioris inter *Damascus* et *Berythum* (Boiss.) Floret in deserto Aprili, in montibus Maio.

Folia divisione suâ ea *A. criniti* referentia sed multò minora ambitu 4-5 pollices lata difficilè describenda. Partitiones laterales iterùm 5-7 partitæ latere exteriori decurrentes, intermedia hastata. Laciniæ 1-3 pollices longæ latitudine multùm variantes in speciminibus deserti 1 1½-2 lineas vix latæ lineares, in Syriacis triangulari-lanceolatae, intermedia basi sæpè pollicem lata. Pedunculus suprâ terram 2-3 pollices tantùm longus sub spathâ in vivo præsertim valdè incrassatus carnosus. Spatha in speciminibus majoribus 7-8 pollices longa, ad basin diametro sesquipollicem, ad limbum 2 1½ pollices lata, in aliis speciminibus multò minor, substantiæ crassæ. Intervallum inter ovaria et stamina sæpè sesquipollicare. Genitalia sterilia 5-6 lineas longa. Spadix terminalis 1 1½-3 pollices longus. Species distinctissima ab *Aro crinito* staturâ humili, foliorum laciniis brevibus, pedunculo apice obconico, spadicis clavâ tuberculato-asperâ nec longè crinitâ etc. discedens, foliis *Dracunculi* cum characteribus floralibus *Ari* donata et hoc genera in unum iterùm conjungere omni jure suadens.

ORCHIDEÆ.

ORCHIS SEPULCHRALIS Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1847.

O. tuberibus indivisis ovatis, caule crasso procerò, foliis remotiusculis a basi longè tubuloso-vaginantibus latè oblongis obtusis summo

ad vaginam reducto, spicâ terminali primùm ovato-oblongâ dein cylindricâ bracteis uninerviis brevissimis triangulari-acuminatis, perigonii laciniis in galeam oblongam conniventibus infernè coalitis 3-5 nerviis, labello carnosulo fusco tripartito laciniis lateralibus e basi lineari sensim spatulato-dilatatis, intermediâ lineari apice abruptè dilatatâ divaricatum bipartitâ partitionibus obovato-spathulatis integris dente brevi interjecto, calcare apice subdilatato saccato ovario dimidiò breviori.

Hab. inter sepulchra umbrosa Turcica propè *Adalia Pamphyliae Alaya* versùs eundo (Heldr.) Martè 1848, in vallibus montium *Tokat Anatoliæ* Aucher N° 5355.

Caulis circiter sesquipedalis, foliorum limbus 4-5 pollices longus 12-18 lineas latus. Spica primùm 1½-2 pollices dein 6-7 pollices longa densiuscula, flores magnitudinis ferè eorum *O. militaris* L. cui soli inter affines propter formam labelli comparari potest ab eo distinctissima labello e sicco nigro-fuscescenti laciniis lateralibus non linearibus, intermedio lobis non oblongis sed spathulato-obovatis, calcare subsaccato. Cl. Rchb. fil. in Icon. Fl. germ. hanc ut varietatem *O. punctulatæ* Steven nobis ignotæ conjungit.

EPIPACTIS VERATRIFOLIA Boiss. et Hohenack. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1847.

E. caule crasso striato procero basi vaginis 3-4 brevibus inflatis apice obliquè truncatis obsito suprâ eas folioso supernè papillari-puberulo, foliis multinerviis albo-nervosis rigidulis intermediis vaginâ brevi insidentibus latè ovatis oblongisve acutis glabris, superioribus floralibusque parcè et brevissimè crispo-puberulis lanceolatis linearibusque longissimis supernè longè attenuatis acuminatis basi subangustatâ sessili amplexicaulibus, floribus in axillis solitariis foliis multoties superatis spicam longissimam laxissimamque formantibus pedunculis densè pubescentibus tandem recurvis ovario vix brevioribus suffultis, ovario densè pubescenti, perigonii patuli laciniis extùs brevissimè farinoso-puberulis exterioribus lateralibus semi-ovato-incurvis omnibusque acuminatis, interioribus duabus dimidiò brevioribus ovatis obtusiusculis, labelli articulo superiori e basi truncato-subcordatâ transversè sublitori medium versùs abruptè angustato acuminato lævi glabro perigonii lacinias æquanti, capsulâ glabrescenti oblongâ.

Hab. in faucibus *March Mahal* montis *Elbrus* propè *Derbend* Kotschy N° 401 et 652.

Caulis 2 1/2 pedalis, folia intermedia 3-6 pollices longa 1 1/2-2 pollices lata 50-80 nervia nervis 8-10 crassioribus, superiora 8-9 pollices longa infernè 9-15 lineas lata sensim in bracteas diminuta. Bracteae inferiores 4-6 pollicares, supremæ 1-3 pollicares, 1-2 lineas latæ. Pedunculi 4-5 lineas longi. Flores e sicco rosei eis *Eptactidis latifoliae* duplò majores numero 15-20 racemum foliatum pedalem et ultrà formantes. Labellum formâ peculiari donatum, hypochilio in formam quæ carinam generis *Coronillæ* refert semicirculariter incurvo, epichilio eo sublongiori ei angustè inserto basi tres lineas lato circiter 5 lineas longo subtrilobo lobis lateralibus rotundatis terminali lanceolato acuto. Species staturâ et florum structurâ distinctissima et faciliè totius generis pulcherrima.

CEPHALANTERA CUCULLATA Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1847. Rchb. fil. Icon. fl. germ. vol. XIV. tab. 120 fig. 2.

C. radice fibris cylindricis constanti, caulibus a basi foliosis, foliis inferioribus ad medium caulis usquè vaginiformibus tubulosis basi attenuatis dein subinflatis apice in auriculam brevem obtusam obliquè truncatis nervoso-striatis, folio intermedio uno alterove e vaginâ brevi in limbum brevem ovatum acutum multinervem cucullatum abruptè dilatato, foliis superioribus floralibusque lanceolato-linearibus linearibusque canaliculato-cucullatis basi abruptè attenuatis brevissimè subpetiolatis flores æquantibus superantibusque, floribus flavescenti-albidis, perigonii laciniis tribus exterioribus longioribus lanceolatis acutis, interioribus 2 oblongis obtusiusculis, labelli basi calcare brevi subincurdo donati laminâ phyllis perigonii breviori latitudine suâ longiori extremitate attenuatâ acutiusculâ.

Hab. in umbrosis montis *Taktali* propè *Smyrnam* (Boiss.). Fl. Maio, in *Cretâ* in pinetis montium *Lassiti* suprâ *Males* alt. circ. 4000' (Heldr.)

Caules pedales vel paulò breviores. Vaginæ foliaceæ non ut in *C. pallenti* 1-2 ad basin caulis sed numero 4-5, pollices 1 1/2 longæ, a basi ad apicem paululùm dilatatæ, folia intermedia tubo vaginanti et limbo semper brevi pollicem ferè longo 6-7 lineas lato instructa, superiora basi non vaginantia, floralia ab inferioribus ad superiora

sensim abbreviata 9-13 lineas longa 1 1/2-2 lineas lata. Flores illis *C. pallentis* vix minores, ejusdem ferè coloris, labellum calcare crassiusculo obtuso antrorsum subincurvo lineas 1 1/4-1 1/2 longo basi auctum quo caractere hæc species statim a *C. pallenti* in quâ labelum ut in aliis speciebus generis obsoletè gibbosum est egregiè differt. Labelli lamina magis quam in *C. pallenti* elongata.

IRIDEÆ.

GLADIOLUS ALEPPICUS Boiss.

Gl. fibris tunicarum radicalium parallelis dense stipatis parcè anastomosantibus areolis angustissimis, foliis elongatis angustè linearibus supernè longè attenuato-acuminatis 10-13 nerviis nervis parallelis inter se valdè approximatis subæqualibus, floribus in spicam secundam approximatis, bracteis lanceolato-linearibus interiori dimidiò breviori, perigonii rosei laciniis obovato-spathulatis basi longè attenuatis omnibus apice rotundatis superiori basi valdè incurvâ, lateralibus duabus labii superioris et infimâ labii inferioris aliis brevioribus, antheris filamentum æquantibus aut eo sublongioribus, capsulâ ovatâ sexsulcatâ apice compressâ, seminibus apteris.

Hab. in agris propè *Aleppum* Kotschy pl. Alepp. Kurd. N° 86.

Planta sesquipedalis, folia inferiora ferè pedalia 2-2 1/2 lineas lata. Flores 6-7 magnitudinis eorum *G. communis*. Antheræ circ. 7 lineas longæ; ab omnibus generis speciebus Europæis statim dignoscitur foliis ut in *Gl. Persico* duobusque sequentibus nervis æqualibus parallelis contiguis percursis dùm in *Gl. palustri*, *G. imbricato*, *G. segelum* etc. nervi pauciores sunt et intermedius aliis crassior basin versùs subitâ curvatione ad laterem anteriorem folii flectitur. *Gl. Persicus* Boiss. eodem caractere foliorum donatus a *Gl. Aleppico* quantum ex speciminibus siccis dijudicare queo differt floribus minoribus subdistichis vix recurvis, perigonii laciniis oblongo-rhombeis acutiusculis, antheris filamentum multò brevioribus. In eo insuper bractæ dilatatæ et abbreviatæ sunt et tota pars superior plantæ sub lente tuberculato-pruinosa sed hi characteres minùs firmi videntur.

GLADIOLUS ATROVIOLOACEUS Boiss.

Gl. fibris tunicarum radicalium parallelis densè stipatis parcè anastomosantibus areolis subindistinctis, foliis glaucis cauli æquilongis vel longioribus linearibus acuminatis 10-12 nerviis nervis parallelis subæquidistantibus, floribus 3-7 in spicam brevem secundam approximatis ob tubum valdè curvatum horizontalibus subcernuisve atrovioleaceis, bracteis lanceolatis attenuato-acuminatis margine angustè scariosis exteriori tubum perigonii superanti, interiori tertiâ parte breviori, perigonii laciniis oblongo-spathulatis acutiusculis superiori valdè curvatâ, tribus labii inferioris cæteras paulò superantibus, antheris filamento suo subbrevioribus apice attenuato-mucronatis, stigmatibus laciniis a basi ad medium linearibus glabris dein subito in laminam spathulatam papillosam dilatatis, capsulâ

Hab. in *Persia*, circâ *Ispahan* Aucher N° 5352, ad *Teheran* inter segetes Kotschy pl. Pers. bor. N° 28.

Pulchra species floribus in spicam brevem confertis valdè incurvis *G. imbricatum* referens sed ob foliorum nervationem in sectione *G. Persici* et *G. Aleppici* collocanda, ab utroque colore et curvatione florum, spicâ confertâ, antheris mucronatis distincta. Pedalis, folia 1 1/2-2 lineas lata, flores eis *G. imbricati* paulò majores, antheræ circiter 5 lineas longæ.

GLADIOLUS HALOPHILUS Boiss. et Heldr. in pl. Anatol. exs. 1847.

G. fibris tunicarum radicalium crassis reticulatis areolis oblongis ellipticisve, foliis glaucescentibus angustè linearibus rigidis cordatis infimo caulem æquanti vel superanti cæteris brevioribus angustioribus, nervis 4-6 crassis æquidistantibus, floribus 1-5 spicam laxiusculam terminalem secundam formantibus, bracteis crassiusculis glaucescenti-rubellis elliptico-linearibus in mucronem acuminatum scariosum abeuntibus inferiori tubum corollæ æquanti interiori subbreviori, perigonii rosei tubo incurvo laciniis obovatis obtusis lateralibus brevioribus, antheris incurvis filamento quartâ parte brevioribus, stigmatibus lobis sursùm sensim spathulato-dilatatis, capsulâ....

Hab. in salsis hyeme inundatis planitiebus *Koniah Isauriæ* in viâ inter *Koniah* et montem *Karadagh* (Heldr.). Fl. Junio.

Pedalis, folia inferiora lineam vel rariùs sesquilineam lata, cætera multò angustiora. Flores illis *Gl. palustris* ferè majores. Species foliorum nervatione præcedentibus approximanda ab eis foliis angustis duris, fibris radicalibus crassis areolatis, bracteis longè scarioso-acuminatis distinctissima.

GLADIOLUS KOTSCHYANUS Boiss.

Gl. fibris tunicarum radicalium parallelis densè stipatis anastomosantibus areolis angustissimis, foliis latiusculè linearibus longè acuminatis 5-6 nerviis nervis inæqualiter distantibus medio crassiori curvato, spicis subdistichis densis, bracteis linearibus cucullatis acuminatis latè scarioso-marginatis inferioribus longissimis, perigonii tubo valdè curvato laciniis omnibus ovato-spathulatis rotundatis basi longè attenuato-stipitatis labii superioris brevioribus, inferioris duabus lateralibus præsertim elongatis, antheris filamento eis ferè duplò longiori suffultis, stigmatibus lobis basi glabris suprà medium subitò in laminam ovatam ciliatam dilatatis, capsulà ovatà trigonà apice non impressâ, seminibus angustè alatis.

Hab. in *Mesopotamiâ* inter *Suereck* et *Diarbekir* Kotschy pl. Mesopot. N° 163.

Planta bipedalis. Folia 3-4 lineas lata. Flores in spicâ 6-8 magnitudinis eorum *Gl. palustris*. Perigonium e sicco basi intensè violaceum versùs laciniarum periphæriam pallescere videtur. Antheræ 3 1/2 lineas longæ. Affinis *Gl. Illyrico* qui differt perigonii labiis subæquilongis, laciniis rhombeo-oblongis, tubo breviori. An tamen hujus speciei forma Orientalis sit ulterius inquirendum.

IRIS STYLOSA Poir. var. angustifolia Boiss. et Heldr.

Planta plerùmque humilior 5-8 pollicaris, folia spathâ angustiora 1 1/2-1 lineam lata margine manifestius scabrida, cæterum omnia speciei.

Hab. in *Atticâ* (Heldr.), *Argolide* (Spruner), *Achaiâ* (Boiss.), *Rhodo*, *Cypro*, *Cretâ* (Heldr.), *Cariâ* (Pinard).

IRIS SUAVEOLENS Boiss. et Reut. (Sect. *Barbatæ*).

1. *pumila*, foliis ensiformibus glaucescentibus subfalcatis caule foliis breviori unifloro, spathæ bivalvis valvis vix inflatis subæquilongis

perianthii tubo paulò brevioribus vel ei æqualibus, exterà interiori duplò latiori totà herbaceà margine vix membranaceà dorso subalato-carinatà, interiori apice membranaceo-scariosà, perianthii tubo tereți obscurè trisulcato limbo triente longiori lividè virescenti, laciniis virenti-ochroleucis basi extùs virentibus exterioribus cuneato-oblongis apice rotundatis leviter emarginatis in medio limbi reflexi maculà ovatà lividè cæruleo-violaceà instructis, barbà concolore, laciniis interioribus paulò latioribus oblongis apice obtuso emarginatis margine undulato-crispis basi subitò in unguiculum contractis, stigmatibus oblongo-spathulatis cristis semiovatis apice acuminatis latere exteriori denticulatis.

Hab. in planitiebus *Bulgaricæ* propè *Kustendje* (Boiss.). Indè relata fuerunt rhizomata ex quibus plantam coluimus descripsimus que.

Caulēs 3-5 pollicares, folia primùm brevīa tandem circiter pedalia. Flores fragrantissimi eis *I. pumilæ* dimidiò minores. Odor florum eum *Asperulæ odoratæ* exsiccatae referens. Affinis *I. pumilæ* differt floribus minoribus odoratissimis, perianthi laciniis inter se subinæqualibus constanter ochroleucis exterioribus maculà ovatà notatis, spathā vix inflatā præter apicem subscariosum totā herbaceā valvā exteriori dorso carinato-alatā.

CROCUS AUCHERI Boiss.

Cr. tunicis radicalibus..., foliis synanthiis latiusculis tubum floris æquantibus infernè margine parcè ciliatulis, bulbo 1-3 floro, spathæ diphyllæ phyllis subæqualibus acuminatis longitudinaliter plicatis, perigonii crocei tubo elongato, fauce nudā, laciniis oblongis, antheris perigonio tertiā parte brevioribus, stigmatibus antheras æquantibus ultrā medium 2-3 partitis laciniis tenuissimis apice vix incrassatis integris.

in *A sia minori* circā *Guenivè* Aucher N° 5349.

Habitus omninò *Cr. aurei* a quo et affinis foliis ciliatulis, stigmatibus setaceo-multifidis nec apice incrassatis crenatis statim dignoscitur. Habeo specimina ex Argolide ab amiciss. Spruner missa huic speciei foliorum latitudine et spathæ formā omninò consentientia sed in eis antheras stigmataque nimia compressione destructa non videre licuit.

CROCUS THESSALUS Bois. et Spruner.

Cr. tunicis radicalibus stipatim fibroso-intertextis areolis angustissimis, foliis synanthiis flore paulò brevioribus linearibus brevibus superne albo-vittatis, spathâ diphyllâ phyllis subæqualibus pellucidis, perigonii rosei laciniis oblongis obtusiusculis, staminibus corollâ dimidiò brevioribus, stylo longè tripartito, stigmatibus antheras subsuperantibus apice dilatato denticulatis.

Hab. in monte *Ætâ Thessaliæ* (Spruner). Floret verisimiliter vere.

Planta florifera 2-3 pollicaris, folia per anthesin abbreviata latitudinis eorum *Cr. verni*. Flos colore *Colchicum autumnale* referens in genere parvus. Egre specierum stylo profundè tripartito stigmatibus non multifidis donatarum. Inter eas *C. variegatus* a nostrâ differt flore duplò majori variegato, tunicis radicalibus reticulatis; *C. Imperati* eadem florum magnitudine et colore, stigmatibus profundè fimbriatis; *C. versicolor* stigmatibus subintegris, tunicis radicalibus membranaceis; *C. Pallasii* foliis hirtis stigmatibusque integris.

CROCUS PESTALOZZÆ Boiss.

Cr. bulbi vaginis cartilagineo-membranaceis fuscis lævibus, foliis synanthiis flores superantibus lineari-setaceis rigidulis margine scabridulis supernè 5 nerviis subtilis lineâ albâ angustâ percursis, floribus 1-3, spathæ diphyllæ phyllis pellucidis obtusis, perigonio (e sicco) albido basi flavescenti laciniis oblongis obtusis, staminibus perigonio tertiâ parte brevioribus stigmati æquilongis, stigmatibus aurantiacis linearibus supernè subdilatis plicato-carinatis apice truncatis integris.

Hab. in *Bithyniâ* propè *Bolu* Pestalozza.

Folia 2-5 pollices longa lineæ 1/3 lata, flores minores eis *Cr. Boryi* cui inter omnes florum coloratione tunicarumque structurâ magis congruit sed *Cr. Boryi* differt foliis abbreviatis trinerviis, spathæ phyllis acutis, stigmatibus multifidis.

CROCUS CANDIDUS Clarke.

Cr. tunicis radicalibus tenuissimè intertexto-fibrillosis, foliis synanthiis flores æquantibus strictis lineari-setaceis utrinquè concoloribus,

spathâ pellucidâ diphyllâ phyllis acutissimis longiori sæpe bifidâ, perigonii (e sicco albi) laciniis oblongis obtusiusculis, staminibus perigonio dimidiò brevioribus, stigmatibus antheras superantibus intensè aurantiacis multifidis.

Hab. in *Ciliciæ* montibus Aucher N° 2129.

Planta 4 pollicaris, flores 1-3 magnitudinis eorum *C. biflori*. Affinis præsertim *C. Boryi* et *C. lævigato* B. et Ch. ab utroque differt tunicis non lævibus membranaceis sed e fibris tenuissimis angulo ferè recto intertextis constantibus. Brevi descriptioni plantæ Clarkianæ omninò convenit.

ROMULEA CROCEA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1847.

R. foliis linearibus compressis striatis recurvo-patulis scapo multò longioribus, scapis unifloris ex eodem bulbo 1-3, spathæ valvis subæquilongis exteriori herbaceâ pallide virenti parallelè multinervi, interiori latè membranaceo-marginatâ, perigonii crocei laciniis oblongis apice attenuatis acutiusculis exterioribus tribus extùs angustè dorso violaceo-fuscescentibus, filamentis basi villosis, stigmantibus stamina longè superantibus perigonio vix brevioribus.

Hab. in pineto montis *Solyma Lyciæ* propè pagum *Karabakir* ubi cl. de Heldreich fine Martii eam legit.

Scapi 2-2 1/2 pollicares, folia 4-6 lineas longa, flos e sicco ferè pollicem longus.

AMARYLLIDEÆ.

PANERATIUM TORTIFOLIUM Boiss.

P. bulbo obovato, caule brevi subterraneo vaginis tenuiter membranaceis foliorum teto, foliis synanthiis glaucis linearibus supernè attenuatis canaliculato-plicatis circinnatim contortis, spathâ laterali breviter pedunculatâ vel intrâ folia subsessili tenerâ albo-membranaceâ ovatâ acuminato-bifidâ 2-3 florâ, perigonii albi tubo angustissimo gracili limbo quadruplò longiori apice sensim ampliato, limbi laciniis angustissimè linearibus acutis, coronæ ultrâ medium liberæ dentibus

acutè triangularibus, filamentis coronæ inter ejus dentes adnatis eis subæquilongis perigonio brevioribus, stigmate perigonium subæquantli.

Hab. in deserto *Arabia* propè *Djedda* Schimper Un. Itin. N° 676.

Folia numerosa 1-3 lineas lata plicata valdè circinnata, spatha 1 1/2-2 pollicaris, perigonii tubus 4-5 pollicaris, limbus magnitudinis illius *P. maritimi*. Laciniæ jam a basi vix 2 lineas latæ. *A. P. maritimo* foliis angustis contortis, tubo longissimo et angustie laciniarum perigonii valdè distinctum. *P. maximum* Forsk ex *Arabia* quoque oriundum ex descriptione longè differt coronâ longissimâ cum tubo pedali etc.

LILIACEÆ.

TULIPA MONTANA Lindl. var. *chrysantha* Boiss. et Hohen. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846.

Folia curvata inferiora latè linearia undulata superiora lineari-subulata. Flores non puniceæ sed intensè citrini.

Hab. in schistosis ad radices montis *Elbrus* alt. 4000'-5000'. Kotschy loco citato N° 78.

Petala exteriora in hac specie plùs minùs acuta, interiora aliquandò acutiuscula aliquandò obovata obtusissima. Bulbi vaginæ præsertim parte superiori valdè albo-lanata.

TULIPA CRETICA Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1847.

T. bulbi vaginis glabris, scapo unifloro glabro humili 2-3 phyllo foliis lanceolato-linearibus expanso-recurvis canaliculatis acutis glabris scapo plerumquè longioribus superiori sæpè angustè lineari, flore erecto minuto pallidè roseo, perigonii phyllis oblongo-ellipticis utrinquè attenuatis acutis apice minutissimè puberulis interioribus basi sub lente utrinquè ciliatulis cæteris glabris, filamentis tertiam partem perigonii vix æquantibus ad tertiam partem inferiorem usquè parcissimè ciliatulis cæterum glabris, ovario lagenæformi antheras luteas æquanti, capsulâ ovato-trigonâ acutiusculâ.

Hab. in montibus excelcis *Cretæ*, montes *Sitta*, *Lassiti*, *Ida*, montes *Sphaciotici* (Heldr.). Fl. Aprili, Maio.

Planta 3-4 pollicaris, folia inferiora 4-5 lineas lata. Perigonii phylla 8-10 lineas longa 2 $1\frac{1}{2}$ -3 $1\frac{1}{2}$ lata. Affinis *T. Bithynicæ* Grisebach pl. Turc. exs. quam cl. auctor nunc in Spicil. fl. Rum ad *T. Turcicam* ducit. Hæc, parviflora quoque, a nostrâ differt foliis angustioribus erectis, perigonii coccinei phyllis acuminatis, filamentis usque ad quintam partem inferiorem dense albo-barbatis.

FRITILLARIA LYCIA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.

Fr. glabra pallidè virens, foliis radicalibus 1-2 teneris oblongis vel oblongo-lanceolatis acutis vel obtusis mucronulatis basi in petiolum tenuem eis longiorem attenuatis, caulinis 3-7 parvis omnibus subæquilatis angustè linearibus acutis, flore terminali nutanti foliis supremis superato, perigonio breviter campanulato basi non gibbosâ rotundato phyllis striatis non tessellatis rubris extus inæqualiter luteo suffusis obovato-cuneatis vel subdeltoideis a basi angustiori sensim dilatatis apiceque abruptè et breviter angustatis exterioribus sæpius angustioribus elliptico-linearibus, filamentis dilatatis supernè subangustatis parcè et brevissimè puberulis perigonii tertiam partem æquantibus antherâ breviter mucronatâ duplò longioribus, stylo glabro antheras superanti ad medium usque trifido.

Hab. in pinetis montis *Solya* Lyciæ (Heldr.). Fl. fine martii.

Caulis 10-12 pollicaris, folia radicalia 12-18 lineas longa 4-5 lata, caulina 2-3 pollices longa lineam unam lata. Flos illo *Fr. Messanensis* multò brevior. Inter *Fr. Græcam* et *Fr. acmopetalam* ferè media huic petalorum formâ accedens sed distincta foliis caulinis angustissimis, perigonio magis abbreviato, filamentis non hirsutissimis. *Fr. Græca* foliis omnibus caulinis ab infimis ad suprema sensim angustioribus, perigonii phyllis oblongis omnibus subæquilatis latè virescenti-fasciatis subtessellatis longiùs distat. *Fr. Messanensis* est planta multò robustior, perigonio longiusculè cylindrico etc.

THERESIA LIBANOTICA Boiss.

Th. fœtida tota farinoso-glaucâ, caule crasso elato totâ longitudine folioso, foliis alternis (aliquando nonnullis ternatim subverticillatis)

oblongo-lanceolatis acutiusculis basi sessili amplexicaulibus, floribus numerosis racemum terminalem laxum elongato-pyramidatum formantibus pedunculis perigonio sesquolongioribus apice subnutantibus suffultis, perigonii breviter campanulati per anthesin subpatentis basi rotundati non gibbosi phyllis ellipticis obtusissimis utrinquè flavo-virentibus striis tenuissimis fuscis apice furcatis eleganter pictis, nectario basilari breviter ovato, filamentis perigonio subbrevioribus antherarum lutearum basi perforatæ insertis, stylo staminibus breviori simplici apice obscurè stigmatoso, capsulis papyraceis fuscescentibus erectis depressis abbreviatim hexagonis acutangulis trilocularibus, seminibus biserialibus compresso-planis obovatis basi angustatis apice rotundatis angustè membranaceo-marginatis.

Var. α *bracteata* — Bracteæ lineares paulò infrà pedunculum ortæ eoque paulò longiores.

Var. β *ebracteata* — Racemus omninò ebracteatus.

Hab. ambo formæ mixtæ sed β rarior in lapidosis umbrosis regionis mediæ *Libani*, in viâ inter *Beyrouth* et *Damascus* suprâ *Khan Hussein*, circâ *Eden* copiosè. Videtur florere primo vere, caules jam fructiferos Maii fine legi bulbosque e quibus specimina florifera educavi.

Planta odore gravi *Lantanæ* vel urinæ felinæ tota polline glauco deterrenti obsita. Caulis florifer 1 1/2-2 pedalis fructifer tripedalis et ultrâ. Folia inferiora 4-6 pollices longa pollicem et ampliùs lata usquè ad caulem summum sensim decrescentia; bracteæ cum adsunt 1 1/2-2 pollicares 1 1/2 lineas latæ. Racemi 15-25 flori floriferi pedem dimidium fructiferi 1-1 1/2 pedes longi. Pedunculi 1-1 1/2 pollicares. Flores paulò majores eis *Theresiæ Persicæ* C. Koch — *Fritill. Persicæ* L. Phylla 6-7 lineas longa 3 1/2 lata. Capsula formæ et ferè magnitudinis earum *Petilii imperialis* sed tenuiùs membranacea et angulis angustiùs alatis donata. Semen tres lineas longum supernè 2 lineas latum. *Th. Persica* cui affinis differt odore nullo, foliis angustioribus, floribus brunneo-violaceis intùs viridi-maculatis, antheris e perigonio subexsertis purpureo-fuscis, racemo breviori abbreviatim pyramidato; hujus capsulam non novi nec comparare potui. — Genus *Theresiæ* a *Fritillariâ* distinctissimum est formâ capsulæ et bulbo non tuberoso sed squamoso omnino *Lilli*, a *Petilio* autem eodem bulbo eademque capsulâ donato tantùm differt inflorescentiâ et stylo integro nec apice trilobo.

ASPHODELUS RIGIDIFOLIUS Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1847.

A. perennis foliis omnibus radicalibus confertis numerosissimis lineari-subulatis rigidis quadrangulis subcompressis ad angulos scabridis acutis basi membranaceo-dilatatis glaucescentibus, scapo nudo folia superanti tereti a mediâ parte ramoso paniculato rariùs simplici, racemis terminalibus tenuibus laxiusculis, bracteis scariosis pellucidis albis nervo obscuro percursis a basi latiori triangulari subulato-acuminatis flores non æquantibus, pedunculis e bractea 1-4 erectis paulò suprâ basin articulatis sub anthesi brevibus postea elongatis perigonium dimidium æquantibus, perigonii albidii ante evolutionem longè et angustè tubulosi phyllis lineari-oblongis basi tantùm connatis obtusis nervo saturatiori percursis, filamentis a basi dilatata sub lente minutè scabrida sensim ad apicem usquè attenuatis tribus perigonio quartâ parte brevioribus, tribus aliis perigonio dimidiò brevioribus apice strumâ globoso-triquetrâ in cuspidem brevem cui anthera inserta est productâ instructis, antheris filamentorum strumosorum brevioribus, capsulâ immaturâ siccâ globoso-subtrigonâ, seminibus acutè trigonis sub lente punctatis dorso rugâ unâ alterâve instructis.

Hab. in collibus apricis *Isauriæ* inter *Kontah* et *Beychehr* loco tribus leucis a priori urbe distante (Heldr.). Fl. Junio ineunte.

Folia 6-7 pollices longa lineam dimidiam lata. Scapus cum racemis 1 1/2 pedalis, racemi 5-7 pollicares, perigonium clausum 7-8 lineas longum 1/2 latum. Species pulchra collocanda propè *A. Tauricum* quod quoque staminibus alternatim strumosis gaudet sed longè differt caule folioso racemo denso thyrsoidæo simplici compacto, bracteis densè confertis flores æquantibus vel superantibus.

ASPHODELUS DAMASCENUS Boiss.

A. perennis, foliis omnibus radicalibus confertis numerosissimis lineari-subtriquetris supernè subulato-attenuatis paginâ inferiori ad margines asperulis superiori lævibus, scapis elatis nudis folia superantibus in racemum simplicem longum laxiusculum abeuntibus, bracteis lanceolatis scariosis acuminatis pedunculos non multùm superantibus, pedunculis ex eadem bractea aggregatis suprâ medium articulatis floriferis perigonium dimidium æquantibus fructi-

feris elongatis, perigonio albido antè evolutionem tubuloso phyllis lineari-oblongis basi tantùm connatis obtusis nervo lato obscuro percursis, filamentis infernè scabridulis e basi latiori sensim attenuatis tribus perigonio paulò brevioribus, tribus aliis perigonio dimidiò brevioribus apice strumà alato-trigonà cuspidatà instructis, antheris filamentorum strumosorum brevioribus, capsulà (immaturà) obovatà rugosà, seminibus acutè triquetris dorso rugosis sub lentè punctatis.

Hab. in jugis humilioribus *Antilibani* in latere orientali ad *Wadi-Barrada* (Boiss.) Fl. Maio.

Folia 8-12 pollices longa infernè 1-2 lineas lata. Scapus cum racemo 2-3 pedalis, racemus fructifer sæpè pedalis et ultrà, perigonium 9-12 lineas longum. Affinis habitu et florum structurà speciei præcedenti a quâ foliis latioribus planioribus læviusculis, racemo semper simplici crassiori, pedunculis longioribus ad medium articulatis, floribus paulò majoribus sat distincta videtur.

ASPHODELUS REFRACTUS Boiss. in pl. Syr exs. 1847.

A. annuus, radice simplici brevi in fibras abeunti, foliis omnibus radicalibus lineari-subcylindricis compressis lævissimis parte inferiori viscidulis basi membranaceis dilatatis parte superiori attenuatis acutis, scapis 1-3 lateralibus ascendentibus incurvis teretibus lævibus folia multo superantibus infrà medium semel bisve dichotomè ramosis, racemis longis laxis, pedunculis viscidulis bractea albà scariosà ovatà abruptè mucronulatà suffultis paulò suprà basin articulatis superne clavato-incrassatis floriferis erectis flore subsesquilongioribus fructiferis refractis capsulà 2-3 plò longioribus, floribus parvis, perigonii phyllis oblongis albidis nervo medio valido obscuriori percursis, filamentis perigonio paulò brevioribus dilatatis basi apiceque attenuatis, capsulà rotundato-trigonà transversè sulcatà, seminibus griseo-albidis acutè trigonis dorso transversè sulcatis facie planis non foveolatis.

Hab. in arenosis vallis *Wadi Mokatteb* jugi *Sinaitici* mixta cum *Asph. clavato* (Vide Diagn. 7. p. 119). Legi floriferum Marte 1846.

Folia 3-4 pollices longa infernè vix lineam unam lata. Scapi 1 1/2 pedales, racemi demùm semipedales longioresque tenues laxè 10-16 flori. Pedunculi fructiferi eximiè refracti 4-5 lineas longi. Flores illis

A. clavati et *fistulosi* minores obconici vix 2 lineas longi. Capsula piso dimidiò minor. Species ab *A. fistuloso*, *clavato* et *viscidulo* affinis præter notas datas statim pedunculis fructiferis elongatis curvatione partis non articulatae eximie refracto-pendulis notabilis.

A. viscidulum a me prius in Diagn. N° VII ex speciminibus Schimperianis descriptum in planitie arenosâ *Ramleh* dictâ ad radices meridionales jugi *el Tih* in *Arabia petreâ* Marté 1846 abundè florentem legi et eum præter notas indicatas ab *A. clavato* scapo ascendenti, foliis non scabridis, capsulâ depressâ, seminibus minoribus cæsis lateraliter non foveolatis valdè distinctum esse observavi.

CHIONODOXA CRETICA Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1847.

Ch. foliis lato-linearibus planis flaccidis erectis apice subcucullatis obtusis scapum æquantibus superantibusve, scapo apice 1 sæpius laxè 2-3 floro, pedunculis erectis perigonio 1-2 plò longioribus, perigonii cærulei laciniis oblongis obtusissimis nervo medio tenui percursis, filamentis subæquilongis albidis apice valdè retusis, antheris filamento subæquilongis.

Hab. in fruticetis Berberide consitis regionis subalpinæ montium *Sphactotricum* suprâ *Askyphous* (Heldr.) Fl. Aprili ineunte.

Scapi sæpè 6-10 pollicares. Folia 4-6 lineas lata, flores vix minores illis Ch. *Luciliæ* minùsque patentes. Huic speciei valdè affinis ab eà sat differre videtur foliis dilatatis, scapo plerumque multifloro, perigonii laciniis brevioribus obtusis, filamentorum longitudine; antheræ eis hujus speciei breviores paulòque acutiores sunt. Diagnosis Ch. *Luciliæ* sic emendanda: Ch. foliis angustè linearibus subcanaliculatis recurvato-flexuosis, scapis subunifloris, perigonii laciniis oblongo-lanceolatis alternatim acutiusculis, filamentis alternatim longioribus.

CHIONODOXA NANA Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1847.

Ch. foliis angustè linearibus subcanaliculatis obtusis subrecurvo-patentibus, scapo foliis subæquilongo unifloro rariùs bifloro, perigonii pallidè lilacini infernè albidis laciniis elliptico-linearibus obtusis nervo saturatori percursis, filamentis apice truncato-retusis alternatim sesquilongioribus.

Hyacinthus nanus Bœm et Schult. — *Puschkinia scilloides* Sieber Reise in Creta II tab. 7.

Hab. in *Cretæ* montibus *Sphacioticis* elatis (Sieber), montes *Lassiti* alt. 4000-5000' (Heldr.). Fl. Maio.

Planta 3-4 pollicaris. Folia 1 $1\frac{1}{2}$ -2 lineas lata. Flos eo *C. Luciliæ* dimidiò minora a quâ habitu, magnitudine et colore floris certè distincta est. Lacinix perigonii 3 $1\frac{1}{2}$ -4 lineas longæ lineam 1 $1\frac{1}{4}$ latæ.

ALLIUM ORIENTALE Boiss. (Sect. *Molium*).

A. bulbo ovato simplici tunicis subcoriaceis externis nigricantibus internis candidis vestito, scapo tereti crassiusculo usque ad quartam partem tantum foliorum vaginis tecto, foliis subternis glabris patulo-flexuosis recurvisve subundulatis planis canaliculato-plicatis oblongo-linearibus vel latè linearibus acuminatis sub lente obscure denticulato-ciliolatis scapo brevioribus crassiusculis glaucescentibus, umbellâ multiflorâ capsuliferâ ob pedunculos inferiores decumbentes hemisphericâ, spathâ membranaceâ candidâ persistenti multinervi tandem ob phyllorum lacerationem plerumquè ad basin usquè 4 phyllâ phyllis ovatis cucullatis acuminatis pedunculis æquilongis demum deflexis, pedunculis flore triplo longioribus, perigonii albidii vel pallidè rubelli phyllis elliptico-linearibus obtusis nervo virenti percursis ad basin usquè liberis, filamentis basi dilatata connatis indè ad apicem usquè sensim attenuatis edentulis perigonio vix brevioribus, antheris lutescentibus, ovario capsulâque ovatâ perigonio subæquilongâ læviusculis.

Hab. in Oriente, *Asiâ minori* in *Cariâ* (Pinard), *Sipylo* monte (Aucher N° 2200) et *Ciliciâ* (N° 2188), monte *Solya Lyciæ* (Heldr), in agris *Syriæ* ad *Aleppum* Kotschy N° 71, in desertis *Arabiciis* ad fines *Palæstinæ* (Boiss.), in *Mesopotamiâ* (Aucher N° 2215).

Species characteribus habitu, umbellæ et florum amplitudine valdè affinis *A. tulipæfolio* Ledeb-decipienti Fisch. pro cuius formâ eam diù habuimus sed differt foliis latioribus (4-6lin.). *A. tulipæfolium* insuper habet spatham diphyllam obtusiusculam pedunculis dimidiò breviorē, perigonii phylla basi longiusculè connata, ovarium tuberculato-scabriusculum.

ALLIUM LIBANI Boiss. in pl. Syr. exs. 1849 (Sect. *Molium*).

A. bulbo simplici tunicis exterioribus griseo-nigricantibus tenuibus interioribus pellucidis albidis vestito, scapo humili tereti ferè ad apicem usquè folioso, foliis glaucis crassiusculis glabris scapo longioribus lineari-lanceolatis planis acutis vel breviter attenuato-acuminatis expansis incurvis sæpè circinnatis margine undulatis integerimis, umbellà multiflorà capsuliferà convexà, spathà membranaceà albà persistenti pedunculos æquantì ultrà medium irregulariter 2-4 lobà lobis acutis, pedunculis crassiusculis rigidis flore sesquilateralibus sub eo incrassatis, perigonii albidì phyllis basi ad quartam partem usquè longitudinis coalitis lanceolatis acutis nervo rubello percursis, filamentis usquè ad perigonii divisionem cum eo et inter se coalitis triangulari-lanceolatis acutis perigonio dimidiò brevioribus, antheris brevibus luteis, capsulà ovatà breviter rostratà perigonio vix breviori.

Hab. in arenosis summi jugi *Libani Makmel* dicti alt. 7000'-8000'. Legi floriferum Julio ineunte.

Scapus 2-3 pollicaris sæpiùs ad 2½ longitudinis arenà mobili sæpultus. Limbus foliorum 2-4 pollicaris internè 2-3 lineas latus. Flores illis *A. tulipæfolii* tertià parte majores. Perigonii phylla supernè angustissima. Ex affinitate *A. tulipæfolii* et *A. akakæ* Gmel. = *latifolii* Jaub. et Sp. Prius differt scapo elatiori, staminibus phylla perigonii oblonga æquantibus; posterius foliis brevibus latis, perigonii phyllis angustioribus basi breviter coalitis multò latiùs nervosis.

ALLIUM PHILISTÆUM Boiss. (Sect. *Molium*).

A. bulbis aggregatis, tunicis exterioribus coriaceis punctatis cinerascentibus interioribus membranaceis albidis, scapis pluribus teretibus crassiusculis tantum imà basi vaginatis, foliis viridibus erectopatulis flexuosis angustè linearibus canaliculato-plicatis supernè longè subulato-attenuatis scapo æquilongis brevioribusve margine remotè ciliolatis cæterum glabris, umbellà capsuliferà multiflorà convexà, spathà persistenti membranaceà plurinervi sordidè lutescenti monophyllà pedunculis floriferis vix breviori ad medium usquè vel inferiùs fissà sæpiùs 3-4 lobatà lobis abruptè et breviter acuminatis, pedunculis rigidiusculis flore sesquilateralibus fructiferis elongatis, peri-

gonii e sicco straminei nitidi phyllis elongatis oblongo-lanceolatis basi breviter inter se coalitis apice attenuatis acutis obscurè nervatis, filamentis a basi latiori inter se breviter et cum corollâ coalitis sensim attenuatis perigonio subæquilongis, antheris luteis, capsulâ rotundato-subdepressâ brevissimè rostratâ acutè triangulatâ perigonio persistenti clauso plùs dimidiò breviori.

Hab. in *Palæstinæ* collibus siccis et arenosis circâ Gaza. Legi Apr. 1846.

Scapi floriferi 3-4 post anthesin 6-8 pollicares, folia infernè 2 lineas tantùm lata. Flores magnitudinis eorum *A. moly* et *A. rosei* sed phylla perigonii angustiora 5-5 1/2 lineas tantùm longa. Ex affinitate *A. chamæmoly* et *A. subvillosi* a quibus characteribus datis facilè distinguitur.

ALLIUM PAPILLARE Boiss. (Sect. *Molium*).

A. bulbo ovatosimplici tunicis exterioribus coriaceis fuscescentibus interioribus membranaceis vestito, scapis mediocribus ascendentibus teretibus crassiusculis teretibus glabris vix ad quartam partem usquè vaginato-foliosis, foliorum vaginis papillis linearibus albis adpressis plerùmque retrorsis densè pubescentibus, limbo erecto glabro canaliculato-plicato a basi lineari longissimè et sensim subulato-acuminato margine integro scapo parùm breviori, umbellâ capsuliferâ multiflorâ convexâ pedunculis subæqualibus flexuosis flore duplò longioribus, spathâ pedunculis æquilongâ persistenti membranaceâ albâ nervosâ in 3-4 lobos in caudam setaceam eis sæpè subæquilongam abruptè desinentes lacero-partitâ, perigonii albi phyllis ovatis obtusis obscurè nervatis basi inter se longiusculè connatis, filamentis perigonio subæquilongis inter se et cum perigonio connatis a basi latâ sensim attenuatis triangulari-lanceolatis, antheris luteis, capsulâ subrotundo-angulatâ perigonio subæquilongâ.

Hab. in deserto ad meridiem *Palæstinæ* inter *Nochl* et *Gaza* (Boiss). Ineunte Aprili jam ferè defloratum erat.

Scapi 6-8 pollicares, folia ad basin limbi 2 1/2 lineas circiter lata, flores magnitudinis eorum *A. subvillosi* Salzmann.-*vernalis* Guss. cui ut et *A. subhirsuto* et *A. hirsuto* Zuccar e *Palæstinâ* quoque oriundo affine est sed ab hisce omnibus facilè distinguendum indole indumenti vaginalium non e pilis sed e papillis rigidis brevibus latiuscu-

lis constanti, foliis non planis sed canaliculatis longissimè attenua-
spathæ lobis longiùs caudatis et præsertim perigonii phyllis brevibus
obtusis nec acutis.

ALLIUM CASSIUM Boiss. (Sect. *Molium*).

A. bulbo ovato simplici tunicis exterioribus cinerascentibus punc-
tatis interioribus albidis vestito, scapo tereti tenui flexuoso ad quar-
tam vel quintam partem usquè folioso, vaginis glabris vel parcissimè
et tenuiter puberulis, foliis angustissimè linearibus planis pluriner-
viis margine integris glabris acutis flexuosis scapo vix brevioribus,
umbellà capsuliferà 6-11 florà pedunculis gracilibus erecto-flexuosis
flore 2-2 $\frac{1}{2}$ plò longioribus, spathà membranacè pedunculis dimidiò
breviori albà persistenti deflexà unilateraliter fissà vel 2-4 lobà lobis
breviter acuminatis, perigonii primùm albidì demùm pallidè rosei
phyllis oblongo-ovatis obtusis ferè ad basin usquè liberis nervo medio
saturationi notatis, filamentis perigonio dimidià vel tertià parte bre-
vioribus brevissimè connatis a basi dilatata usquè ad $\frac{2}{3}$ longitudinis
sensim angustatis tertià parte superiori subulatis, antheris luteis,
capsulà

Hab. in lapidosis partis superioris montis *Cassii Syriæ borealis*
orientem versùs (Boiss.) Junio ineunte florere incipit.

Scapus 8-9 pollicaris, folia infernè sesquilineam tantùm lata viridia,
flores illis *A. rosei* vix minores. Hoc affine nostræ speciei ab eà differt
scapo elato robustiori, foliis latioribus denticulato-scabridis, umbellà
multiflorà, perigonii phyllis intensè roseis minùs obtusis concoloribus,
filamentis a basi ad apicem sensim attenuatis perigonio vix quartà
parte brevioribus. *A. eriophyllum* et *A. Græcum* phyllis perigonii
acutis longiùs distant.

ALLIUM CARMELI Boiss. in pl. Syr. exs. 1847. (Sect. *Molium*).

A. bulbo ovato tunicis albidis crassiusculis opacis secùs scapi basin
in vaginas elongatas rubellas productis vestito, scapo crasso elato
tereti rigido lævi medullà farcto ad quartam partem usquè folioso,
vaginis foliorum undiquè retrorsùm pilis albis brevibus mollibus ve-
lutino-hirtis, foliis lato-linearibus planis elongatis scapo brevioribus
supernè longè et sensim attenuatis canaliculato-plicatis utrinquè hir-

lis margine ciliatis, umbellæ multifloræ globosæ capsuliferæ pedunculis subæqualibus flore subquadruplò longioribus, spathâ monophyllâ in 4 lacinias ovato-ventricosas albido-membranaceas virescenti-nervosas apice attenuatas breviter setaceo-caudatas umbellâ paulò breviores demùm deflexas ferè ad basin usquè partitâ, perigonii campanulati albi phyllis oblongis obtusis concavis subenerviis ferè a basi liberis, filamentis vix coalitis a basi dilatatâ sursùm attenuatis supernè subulatis, antheris luteis brevissimè exsertis.

Hab. in rupestribus *Carmeli* ubi legi floriferum ineunte Maio.

Culmus 3-4 pedalis infernè pennâ anserinâ crassior, foliorum inferiorum limbus 1 $\frac{1}{2}$ 2 pedalis basi 6-7 lineas latus. Umbella diametro 1 $\frac{1}{2}$ -2 pollicaris, flores magnitudinis et coloris eorum *A. cepæ*. Species quoad affinitatem dubia; statura elata et umbella *A. porri* et *A. multiflora* sed stamina simplicia. Hoc *Molliis* ob spathæ formam indumentumque foliorum adnumeravi sed ab eis differt scapo infernè folioso et perigonio campanulato nec patenti. Forsan meliùs in Sect. *Scorodo* collocandum.

ALLIUM ATROVIOLOACEUM Boiss. Diagn. VII. var. *angustifolium*.

Minùs elatum. Umbellæ minores magnitudinis speciminum majorum *A. Spæthrocephali*. Folia 1 $\frac{1}{2}$ -2 lineas lata.

A. serrulatum Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. N° 449.

Hab. propè *Teheran* (Kotschy), in *Mesopotamiâ* ad *Bauerd* Kotschy pl. Mesop. N° 409.

ALLIUM RUBROVITTATUM Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1847. (Sect. *Porrum*).

A bulbo unico vaginis albis opacis vestito, scapo humili ferè ad medium usquè foliato tereti sub lente angulato-costato, foliis angustè lineari-subulatis scapum plerumquè superantibus semiteretibus supernè canaliculatis non fistulosis infernè margine subserrulatis cæterùm glabris viridibus flexuosis, umbellâ capsuliferâ parvâ densâ capitato-globosâ, spathæ valvis binis albis opacis breviter acuminatis umbellâ triplò brevioribus, pedunculis externis brevissimis internis florem æquantibus vel eo sesquolongioribus, floribus mediocribus, perigonii phyllis a basi distinctis ovatis carinatis obtusiusculis dorso

et margine aculeolato-scabridis ad carinam intensè rubro-vittatis margine albidis, filamentis dilatatis apice rubellis internis tricuspidatis. cuspidè antheriferà lateralibus exsertis dimidiò breviori filamento multoties breviori, capsulà minutà ovato-rotundà perigonio paulò breviori.

Hab. in Cretà, in saxosis faucis *Kordalio* in Eparchià *Agio Vasili* (Heldr.) Floret ineunte Junio.

Scapi 2-3 pollicares, folia tenuia rigidula. Umbella magnitudinis avellanæ minutæ. Flores eis *A. sphærocephali* paulò minores a quo scapo humili, foliis non fistulosis, pedunculis multò brevioribus, perigonii coloratione et dentium stamineorum proportionē differt. Habitu magis affinis *A. gomphrenoidi* et *A. Cilicio* quæ eisdem characteribus differunt et *A. Reuteriano* quod foliis crassioribus, perigonio roseo lævi, filamentis multò longiùs exsertis differt.

ALLIUM CALYPTRATUM Boiss. (Sect. *Porrum*).

A bulbo unico ovato tunicis fuscis apice in fibras longas laceras partem inferiorem scapi laxè vaginantes productis vestito, scapo tereti striato ad tertiam partem usquè vaginato-folioso, foliorum limbo glabro viridi brevi plano-lineari acuto multinervi rigidulo margine sub lente scabridulo, umbellæ laxiusculæ 10-15 floræ pedunculis inæqualibus flore 1-2 1/2 plò longioribus, spathà membranaceà rubrà tenerà calyptreiformi monophyllà ovatà in cuspidem eà sesquilongiorem abruptè abeunti tandem floribus explicatis basi circumscissà sæpèque lateraliter fissà deciduà, spathellis partialibus albis laceris pedunculorum basin cingentibus, perigonii albidis phyllis oblongis ferè a basi liberis carinatis obtusis carinà scabridà apice prominenti obscurè mucronulatà, filamentis dilatatis interioribus tricuspidatis cuspidè antheriferà lateralibus triplò breviori subexsertà filamento multoties breviori, antheris brunneo-luteis.

Hab. in regione alpinà montis *Cassii* in consortio *A. Cassii*. Nondum floribus satis explicatis hanc plantam Junio ineunte legi.

Pedale. Fibræ e tunicis ortæ secùs scapum ferè 2 pollices longæ; foliorum limbus 1 1/2-2 lineas latus 3-4 pollices longus *Cartici* folium referens. Flores magnitudinis eorum *A. ampeloprasi*. Spatha ampullacea in cuspidem 7-9 lineas longam abruptè desinens. Flores in speciminibus meis in chartà explicatis albi. Species spathæ formā

insignis, indole tunicarum *A. Bæticum* referens, ab eo et ab *A. arvensi* petalis carinâ scabridis, cuspidè antheriferâ brevissimâ foliisque planis distincta.

ALLIUM SINAITICUM Boiss. (Sect. *Porrum*).

A. bulbo . . . , scapo humili ad medium usquè foliato, foliis glabris viridibus angustis teretibus fistulosis apice attenuatis acutis scapo plûs duplò longioribus, umbellæ paucifloræ pedunculis subinæqualibus flore 2-3plò longioribus, spathâ albâ membranaceâ plurinervi persistenti floribus expansis irregulariter ruptâ, perigonii albi phyllis oblongis obtusiusculis carinâ virentibus totâ facie scabridulis, filamentis internis tricuspidatis cuspidibus subæqualibus filamento dimidiò brevioribus antheris fuscescentibus exsertis.

Hab. in locis elatis deserti *Sinaitici* inter conventum et jugum *Tih* ubi specimina pauca Aprili 1846 legi.

Scapi 4-5 pollicares, folia 6-8 pollices longa 1-1 1/4 lineas lata. Flores 5-8 magnitudinis eorum *A. ampeloprasi* et *A. calyptrati* cui affine est sed a quibus foliis, cuspidum staminum proportionè distinguitur. Forskahleus in *Flor. Egypt.* paucissimis verbis *Allii* speciem in desertis Kahirinis ei obviam et ab eo *A. desertorum* nominatam describit quæ ex antheris quæ subulatæ dicuntur et corollâ albo-fuscescenti a plantâ hic descriptâ diversa esse videtur.

ALLIUM SCABRISCAPUM Boiss. in Kotschy pl. Pers. bor. 1847 (Sect. *Rhizirideum*).

A bulbis oblongis rhizomate tenui horizontali brevissimo conjunctis tunicis crassis fibrosis elongatim areolatis densissimè obsitis infernè fibras tenuiter cylindricas longas numerosas edentibus, scapo erecto tereti striato crassiusculo infernè tantum breviter folioso superne secùs strias regulariter papillari-scabrido, foliis in fasciculos steriles tunicâ communi inclusos dispositis et secùs scapi partem inferiorem sitis, vaginâ albidâ tubulosâ virescenti-nervosâ, limbo plano crassiusculo glaucescenti brevi margine serrulato-papillari lineari apice breviter angustato acutiusculo infernè usquè ad vaginam longè attenuato, umbellæ multifloræ capsuliferæ globosæ pedunculis æqualibus flore subtriplo brevioribus, spathâ tenerâ membranaceâ

albidâ obscurè nervosâ umbellâ dimidiò breviori in 3-4 phylla obtusa demùm deflexa lacero-partitò, perigonii albi campanulati phyllis vix coalitis oblongis obtusis nervo medio pallidè virenti percursis, filamentis a basi dilatâtâ ad apicem usquè sensim attenuatis perigonium subæquantibus, antheris fusco-luteis.

Hab. in saxosis montis *Elbrus Persiæ* borealis propè pagum *Pass-gala* Kotschy loc. cit. N° 262.

Pedale vel sesquipedale. Folia 5-6 pollices longa circ. 3 lineas lata infernè valdè attenuata. Umbella diametro circiter pollicaris, flores magnitudinis et coloris eorum *A. Cepæ*. Ob rhizoma vix manifestum inter *Rhizirideum* et *Scorodon* medium est. Radicis indole et toto habitu affine *A. Tatarico* foliis angustè linearibus scapoque lævibus, perigonii paulò majoris phyllis acutissimis distincto. Foliorum limbus infernè in petiolum angustatus quamdam affinitatem cum *A. Victoriali* quoque demonstrat.

ALLIUM MACRORRIZUM Boiss. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846 (Sect. *Rhiziridium*).

A. bulbo subrhizomatoso tunicis fuscis coriaceis secùs basin scaporum in lacinias laceras longè productis densè vestito longo crasso parte inferiori fibras numerosas longas tenues cylindricas edenti, culmis teretibus striatis ad medium usquè foliatis, foliis linearibus rigidulis lævibus glabris scapum subæquantibus infrâ canaliculatis suprâ planis, umbellâ globosâ capsuliterâ pedunculis æqualibus flore subduplò longioribus, spathæ valvis binis ovalis albis membranaceis umbellâ dimidiò brevioribus citò laceris evanidisque, perigonii rosei phyllis oblongo-linearibus obtusiusculis basi inter se coalitis nervo saturatori percursis, filamentis basi breviter coalitis dilatatis dein attenuatis supernè subulatis rubellis perigonio sesquilongioribus edentulis, antheris rubellis.

Hab. in regionibus excelsioribus montis *Demawend Persiæ* borealis Kotschy N° 610. Fl. Aug.

Radix 3-4 pollices longa pollicem diametro lata. Culmi 12-15 pollices longi, folia supernè sesquilineam lata. Umbellæ et flores similes eis *A. stricti* quod a nostrâ specie differt tunicis radicis tenuioris reticulato-fibrosis, filamentis tribus basi utrinquè unidentatis, foliis angustioribus. Affine quoque *A. ochroleuco* tunicis apice truncatis coloreque floris diverso.

Obs. *A. vulcanicum* Boiss. in Kotschy. Pl. Pers. bor. exs. N° 49
ulteriori examini subjectum est tantum forma floribus majoribus *A.*
rubelli MB.

ALLIUM CHLORANTHUM Boiss. (Sect. *Codonoprasum*).

A. bulbo ovato simplici tunicis exterioribus nigricantibus corticosis interioribus membranaceis vestito, scapo flexuoso tereti ultrà medium ramosò folioso, foliis subcylindricis fistulosis acutiusculis scapo subæquilongis, umbellà multiflorà capsuliferà pedunculis parum inæqualibus flore 1 1½-2plò longioribus exterioribus deflexis, spathæ valvis binis albo-membranaceis nervosis a basi oblongà longè caudato acuminatis umbellam æquantibus aut eà 1 1½-2plò longioribus tandem deflexis, perigonii campanulati phyllis oblongis obtusissimis lævibus recentibus pallidè luteolo-virentibus nervo viridi percursis exsiccatis luteolo-stramineis, filamentis basi inter se et cum perigonio connatis sinubus edentulis a basi sublatori usque ad apicem paululum attenuatis, antheris breviter exsertis luteis, ovario hexagono sulcato tuberculato-oblongo, capsulà trigonà truncatà vesiculoso-tuberculatà perigonio sublongiori.

Hab. in monte *Cassio Syriæ* borealis ubi Junio 1846 legi et undè bulbos retuli e quibus plantam vivam descripsi.

Species *A. pallenti* L. habitu, umbellæ et florum magnitudine characteribusque proximè affinis sed ab ejus formis omnibus florum colore, ovario capsulàque eximiè vesiculoso-tuberculatis nec lævibus facilè distinguenda.

ALLIUM MODESTUM Boiss. (Sect. *Codonoprasum*).

A. bulbo ovato tunicis albo-membranaceis vestito, scapo tereti humili ad medium usque folioso antè anthesim apice eximiè flexo, foliis tenuibus semicylindricis supernè canaliculatis infernè fistulosis scapum æquantibus vel superantibus citò emarcidis, umbellà capsuliferà submultiflorà pedunculis tenuibus patulo-effusis inæqualibus flore 3-4plò longioribus, spathæ phyllis binis a basi subdilatatà linearibus umbellæ æqualibus vel eà duplò longioribus deflexis, perigonii elongati cylindrici phyllis oblongo-linearibus obtusiusculis lævibus vivis sordidè albo-virentibus rubello-tinctis siccis rubellis, filamentis infernè inter se

et perigonio adnatis e basi sublatori attenuatis edentulis perigonio tertiâ parte brevioribus, antheris luteis, ovario ovato obtusè hexagono vesiculis oblongis obsoletè punctato.

Hab. in desertis ad meridiem *Palestinæ Gazam* versùs ubi Aprili 1846 floridum legi et undè retuli bulbos quibus plantam educavi et descripsi.

Scapi 5-8 pollicares. Umbella 15-20 flora. Perigonium 3-3 1/2 lineas longum. Inflorescentia diffusa et habitus *A. pulchelli* Don. Ab eo et omni grege *A. pallentis* et *A. carinati* distinctissimum perigonio longiori cylindrico filamentis multò longiori. *A. callimischio* Kth. *A. lepto* et *A. parcifloro* perigonii formâ magis accedit sed propter inflorescentiam diffusam, colorem florum, etc., cum eis non confundi potest.

Obs. 1º *A. Pisidicum* Boiss. et Heldr. pl. Anat. 1846 cum amiciss. J. Gay in ann. Sc. Nat. Oct. 1847 cum *A. Cupani* Rufin. conjungimus.

2º Cl. Gay loco citato sub *A. pulchello* *A. carinatum* β *capsuliferum* Koch et *A. pulchellum* Don. verum conjunxit sed hæc planta mihi a priori pedunculis longis effusè divaricatis, perigonio rotundato nec ovato, staturâ minori facilè distinguenda esse videtur.

3º *A. Olympicum* Boiss. a cl. Gay ut synonymon *A. pulchelli* sui *A. carinati* β *capsuliferi* citatum mihi semper species distincta esse videtur; præter umbellæ condensatæ pedunculos subæquales, flores in eo semper saltem tertiâ parte minores sunt, tunicæ radicales ultrâ scapi originem ut in eo nunquam productæ sunt.

ALLIUM FRIGIDUM Boiss. et Heldr. (Sect. *Codonoprasum*).

A. bulbo ovato tunicis externis membranaceis nigris secùs scapi partem inferiorem plùs minùs productis internisque albis pellucidis vestito, scapo tenui humili ad medium usquè 2-3 foliis instructo sicco striato, foliorum vaginis striatis, limbo subulato semicylindrico rigidiusculo flexuoso obtuso scapo breviori, umbellæ capsuliferæ paucifloræ pedunculis subinæqualibus per anthesin flori æquilongis tandem elongatis, spathæ phyllis binis e basi latiori attenuatis lanceolato-linearibus umbellâ vel brevioribus vel sublongioribus, perigonii breviter campanulati phyllis ovato-oblongis lævibus in vivo lutescentibus siccis stramineo-rubellis nervo dorsali rubello producto breviter mucronatis, filamentis basi longiusculè perigonio adnatis a basi latiori sensim attenuatis perigonium subæquantibus, capsulâ lævi breviter ovatâ trigonâ perigonio subbreviori.

Hab. in cacumine *Taygeti* orientem versùs Heldr. pl. exs. 1848 sub *A. montano* Sibth. evulgatum. Alt. 6000-7500'. Huic quoque probabiliter referenda sunt specimina incompleta e *Tauro Ciliciæ* Kotschy pl. Taur. N° 497.

Scapus 4-5 pollicaris, folia tenuia, flores magnitudinis eorum *A. carinati* sed subbreiores. Ab omnibus formis *A. pallentis* staturâ, umbellâ 3-12 florâ, perigonii phyllis acutiusculis mucronatis nec obtusis truncatis longè diversum. Magis affine *A. Stipyleo* Boiss. quod ab eo foliis crassioribus, pedunculis crassioribus longioribus valdè inæqualibus perigonioque elongato cylindrico-campanulato tantùm differt. *A. montanum* Sibth. Fl. gr. tab. 319 cujus tandem specimina e loco classico (*Olympo Bithyniæ*) et iconi omninò conformia in Aucher N° 2207 vidi, differt a nostrâ specie tunicis bulbi coriaceis elevatim costato-nervosis.

BELLEVALIA MACROBOTRYS Boiss.

B. foliis latè lanceolato-linearibus supernè attenuatis scapo æquilongis viridibus margine sub lente minutè et remotè serrulato-scabridis, scapo elato in racemum laxum post anthesin longissimum abeunt, pedunculis basi squamulâ vix perspicuâ obsitis flori æquilongis fructu triplò longioribus et tunc arcuato-patentibus, floribus omnibus fertilibus cæruleis demùm livescentibus, perigonio campanulato infrâ tertiam partem usquè partito, filamentis dilatatis triangularibus paululùm infrâ tubi divisionem insertis, antheris rubello-ferrugineis, capsulæ trigonæ valvulis ovalis subretusis elevatim penninerviis sub lente areolatis.

Hab. in arvis *Palæstinæ* calidioris in regione *Amalecitarum* ad meridiem urbis *Gaza* sitâ, inter *Ramla* et *Hierosolymam* legi flor. Aprili.

Scapus cum racemo sæpè bipedalis, hic fructifer pedalis et ultrâ pedunculis pollicaribus aliquandò subverticillatis. Folia 7-15 lineas longa, flores tres lineas longi illis *B. Romanæ* paulò minores angustioresque; hæc insuper differt foliis angustioribus, filamentis profundius insertis, antheris azureis. *B. dubia* distinguitur foliis angustis, pedunculis fructiferis capsulâ non longioribus. *B. trifoliata* deniquè floribus sex lineas longis breviter pedunculatis, antheris cæruleis longius distat.

BELLEVALIA FLEXUOSA Boiss.

B. foliis angustè lanceolato-linearibus apice attenuatis scapo æquilongis margine denticulato-scabridis parallelè multinerviis, scapis 1-4 ex eodem bulbo suprâ basin curvatis ascendentibus in racemum sub anthesi brevem ovatum fructiferum laxum abeuntibus, floribus livescentibus pedunculo flore subbreviori fructu æquilongo vel sesquilongiori patuloque suffultis, squamulis ad pedunculorum basim minimis, perigonio campanulato vix ad tertiam partem sexpartito, filamentis triangulari-elongatis tubo ad ejus divisionem insertis, antheris cæruleis, capsulæ trigonæ valvulis ovalis obtusis mucronulatis sub lente elongatim areolatis.

Hab. in pratis siccis et muris humo tectis circâ *Hierosolymam* frequenter. Floret Aprili (Boiss.)

Folia ut et scapi 3-5 pollicaria. Racemi 10-20 flori fructiferi 2-2½ pollicares, pedunculi fructiferi 3-5 lineas longi. Folia 2-4 lineas lata. Flores tres lineas longi. A præcedenti distinctissima staturâ humili, foliis angustis, pedunculis brevibus, antherarum colore. Inter species pumilas et angustifolias ejusdem generis *B. glauca* Kth. differt pedunculis fructiferis valdè elongatis, antheris cæsiò-ferrugineis, foliis ciliatis; *B. Romana* et *B. dubia* foliis longioribus, perigonio multò profundius fisso, capsulâ majori.

MUSCARI LONGIPES Boiss.

M. foliis lineari-lanceolatis infernè angustatis apicè longè attenuatis canaliculato-plicatis margine subundulatis sub lente scabridodenticulatis parallelè multinerviis scapo brevioribus, scapis erectis in racemum pyramdatum abeuntibus, pedunculis horizontaliter patentibus perigonio florido æquilongis vel sesquilongioribus perigonio fructifero 4-6plò longioribus, floribus cærulescenti-lividis supremis sterilibus paucis amethystinis brevissimè pedunculatis, perigonio urceolato-cylindrico subpyriformi parte inferiori infrâ stamina subangustato apice constricto brevissimè et rotundatim quinquelobo, filamentis brevissimis planiusculis versùs mediam partem perigonii in duas series quarum altera altior insertis, antheris brevibus rufescentibus, capsulâ (juniori) pedunculo multoties breviori oblongâ apice attenuatâ valvulis parallelè et transversè nervosis.

Hab. in arvis pinguibus *Palæstinæ* littoralis calidioris ad meridiem urbis *Gaza* sitis et in regione *Philistæorum* ad septentrionem ejusdem urbis (Boiss.) Fl. Aprili.

Species insignis inflorescentiâ *Bellevaliæ ciliatæ* et floribus *Muscariidis*; Folia latitudine a 4 ad 11 lineas variantia. Racemi fructiferi 4-6 pollicares ob pedunculos inferiores sæpè bipollicares eximè pyramidati. Perigonium sub anthesi 3 1/2-4 lineas longum. Ab omnibus aliis generis inflorescentiâ, staminum insertionem, etc. diversa.

Obs. *Botryanthus Sauli* Jaub et Sp. Illustr. pl. Or. tab. 320 est *Muscari moschatum* W.

COLCHICACEÆ.

MERENDERA PERSICA Boiss. in Kotschy pl. Pers. bor. 1847.

M. bulbo elongato apice attenuato tunicis fuscis secùs scapum productis vestito, vaginâ tubulosâ integrâ apice obliquè truncatâ membranaceâ pallidè fuscâ scapum usquè ad foliorum ortum cingenti, foliis 3-4 crassiusculis lineari-lanceolatis attenuatis acutis erecto-patulis glabris, flore intrâ folia breviter pedunculato, perigonio ad basin usquè sexpartito unguibus longissimis filiformibus laciniiis angustè oblongo-linearibus elongatis omnibus in unguem sensim attenuatis exauriculatis, filamentis usquè ad laminæ tertiam partem inferiorem adnatis parte liberâ brevissimis, antheris lutescentibus linearibus elongatis paulò suprâ basin filamentum adnatis, stylis tribus filiformibus a basi distinctis, carpellis ovatis basi adnatis supernè liberis attenuatis acutis.

Hab. in Persiâ propè *Teheran* Kotschy N° 80.

Species ex speciminibus fructiferis perigonia sicca retinentibus et quoad radicem incompletis descripta et ideò observationi ulteriori commendanda. Scapus fructifer 4-5 pollicaris, folia 3-4 pollices longa infernè circiter 3 lineas lata. Perigonii lacinie e sicco 2 1/2 pollicares angustissimæ. Antheræ 4 1/2-5 lineas longæ. *A. M. Caucasica* cui habitu et florum magnitudine affinis est differt antheris longè linearibus nec breviter oblongis basi sagittatis. *M. Attica* et

M. sobolifera quam e descriptione solùm novi quoque antheris ellipticis filamento multò brevioribus; *M. filifolia* antheris linearibus donata foliis angustissimis a nostrà specie distinguuntur.

COLCHICUM KOTSCHYI Boiss. in Kotschy pl. Pers. bor. 1847.

C. bulbo oblongo tunicis tenuibus membranaceis fuscis in vaginam elongatam productis vestito plurifloro, vaginà tubulosà obtusà apice fissà tubum florum amplexenti, foliis hysteroanthiis . . . , perigonii tubo e vaginà longè exserto limbo 8-6plò longiori, laciniis pallidè roseis concoloribus angustè elliptico-linearibus obtusis obsoletè 16-18 nerviis nervis rectis distinctis venis paucissimis transversis, antheris flavis linearibus rectis filamento paulò suprà suam basin insertis eoque subæquilongis, stylis in stigmata apice subincurva subincrassatis stamina superantibus.

Hab. in solo schistoso ad radices montis *Elbrus* propè *Passgala* Fl. Aug. Kotschy pl. Pers. bor. exs. N° 683.

Bulbus in meo specimine magnit. nucis sed longior. Perigonii tubus semipedalis et ultrà. Limbi laciniæ sesquipollicem circiter longæ parte latiori 2 1/2-3 lineas latæ. Antheræ 4 lineas longæ. Species foliis deficientibus imperfectè nota *C. autumnali* ut videtur affinis distincta tubo perigonii longiori, laciniis angustioribus nervis paucioribus percursis, antheris longioribus filamento æquilongis nec eo 2-3plò brevioribus propè basin nec medium versùs affixis. *C. umbrosum* Stev. habet flores dimidiò minores laciniis perigonii oblongis et longiùs distat.

CYPERACEÆ.

CAREX KOTSCHYANA Boiss. et Hohen. in Kotsch. pl. Pers. austr. 1846. (Sect. *Legitimæ*).

C. radice cæspitosà stoloniferà, vaginis inferioribus non reticulato-fissis, culmo erecto acutè angulato supernè ad angulos scabro infernè folioso, foliis pallidè virentibus longè acuminato-attenuatis apice setaceis in margine scabris, spicà terminali masculà erectà, fæmineis 2-3 subsessilibus oblongo-cylindricis erectis, bracteis foliaceis

vaginà destitutis basi utrinquè scarioso-marginatis lineari-setaceis infimà spicam æquanti vel eà breviori cæteris multò brevioribus, fructu glabro viridi obovato obtuso brevissimè rostellato utrinquè compresso subinflato enervi, rostello tereti integro, squamis fuscis oblongis fructu angustioribus brevioribusque, stigmalibus binis.

Hab. ad rivulos Alpīs *Kuh Daëna Persiæ* australis et ad fontem *Dscheschme Pias* ejusdem jugi. Kotschy loc. cit. N° 694 et 740a, in faucibus montis *Elbrus* propè *Passgala* Kotschy pl. Pers. bor. exs. N° 120.

Culmi 7-13 pollicares, folia circiter sesquilineam lata, inflorescentia et spicæ *C. vulgaris* Fries a quâ bracteis brevibus fructibusque enerviis differt. *C. stricta* et *C. pacifica* vaginis inferioribus reticulato-fissis, hæc insuper bracteis subvaginantibus, illa fructibus nervosis, *C. acuta* spicis fæmineis nutantibus, masculis pluribus differunt.

CYPERUS HELDREICHIANUS Boiss. in Heldr. pl. Anat. exs. 1847.

C. perennis radice repente stoloniferâ, foliis glaucescentibus lævibus culmo acutè triquetro nudo brevioribus, anthelâ decompositâ, involucri triphyllis phyllis ramos superantibus, anthelæ ramis longioribus apice umbellatis pedunculis umbellarum ramisque brevioribus erectis inæqualibus fasciculos breviter ovatos e 5-10 spiculis sessilibus constantes gerentibus, spiculis lineari-oblongis obtusis basi subattenuatis 6-8 floris, glumis ovatis obtusissimis dorso valdè striatis margine latè scariosis, nukulâ oblongâ acutiusculè triquetrâ, stigmalibus tribus.

Hab. ad aquas calidas *Ciliciæ* in faucibus *Tauri* propè *Tchiftèckan* ubi amiciss. de Heldreich fine Septembris fructiferum legit.

Folia 1-1 1/2 lineas lata semipedalia. Culmi 1-1 1/2 pedales. Longiores ex ramis anthelæ 3-4 pollicares. Spiculæ 2 1/2 lineas longæ ferè lineam latæ quâ notâ egregiè differt a *C. longo* affini qui habet spiculas angustè lineares elongatas multifloras acutas, glumas minùs obtusas angustius scariosas.

CYPERUS PERSICUS Boiss. et Hohenack. in Kotschy pl. Pers. austr. 1845,

C. glaber glaucescens radice repenti ramosâ, culmis humilibus tenuibus teretibus basi vaginis laceris foliorum emarcidorum vestitis

basi breviter foliosis, foliis angustè linearibus plicatis obtusiusculis rigidis patentibus sæpè curvatis culmo brevioribus rariùs eum excedentibus basi in vaginas striatas fuscescentes angustè albo-membranaceas dilatatis, capitulo terminali globoso e spiculis numerosis sessilibus distichis 9-13 floris ovato-oblongis constanti, involucri 2-3 phylli phyllis foliis similibus rectis vel subpatulis valdè inæqualibus minori capitulum sæpè non excedenti majori eo 3-4plò longiori, floribus distichè imbricatis omnibus fertilibus, glumis pallidè stramineis oblongis carinatis 10-12 nervis rubellis percursis apice brevissimè mucronatis, stigmatibus tribus.

Hab. in insulis *Karrak* et *Kargo* sinùs *Persici* ubi colliculos arenosos densè tegit et quoque in arenosis maritimis Kotschy loc. cit. N° 5 et 21.

Culmi 3-6 pollicares, capitula magnitudinis avellanæ. Affinis *Schæno mucronato* L. qui quoque meo sensu generi *Cypero* adnumerandus est ab eo differt culmis foliisque tenuioribus, involucri phyllis brevioribus, capitulis minoribus, spiculis evidentius distichis, glumis stramineis nec rubro-fuscis magis abbreviatis et sensim nec abruptiusculè in mucronem breviorè abeuntibus.

GRAMINEÆ.

ALOPECURUS TEXTILIS Boiss. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Colobachne*.)

A. perennis rhizomatibus obliquis abbreviatis fibras radicales crassas edentibus, collo vaginis foliorum radicalium membranaceo-dilatatis teneris pallidè rufescentibus subpellucidis parcè et breviter hirtulis stipato, foliis glauco-virentibus abpressiusculè et parcè hirsutis erectis angustè linearibus canaliculato-plicatis radicalibus et inferioribus flexuosis culmum æquantibus, superiorum vaginà elongatà inflatà multistriatà glabriusculà limbo brevissimo, ligulà minimà truncatà ciliatà, paniculà spiciformi densà oblongo-cylindricà obtusà, ramis paniculæ 4-8 spiculas gerentibus, glumis trinerviis oblongo-lanceolatis acuminatis subæqualibus longè hirsutis, ad quartam partem

usquē inter se connatis, glumellis duabus exteriori glumis paulò breviori trinervi apice truncato-subtridentatà ciliatà cæterùm glabrà superiori uninervi lineari acutà breviori angustiorique, aristà ad basin glumellæ exterioris sità geniculatà spiculà duplò longiori.

Hab. in glareosis vulcanicis jugi *Besmitschal* montis *Demawend* alt. 9000' Kotschy loc. cit. N° 531.

Culmus foliaque inferiora pedalia, spica magnit. *A. pratensis* 10-12 lin. longa. Ab *A. vaginato* foliis latioribus multòque longioribus, collo robustiori, vaginis minùs inflatis, spicà non breviter ovatà, glumis longius acuminatis, glumellà apice longè penicillatà nec hirtulà etc. diversus. *A. Gerardi* longiùs distat.

ALOPECURUS CASSIUS Boiss. (Sect. *Colobachne*).

A. perennis glaber radice perenni culmis cæspitosis basi vix fibroso-vaginato, foliis planis angustè linearibus glaucescentibus margine scabris inferioribus expansis caulinis paucis vaginà elongatà subdilatatà, limbo brevi, ligulà ovatà denticulatà, paniculà spicæformi terminali oblongà, ramis paniculæ 4-5 floris, glumis oblongo-lanceolatis æqualibus basi connatis undiquè densè hirsutis apice divergentibus in aristam brevem attenuatis, flosculo glumis parùm breviori, paleà superiori glabrà trinervi apice obliquè truncatà obsoletè tridentatà superiori breviori angustè lanceolatà uninervi, aristà ad tertiam partem inferiorem dorsi paleæ inferioris insertà incurvā flosculo duplò longiori spiculam superanti.

Hab. in regione alpinà montis *Cassii*. Legi Junio 1846.

Affinis *A. vaginato* qui differt vaginis omnium foliorum culmeorum valdè inflatis, radicalibus setaceo-linearibus, spicis majoribus ovato-rotundis, glumis densiùs et longius hirsutis, flosculo apice hirtulo. *A. Gerardi* aristis inclusis etc longius distat.

ALOPECURUS AUCHERI Boiss. in Kotschy pl. Pers. bor. 1845 (Sect. *Eualopecurus*).

A. perennis rhizomate fibroso stolones repentes longiusculos edenti, collo vaginis in fibras solutis stipato, foliis planis viridibus glabris radicalibus abbreviatis ferè expansis, superiorum vaginà elongatà subinflatà striatà limbo brevi, ligulà brevi truncatà glabrà, paniculà

spicæformi ovato-oblongâ ramis 3-5 floris, glumis oblongo-lanceolatis subæqualibus carinâ præsertim hirsutis in aristulam eis quadruplò breviorē attenuatis basi breviter connatis, glumellâ unicâ glumis tertiâ parte breviori apice eroso-truncatâ glabrâ basi aristâ geniculatâ spiculâ duplò longiori obsitâ.

Hab. in monte *Elbrus* Aucher N° 5457, ad nives deliquescentes ejusdem jugi suprà pagum *Asadbar* Kotsch. loc. cit. N° 464.

Pedalis vel altior, spicæ 8-9 lin. longæ. Habitus *A. Gerardi* a quo præter glumellæ superioris defectum differt valvis longiùs aristulatis, corollæ aristâ multò longiori. *A. vaginatus* foliis inferioribus angustissimis etc. longiùs distat.

ALOPECURUS ANTHOXANTHOIDES Boiss. (Sect. *Eualopecurus*).

A. annuus glaber, radice fibrosâ, culmis tenuibus erectis ascendentibusve, vaginis striatis supremâ præsertim elongatâ inflatâ, limbo lanceolato acuminato rigidulo, ligulâ truncatâ tubuloso-convolutâ, spicâ terminali ovato-oblongâ subdistichâ, glumis oblongo-lanceolatis acutis compressis carinato-subalatis albidis viridi-trinerviis carinâ hirta-scabridis præterea basi marginibus et carinâ ciliatis æquilongis superiori angustiori, glumellâ unica glumam æquanti ad 2/3 usque utriculiformi lanceolatâ acutâ trinervi glabrâ basi aristâ geniculatâ spiculâ subtriplo longiori auctâ.

Hab. in monte *Cassio* Syriæ borealis.

Habitus omninò, spicarum et spicularum magnitudo *Anthoxanthi aristati* Boiss. Voy. Esp. = *A. Carrentani* Parlat. sed spiculæ unifloræ, glumella solitaria utriculiformis *Alopecuri*. Ab omnibus hujus generis speciebus spicâ subdistichâ spiculisque magnis distinctissima, juxtâ *A. utriculatum* collocanda.

PHLEUM GRÆCUM Boiss. et Heldr. in pl. Græcæ 1848.

Ph. annuum glabrum radice fibrosâ, culmis e collo pluribus erectis foliosis supernè rubellis, foliis viridibus læviusculis, inferioribus angustè linearibus sub anthesi jam exsiccatis flexuosis superiorum vaginâ elongatâ subdilatatâ limbo lanceolato vaginâ multò breviori, ligulâ oblongâ truncatâ subglabrâ culmum involventi, spicâ e folio supremo remotiusculâ cylindricâ densâ, spiculis compressis, glumis

lanceolatis carinato-plicatis supernè modicè divergenti-incurvis in aristam brevem acuminatis dorso viridibus carinà a medio sursùm longè ciliato-pectinatis margine latè membranaceis et supernè brevius tenuiusque sub lente hirtulis, flosculo glumis sextuplò minori oculo nudo vix perspicuo glaberrimo, paleà inferiori ovatà apice truncata crosulà quinquenervi superiorem multò angustiore obtusam involventi, rudimento flosculi secundi nullo.

Hab. in campis sterilibus propè *Athenas* Heldr. Apr. 1848.

Culmi 10-14 pollicares, spica 1½-2 poll. longa diametro 3½-4 lin. lata, glumæ sesquilineam aut paulò ampliùs longæ. Species pulchella affinis *Ph. arenario* quod præter rudimentum flosculi superioris differt culmis humilibus, spicis abbreviatis, glumis introrsùm nec extrorsùm curvatis etc. Habitus *Ph. Bœhmeri* cæteris neglectis radice perenni diversissimi.

Obs. I. *Crypsis pygmea* Jaub. et Spach. Illustr. pl. Orient. tab. 307 est *Rhizocephalus Orientalis* Boiss. Diagn. 5.

Obs. II. *Pappophorum Aucheri* Jaub. et Spach. Illustr. pl. Orient. tab. 323 est *Enneapogon Persicus* Boiss. Diagn. 7.

PENNISETUM TIBERIADIS Boiss.

P. perenne cæspitosum, radices fibris robustis duris, culmis robustis simplicibus erectis vel ascendentibus elatis basi vaginatis foliosis supernè sub spicà striatis scabris, foliis glauco-virentibus duris rigidis angustè linearibus scabris siccis canaliculatis, vaginis non inflatis ore ciliatis, ligulà ad cilia reductà, spicis terminalibus longis crassis densis albidis vel rubellis cylindricis, spiculis in involuero solitariis, involucri substipitati setis rubellis flosculo duplò longioribus infernè plumosis intimà aliis duplò longiori crassiorique, glumis oblongis hyalinis albis glabris inferiori subtriplò majori trinervi acuminatà superiori uninervi acutà, flosculo neutro nullo vel ejus loco squamulà lineari, flosculi hermaphroditi glumellis vix coriaceis virescentibus æquilongis glumam majorem subsuperantibus oblongis acuminatis inferiori 5 nervi superiorem trinerviam involventi, stigmatibus plumosis rufescentibus longè exsertis.

Hab. in rupestribus calidis *Galileæ*, in rupibus propè *Tiberiadem*, prope *Khan Hussein* ad littora lacus *Genesareth* et ad *Banias*, Legi ineunte Maio.

Culmi 1 1½-2 pedales, spica 3-6 pollicaris, involucri seta major pollicem longa. Pulcherrima species a *P. Orientali* Rich. (cui *P. fasciculatum* et *P. Sinaicum* ut synonyma adnumeranda sunt,) *P. rufescenti* et aliis spicis longissimis densis longissimè setosis distinctissima, propiùs accedens ad *P. macrostachyum* Abyssinicum quod foliis setaceo-convolutis, spicà minùs densà, spiculis geminatis etc. egregiè distinguitur.

ANTEPHORA PERSICA Boiss.

A. perennis radice . . . culmis simplicibus basi ascendentibus subgeniculatis dein erectis internè foliosis supernè longè denudatis glabris, vaginis patulè hispidis limbo lineari plicato subcoriaceo lævi glaucescenti, spicà terminali cylindricà elongatà, axi valdè flexuosà persistenti ad fasciculos spicularum tuberculis pilosis obsità, spiculis bifloris 6-7 basi connatis circà spiculam centralem glumà destitutam concentricè dispositis fasciculos spiculiformes ovatos secùs rachidem densè imbricatos sessiles articulatos deciduos formantibus, glumà exteriori coriaceà albidà lanceolatà breviter acuminatà planà multinervi pungenti dorso breviter hirtà basi angustatà ad periphæriam fasciculi sità. superiori internà multò angustiori breviorique hyalinà e basi angustissimè lanceolatà subulatà hirsutà, spiculis glumà exteriori brevioribus eique adpressis hyalino-membranaceis exteriori unipaleacea oblongà obtusiusculà 3 nervi supernè marginibus longè penicillato-ciliatà spiculam interiorem æquilongam e paleis glabris oblongo lanceolatis acutiusculis æquilongis subnerviis constantem amplectenti.

Hab. in *Persia australi* loco et numero non notatis (Aucher).

Culmus in specimine meo bipedalis, spica ferè tripollicaris diametro 2 1½ lineas lata, glumæ spicularum inæquales majores ferè 4 lineas longæ. Species nova generis *Hypodæuri* a cl. Hochst. in pl. Schimp. Abyssin. Sect. I. N° 71. propositi sed quod ipse auctor postea in Bot. Zeit. ad *Antephoram* jure reduxit.

TRAGUS BREVICAULIS Boiss.

Tr. annuus caulibus brevibus geniculatis ascendentibus, foliis glaucis, vaginis glabris superioribus dilatatis, limbo lineari-lanceolato

marginē ciliis rigidis brevibus distantibus pectinato, ligulā ad seriē pilorum reductā, spicis e folio supremo vix exsertis cylindricis laxiusculis, spiculis in pedunculo brevissimo geminis erectis, glumæ superioris aculeis ad unumquemque nervum 5-6 basi distantibus rectiusculis elongato-conicis parte inferiori flavidis superiori hyalinis.

Hab. in aridis *Persiae australis* Aucher N° 5472, *Arabiae felicitis* Schimper N° 792, regni *Kordofani* Kotschy N° 37.

Ab affini *Tr. racemoso* mihi sat differre videtur caulibus abbreviatis, glaucescentiā, foliis validiūs et brevius ciliatis, inprimis aculeis glumarum paucioribus basi non confluentibus nec apice uncinatis. *Tr. occidentalis* spiculis minutis aliisque notis longius differt.

MILIUM TRICHOPODUM Boiss.

M. annuum glabrum glaucescens, radice fibrosā, caulibus nanis, paniculā ferē radicali foliis æquilongā eorumque vaginis basi involutā ambitu ovatā divaricatim effusissimā, vaginis striatis subdilatis, ligulā truncata glabrā, limbo erecto angustē lanceolato-lineari, paniculæ pedicellis setaceis rigidulis divergentibus lævibus spiculā 3-4plō longioribus apice incrassatis, spiculis oblongis attenuatis, glumis oblongis acutis lævibus, glumellis glumæ æquilongis sub lente adpressissimē et parcē puberulis.

Hab. in palude exsiccata spongiosā herbida *Antilibani* inter *Rascheya* et *Damascum*, legi quoque in Antilibano suprā *Zebdani*, in *Mesopotamiā* inter *Orfa* et *Suerek* Kotschy N° 41.

Plantula bipollicaris caules 2-3 e radice edens, spiculæ eis *M. vernalis* paulō minores et præsertim magis elongatæ. *M. vernale* *M. B.* differt præterea caule elato, glumis scabris glumellas læves glabras manifestē superantibus.

STIPA DAMASCENA Boiss.

S. perennis cæspitosa glauca foliis radicalibus convoluto-filiformibus brevibus rigidis patulo-recurvis undiquē retrorsum puberulis, caulinis glabris limbo brevi tenui, culmis erectis mediocribus, paniculæ contractæ foliis summis involutæ ramis solitariis vel geminatis 1-2 spiculiferis, glumis longē setaceo-subulatis subinæqualibus glu-

mellà ad 2/3 usquè undiquè adpressè pilosulà plùs duplò longioribus aristà caducà infernè tortili pilosà supernè plumosà 4-5 pollicari.

Hab. in collibus aridissimis ponè urbem *Damascum* sitis ubi legi ineunte Maio 1846.

Folia sesquipollicaria recurva, culmi semipedales, gluma inferior 14-15 lineas flosculus 5-6 lin. longus. *St. Arabica* cui affinis differt foliis glabris duplò longioribus tenuioribusque rectis, glumis sub-æqualibus. *St. Ehrenbergiana* habet staturam elatam et aristas elongatas *St. pennatæ*.

AGROSTIS SINAICA Boiss.

A. perennis glabra glaucescens, collo subnodoso, culmo erecto simplici elato, foliis rigidulis erectis linearibus setaceo-acuminatis siccitate convolutis multistriatis, ligulà oblongà brevi truncatà, paniculà erectà contractà oblongo-lineari albidà ramulis pedicellisque strictis abbreviatis scabridis, glumis æqualibus acutiusculis mucronulatis undiquè sed ad carinam longiùs scabridis flosculo mutico sesquilongioribus, glumellis glabris exteriori oblongà acutiusculà inferiori paulò breviori subtruncatà.

Hab. ad aquas jugi *Sinaitici* Bovè, pl. exs. et in Decaisne. Flor. Sin. N° 44 sub *A. maritimà*.

Culmi bipedales, panícula tripollicaris angusta, habitus *A. Stoloni-feræ* a quà glumis undiquè nec carinà tantùm scabris, glumellà inferiori acutà nec truncatà statim dignoscitur. *A. stolonifera* quæ glumas quoque hirtulas habet differt radice annuà, culmis decumbentibus, ligulà fimbriatà, foliis planis non rigidis etc. *A. Schimperiana* Hochst., planta Abyssinica cui *A. Simensis* ejusdem regionis ut varietas aristata adjungenda est et quæ quoque glumis hirtis gaudet differt glumellà calyce vix breviori, foliis teneris planis etc.

AGROSTIS BYZANTINA Boiss.

A. annua? glabra, radice fibrosà subpræmorsà, culmis ascendentibus dein erectis foliosis, foliis brevibus vaginis striatis limbo a basi angustè lineari-lanceolatà subulato multinervi supernè et marginibus scabro, ligulà brevi ovato-subtruncatà, paniculà erectà valdè contractà angustè lineari-elongatà virenti ramis 2-3 verticillatis capillari-

bus strictissimis scabris , pedicellis scabridis apice incrassatis spiculâ parum longioribus, glumis lanceolatis acutis æqualibus subcarinatis dorso virescentibus obscurèque uninerviis cæterum hyalinis carinæ apice scabriusculis cæterum lævibus, flosculo glaberrimo mutico, paleâ inferiori glumâ saltem tertiâ parte minori basi virenti cæterum hyalinâ apice obtusâ minutissimè denticulatâ, superiori hyalinâ plus dimidiò minori apice obtusè bidentatâ.

Hab. propè *Byzantium* Noë 1844 sub N° 225.

Planta pedalis, panicula 3-4 pollicaris angustissima, spiculæ magnitudinis earum *A. caninæ* a quâ cæteris neglectis paniculâ contractiori, flosculis muticis bipaleaceis differt. Propius affinis *A. Castellanæ* Boiss. et Reut quæ eadem ac *A. effusa* Spreng. (nomen omninò improprium) esse videtur et quæ quoque paniculâ contractâ insignis longè differt glumis majoribus acutioribus, flosculis basi hirsutis etc.

SPOROBOLUS ARABICUS Boiss.

S. perennis cæspitosus glaucus, collo incrassato, foliis radicalibus congestis rigidis convolutis brevissimis pungentibus sed apice sub lente obtusis, caulinis paucissimis limbo brevissimo, serie pilorum brevium ligulæ locum tenenti, culmo tenui erecto basi subgeniculato, paniculâ oblongo-pyramidatâ brevi, ramis pedicellisque brevibus, spiculis minimis lævibus glabris, glumis oblongis obtusiusculis inferiori plus dimidio breviori, glumellis æquilongis glumam interiorem subsuperantibus exteriori subtruncatâ.

Hab. in aridis *Arabie* propè *Mascatæ* Aucher N° 5425.

Culmus in meo specimine 7-8 pollicaris, folia radicalia pollicaria, panicula sesquipollicem longa, spiculæ illis formarum minorum *A. vulgaris* minores. *Sporobolo* potiùs quam *Agrostidi* ob glumæ et glumellæ proportionem adjungenda est; inter *Sporobolos* laxifloros propè *S. æneum* et *junceum* collocanda.

Calamagrostis rubella Boiss. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846 N° 527 ex monte Elbrus a *C. Persicâ* Boiss. Diagn. 7. specificè non differt.

TRisetum NOEANUM Boiss.

T. annuum pumilum, foliis patulè vel retrorsum hirtis, ligulà brevì truncatà denticulatà, paniculà e folio supremo brevissimè exsertà breviter ovato-oblongà lobatà, spiculis confertis breviter pedicellatis nitidis minutis, glumis aureo rubelloque variegatis æqualibus oblongis acutis subulato-acuminatis carinà vix scabridulis cæterum lævibus glabris, flosculis binis glumà paulò brevioribus axique glabris, paleà inferiori paulò suprà medium dorsum aristatà supernè hyalinà bidentatà dentibus triangularibus breviter setaceo-mucronatis, aristà geniculatà basi subtortili glumis duplò longiori, paleà superiori vix breviori bidentatà.

Hab. propè *Byzantium* Noè 1844 sub N° 116.

Specimina mea 3-4 pollicaria, panicula 9-10 lin. longa, spiculæ magnitudinis earum *Tr. condensati* paniculæ formà et characteribus nostræ speciei affinis sed quod differt glumis non variegatis superiori breviori dimidiòque angustiori, paleis valdè inæqualibus etc.

TRisetum MACROCHÆTUM Boiss.

Tr. annuum pumilum, foliis lineari-setaceis glabris vel brevissimè ciliatulis vaginis glabris, ligulà brevissimà truncatà denticulatà, paniculà breviter oblongà parvâ erectâ pedicellis scabridis, spiculis parvis bifloris nitidis, glumis lanceolatis acuminatis carinà scabridulis superiori paulò breviori dimidiòque angustiori, axi adpressè et brevissimè hirsutâ, flosculis glabris, paleà inferiori glumis subdimidiò breviori apice in 2 setas ei æquilongas glumas apice subæquantes abeunti suprà medium dorsum aristà geniculata basi tortili glumis subduplò longiori obsitâ, paleà superiori quadruplò breviori vix perspicuâ, pedicello minimo piloso ad basin cujusque flosculi sitò.

Hab. in *Palæstinâ* undè duo specimina tantum plantis circà *Hierosolymam* lectis commixta retuli.

Statura habitus et paleæ longè setosæ *Tr. Læflingiani* et *Valesiaci* a quibus paniculà minùs densâ spiculisque minoribus differt; prius insuper recedit flosculis hirtulis, posterius pilis axeos flosculos ferè æquantibus.

TRisetum GLUMACEUM Boiss.

Tr. annuum pumilum, foliis lineari-setaceis teneris flexuosis vaginisque retrorsum hirtis, ligulâ brevi truncatâ fimbriatâ hirtâ, paniculâ basi vaginâ subdilatatâ folii supremi involucreatâ oblongo-spiciformi densâ, glumis flavidis nitidis lanceolatis acutis æqualibus supernè ad carinam subscabridis cæterùm glabris lævibus, axi brevissimè pilosâ, paleâ exteriore glabrâ gluinâ dimidiò breviorè setis 2 rectis ei subæquilongis terminatâ sub medio dorso aristâ geniculatâ basi tortili e glumis breviter exsertâ obsitâ, paleâ superiore angustè lineari setaceâ paulò breviori, pedicello hirsuto ad basin superiorem uniuscujusquè flosculi sito.

Hab. in *Arabia petræa* Palestinæ conterminâ ubi legi Apr. ineunte.

Planta 4-6 pollicaris culmis pluribus ascendentibus, paniculâ sesquipollicem longâ. Spiculæ nitidæ Tr. *condensati* sed majores, ab eo ut et a Tr. *neglecto* paleis longè setosis axique hirtâ præterea discedens; a specie præcedenti cui pedicello piloso ad basin flosculorum accedit glumis æqualibus latioribus, paleâ superiori majori spicâque densâ distinctum.

TRisetum LINEARE Boiss.

Tr. annuum glabrum vel tomentellum culmis strictis, vaginâ brevissimâ truncatâ ciliolatâ, foliis e basi lineari setaceis strictis, paniculâ spicatâ lineari elongatâ densâ, spiculis 1 vel 2 floris cum pedicello piloso brevissimo florem superiorem referenti, glumis angustissimè subulato-lanceolatis longis æqualibus carinâ scabridulis cæterùm glabris, axi glabrâ, paleâ inferiore lineari-subulatâ in 2 setas eâ multò longiores glumam longè superantes abeunti paulò sub apice aristâ subgeniculatâ basi tortili setas superanti auctâ, paleâ superiori subæquilongâ lineari-setaceâ apice bidentatâ.

Trisetaria linearis Forsk Delile Eg. pl. 12 fig. 3. — *Trisetum arenarium* Labill. Ic. Pl. Syr. Dic. 10. tab. 7. — *Trisetum trisetaria* R. et Sch.

Hab. in *Ægypto* (Del.), *Arabia petræa* (Boiss.) *Syriâ* (Labill.)

Omnibus notis generi *Triseti* adnumerandum nomenque specificum Forskahlei antiquius aptissimumque omni jure servandum.

ARENA CARMELI Boiss.

A. perennis, radice....., culmo erecto glabro, foliis planis angustè linearibus flexuosis utrinquè scabris inferiorum vaginis retrorsum hispida superiorum glabris, ligulà brevissimà fimbriatà, paniculà contractà spiciformi simplici erectà, spiculis geminatim dispositis pedicellis strictis crassis striatis altero subnullo altero spiculà triplò breviori suffultis subtrifloris, glumis lanceolato-linearibus breviter acuminatis rigidis argutè inferiori 3 superiori longiori 5 nervi, axiglaberrimà in articulos cum flosculis facillimè ruptili, flosculis glaberrimis, paleà inferiori lanceolato-lineari coriaceà viridi 7 nervi ad nervos subscabridà apice albo-membranaceà breviter et acutè bidentatà dorso supernè ad quartam longitudinis partem aristà basi tortili rectà paleà paulò longiori auctà, paleà superiori paulò breviori membranaceà lineari obtusà supernè margine remotè ciliatà.

Hab. in monte *Carmelo* ubi legi Maio ineunte 1846.

Sesquipedalis, folia caulina 4-5 lin. longa sesquilineam lata, spica circ. tripollicaris, palea inferior circ. 5 lin. longa lineæ 3/4 lata. Species habitu *Av. bromoidem* referens ei affinis sed ab eà axi glabrà fragillimà, spiculis 2-3 nec 7-9 floris, pedicellis spiculorum crassis brevibus distinctissima; hanc ultima nota *Av. macræ* Steven accedit quæ foliorum limbo brevi convoluto, radice ut videtur annuà, spiculis multifloris etc. differt. Habitus quoque *Gaudiniæ* a quâ spiculis geminatis non sessilibus longiùs differt.

ARENA AGROPYROIDES Boiss.

A. annua ? glabra glaucescens radice fibrosà, culmis erectis, vaginis striatis læviusculis limbo rigidulo patulo angustè lineari margine scabridulo, ligulà elongatà acutà glabrà, spiculis brevissimè pedicellatis solitariis axi strictissimis subtrifloris paniculam spicæformem angustissimam laxam formantibus, glumis teneris lanceolatis triner-viis supernè hyalinis acuminatis inæqualibus superiori flosculos æquanti, axi glabrà callo ad basin flosculorum brevissimè piloso, paleà inferiori ad medium usquè adpressè et brevissimè sericeà supernè glabrà hyalinà apice brevissimè bidentatà suprà medium aristà geniculatà basi tortà eà paulò longiori auctà.

Hab. in *Argolide* undè misit amiciss. Spruner.

Culmi 1-1 1/2 pedales, spicæ 3-4 pollicares, spiculæ inferiores suâ longitudine invicem distantes ferè 7 lineas longæ. Species ab *A. pratensi* et *A. bromoidi* quibus affinis foliorum limbo rigido patulo, ligulis elongatis, spiculis strictis solitariis dissitis spicam angustam formantibus, paleis infernè hirtulis diversa.

ARRHENATHERUM PALÆSTINUM Boiss.

A. radice fibrosâ ad collum tubera globosa superimposita ferenti, foliis glabris linearibus planis, ligulâ breviter ovatâ lacerâ, culmis erectis, paniculâ elongatâ compositâ angustè pyramidatâ ramis elongatis flexuosis nutantibus, glumis stramineis glabris dorso scabridis inferiori breviori angustiorique, flosculis binis basi hirsutis inferiori sessili paulò suprâ basin aristâ infernè tortili eo 2 1/2 plò longiori aucto hirtulo marginibus ciliato, superiori pedicellato infrâ apicem aristâ brevi rectâ instructo toto ad aristæ insertionem usquè adpressè et longè hirsuto.

Hab. in *Palæstinâ* loco non notato. Boiss. 1847.

Planta 2-3 pedalis, panicula 7-9 pollicaris ramis inferioribus sæpè bipollicaribus. Ab *A. bulboso* flosculo superiori longè hirsuto facilè distinguendum. Ab *A. eriantho* B. et R. quod eodem caractere gaudet ut videtur specificè distinctum paniculæ amplæ compositæ ramis elongatis inferioribus subnutantibus.

AMMOCHLOA.

Spiculæ 11-13 floræ compressæ densè distichæ plures ad culmorum apicem in capitula basi glumis involucrata congestæ. Glumæ bipæ flosculis breviores ovato-oblongæ subinæquales acutæ valdè inæqualiter carinato-plicatæ carinâ latè alatæ uninerves marginibus et carinâ membranaceæ ad medium subcoriaceæ, flosculi a basi turgidâ attenuati acuti oblongi vel lanceolati. Palea inferior ovato-oblonga coriacea quinque nervis concavo-plicata dorso teres inter nervos sulculosa apice in cuspidem subpungentem attenuata margine membranâ hyalinâ sub cuspidè supernè abruptè desinenti marginata, palea superior hyalina paulò brevior multòque angustior lineari-lanceolata

binervis ad nervos carinato-subplicata ciliatula apice truncata. Ovarium ovatum glabrum. Styli 2 apicales in stigmata elongata denticulato-pilosa sub apice flosculi egredientia attenuati. Antheræ lineares basi bifidæ. — Gramina annua facie *Echinariam* vel *Oreochloam* referentia, arenicola. Hoc genus formâ glumarum valdè inæqualiter plicatarum et quarum carina latè alata pro margine ipso angusto subtus occultato absque inspectione accuratiori haberi posset *Sesleriaceis* adnumerandum est. *Sesleria* ab eo præterea differt inflorescentiâ et habitu diversissimis, spiculis non distichis, flosculis non acutis, paleâ inferiori non coriaceâ nec truncato-pluridentatâ. *Oreochloa* Link spiculis distichis quoque donata flosculis carinato-compressis habitu glumisque diversissimis differt. *Dactylis* tandem cui priorem speciem botanici plures adnumeraverant cæteris neglectis stigmatibus e basi flosculi egredientibus longissimè distat.

AMMOCHLOA PUNGENS Boiss.

A. glabra, foliis inferioribus angustè linearibus flexuosis, culmeorum limbo dilatato abbreviato obtusiusculo, ligulâ brevi truncatâ, culmis nudis folia sæpè pluries superantibus tenuibus, paleâ inferiori infernè hirtulâ apice in mucronem subrecurvum longiusculum abeunti marginibus sub mucrone in membranam rotundatam sæpè fimbriolatam manifestam abeuntibus.

Dactylis pungens Schreb. Gram. 2 tab. 27 fig. 1. Desf. atl. tab. 16.
Sesleria echinata Lam. III. tab. 47, fig. 2 (mala!)

Hab. in Barbariâ (Desf. Bovè! Durieu!)

AMMOCHLOA PALÆSTINA Boiss.

A. glabra, foliorum omnium limbo elongato flexuoso angustè lineari apice attenuato, ligulâ brevissimâ, culmis brevissimis incrassatis inanibus foliis multò superatis, paleâ inferiori sub lente scabridulâ in cuspidem brevissimum rectum attenuatâ marginibus sub apice obsolete membranaceâ.

Hab. in desertis *Palæstinæ* australis circâ Gaza ubi Aprili ineunte unicum specimen legi.

Habitus quodammodò *Scirpi Micheliani*. A præcedenti optimè distincta scapis sesquipollicaribus subincrassatis intus vacuis, flosculis apice magis attenuatis in mucronem brevissimum a flosculo non distinctum nec recurvum lineam et ampliùs longum abeuntibus.

KÆLERIA SINAICA Boiss.

K. annua, culmis pumilis foliosis e basi geniculatâ erectis, foliis teneris striatis sparsim et deflexè hirtis, limbo e basi latiori lanceolato acuto, ligulâ brevi hirsutâ, spicâ oblongâ laxiusculâ infernè sæpè lobatâ ramosâ, glumis flosculis paulò brevioribus lanceolatis acutis æquilongis inferiori villosâ sublatiori superiori carinâ tantùm ciliatâ vel glabrescenti, flosculis glaberrimis, paleâ inferiori oblongo-lanceolatâ acutâ subintegrâ supernè ad quartam partem longitudinis dorso aristâ rectâ et æquilongâ auctâ, paleâ interiori multò breviori hyalinâ apice bifidâ.

Hab. in regione *Sinaiticâ* Aucher N° 3061.

Specimen meum tripollicare, spica limbum folii supremi vix superans; habitus et spicularum magnitudo *K. phleoidis* a quâ ut et ab omnibus *Kæleritis* annuis aristâ multò inferiùs insertâ, flosculis glabris, etc. eximiè differt.

MELICA MICRANTHA Boiss. et Hbh. in pl. Kotsch. Pers. hor. 1846.

M. glaucescens culmis elatis laxè foliosis glabris, vaginis multistriatis retrorsùm scabridulis, limbo augustè lineari subtùs glabro læviusculo supernè sub lente adpressè tomentello, ligulâ oblongâ acutiusculâ, paniculâ spiciformi angustâ laxâ interruptâ, pedicellis striculis brevissimis apice subscabridis, spiculis brevissimis pallidis, glumis membranaceis læviusculis oblongis acutis superiori quartâ parte longiori angustiorique flores superanti, paleâ inferiori flosculi hermaphroditi oblongo-lanceolatâ obtusiusculâ margine pilis flavidis ejus diametro longioribus densè ciliatâ dorso scabridulâ interiori paulò breviori glabrâ, flosculis neutris binis corpusculum pedicellatum turbinatum truncatum flosculo fertili brevius formantibus.

Hab. in faucibus montis *Elbrus* propè *Derbend* Kotsch. N° 438.

Culmi 2-3 pedales, spica 2-3 pollices longa 4-8 lineas lata, spiculæ 2 lineas tantùm longæ dimidiò minores eis *M. ciliatæ* quæ nostræ magis affinis præter florum magnitudinem paniculamque longiorem densores egrediè differt glumis longè acuminatis, paleæ pilis albis nec flavidis spiculam longè nec breviter superantibus, flosculorum neutrorum corpusculo oblongo acuto.

MELICA CRETICA Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1847.

M. caespitosa, culmis nanis parçè foliosis glabris lævibus, foliis rigidulis brevibus convolutis filiformibus extùs lævibus intùs brevissimè sub lente hirtellis, ligulà truncatà sublacerà glabrà, paniculà spiciformi simplici oblongà laxiusculà, pedicellis strictis scabridulis spiculà subbrevioribus, glumis membranaceis flavidis rubellisve ovato-oblongis acutis læviusculis inferiori paulò breviori latiorique, paleà inferiori flosculi hermaphroditi oblongo-lanceolatà acutà margine pilis albidis ejus diametro longioribus spiculam superantibus densè ciliatà dorso scabridà, superiori breviori ad margines ciliatulà, flosculis neutris binis corpusculum oblongum læve pedicello æquilongo suffultum flosculo fertili brevius formantibus.

Hab. in saxosis cacuminis *Hagios Theodoros* montium *Sphaciotiorum* alt. circ. 7000' rara (Heldreich), in regione superiori *Libani* suprà Cedros (Boiss.).

Culmi cum floribus 3-4 pollices tantùm longi, spicæ simplices pollicem aut paulò ampliùs longæ, spiculæ lin 2 1/2 circ. longæ. Species nana hoc caractere *M. hispanicæ* Boiss. Voy Hisp. accedens quæ ab eà foliis minùs angustis convolutisque facie superiori glabris, spiculis majoribus, corpusculo neutro turbinato-pyriformi truncato distinguitur. Specimina Libanotica Creticis optimè congruunt.

MELICA HOHENACKERI Boiss.

M. culmis ascendentibus elatis glabris foliosis, vaginis foliorum inferiorum pilis longis mollibus deflexis hispidis 1-2 superiorum glabris, limbo omnium rigido lineari siccitate convoluto glabro scabriusculo, ligulà brevi fimbriato-lacerà, paniculà spiciformi composità laxà angustà interruptà, pedunculis pedicellisque strictis læviusculis, glumis pallidè rubellis lanceolatis acutis læviusculis carinà subscabridis flosculos superantibus superiori paulò breviori, paleà inferiori flosculi hermaphroditi lanceolatà acutà dorso undiquè pilis longis spiculam æquantibus hirsutà, interiori paulò breviori lineari apice rotundatà margine scabridulà, flosculo neutro unico longè pedicellato angustè oblongo-lineari lævissimo.

M. Persica Hohen. Talusch. Enum. non Kunth. — *M. Persica* β *Caspica* Griseb. gram. Ross.

Hab. in districtu *Talüsch* prov. transcaucasicarum (Hochstetter).

Planta 1 $1\frac{1}{2}$ -2 pedalis, spicâ 4-5 pollicari angustâ, spiculis 3 $1\frac{1}{2}$ lin. longis. Hæc est de quâ in diagnosibus *M. inæquiglumis* et *brevifloræ* sermonem feci et quam ex auctoritate Botan. Rossicorum pro *M. Persicâ* habui quam nunc icone Kunthianâ collatâ diversissimam comperi foliis omnibus cum limbo pubescenti-villosis, glumis valdè inæqualibus, flosculis neutris pluribus imbricatis flosculum turbinato-truncatum scabridum formantibus. Ad hanc *M. Persicam* Kth. veram referenda est *M. Kotschyi* Hochst. in Pl. Kotsch. Kurdist. Nostra *M. Hohenackeri* propè *M. Cupani* Guss. collocanda est ab eâ vaginis inferioribus eximiè et deflexè hirsutis, flosculo neutro unico nec pluribus, aliisque notis distinctissima.

MELICA PANNOSA Boiss.

M. cæspitosa culmis pumilis basi geniculatis dein erectis foliosis adpressè velutinis, foliis omnibus ad vaginas et limbum densissimè et brevissimè tomentosis argyreo-sericeis, limbo patenti plano lanceolato attenuato-acuminato, ligulâ marginiformi brevissimâ, spicis oblongo-cylindricis terminalibus densis. spiculis subsessilibus, glumis membranaceis stramineo-rubellis acutis glabris inferiori ovato-oblongâ triplò breviori superiori lanceolatâ, flosculi hermaphroditi paleâ inferiori pilis albis glumam æquantibus undiquè densè hirsutâ, superiori paulò breviori angustiori obtusâ margine ciliatulâ, flosculis neutris binis pedicellatis imbricatis apice truncatis valdè scabrido-aculeatis interiori multò breviori.

Hab. in rupibus calidis *Antilibani* ad Souk *Wadi Barrada*, legi Maio 1846.

Semipedalis vel paulò longior, foliorum limbus 2-3 pollicaris, spicæ sesquipollicares, spiculæ 3 $1\frac{1}{2}$ lin. longæ. Affinis *M. Persicæ* Kth. Gram. tab. 89 quæ ex icone differt indumento multò minùs denso et pannoso, spicâ laxâ, spiculis longè pedicellatis, flosculis neutris æquilongis. *M. Kotschyi* Hochst. quæ probabiliter eadem ac *M. Persica* iisdem notis ligulâque elongatâ distinguitur. *M. vestita* Boiss. deniquè spicis laxis, foliis angustioribus minùs densè hirsutis, flosculo neutro cylindrico lævi differt.

MELICA ELIGULATA Boiss.

M. caulibus ascendentibus elatis foliisque densissimè et adpressè tomentellis subscabridis, limbo plano lanceolato erecto-patulo longè attenuato subulato, ligulà prorsùs nullà, paniculà spiciformi cylindricà subcomposità densà pedunculis pedicellisque strictissimis hisce spiculà multò brevioribus, glumis membranaceis pallidè stramineis acutis inferiori ovatà superiori triplò longiori lanceolatà, paleà inferiori flosculi hermaphroditi dorso undique pilis niveis glumam superantibus densè hirsutà, superiori breviori lineari obtusà margine retrorsum ciliatulà, flosculo neutro pedicellato lineari-cylindrico læviusculo.

Hab. in *Persia boreali* loco non indicato (Kotschy N° 718).

Pedalis, spica bipedalis et longior, spiculæ 4 lin. ferè longæ. Indumento et spicà densà affinis præcedenti a quà differt indumento minus denso non sericeo, ligulà nullà, flosculo neutro solitario cylindrico etc. A *M. Kotschy* et *vestitâ* quoque ligulæ deficientiâ, spicà densà, spiculis breviter pedicellatis distincta.

MELICA RECTIFLORA Boiss. et Heldr. in pl. Cret. exs. 1847.

M. glaberrima cæspitosa candiculis erectis ramosis nigricanti-rubellis, culmis erectis foliosis, foliis planis lanceolato-linearibus erectis strictis apice attenuatis præter marginem remotè et obsoletè scabridulum lævibus, ligulà marginiformi vix perspicuâ in dentem ovatum oppositifolium culmum amplexentem productà, paniculà in spicam erectam angustè linearem laxam contractà, pedunculis pedicellisque strictissimis lævibus hisce spiculà brevioribus sæpè subnullis, glumis pallidè stramineis oblongo-linearibus acutiusculis vix inæqualibus flosculos æquantibus, flosculo fertili unico, paleà inferiori glabrâ elliptico-lineari obtusiusculà sulculoso-nervosà coriaceâ interiori elliptico-lineari vel ellipticà obtusà subcoriaceâ ad 2 nervos carinantes supernè ciliolatà, flosculo neutro longè pedicellato ovato-pyriformi truncato flore vix breviori.

Hab. ad rupes prov. *Sphakia* Cretæ in fauce *Hagio Rumeli*. Fl. Aprili (Heldreich).

Planta 8-14 pollicaris, foliorum limbus 3-4 pollices longus basi lineà unà paulò latior, spica 1-2 pollicaris angustissima, spiculæ illis *M. unifloræ* ferè dimidiò minores. Huic speciei flosculo fertili unico affinis ab eà differt ligulæ formà, spiculis non longè pedicellatis, glumis angustis etc. Habitu et spicularum magnitudine magis affinis *M. virgatæ* Turcz. quæ spiculis multifloris aliisque notis longiùs distat.

POA ATTICA Boiss. et Heldr. in pl. Græc. exs. 1846.

P. perennis glabra radice repenti, culinis basi compressis geniculatis dein erectis teretibus lævibus, foliis planis lineari-lanceolatis lævibus, vaginis omnibus glabris supremis limbo longioribus, ligulis omnibus truncatis brevissimis marginiformibus, paniculà erectà oblongà ramis erectis strictiusculis scabris inferioribus ternis valdè inæqualibus, spiculis 4-5 floris ovatis virentibus rubello variegatis, flosculis basi et ad carinam infernè lanà parçà protrahendà obsitis cæterùm ad margines et 5 nervos prominulos glaberrimis lente punctulatis acutis angustè supernè albo-marginatis.

Hab. in oliveto *Athenarum* ubi cl. Heldr. legit fine Aprilis.

Culmus circ. bipedalis, folia infernè circ. 2 lineas lata, panicula ferè 3 pollices longa. Habitu et spicularum magnitudine affinis *P. pratensi* quæ differt ligulà longiori, culmis basi non compressis, paniculæ ramis pluribus magis patulis, flosculis obtusiusculis ad dorsum et marginem densè pubescentibus. Accedens prope ad *Poam compressam* quæ culmo rigido totà longitudine compresso, foliis abbreviatis, paniculæ ramis brevissimis, flosculis obtusis obsoletè nervosis ad margines puberulis longiùs differt.

POA PSYCHROPHILA Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846.

P. perennis glabra pallidè virens, radice stolones numerosos sæpè elongatos edenti, foliis inferioribus rigidulis erecto-patulis siccitate margine subconvolutis lanceolatis acuminatis caulinorum superiorum vaginà limbo multò longiori, ligulà brevissimà rotundatà, paniculà valdè contractà oblongo-lineari pedunculis scabridis strictis inferioribus geminis, spiculis virenti-rubellis subtrifloris ovatis, glumis lanceolatis acutis superiori carinà scabridà, flosculis obsoletè nervosis dorso margineque densè pubescentibus basi parçè lanà brevi connexis.

Hab. inter lapides deciduos regionis superioris montis *Stavros* *Pisidiæ* et *Anemas* *Lycaoniæ* alt. 6000 '8000', in regione alpina *Olympi Bithyni* (Boiss.).

Species *P. cenisiæ* valdè et forsan nimis affinis ab eo tamen differre videtur glaucescentiâ, foliis angustioribus, ligulâ abbreviatâ, inprimis paniculâ valdè contractâ nec patente angustâ, spiculis minoribus, flosculis lanâ pauciori connexis. An varietas orientalis *P. cenisiæ*?

Obs. *Poa Pamphylica* Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846 ulterius collata non satis differt a *P. Persicâ* Trin. specie in toto Oriente a Caucaso ad Persiam australem Syriam et Anatoliam vulgatissimâ et quæ staturâ humillimâ vel elatâ, paniculâ plus minusve patentî, spiculis plus minùs elongatis, paleis acutis vel erosulo-truncatis variat et ad quam *P. subtilis* Kar. et Kir. e Songariâ oriundâ quoque referenda videtur. Hæc *Poa Persica* in genere *Poa* habitu et quibusdam notis anomala est, ab *Eragrostide* cui facie convenit axide articulatim secedenti discedit, forsan melius generi meo *Nephelochloæ* a quo aristæ deficientiâ tantùm differt associanda et *N. Persica* dicenda.

NB. His jam anno 1848 conscriptis video cl. Grisebach in Gram. Rossicis *Poa Persicam* quoque sub *N. Persicæ* anno 1852 descripsisse.

FESTUCA CYLLENICA Boiss. et Heldr. in pl. Græc. exs. 1849.

F. perennis glaberrima densè cæspitosa, radice fibrosâ, foliis radicalibus densè congestis angustè linearibus secùs paginam superiorem scabram plicatis tenuiter cylindricis lævibus rigidis erecto-subarcuatis acutis subpungentibus cæspites lubricos formantibus, caulinis paucis brevibus minùs rigidis convolutis, ligulâ ovatâ brevi, culmis tenuibus erectis, paniculâ erectâ contractâ brevi e spiculis paucis strictis constanti, spicularum pedicellis solitariis vel binis setaceis scabridis spiculâ plerunquè brevioribus, spiculis subtrifloris stramineis, glumis lutescentibus oblongis obtusis inferiori breviori angustiori uninervi superiori obsoletè trinervi flosculis tertiâ parte breviori, axi glabrâ in articulos facilè secedenti, flosculis glaberrimis lævibus linearibus teretibus, paleâ inferiori marginibus convolutâ subnervi apice membranaceo-marginatâ in aristulam brevissimam

attenuatâ, interiori subbreviori acutiusculâ ad 2 nervos carinales superne sub lentè hirtellâ.

Hab. in saxosis regionis alpinæ montis *Kyllenes* Peloponnesi alt. 5000'-6000' (Heldreich).

Folia radicalia 1½-1 pedalia illis *F. variæ* ferè tenuiora, culmi sesquipedales, panicula pollicaris e spiculis 6-10 constans, flosculi vix 2 1½ lin. longi. Species distincta *F. dimorphæ* Guss. inter omnes magis affinis, hæc a nostrâ differt foliis planis, paniculâ magis multiflorâ, glumis latè membranaceis, flosculis evidenter nervatis etc. Utraque a grege *F. variæ* spiculis paucifloris, flosculis teretibus vel dorso subcompressis nec lateraliter compressis egregiè differunt et hæc notâ ad genus *Triodiam* glumis flores superantibus flosculisque apice tridentatis cæterum diversum accedunt.

FESTUCA SCLEROPHYLLA Boiss. et Hoh. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846.

F. perennis glabra glaucescens radice fibrosâ culmos crassos valdè elatos remotè et strictè foliosos fasciculosque foliorum sterilium edenti, squamis fasciculorum sterilium sensim in folia abeuntibus, foliis rigidis duris erectis longissimis linearibus siccitate subconvolutis concoloribus valdè striato-nervosis ad nervos et præsertim margines scabris, caulinarum superiorum limbo stricto vaginæ æquilongo, ligulâ oblongâ apice lacerâ, paniculæ erectæ ramis longè denudatis diffuso-pubentibus scabridis inferioribus binis, pedicellis scabridis spiculâ sæpiùs brevioribus, spiculis albido-virentibus 6-7 floris, axi scabridâ, glumis lanceolatis acutis valdè inæqualibus, paleâ inferiori punctulato-scabrâ conspicuè quinquenervi acutiusculâ apice brevissimè mucronulatâ, interiori acutâ bifidâ margine scabridâ, ovario apice hirtulo.

Hab. in schistosis montis *Elbrus* propè *Derbent* Kotschy N° 245.

Culmi 3-4 pedales, panicula 8-10 pollices longa ramis inferioribus parte nudâ 2-3 pollices longis. Folia fasciculorum pedem vel sesquipedem longa. Spiculæ magnitudinis *F. spectabilis* Jan quæ nostræ affinis differt foliis tenuioribus non rigidis brevioribus multò minùs scabris siccitate non convolutis, paniculâ magis multiflorâ, flosculis punctulatis nec scabris etc. *F. drymeta* spiculis multò minoribus radiceque indole longiùs distat.

DACTYLIS RIGIDA Boiss., et Heldr. in pl. Cret. exs. 1847.

D. cæspitosa glabra radice fibrosâ, culmiorum foliorumque basi vaginis membranaceis pellucidis tunicatâ, foliis ferè omnibus radicalibus limbo expanso angustè lineari canaliculato-plicato angustè albo marginato utrinquè lævi, ligulâ oblongâ acutâ, foliis culmeis paucis vaginâ angustâ longissimâ limbo brevissimo stricto, culmis rigidis brevibus, paniculâ in spicam angustè linearem brevem strictissimam densam basi aliquandò subinterruptam valdè contractâ, spiculis sessilibus trifloris, glumis oblongo-linearibus flore inferiori paulò brevioribus inferiori acutâ superiori paulò longiori breviter mucronatâ, flosculis oblongo-linearibus præter carinam supernè obsoletè ciliatulam glabris quinquenerviis apice obtusis subtruncatis dorso excurrente brevissimè mucronulatis, paleâ superiori æquilongâ lanceolato-lineari carinato-plicatâ ad carinam scabridulâ.

Hab. in saxosis montis *Idæ* loco *Eis ta Kopita* dicto alt. circ. 6000' (Heldr.).

Culmi semipedales brevioresque, folia circ. sesquipollicem longa plicata lineâque dimidiâ angustiora, spicæ 7-10 lin. longæ sesquilineam vix latæ. Species ab omnibus formis *D. glomeratæ* diversa quibus culmi semper longiores minus firmi, spicæ ovato-rotundæ vel ovato-oblongæ multò crassiores densiores multifloræ, flosculi carinâ longiusculè ciliati ex apice emarginato mucronulati.

SCLEROPOA PHILISTEA Boiss.

Scl. glabra annua radice fibrosâ, culmis pluribus basi geniculatis dein erectis lævibus rubellis, foliis lævibus angustè linearibus apice setaceo-acuminatis siccitate subconvolutis radicalibus numerosioribus, culmeis paucis limbo brevi strictiusculo, ligulâ oblongâ acutâ fimbriatâ, paniculâ ovato-oblongâ ramis 3-5 spiculatis erecto-patulis spiculis brevioribus pedicellisque tandem sæpè deflexis acutè angulatis lævibus, spiculis pallidè rubellis compressis eximè distichis oblongis 10-15 floris basi sæpè attenuatis, glumis parvis lanceolatis acutis acutè carinatis flore proximo paulò brevioribus, axi parcè hirtulâ non fragili, flosculis oblongo-linearibus, paleâ inferiori subcoriaceâ trinervi basi obtusè supernè acutè carinatâ glabrâ vel infernè parcè et brevissimè hirtulâ apice brevissimè membranaceâ rotundatâ,

carinā vel muticā vel in mucronulum apice non longius lente vix perspicuum sub apice abeunti, paleā superiori breviori oblongo-lineari bicarinatā ad carinas scabridulā.

Hab. in arenā luteā mobili regionis Philistææ circā Gaza in *Palæstinā* australi. Legi Aprili 1846.

Semi-1 pedalis, folia brevīa, panicula 2-5 pollicaris, spiculæ 5-6 lineas longæ 2 vel paulò ampliùs latæ. Affinis *Scleropoa maritimæ* Link quæ egregiè differt spiculis minus regulariter distichis angustioribus, axi fragili, flosculis glaberrimis magis elongatis acutè quinque-nerviis nervis lateralibus approximatis. Nostra species habitu et spiculis distichis magis refert *Catapodium Siculum* = Link *Triticum untoloides* Ait. spiculis sessilibus statim distinguendum et flosculis apice tantum acutè carinatis transitum inter *Scleropoas* et *Catapodia* genericè forsā non satis distincta præbet.

SCLEROPOA PUMILA Boiss.

Scl. annua glabra, culmis numerosis pumilis exterioribus basi geniculatis omnibus foliosis longitudine inæqualibus scabridis, foliis inferioribus paucis lineari-setaceis, caulinarum vaginis dilatatis striatis jævibus elongatis limbo lanceolato apice subulato folii supremi paniculam sæpè æquanti, ligulā oblongo-lanceolatā acutā lacerā, paniculā oblongā ramis brevibus angulatis scabridis divaricatim ramulosis ad spicularum ortum infracto-flexuosis, spiculis sessilibus super ramulum angulo recto patentibus angustissimè linearibus, glumis æqualibus angustè lineari-lanceolatis obtusiusculis acutè carinatis flosculo inferiori ferè dimidiò brevioribus, axi elongatā, flosculis strictis invicem plùs eorum longitudine mediā distantibus linearibus, paleā inferiori lineari nervis tribus validis percursā subcoriaceā virenti margine et apice brevissimè albomembranaceā carinatā obtusiusculā ad nervos supernè scabridā, superiori æquilongā lineari obtusā ad 2 nervos scabridulā.

Hab. in deserto *Arabix petreæ* *Palæstinæ* conterminæ (Boiss.), in desertis *Alexandriæ* (Cadet de Fontenay).

Culmi sæpiùs 3-4 rariùs 5-7 pollicares, paniculæ 1 1/2-2 poll. longæ ramulis spiculis brevioribus, spiculæ 3-4 lineas longæ angustissimæ tereti-angulatæ. Affinis *Scler. divaricatæ* Link = *Festucæ divaricatæ* Desf. quæ egregiè differt culmis elatioribus vix basi geniculatis,

vaginis foliorum culmeorum non dilatatis inflatis, spiculis multifloris 8-12 lin. longis crassioribus, paleis obsoletius nervosis inferiori non scabridâ.

SCLEROPOA MEMPHITICA Boiss.

Sc annua glabra, culmis numerosis basi valdè geniculatis dein erectis lævibus, foliis ferè omnibus culmeis vaginis striatis lævibus latis subinflatis limbo lanceolato subulato-attenuato vaginæ æquilongo eo folii supremi paniculæ sæpius æquilongo, ligulâ oblongâ acutâ lacerâ, paniculâ oblongâ ramosissimâ, ramis articulato-fragilibus patentibus angulatis scabridis inferioribus elongatis omnibus divaricatim ramulosis, spiculis subsessilibus ramulo angulo recto insidentibus oblongo-linearibus trifloris, glumis linearibus acuminatis rigidis subinæqualibus carinatis supernè carinâ parcissimè scabridis cæterùm glabris flosculo inferiori dimidiò brevioribus, flosculis strictis linearibus acuminatis invicem quartâ parte eorum longitudinis distantibus, paleâ inferiori glabrâ trinervi carinatâ obsoletè ad carinam supernè scabridulâ vel omninò lævi coriaceâ virenti angustè lineari supernè attenuato-acuminatâ albedo-membranaceâ apice in denticulum acutum minutum abeunti, carinâ in aristulam denticulo longiorem productâ, paleâ superiori breviori lineari obtusâ ad 2 nervos scabridâ.

Hab. in arenâ mobili ad pedem rupium in vallibus Sinaiticis *Wadi Mokatteb*, *Wadi Schetck*, etc. (Boiss.), in desertis *Ægyptiaco-Arabicis Thebaidis* (Husson).

***Dactylis Memphitica* Spreng.**

Planta 1 1½-1 pedalis infernè sæpè arenâ mobili sepulta, foliorum superiorum limbus sæpè 2-3 poll. longus, vaginæ 2 1½-3 lineas sæpè latæ, panicula eâ præcedentis amplior propter ramos longiores magis effusa. Habitu et vaginis latis foliorum præcedenti affinis ab eâ differt ramis paniculæ elongatis, spiculis breviter pedicellatis et præsertim flosculis inter se minùs remotis axi minùs strictis ferè lævibus attenuato-subulatis apice longiùs membranaceis et carinâ productâ longiusculè aristulatis. A. *Scleropodâ divaricatâ* notis datis longiùs distat.

VULPIA PATENS Boiss.

V. annua glabra, culmis tenuibus pumilis basi geniculatis parcè foliosis lævibus vaginis angustis, limbo convoluto setaceo flexuoso, li-

gulâ brevissimâ ovatâ acutâ, paniculâ erectâ simplici vel basi ramosâ oblongâ parvâ, spiculis rachidi crassiusculâ rigidâ acutè angulatâ distichè et angulo recto insidentibus patentibus subsessilibus oblongis 5-7 floris, glumâ inferiori minimâ triangulari squamæformi, superiori lanceolatâ quadruplò majori flosculi infimi quartam partem æquantî utrâquè glabrâ, flosculis glabris linearibus infimis acutis superioribus in mucronem brevem attenuatis.

Hab. in deserto *Arabiae petreæ* Palæstinæ contermino ubi pauca specimina Aprili 1846 legi.

Culmi vix semipedales, panicula 1-1 1/2 poll. longa, spiculæ cum pedicello brevissimo ferè 2 lineas longæ, flosculorum mucro vix lineam dimidiam longus. Species spiculis axidi spicæ distichè et angulo recto insidentibus brevissimè aristatis propè *V. cynosuroidem* Parlatore. = *Festucam delicatulam* Lag. collocanda.

BROMUS ANATOLICUS Boiss. et Heldr. in pl. Anat. exs. 1846 (Sect. *Serrafalcus*).

Br. annuus foliis inferioribus ad vaginas et limbum, superioribus secùs limbum tantùm indumento longo patulo mollissimo obsitis, paniculâ erectâ patenti pyramidatâ ramis capillaribus patulis nutantibus inferioribus elongatis, spiculis oblongo-lanceolatis adpressè velutinis, floribus latè ellipticis fructiferis margine subimbricatis, paleâ inferiori elevatim 9 nervi margine medium versùs rotundatâ superiorem paulò superanti, arislis ad tertiam partem dorsi insertis siccatis recurvato-subpatulis florum superiorum paleâ longioribus inferiorum brevissimis.

Bromus squarrosus β *Cyri* Trinius ex Griseb. Gram. Ross.

Hab. in rupestribus collium propè *Tsimboukkan Pamphyltæ* (Heldreich).

Species habitu, spicularum formâ et magnitudine *B. squarroso* affinis qui differt indumento multò breviori velutino, flosculis arctiùs imbricatis brevioribus oblongis, paleâ exteriori margine latiùs membranaceâ angulum obtusum manifestum exhibenti, aristâ altiùs insertâ. *Br. arvensis* et *B. patulus* spiculis lanceolatis apice attenuatis, paleisque quoque margine obtusè angulatis longiùs distant.

BROMUS MACROCLADUS Boiss. (Sect. *Serrafalcus*).

Br. annuus ad limbos et vaginas breviter et patulè hirtò-velutinus, culmo elato, paniculà erectà triangulari-pyramidatà ramis filiformibus erecto-patulis longis inferioribus 5-7 verticillatis, spiculis oblongo-ellipticis, floribus ellipticis fructiferis margine imbricatis, paleà inferiori asperulo-punctatà sub 7 nervi rubellà margine latiusculè albo membranaceà medium versùs convexà nec angulatà, superiori conspicuè breviori, aristà paulò suprà tertiam partem paleæ inferioris insertà tenui rectà vel extrorsum subarcuatà florum superiorum paleà longiori inferiorum brevissimà.

Hab. in collibus ad radices meridionales *Tmoli* inter *Terrassu* et *Birgui* in *Lydià* (Boiss. 1842).

Tripedalis, panicula semipollicem et ampliùs longa, ramis inferioribus sæpè 3 pollices longis, his notis affinis *B. arvensi* qui differt spiculis angustioribus lanceolatis apice attenuatis, paleis paululùm abbreviatis margine suprà medium obtusè angulatis, aristà altiùs insertà. *Br. patulus* quoque paleis angulatis, inferiori subæquilongà, paniculàque subunilaterali differt. *Br. Anatolicus* deniquè præter pubescentiæ indolem aristis crassioribus recurvis, spiculis latioribus etc. longiùs differt.

BROMUS CRINITUS Boiss. et Hoh. in pl. Pers. bor. 1846. (Sect. *Eubromus*).

Br. annuus? cæspitosus radice fibrosà, culmis pluribus erectis flososis mediocriter elatis, foliis teneris viridibus vaginisque pube brevissimà deflexà sub lente parcè obsitis, limbo lineari-lanceolato acuto, ligulà ovato-oblongà hirsutà fimbriato-lacerà, paniculà oblongà contractà ramis capillaribus strictis scabridis spiculà pluriès longioribus, spiculis minimis ovalis modicè compressis subquadrifloris glabris, glumis subæquilongis lanceolatis attenuato-acuminatis flosculum inferiorem æquantibus inferiori 1 superiori 3 nervi, flosculis ellipticis, paleà exteriori viridi lævi obsoletissimè 6-7 nervi paululùm sub apice brevissimè membranaceo subbidentatà aristà setaceà rectà eà sextuplò longiori munità, paleà interiori æquilongà elliptico-lineari ad 2 nervos scabridulà.

Hab. in monte *Elbrus* propè pagum *Passgala*.

Culmi 6-9 pollicares, panicula 1 1/2-2 pollicaris densiuscula, spicula absque aristis 2 1/2 lin. ferè longa, flosculi sesquilineam aut paulò ampliùs, aristæ 7-9 lin. longæ. Species floribus minutis longè aristatis insignis, nulli aliæ generis propiùs affinis, spiculis compressiusculis sectioni *Serrafalco* accedens sed numero nervorum glumarum habituque aptiùs propè *Br. tectorum* collocanda.

BROMUS SIPYLEUS Boiss. (Sect. *Eubromus*).

Br. perennis, radice fibrosà, foliis lato-linearibus planis flexuosis margine scabris infimis paulò angustioribus omnibus præter 2-3 superiora ad vaginas deflexim hispidulis ad limbi margines ciliatis, vaginà brevissimà subtruncatà, culmo elato, paniculæ flaccidæ nuntantis abbreviatæ ramis valdè elongatis nudis, pedunculis scaberrimis spiculà brevioribus, spiculis lineari-lanceolatis strictis elongatis 7-9 floris, glumis æqualibus lineari-lanceolatis trinerviis carinatis acutissimis glabris carinà scabridis, flosculis lanceolatis, paleà exteriori lanceolatà lineari sub 7 nervi apice attenuatà acutà paululùm sub apice aristà rectà tenui dimidiò breviori auctà scabridulà, interiori breviori elliptico-lineari ad 2 carinas remotè breviter et rigidulè denticulato-ciliatà.

Hab. in umbrosis *Sipyli* suprà *Magesium* in *Lydià* ubi legi fine Junii 1842.

Planta 4-8 pedalis, culmo crassiusculo, foliorum intermediorum limbo sæpè ferè pedali 4 lin. lato, paniculæ rami inferiores parte nudà 2-3 pollicares cernui, spiculæ sesquipollicares angustæ. Species pulchra habitu et characteribus *Br. asperi* donata qui differt pilis foliorum validioribus longioribus magis asperis, spiculis flosculisque ferè triplò minoribus adpressè hirtis, glumis inæqualibus. *Br. erectus* paniculæ erectæ ramis brevissimis longiùs distat.

BROMUS SCLEROPHYLLUS Boiss. (Sect. *Eubromus*).

Br. glaberrimus perennis, radice repenti, caudicibus crassis vaginis vetustis nigris reticulato-fibrosis vaginatis, culmis elatis rigidis erectis parè foliosis, foliis rigidis duris plicato-convolutis subcylindricis subincurvis elevato-plurinerviis albidis subpungentibus, ligulà brevissimà truncatà, paniculà brevissimà erectà ovatà paucispiculatà,

ramis unispiculatis spiculâ longioribus strictis inferioribus binis, spiculâ 7 florâ, glumis anguste lanceolatis valdè acuminatis æqualibus flosculum infimum subæquantibus, axi pilosulâ, flosculis subdissitis, paleâ inferiori lanceolatâ trinervi adpressè et valdè scabridâ paulò sub apice acuminato membranaceo aristâ æquilongâ contorto-divaricatâ auctâ, paleâ superiori elliptico-lineari remotè et longiusculè setulis scabridâ.

Hab. in monte *Tmolo* suprâ *Philadelphiam* in *Lydiâ* ubi legi Jun. 1842.

Culmus sesquipedalis, folia inferiora angusta 4-5 pollices longa, panicula 2 1/2 pollicaris in meo specimine 5-6 spiculata, flosculi 6-7 lin. longi, arista paulò suprâ basin contorta. Species *Br. erecto* et *Br. tomentello* affinis ab utroque radice breviter repenti, foliis duris convolutis cylindricis distincta, a priori iterùm flosculis 3 nec 5-7 nerviis longè aristatis aristâ divaricatâ, a posteriori glabritie diversa.

Obs. *Br. Persicus* Boiss. in Kotschy pl. Pers. bor. 1846 est *Br. tomentosus* Trinius.

LOLIUM PERSICUM Boiss. et Hoh. in pl. Pers. bor. 1846.

L. annuum vel bienne, radice fibrosâ culmos floriferos tantùm agentis, culmis tenuibus erectis, foliis viridibus teneris multinerviis limbo stricto angustissimè lanceolato-lineari, ligulâ rufescenti ad marginulum truncatum ferè obsoletum reductâ, spicâ tenuissimâ remotiusculè 5-7 spiculatâ, spiculis strictis minimis subtrifloris, glumâ elliptico-lanceolatâ obtusâ dorso quinquenervi angustè membranaceâ flosculis tertiâ parte breviori, paleâ inferiori oblongo-lanceolatâ viridi subcoriaceâ dorso subcarinatâ acutâ in aristam rectam tenuem eâ ferè duplò longiorem abeunti, interiori æquilongâ subæquilatâ acutissimâ apice subbifidâ ad carinas scabridâ.

Hab. in uliginosis montis *Elbrus* propè *Derbend* Kotschy N° 278.

Culmi 9-10 pollicares tenuissimi, spicæ lineares 1-1 1/2 pollicares, spiculæ absque aristis vix 3 lineas longæ, aristæ ferè 5 lineas longæ. Propè *L. multiflorum* et *L. tenue* auct. = *rigidum* Gaud. collocandum, ab utroque spiculis multò minoribus paucifloris, flosculis magis coriaceis longè aristatis diversissima. *L. arvense* culmo et rachide multò crassioribus, spiculis multifloris, flosculis brevibus turgidis muticis vel breviter aristatis longè quoque distat. Habitus *Narduri*.

LOLIUM LEPTUROIDES Boiss.

L. bienne vel *annuum* culmis humilibus basi foliosis citò in spicas crassas cylindricas incurvas abeuntibus, foliis latè lineari-lanceolatis multinerviis, ligulà brevi marginiformi, rachide crassissimà dextrorsum sinistrorsumque alternatim et profundè excavatà spiculasque excipienti marginibus latis rotundatis, glumà latè lineari obtusà coriaceà multinervi flosculos superanti rachidis excavationes exactè claudenti, spiculis excisuris rachidis inclusis a dorso valdè compressis subquinquefloris, paleà inferiori coriaceà ellipticà obtusà glabrà muticà interiori æquilongà æquilatàque carinis scabridà utrâque achenio arcuè adhærenti.

Rottbolla loliacea Bory et Chaub. Fl. Pelop. pl. 3 f. 2.

Hab. in Peloponneso circa *Modon*.

Planta vix semipedalis, folia basi 2 lineas et ampliùs lata, spica 3-4 pollices lata diametro 2 lineas ferè lata, gluma sæpè 6-7 lin. longa, flosculi 2 lin. circ. longi. Species insignis habitu omninò *Lepturi* a quo spiculis multifloris distat et omni jure in genere *Lolio* juxtà *L. tenue* auct. — *rigidum* Gaud collocanda a quo spicà crassà incurvâ, rachide multò crassiori profundiusque excisâ, glumà spiculas superanti nec eis subbrevisiori differt.

AGROPYRUM CRISTATUM R. et Sch. β *puberulum* Boiss. —

Vaginæ et folia pilis patulis vel deflexis velutina, spicæ angustæ spiculis glabris vel velutinis.

Triticum puberulum Boiss. et Hoh. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846.

Hab. ad radices montis *Demawend* propè *Ask*. Kotsch. N° 374.

Ex comparatione polymorphi *Ag. cristali* cui *A. pectinatum* quoque referendum comperi nostram plantam ab eo specificè non differre et præsertim habitu et spicis *Ag. cristato* *Var. β* Flore Altaicæ optimè congruere.

AGROPYRUM HORDEACEUM Boiss.

A. annuum culmis nanis foliosis, foliis inferioribus angustè linearibus brevissimè tomentello-hirtulis superiorum glabrescentium vaginâ inflatâ elongatâ valdè nervosâ limbo dilatato ad margines latiùs albounervoso spicam æquantì vel superanti, spicà densâ ovato-oblongâ

obsoletè distichâ vaginâ summâ basi involucriatâ, spiculis 4-8 floris, glumis angustissimè lanceolato-linearibus carinatis ad margines præsertim hirsutis longè attenuato-subulatis flosculos subsuperantibus æquilongis nervo carinali absque lente vix distincto, paleâ inferiori trinervi a basi lanceolatâ parcè et longè hirsutâ longè setaceo-atenuatâ, paleâ superiori breviori angustè lineari-lanceolatâ attenuato-acuminatâ longè bidentatâ ad carinas scabridâ.

Hab. in prov. *Aderbidjan Persiæ* Aucher N° 5422.

Culmi 1-2 pollicares, spicæ pollicem aut paulò ampliùs longæ 6-8 lineas latæ, glumæ 9-11 lineas longæ basi lineam dimidiam latæ. Species pulchra ex affinitate *Tr. Orientalis* spiculis longis longè setaceo-acuminatis insignis facie *Heteranthelium piliferum* referens.

AGROPYRUM LASIANTHUM Boiss.

A. annuum, culmis pumilis foliosis, foliis inferioribus sub lente hirtulis cæteris glabrescentibus, vaginis superioribus subinflatis, limbo oblongo-lineari abbreviato, spicis densis ovatis obsoletè distichis e vaginâ summâ remotiusculis, spiculis 4-8 floris, glumis lanceolato-linearibus æquilongis a basi angustè lanceolatâ longè et patulè hirsutâ setaceo-atenuatis flosculos subsuperantibus trinerviis carinatis nervo carinali vix absque lente distincto, paleâ inferiori e basi oblongâ densè et longè albo-hirsutâ subulato-atenuatâ, paleâ superiori breviori lanceolatâ acutâ tenuiter et longè bidentatâ ad carinas scabridâ.

Tr. orientale var. *lanuginosum* Griseb. Gram. Ross.

Hab. in *Campis Caspiis* (Fisch.) in *Songariâ* (Turcz) sub nomine *Tr. orientalis* acceptum.

Planta 3-4 pollicaris, spica 8-9 lineas longa 6-7 lata; glumæ circ. 8 lineas longæ. Præcedenti characteribus affinis differt foliorum limbo abbreviato, spicâ breviori minori, glumis flosculisque multò brevioribus densiùs et longiùs hirsutis abruptiùs et a medio nec a basi et longissimè attenuatis. *Ag. Orientale* spicularum longitudine magis affine differt spicâ eximiè et regulariùs distichâ, glumis breviter et parciùs hirsutis flosculis subbrevioribus et nervo dorsali crasso oculo nudo statim perspicuo donatis, flosculis breviter hirsutis in mucronem eis breviorē nec longiorē attenuatis.

AGROPYRUM KOTSCHYANUM Boiss. et Hoh. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846.

A. annuum glabrum glaucescens, culmis internè geniculatis, vaginis foliorum superiorum subdilatatis limbo abbreviato-oblongo lanceolato, spicà e vaginà superiori longiusculè remotà densiusculà ovalà imbricatà, spiculis 1-3 floris linearibus, glumis coriaceis angustè linearibus acutis ad nervum carinalem crassum scabridis flosculos non æquantibus æquilongis, paleà superiori angustè lineari-lanceolatà acutà dorso parè scabridulà basi tereti supernè carinatà, superiori breviori lanceolatà acutà bidentatà ad carinas scabridà.

Hab. in *Persia* Aucher N° 2970, ad *Teheran* Kotsch. N° 12.

Culmi 6-8 pollicares, spicæ pollicares 8-9 lineas latæ, spiculæ ferè 8 lineas longæ. Valdè affine *A. squarroso* Link pro cujus varietate primùm habui. *Ag. squarrosum* tamen nunc me iudice specificè differre videtur spicis spiculisque paulò minoribus, nervo glumarum carinali crassiori magis prominulo, flosculis duobus superioribus aristà setaceà plus minùs elongatà terminatis.

TRITICUM BÆOTICUM Boiss.

Tr. annuum, culmis erectis gracilibus, foliis breviter puberulis, culmeorum limbo vaginà multò breviori, fasciculo pilorum ligulæ locum tenenti, spicà terminali densà lineari angustà a latere vix compressà, rachide fragili longè et densè albo-pilosà, spiculis bifloris flore superiori sterili mutico, glumis bicarinatis scabridis flosculo subbrevioribus apice bidentatis dentibus rectis brevibus acutis triangularibus inæqualibus, flosculi fertilis paleà inferiori apice in aristam rectam eà multoties breviorē abeunti ad aristæ insertionem margine 2 denticulis rectis valdè scabridis auctà.

Hab. in planitie *Bæotica* (Spruner).

Spicæ absque aristis sesquipollicares 1 1/2-2 lineas tantum latæ, aristæ super. bipollicares. *Triticum monococco* valdè affine sed spica ferè dimidiò angustior obsoletè a latere compressa nec valdè compressa distichaque; spiculæ dimidiò minores, axis valdè nec obsoletè albo-hirsuta, glumæ glabræ scabridæ nec supernè hispidulæ.

Obs. I. *Egilops macrura* Jaub. et Sp. Illustr. pl. Or. tab. 313 est *Egilops Aucheri* Boiss. Diagn. N° V. jam anno 1844 edita.

Obs. II. *Egilops loliacea* Jaub. et Spach tab. 317 est *Egilops mutica* Boiss. Diagn. V.

HORDEUM ITHABURENSE Boiss.

H. annuum glabrum culmis erectis foliosis, foliorum limbo flaccido pallidè virenti margine scabro, spicà e folio summo remotiusculà lineari a latere vix compressà, rachide fragillimà compressissimà utroque margine densè ciliatà spiculis ternis, lateralibus masculis muticis, intermedio aristato unifloro cum flosculo sessili setaceo plumoso, glumis æqualibus linearibus densè et adpressè setosis in aristam setaceam flosculo paulò longiorem abeuntibus, paleà flosculi fertilis durà glabrà dorso bisulcatà in aristam validam complanato-trigonam margine scabram sensim attenuatam rectam longissimam abeunti, paleà superiori æquilongà apice retusà.

Hab. in declivibus siccis montis *Ithaburis* in latere meridionali suprà *Daburieh*.

Sesquipedalis, spica absque aristis 1 1/2-2 pollicaris, glumæ 7-8 lineas longæ, arista semipedalis basi lineæ 3/4 lata. Species pulcherrima ob aristas ingentes nulli propiùs affinis, propè *H. vulgare* et *distichum* collocanda.

HORDEUM VIOLACEUM Boiss. et Hoh. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846.

H. perenne cæspitosum, radice fibrosà, culmis erectis basi non incrassatis, foliis radicalibus numerosis caulinisque sparsis scabridis rigidiusculis limbo abbreviato, spicis violaceo-nigricantibus linearibus vix compressis axi fragillimà hirtulà, spiculis ternis unifloris cum rudimento subulato flosculi superioris, glumis subulatis scabris flosculos æquantibus, flosculis lateralibus masculis muticis sæpiùs minoribus subpedicellatis, paleà inferiori floris hermaphroditi lanceolato-lineari in aristam brevem eà breviorē abeunti, superiori æquilongà acutà.

H. pratense var. *nodosum* Griseb. Gram. Ross.

Hab. in pinguibus ad radices montis *Demawend* propè *Lar*. Kotsch. N° 323 et in monte *Totschal* propè *Teheran* alt 8000' N° 3, in faucibus montis *Elbours*, N° 643, in monte *Kuh Dæna* Persiæ australis Kotsch. N° 684 sub *H. bulbosi* var.

Culmi 2-2 1/2 pedales, spicæ 1-2 pollicares, spiculæ circ. 2 1/2 lin., aristæ longiores 3 lineas tantum longæ. Affine *H. bulboso* cujus olim varietatem esse credideram sed a quo differt culmis non solitariis nec basi bulbosis, glumis flosculos non superantibus, paleà floris intermedii in aristam eà breviorē nec longiorē abeunti.

LEPTURUS PERSICUS Boiss. Sect. (*Pholiurus*).

L. annuus culmo paulò suprâ basin ramoso erecto infernè folioso citò in spicas lineares cylindricas longas rectas abeunti, vaginis folisque brevibus retrorsùm scabridulis, rachide spicæ fragillimâ dorso convexâ albo-marginatâ articulis spiculis æquilongis, glumis duabus coriaceis extùs convexis sub lenteque adpressè hirtulis plurinerviis apice obtusis vix et brevissimè membranaceis æquilongis flosculos paulò superantibus rachidi arcuè adpressis alterâ paulò angustiori, flosculis binis rariùs solitariis, paleis æquilongis albo-membranaceis lanceolato-linearibus obtusiusculis glaberrimis.

Hab. in *Persia australi* Aucher N° 2914.

Planta habitu spicisque rectis cylindricis 3-4 pollices longis *L. cylindricum* referens sed statim ab eo glumis bivalvibus distinguenda. Spiculis bifloris in subgenere *Pholiuro* propè *L. pannonicum* collocandus qui a nostrâ specie glabritie, rachide spicæ multò tenuiori, spiculis a rachide sejunctis nec ejus excavationibus arcuè incumben-
tibus minoribus, paleis apice bidentatis nec integris faciliè dignoscitur.

ANTHISTIRIA BRACHYANTHA Boiss.

A. perennis glauca radice fibrosâ cæspitosâ, culmis erectis simplicibus teretibus flavidis foliosis parte superiori obtusè angulatis, foliis linearibus planis rigidulis inferioribus secùs vaginas superioribus ad basin limbi sparsim setis longis e tuberculo ortis obsitis margine et ad nervos scabris, ligulâ brevi truncatâ fimbriolatâ, fasciculis spicularum 4-5 pedunculo filiformi suffultis infimo remoto cæteris terminalibus omnibus nutantibus singulis spathâ glabrâ lanceolatâ acuminatâ plicatâ suffultis iterùm in tres-4 glomerulos spathis lanceolatis dimidiò minoribus suffultos divis, glomerulorum 1 vel 2 e spiculis hermaphroditis masculisque cæteris e spiculis neutris muticis tantùm constantibus, spiculis neutris vel masculis sessilibus basi glabris, glumis exterioribus viridibus oblongo-lanceolatis cucullatis acutis dorso multinerviis margine rufescenti-membranaceis supernè setis nonnullis e tuberculis crassis ortis obsitis, glumis interioribus hyalinis, spiculâ hermaphroditâ pedicello longè rufescenti barbato suffultâ ad apicem pedicelli 2 spiculis abortivis subulatis viridibus iterùm pedicellatis auctâ biglumi, glumis æquilongis oblongis obtusis subcoriaceis exteriori apice breviter puberulâ interiorem arcuè involventi, aristâ flosculi rufâ contortâ infernè hirsutâ spiculas multoties superanti spathâ fasciculorum ferè longiori.

Hab. in siccis dumosis *Syriæ* littoralis ad radices australes jugi *Cassii* inter *Laodiceam* et *Suadieh*. Legi Junio 1846.

Circ. tripedalis, folia radicalia ferè sesquilineam lata 4-6 pollices longa, spicularum neutrarum bractæ 3 $1\frac{1}{2}$ -4 lineas longæ, arista sesquipollicaris.

ANTHISTIRIA SYRIACA Boiss.

A. perennis glauca radice....., culmis parcè ramosis infernè obtusè supernè acutiusculè angulatis suprâ nodos incrassatis, foliis glaberrimis linearibus planis rigidulis utrinquè scabridis, ligulâ brevi ovalâ timbriatâ, fasciculis pedunculis filiformibus suffultis nutantibus 2-3 in culmi parte superiori, inferiori remoto, omnibus spathâ lanceolato-lineari longè acuminatâ plicatâ infernè marginibus ciliatâ suffultis iterùm e 3-4 glomerulis constantibus, glomerulis omnibus e spiculis marginalibus neutris sessilibus centralique pedicellato hermaphrodito constantibus singulis spathâ lanceolatâ minori eis paulò longiori stipatis, spicularum neutrarum glumis exterioribus oblongo-lanceolatis acutis viridibus multinerviis margine membranaceis supernè setis parçissimis e tuberculo ortis obsitis, glumis interioribus hyalino-membranaceis, spiculâ hermaphroditâ ad pedicelli rufosetosi apicem 2 spiculis quoque pedicellatis rudimentariis neutris viridibus lanceolatis obsitâ, glumis albidis coriaceis æquilongis obtusis exteriori apice hirtoscabridâ interiorem arcuè involventi, aristâ flosculi contortâ rufescenti spiculis multo longiori spatham fasciculorum æquantî.

Hab. in regione sylvaticâ inferiori jugi *Cassii* in *Syriâ boreali* ubi legi non procul a præcedenti Jun 1846.

Planta præcedenti major, folia longiora semper glabra, fasciculorum spatha 3-4 nec bipollicaris margine infernè ciliata nec glaberrima, glumæ spicularum neutrarum majores acutiores 5-6 lineas longæ setis parçissimis e tuberculo minori ortis, spiculæ neutre binæ ad basin floris hermaphroditi sitæ lanceolatæ nec subulatæ. A. *glauca* Desf. huic speciei affinis differt culmo compresso, glumis florum neutrorum præter cilia nonnulla ad apicem sita tuberculis prorsus destituta glaberrimis, pilis secus pedicellum floris hermaphroditi sitis multò brevioribus aliisque notis. A. *punctata* Hochstetter ex Abyssiniâ affinis quoque, spathis undiquè hispidis pilis e tuberculis nigris ortis, glumis longè pilosis, etc., statim distinguitur.

EMENDANDA ET ADDENDA

AD DIAGNOSES. SERIEI PRIORIS.

- Diagn. I. pag. 8. *Polygala pruinosa*. Dele ex habitatione locos in Græciâ indicatos et vide Diagn. Seriem secundam N° I.
- „ „ 17. *Saponaria thymifolia* var. *ocellata*. Vide Diagn. Ser. 2, N° 1.
- „ „ 33. *Silene rhynchocarpa* B. est *Silene stentoria* Fenzl. in Kotschy Pl. Tauri.
- „ „ 36. *Linum Anatolicum* B. est varietas *L. hirsuti* L. Vide Diagn. Ser. 2, N° 1.
- „ „ 62. *Aplophyllum* lege *Haplophyllum*.
- „ „ 69. *Barbarea Angustana* lege *Augustana*.
- Diagn. II. p. 13. *Cornicina pseudocytisus* B. est *Cytisopsis dorycniiifolia* Jaub. et Spach. Illustr. tab. 84.
- „ „ 17. *Trigonella Sprunneriana* lege *Spruneriana*.
- „ „ 20. *Trigonella elliptica* Boiss. Huic ut synonymon adde *Botryolotus Persicus* Jaub. et Sp. Illustr. pl. Or. tab. 63.
- „ „ 73. *Astragalus Friwaldskyanus* B. est *A. physocalyx* Fisch. Griseb. Spic. Rumel I. p. 38.
- „ „ 79. *Astragalus Spruneri* B. lege *Spruneri*.
- „ „ 90. *Taverniera glabra* B. Adde synonymon *T. ephe-droidea* Jaub. et Spach. Illustr. tab. 62.
- „ „ 90. *Taverniera incana* B. Adde synonymon *T. gonoclada* Jaub. et Spach. Illustr. tab. 61.
- „ „ 98. *Ebenus barbigera* B. Adde synonymon *E. pogonotroptis* J. et Spach. Illustr. tab. 252.
- „ „ 99. *Ebenus laguroides* B. Adde synonymon *E. Montbretii* Jaub. et Spach. Illustr. tab. 250.
- „ „ 100. *Ebenus stellata* B. Adde synonymon *E. tragacanthoides* Jaub. et Spach. Illustr. tab. 254.
- Diagn. III. p. 32. *Mericalpæa vaillantoides*. Adde synonymon *Galium cristatum* Jaub. et Spach. Illustr. pl. Orient. tab. 194.

- Diagn. V. p. 52. *Euphorbia sessiflora* lege *sessiliflora*.
 „ „ 54. In descriptione *Euph. macrocladæ* adde : „glandulis semilunaribus basi truncatis cornubus brevibus divergentibus linearibus non incrassatis.„
- Diagn. VI. p. 26. *Hypericopsis Persica*. Adde synonymon *Frankenia Persica* Boiss. in Kotsch. pl. Pers. Jaub. et Spach. Illustr. tab. 188.
- Diagn. VII. p. 30. *Rindera Græca* B. et H. est *Mattia Græca* A. DC. Prodr.
 „ „ 82. *Polygonum tuulosum* lege *tubulosum*.
- Diagn. VIII. p. 55. CARIOPHYLLÆ lege CARYOPHYLLÆ.
 „ „ 118. *Erodio tuberoso* Boiss. adde synonym. *Er. hirtum* Willd. non Boiss. Voy. Esp. Vide Pugill. pl. nov. Af. bor. pag. 26.
- Diagn. IX. p. 1. lin. 6. adde TEREBINTHACEÆ.
 „ „ 100. pro *Hedysarum Kotschy* pone *Kotschy*.
 „ „ 115. lin. 25 pro *gluscosis* lege *glareosis*.
- Diagn. X. p. 107. pro *Cheitolaps* pone *Cheirolepis*.
- Diagn. XI. *Kælpinia sessilis*. Hæc planta quam ex habitu *Kælpintiis* simillimo huic generi infaustè adnumeravi ab eis et a Cichoraceis florum et fructûs characteribus abhorret et Calendulaceis adnumeranda est. Pro eâ pone DIPTEROCOME PUSILLA F. et M. Ind. Sem. Petrop. 1835 — DC. Prodr. VII. p. 255 — *Jaubertia Kælpinioides* Jaub. et Spach. Illustr. pl. Or. tab. 289.
 „ p. 90. lin. 24 pro *Nilotigo* lege *Nilotico*.
- Diagn. XII. p. 31. *Scrophularia cryptophilla* lege *cryptophila*.
 „ „ 76. *Sideritis Cassia* lege *Stachys Cassia*.
 „ p. 96. lin. 6. Loco var. S. lege var. β.
 „ p. 111. lin. 6. *Notadænia* lege *Notadenia*.
- Diagn. XII. p. 12. *Cephalantera* lege *Cephalantera*.
 „ p. 18. *Paneratium* lege *Pancratium*.
 „ p. 61. lin. 11. pro *Catapodium Siculum* = Link pone *Catapodium Siculum* Link.

INDEX SPECIERUM

AD DIAGNOSES PLANTARUM ORIENTALIU

Nº I-XIII

Seriem primam.

ACANTHACEÆ	Diagn. IV p. 85	Acanthus hirsutus	Diagn. IV p. 85
	XI 435		XI 436
Acantholimon acerosum	VII 80	spinosus	" 436
androsaceum	" 73	Syriacus	" 435
Assyriacum	" 81	ACERINEÆ	VI 28
bracteatum	" 70	Acer cinerascens	" 29
caryophyllaceum	" 78	velutinum	" 28
ferox	" 81	Achillea ambigua	XI 46
festuaceum	" 76	imbricata	" 45
genistoides	" 76	Lycaonica	" 47
glumaceum	" 75	oxydonta	" 45
Hohenackeri	" 75	sulphurea	" 48
Kotschy	" 74	Talagonica	" 47
lepturoides	" 77	Taygetea	" 46
leucanthum	" 81	Adenocarpus villosus	II 14
melananthum	" 74	Adonis Palæstina	VIII 4
oliganthum	" 77	Persica	VI 4
Olivieri	" 80	Ægopordon berardioides	" 443
Phrygium	" 79	Ægyalophila Cretica	X 406
Pinardi	" 79	pumila	X 405
roseum	" 71	Ægylops Aucheri	V 74
Schirazianum	" 72		XIII 69
Scorpius	" 81	crassa	VII 429
tenuifolium	" 78	Kotschy	" 429
tomentellum	" 72	loliacea	XIII 69
tragacanthinum	" 81	macrura	" 69
venustum	" 80	mutica	V 73
viscidulum	" 71		XIII 69
Acanthophyllum	I 43	Persica	VII 429
<i>brevistylum</i>	I 42	Æthionema	"
cæspitosum	I 41	cardiophyllum	VIII 44
Fontanesii	I 42	elongatum	VI 47
crassifolium	I 43		
<i>microcephalum</i>	I 43		

<i>Æthionema</i> Græcum	Diagn. VI	p. 16	<i>Allium</i> calyptratrum	Diag. XIII	p. 30
<i>grandiflorum</i>	VIII	42	<i>capitellatum</i>	VII	118
<i>thesiifolium</i>	"	44	<i>Carmeli</i>	XIII	28
<i>Agropyrum</i> Aucheri	V	73	<i>Cassium</i>	"	28
<i>bulbosum</i>	V	73	<i>chamæspathum</i>	VII	113
<i>cristatum</i>			<i>chloranthum</i>	XIII	33
<i>β puberulum</i>	XIII	67	<i>Cilicium</i>	VII	113
<i>hordeaceum</i>	"	67	<i>eriophyllum</i>	"	112
<i>Kotschyanum</i>	"	69	<i>frigidum</i>	XIII	35
<i>lasianthum</i>	"	68	<i>gomphrenoides</i>	VII	114
<i>Agrostis</i> Byzantina	"	47	<i>Kotschy</i>	"	117
<i>Sinaica</i>	"	46	<i>Libani</i>	XIII	26
<i>Ainsworthia</i> Carmeli	X	44	<i>macrorrhizum</i>	"	32
<i>trachycarpa</i>	X	43	<i>modestum</i>	"	33
<i>Ajuga</i> euphrasioides	VII	63	<i>myrianthum</i>	VII	59
<i>Mesogitana</i>	"	62	<i>Olympicum</i>	V	58
<i>Palæstina</i>	XII	92		XIII	34
<i>scoparia</i>	VII	63	<i>Orientale</i>	"	25
<i>vestita</i>	"	62	<i>papillare</i>	"	31
<i>Alhagi</i> Græcorum	IX	114	<i>Philistæum</i>	"	26
<i>Maurorum</i>	"	114	<i>Pisidicum</i>	"	34
<i>Turcorum</i>	"	113	<i>Reuterianum</i>	V	60
<i>Alkanna</i> areolata	IV	45	<i>rubrovittatum</i>	XIII	29
<i>bracteosa</i>	XI	117	<i>scabriflorum</i>	V	61
<i>filaginoides</i>	"	119	<i>scabriscapum</i>	XIII	31
<i>frigida</i>	VII	52	<i>Sipyleum</i>	V	58
<i>Galilæa</i>	XI	118	<i>Sinaiticum</i>	XIII	31
<i>Græca</i>	IV	47	<i>trachypus</i>	VII	114
<i>incana</i>	"	45	<i>variegatum</i>	"	118
<i>macrophylla</i>	XI	120	<i>vulcanicum</i>	XIII	33
<i>macrosiphon</i>	"	120	<i>Alopecurus</i>		
<i>Orientalis</i>	IV	47	<i>anthoxanthoides</i>	"	42
<i>Pinardi</i>	"	48	<i>Aucheri</i>	"	41
<i>rostellata</i>	XI	119	<i>Cassius</i>	"	41
<i>strigosa</i>	IV	46	<i>textilis</i>	"	41
<i>tubulosa</i>	"	48	<i>Alsine</i> aizoides	I	47
<i>viscidula</i>	XI	119	<i>Attica</i>	V	84
<i>Allium</i> armerioides	VII	116	<i>Billardieri</i>	VIII	95
<i>atroviolaceum</i>	"	112	<i>brevis</i>	"	97
<i>atroviolaceum</i>			<i>dianthifolia</i>	"	99
<i>var. angustifolium</i>	XIII	29	<i>erythrosepala</i>	"	98
<i>Aucheri</i>	VII	116	<i>leucocephala</i>	I	45
<i>Bæticum</i>	"	113	<i>Libanotica</i>	VIII	99
<i>brachyodon</i>	"	117	<i>Mesogitana</i>	I	45

Alsine Meyeri	Diagn. VIII	p. 96	Anchusa Spruneri	Diagn. XI	p. 98
Parnassica	I	46	Thessala	"	99
	V	83	Andrachne fruticulosa	VII	86
Pestalozzæ	VIII	99	Andropogon Aucheri	V	77
pulvinaris	I	46	Olivieri	V	77
	V	84	Androsace Olympica	IV	37
saxifraga	I	47	Anemone stellata Lam.		
Sinaica	VIII	400	var. Heldreichii	VIII	3
tenuifolia			Anethum chryseum	X	32
var. marit.	"	95	Ankyropetalum		
Villarsii			Cælesyriacum	VIII	59
var. stricta	"	400	Anthemis absinthifolia	IV	8
Althæa Aucheri	VI	28	aciphylla	"	7
digitata	VIII	406	albida	"	10
remotiflora	"	408	ammophila	XI	9
setosa	"	407	Anatolica	"	40
sulphurea	"	408	auriculata	IV	5
Alyssopsis Kotschy	VI	14	Aucheri	VI	87
Alyssum bracteatum ^{var. pseudophyllum}	I	45	Brachmanni	"	84
Cassium	VIII	34	callichroa	"	86
crenulatum	"	33	carnea	IV	4
elatum	"	33	Cassia	XI	40
heterotrichum	VI	45	cælopoda	"	42
Idæum	VIII	35	cornucopiæ	"	8
lepidotum	I	73	crassipes	"	9
microcephalum	I	45	leucanthemoides	IV	9
minutiflorum	I	73	odontostephana	VI	83
Sphacioticum	VIII	35	ormenioides	IV	5
AMARYLLIDÆ	XIII	48	Pamphylica	XI	8
Amelanchier integrifolia	III	8	pauciloba	VI	83
parviflora	"	9	pectinata	IV	6
Pisidica	X	2	Persepolitana	XI	7
AMENTACEÆ	XII	147	Persica	VI	85
Ammanthus filicaulis	XI	49	Pestalozzæ	XI	42
maritimus	"	49	pseudo-cotula	VI	86
Ammochloa Palæstina	XIII	52	Rascheyana	XI	8
pungens	"	52	Reuteriana	IV	8
AMPELIDÆ	VI	51	Rhodensis	XI	41
Amygdalus agrestis	X	4	Smyrnæa	IV	7
leiocarpa	VI	52	Taygetea	VI	83
spatulata	"	53	Antephora Persica	XIII	44
Anacyclus nigellæfolius	XI	43	Anthistiria brachyantha	"	74
Anchusa limbata	"	39	Syriaca	"	72
macrocarpa	IV	42	Aplectrocarnos Cætica	V	79

Aplophyllum vide Haplo-		Arnebia tinctoria	Diagn. XI p. 147
phyllum.		AROIDEÆ	XIII 5
APOCYNEÆ	Diagn. VII p. 21	Arrhenatherum Kotschy	VII 122
Arabis Cadmæa	VIII 21	Palæstinum	XIII 51
Cretica	" 20	Artemisia lasiocline	VI 92
ionocalyx	" 20	melanolepis	XI 27
Pedemontana	I 69	Persica	VI 91
Sinaica	VIII 21	subspinescens	" 94
Arenaria acerosa	" 103	Arthrolepis membranacea	XI 45
Armeniaca	I 48	Arum crassipes	XIII 9
Aucheriana	I 50	Creticum	" 9
	VIII 100	hygrophilum	" 8
Cassia	" 104	Kotschy	" 8
conferta	I 51	Palæstinum	" 6
drypidea	I 49	rupicola	" 7
macrosepala	I 52	ASCLEPIADEÆ	IV 38
nana	VIII 103		VII 20
Pamphylica	" 102		XI 79
Persica	I 49	Asperula Athoa	X 62
polycnemifolia	I 48	brachyantha	VI 66
Rhodia	I 52	breviflora	X 63
	V 85	fasciculata	" 60
	VIII 103	Gussonii	" 63
Sipylea	I 31	Libanotica	" 59
	V 5	lilaciflora	III 33
tetrasticha	I 50	mollis	" 31
Tmolea	I 50	Mungierii	X 61
tremula	VIII 104	Orientalis	III 30
Argyrolobium Arabicum	II 43	nitida var. puberula	X 62
	415	pycnantha	X 64
Kotschy	VI 52	seticornis	VI 65
prostratum	II 43	setulosa	X 61
	415	stricta	III 33
Syriacum	" 43	stylosa	" 31
	415	tenuifolia	" 32
Aristolochia auricularia	V 49	Taygetea	X 60
microstoma	V 50	Asphodelus Damascenus	XIII 22
Olivieri	V 50	refractus	" 23
pæcilantha	XII 104	rigidifolius	" 22
scabridula	" 103	viscidulus	VII 118
ARISTOLOCHIEÆ	V 49		XIII 24
	XII 104	Astragalus acinaciferus	IX 72
Arnebia echioides	XI 117	adunciformis	II 42
flavescens	" 117	ægobromus	IX 74

Astragalus Aleppicus	II	58	Astragalus columnaris	XI	70
Alexandrinus	IX	75	coluteocarpus	»	65
Alindanus	II	85	crenophilus	»	90
Amalecitanus	IX	46	crinitus	II	53
ammocryptus	»	59	cruentiflorus	II	82
Anatolicus	II	77	curviflorus	II	67
angustatus	IX	47	curvirostris	VI	38
anisacanthus	»	103	cucullaris	»	39
anserinaefolius	II	76	dactylocarpus	II	60
Antabicus	IX	86	Dænensis	VI	35
argyrostachyus	VI	41	Damascenus	IX	101
argyrothamnos	IX	9	decurrens	VI	40
armatus	»	102	deinacanthus	IX	76
Armeniacus	II	86	demissus	»	50
atropurpureus	IX	54	densifolius	»	38
Aucheri	II	46	Drusorum	»	78
aulacolobus	IX	64	dictyocarpus	II	84
Bethlehemicus	»	85	ebenoides	II	70
bombycinus	II	50	echinops	II	57
bounophilus	IX	99	Elbrusensis	IX	45
brachycalyx	»	90	emarginatus	»	36
brachyodontus	II	46	eremophilus	II	54
brachypodus	II	69	eriophyllus	IX	39
Bruguieri	IX	102	eripodus	II	48
Cabulicus	»	48	erpocaulos	IX	58
Cadmicus	II	44	erythrolepis	II	65
callichrous	IX	62	erythrotænius	VI	39
campylanthus	VI	42	eubrychioides	IX	41
campylosema	II	82	expansus	»	43
Candolleanus	II	81	falcinellus	»	63
Cappadocicus	II	74	fasciculifolius	II	73
capito	IX	40	flavescens	II	64
Cariensis	»	56	floccosus	II	61
cedreti	»	39	filagineus	IX	89
Chardini	II	74	Forskahlei	»	101
chionophilus	IX	52	Friwaldskyanus	II	75
chlorocyaneus	»	56	Emend.		
chromolepis	»	84	genistoides	IX	97
chrysanthus	»	73	Gerensis	»	71
chrysophyllus	»	38	gladiatus	II	43
chrysotrichus	II	75	globiflorus	IX	81
chrysostachys	II	69	glumaceus	II	69
Cilicius	II	59	gilvus	IX	71
Clusii	IX	101	Græcus	II	57

Astragalus grammocalyx	IX	53	Astragalus Mitchellianus	IX	80
griseus	VI	36	modestus	•	75
gymnopodus	IX	66	monanthemus	II	79
Haarbachii	II	50	mucronifolius	II	68
Hasbeyanus	IX	77	murinus	II	72
Hauarensis	•	63	myriacanthus	IX	91
Heldreichii	•	43	Nevadensis	II	63
Hermoneus	•	94	neurocarpus	II	59
Hohenackeri	II	70	nitens	IX	51
horridus	II	66	nucleiferus	II	83
hymenocalyx	II	55	obcordatus	VI	38
infestus	IX	95	ochrochlorus	IX	83
intermedius	II	53	oligophyllus	II	47
iodotropis	IX	100	oocephalus	II	56
isopetalus	•	67	orthocarpus	IX	68
Ispahanicus	II	52	ovigerus	II	67
Johannis	VI	41		VI	35
jubatus	IX	104	ovinus	II	76
Kotschyanus	II	44	oxytropifolius	IX	37
Kurdicus	IX	84	Parnassi	•	80
Lamarckii	•	82	pectinatus	II	54
Laricus	•	61	peregrinus		
lasiosemius	•	96	rotundifolius	IX	62
leioclados	II	62	Persepolitanius	•	60
lepidanthus	IX	85	Pestalozzæ	•	41
leucacanthus	•	93	phlomoides	II	56
lilacinus	•	42	Pinardi	IX	56
Listoniæ	•	37	pinetorum	II	77
lycioides	II	66	Pisidicus	IX	70
Lycius	IX	45	plebeius	VI	37
Lydius	II	43	podolobus	IX	49
macrosemiis	IX	93	pæcilanthus	•	50
medicagineus	•	42	polybotrys	•	64
medullaris	•	66	poterium	•	101
melanocephalus	•	50	Prusianus	•	88
melanodon	VI	36	ptychophyllus	VI	42
Melitenensis	II	43	ptilodes	IX	81
Mesogitanus	II	41	psilacanthus	•	97
mesoleios	IX	91	psilodontius	•	86
Mesopotamicus	II	68	pulchellus	II	86
Meyeri	IX	88	pyrrhotrichus	IX	75
microphysa	II	71	raphiodontus	•	96
Michauxianus	II	62	refractus		
minutus	IX	58	var. brachycarpus		

<i>Astragalus remotiflorus</i>	II	72	<i>Astragalus trifoliolatus</i>	II	48
remotijugus	IX	74	trigonelloides	•	49
retamocarpus	•	68	tumidus	IX	101
Reuterianus	II	71	vanillæ	II	60
rhizanthus	•	83	venulosus	•	73
	IX	56	vestitus	IX	98
Rostani	II	45	vexillaris	II	49
	IX	38	Zerdanus	•	51
		39		VI	35
Roussæanus	II	61	<i>Atractylis</i>	•	110
	IX	93	prolifera	X	96
ruscifolius	II	47	scabra	VI	109
Russeli	IX	102	<i>Atriplex lasiantha</i>	XII	93
saccatus	•	53	leucoclada	•	93
sanctus	•	47	Palæstina	•	96
scabrifolius	II	81	Persica	•	96
Schimperii	•	53	<i>Aubrietia gracilis</i>	I	74
schistosus	IX	49	Kotschyi	VIII	32
schizopetalus	II	82	Libanotica	•	33
scorpius	IX	105	parviflora	VI	14
sesamoides	•	59	<i>Avena agropyroides</i>	XIII	50
Sibthorpianus	II	84	Dænensis	VII	123
siliquosus	•	51	Carmeli	XIII	50
	VI	40	compacta	VII	122
Sinaicus	IX	57	<i>Ballota Aucheri</i>	V	59
speciosus	•	67	Damascena	XII	87
sphæranthus	VI	57	Larendana	•	88
Spruneri	II	79	<i>Barbarea Augustana</i>	I	69
strictifolius	IX	78	brachycarpa	V	80
submitis	•	100	<i>Barkhausia Kotschyana</i>	VII	13
subsecundus	•	54	<i>Bellevalia densiflora</i>	•	109
Susianus	II	64	flexuosa	XIII	36
tæniolepis	IX	99	macrobotrys	•	33
Talagonicus	•	87	micrantha	V	63
Tavernieri	II	78	Pinardi	V	62
Teheranicus	IX	44	spicata	VII	110
tenuirugis	•	60	<i>Bellis longifolia</i>	XI	4
tephrosioides	•	69	<i>Beta nana</i>	VII	82
tetragonocarpus	II	52	<i>Betonica Græca</i>	V	27
Thessalus	•	80	<i>Biarum Alexandrinum</i>	XIII	6
Thymphresteus	•	65	Spruneri	•	5
Tigridis	IX	55	<i>Bonjeania Syriaca</i>	IX	51
Tmoleus	•	79	<i>Boreava aptera</i>	VIII	49
Tournefortii	•	92			

BORRAGINÆ	Diagn. IV p. 40	Caccinia Russelii	Diagn. XI p. 134
	VII 29	strigosa	» 134
	XII 86	Cachrys goniocarpa	X 53
Botryanthus Aucheri	V 63	Calamagrostis Olympica	V 70
Sauli	XIII 37	Persica	VII 120
Brachypodium			XIII 47
longearistatum	VII 127	Calamintha florida	XII 51
Brassica lativalvis	VI 12	incana	» 52
nivea	I 72	organifolia	» 50
Persica	VIII 26	Pamphylica	» 52
Bromus Anatolicus	XIII 63	Spruneri	» 55
crinitus	» 64	staminea	» 51
macrocladus	» 64	suaveolens	» 54
Persicus	» 66	Calendula aurantiaca	VI 96
sclerophyllus	» 64	Cariensis	X 82
Sipyleus	» 63	Lusitanica	» 83
tomentellus	VII 126	Palæstina	» 83
Brossardia papyracea		Camelina grandiflora	V 82
var. Kotschyi	VIII 41	Campanula Aizoon	IV 54
Bryonia micrantha	X 7	amplexicaulis	XI 77
multiflora	» 8	aspera	» 77
Buchingera axillaris	VIII 29	Attica	» 67
Buffonia brachyphylla	» 94	camptoclada	» 63
elata	I 44	Cappadocica	» 77
enervis	I 44	cichoriformis	» 77
hebecalyx	I 45	Cilicia	» 77
Buplevrum dichotomum	V 28	compacta	» 71
Kotschyanum	» 29	delicatula	» 67
pulchellum	» 27	euclasta	» 70
subuniflorum	» 28	firma	» 77
Bunium Cassium	» 24	Fontanesiana	» 76
glauco carpum	» 23	gracilis	» 77
Pestalozzæ	» 24	hesperidifolia	» 76
Butinia Cretica	» 50	Hierosolymitana	» 62
glaucescens	» 51	incanescens	VII 16
Libanotica	» 51	leucosiphon	XI 64
nodosa	» 51	limonifolia	» 76
Buxus longifolia	XII 107	Lourica	» 70
		Lycia	» 77
		macrostyla	» 65
Caccinia Celsii	XI 132	Marschalliana	» 77
glauca	» 132	michauxioides	IV 33
Kotschyi	VII 31	multicaulis	VII 19
	XI 134	myrtifolia	XI 69

Campanula odontosepala D. XI p. 66		Carpoceras oxyceras Diag. VIII p. 37	
Olympica	IV 34	Sibiricum	» 37
Parnassica	VII 17	stenocarpum	» 37
Persepolitana	» 19	CARYOPHYLLÆ	I 9
Pestalozzæ	XI 62		V 83
remotiflora	XI 77. Errata.		VI 22
podocarpa	XI 68		VIII 33
pulchella	» 76	Carum brachycarpum	X 22
Raveyi	IV 32	cylindricum	» 23
repanda	XI 76	ferulæfolium	» 22
rigida	» 76	Græcum	VI 38
rupicola	VII 17	Catabrosa variegata	V 71
salicifolia	XI 76	violacea	VII 126
sclerotricha	» 66	Celsia Aucheri	XII 29
Sibthorpiana	» 77	Cilicia	» 30
Sinaï	» 76	Luciliæ	IV 63
stellaris	» 63	pinetorum	XII 30
stenophylla	» 77	pyroliformis	» 29
stenosiphon	VII 18	Cephalanthera cucullata	XIII 12
stylidioides	XI 77	Cephalaria ambrosioides	II 108
sulphurea	» 64	dichætophora	VI 71
teucrioides	IV 32	juncea	» 72
trichopoda	XI 68	Kotschyi	X 76
virgata	» 77	setosa	II 107
CAMPANULACEÆ	IV 32		VI 71
	VII 16	stellipilis	X 76
	XI 60	Cephalorrhynchus	
CAPPARIDÆ	I 5	Aucheri	VII 11
	VI 20	glandulosus	IV 28
Capparis coluteoides	I 3	Centaurea Ainensis	X 117
mucronifolia	I 3	Aphrodisea	VI 17
parvifolia	I 4	aminocyanus	X 109
Capsella grandiflora	I 76	araneosa	» 121
Cardamine Olympica	VIII 19	arifolia	» 112
Carlina frigida	VI 109	Antiochia	» 113
Libanotica	X 93	brevicaulis	» 120
Carduncellus eriocephalus	» 100	Cadmea	IV 16
Carduus armatus	VI 104	calolepis	VI 129
Cronius	» 105	Candolleana	» 127
Esdraëlonicus	X 90	Cariensis	IV 19
Tmoleus	IV 21	cardunculus	VI 133
Carex Kotschyana	XIII 58	Castellana	» 129
Caroxylon tancifolium	XII 98	Cassia	X 108
Carpoceras hastulatum	VIII 38	chrysoleuca	IV 21

Centaurea crocodylioides D.	X	p. 118	Cerastium scaposum Diag. VIII	p. 104
Damascena	»	112	Tmoleum	V 86
dichroa	»	111	Cerasus brachypetala	VI 52
dumulosa	»	111	prostrata	
Euphratica	VI	123	var. concolor	X 2
Græca	»	128	Ceratocapnos Palæstina	VIII 12
Hellenica	»	131	Cerintho cleiostoma	IV 44
Hermonis	X	122	Ceruana Schimper	XI 4
Hierapolitana	IV	15	Chærophyllum Creticum	X 51
hyalolepis	»	135	Chamæmelum ambiguum	XI 20
Idæa	X	119	auriculatum	» 23
intricata	VI	150	callosum	» 22
Ispahanica	»	153	Caucasicum	» 20
leptocephala	X	110	decipiens	» 22
Lycia	»	109	disciforme	» 21
Lydia	IV	20	elongatum	» 20
Macedonica	VI	130	inodorum	» 21
mathiolifolia	IV	19	maritimum	» 21
microlonchoides	VI	127	microcephalum	» 25
onopordifolia	X	114	oreades	» 21
Pamphylica	»	120	præcox	» 21
Persica	VI	132	trichophyllum	» 21
Pestalozzæ	X	118	uniglandulosum	» 21
phyllocephala	IV	134	Cheirolepis Cappadocia	X 107
Pinardi	»	17	drabifolia	» 107
polypodiifolia	VI	126	Kotschy	» 107
procurrens	X	119	Libanotica	» 107
pseudo-Behen	VI	127	Persica	» 108
regia	»	133	Chenolea Arabica	XII 97
Reuteri	»	18	Asphaltica	» 98
sclerolepis	»	156	CHENOPODIACEÆ	VIII 82
scopulorum	X	115		XII 93
Smyrnæa	IV	20	Chesneya Kotschy	VI 34
speciosa	X	116	Chionodoxa Cretica	XIII 24
spicata	»	115	Luciliæ	V 61
Spruneri	VI	132	nana	XIII 24
Centranthus elatus	X	75	Chondrilla acantholepis	XI 48
juncus	»	73	pusilla	VII 11
macrosiphon	III	57	Chrysanthemum	
Cerastium cœruleum	I	53	trichophyllum	IV 10
	VIII	104		XI 21
fragillimum	I	54	Chrysophtalmum	
laxum	VI	25	dichotomum	» 5
macranthum	V	83	montanum	» 5
Persicum	I	54		

Crypsis pygmæa	Diagn. XIII	p. 43	Conringia Persica	Diagn. VI	p. 12
Cicer ervoides	IX	130	Conyza intermedia	XI	6
Judaicum	•	131	CONVOLVULACEÆ	IV	40
minutum	•	130		VII	22
oxyodon	•	129		XI	84
subaphyllum	VI	44	Convolvulus acanthocladus	VII	27
Cirsium aduncum	VI	104	cephalopodus	•	24
cephalotes	•	102	cephalophorus	•	22
hygrophilum	X	89	chondrilloides	XI	83
hypopsilum	VI	101	Cœlesyriacus	•	85
Kotschyanum	•	103	commutatus	•	81
laniflorum	•	104	compactus	IV	40
Lycaonicum	X	90	evolvuloides	VII	25
Persicum	VI	103	gonocladus	•	22
rigidum	•	104	Kotschyanus	•	23
serrulatum	•	104	leiocalycinus	•	28
strigosum	•	104	leptocladus	•	25
Cissus vitifolia	•	31	Libanoticus	XI	82
CISTINEÆ	VII	49	lycioides	VII	28
Clematis Ispahanica	VI	3	Mascatensis	VII	25
Cleome oxypetala	•	20	modestus	XI	82
Clypeola microcarpa	I	74	oxyphyllus	VII	26
Cochlearia aphragmodes	VI	15	oxysepalus	•	23
COLCHICACEÆ	V	66	Palæstinus	XI	84
	XIII	37	peduncularis	•	84
Colchicum Ægyptiacum	V	66	Schimperianus	•	81
crocifolium	•	67	Schirzianus	•	82
Kotschy	XIII	38	spinosus	VII	27
Colutea melanocalyx	IX	35	strigulosus	XI	83
Persica	VI	33	virgatus	VII	25
COMBRETACEÆ	•	54	ulicinus	•	26
COMPOSITÆ CORYMBIFERÆ			Cornicina pseudocytisus	II	15
	IV	3		Emend.	
	VII	71	Coronilla emeroïdes	II	101
	XI	1	grandiflora	V	88
COMPOSITÆ CYNAREÆ	IV	15	Libanotica	IX	104
	VII	97	Corydalis rupestris	VI	8
	X	82	var. bracteata	VIII	11
COMPOSITÆ CICHORACEÆ			rutæfolia		
	IV	23	var. subuniflora	•	11
	VII	3	Cotoneaster peduncularis	III	8
	XI	33	Crotalaria furfuracea	II	6
CONIFERÆ	VII	100	Cousinia actinocephala	X	103
Conringia grandiflora	VIII	25	Aleppica	•	101
Plant. Orient. nov.					

Cousinia anisoptera	Diagn. X	p. 103	Crepis macropus	Diagn. XI	p. 57
<i>calcitrapiformis</i>	"	103	<i>Mungierii</i>	"	55
<i>calolepis</i>	VI	116	<i>Raulini</i>	"	58
	X	103	<i>Reuteriana</i>	"	55
<i>chamæpeuce</i>	VI	120	<i>robertioides</i>	"	59
	X	103	<i>Sibthorpiana</i>	"	56
<i>cylindracea</i>	VI	115	<i>Sieberi</i>	"	53
<i>cymbolepis</i>	"	119	Crocus Aucheri	XIII	16
	X	103	<i>candidus</i>	"	17
<i>eryngioides</i>	"	101	<i>Pestalozzæ</i>	"	17
<i>gracilis</i>	VI	117	<i>Spruneri</i>	VII	102
<i>Hermonis</i>	X	102	<i>Thessalus</i>	XIII	17
<i>hypoleuca</i>	"	103	Crucianella Bithynica	X	58
<i>involutrata</i>	VI	114	<i>bracteata</i>	III	29
	X	103	<i>disticha</i>	"	25
<i>Kotschy</i>	VI	120	<i>galioides</i>	"	29
	X	103	<i>Græca</i>	"	25
<i>lasiolepis</i>	VI	118		X	59
<i>minuta</i>	"	117	<i>imbricata</i>	"	59
	X	103	<i>Kotschyana</i>	III	28
<i>oligocephala</i>	VI	116	<i>macrostachya</i>	"	27
<i>Olivieri</i>	X	103	<i>membranacea</i>	"	27
<i>pinarocephala</i>	VI	121	<i>penicillata</i>	"	26
<i>Schultziana</i>	X	103	<i>sherardioides</i>	"	24
<i>serratuloides</i>	VI	118	<i>Syriaca</i>	X	58
	X	103	CRUCIFERÆ	I	69
<i>silyboïdes</i>	"	103		V	80
<i>sphærocephala</i>	"	103		VI	9
<i>squarrosa</i>	"	102		VIII	15
<i>stenocephala</i>	VI	115	CUCURBITACEÆ	X	7
<i>xiphiolepis</i>	"	121	Cuscuta Kotschyana	VII	29
	X	103	<i>Palæstina</i>	XI	86
Crambe Kotschyana	VI	19	<i>Schiraziana</i>	"	86
CRASSULACEÆ	III	14	Cylamen Cilicium	"	79
	VI	55	Cyclotaxis Palæstina	X	49
<i>Crenosciadium siifolium</i>	X	14	Cymboseris Palæstina	XI	51
Crepis Athoa	"	51	Cynara Sibthorpiana	X	94
<i>Bithynica</i>	XI	57	<i>Syriaca</i>	"	94
<i>Cretica</i>	IV	29	Cynoglossum Sphacioticum	XI	125
<i>crocifolia</i>	XI	53	CYPERACEÆ	XIII	38
<i>divaricata</i>	VII	14	Cyperus Heldreichianus	"	39
<i>Elbrusensis</i>	"	14	<i>Persicus</i>	"	39
<i>Hierosolymitana</i>	XI	58	Cytisus Cassius	IX	5
	"	54	<i>chrysotrichus</i>	II	12

Cytisus Creticus	Diagn.	IX	p. 3	Dianthus stenocephalus D.	I	p. 19
drepanolobus		IX	6		VIII	64
eriocarpus		II	11	stramineus	"	70
parviflorus		II	9	viscidus		
pterocladus		II	10	var. Tymphrestea	"	64
Smyrnæus		II	10	xylorrhizus	VIII	67
Tmoleus		II	11	Diceratella canescens	V	80
				floccosa	"	80
Dactylis rigida		XIII	60	Didymophysa Aucheri		
Daphne acuminata		XII	103	var. stenophylla	VIII	36
Daucus microsciadius		X	47	DIPSACEÆ	II	107
Delphinium cinereum		I	67		V	88
cyphoplectrum		VI	7		X	76
Kurdicum		I	67	Dipterocome pusilla	Emend.	
lanigerum		VIII	10	Dionysia aretioides	VII	68
lithaburense		"	9	bryoides	"	66
micranthum		I	68	cæspitosa	"	67
Raveyi		I	66	diapensiæfolia	"	65
saniculæfolium		VI	6	Michauxii	"	67
sclerocladum		VIII	8	odora	"	67
Dianthus actinopetalus		"	67	revoluta	"	65
Anatolicus		I	22	Doronicum cacaliæfolium	XI	31
atomarius		VIII	71	reticulatum	IV	12
calocephalus		VI	23	Dorycnium Anatolicum	IX	51
cinnabarinus		"	22	Dorystæchas hastata	XII	55
Cous		I	20	Draba Cretica	VIII	27
erinaceus		I	21	oxycarpa	"	28
hymenolepis		VIII	64	macrocarpa	"	28
hypochlorus		"	67	Dracocephalum Aucheri	V	25
Judaicus		"	66		VII	54
Kotschyanus		"	68	Kotschyi	VII	53
Lydius		I	20	Drosanthe fimbriata	VIII	116
macranthus		I	23	helianthemoides	"	116
macrolepis		I	18	hirtella	"	116
		VIII	64			
micranthus		"	69	Ebenus barbigera	II	98
microlepis		I	22		Emend.	
multipunctatus		VIII	65	laguroïdes	II	99
Olympicus		I	19		Emend.	
		VIII	64	stellata	II	100
parviflorus		I	21		Emend.	
polycladus		VIII	65	Echinops adenocaulos	X	88
Sinaicus		I	23	albidus	VI	97
Sphaciottens		VIII	70	Aucheri	"	98

Echinops Bithynicus Diagn. VI p. 100		Erigeron Zerdanum Diagn. VI p. 82	
Bovei	» 99	Erित्रichium Persicum	XI 123
ceratophorus	» 100	Erodium cinereum	VIII 118
Creticus	X 87	bryoniæfolium	I 64
echinophorus	» 87	Hussoni	VIII 119
Heldreichii	» 84	leucanthum	I 60
Hussoni	» 86		VI 34
Kotschy	VI 99	pelargoniiiflorum	VIII 120
lasioclinus	X 89	Sibthorpiunum	I 60
macrochætus	» 85	tuberosum	VIII 118
polyceras	» 88		Emend.
Sartorianus	VI 97	Ervum Biebersteinii	
Syriacus	X 84	var. Hymettia	IX 115
Taygeteus	VI 98	cyaneum	» 115
Echinophora Anatolica	X 37	Kotschyunum	VI 47
Echinospermum Cariense	IV 41	Orientale	IX 115
	XI 124	Erucaria grandiflora	VI 13
Ispahanicum	» 123	microcarpa	VIII 47
Kotschy	VII 29	Eryngium Heldreichii	X 20
sessiliflorum	XI 124	Palmito	» 21
Echium elegans var. incana	» 93	Erysimum Boryanum	I 71
glomeratum	» 93	goniocalon	VIII 23
Marianum	» 90	laciniatum	I 71
Pavonianum	» 91	lineare	VIII 24
polycaulon	» 92	mutabile	» 24
pomponium	» 93	nanum	» 23
Eichwaldia Persica	III 15	Persepolitunum	VI 11
Elæosticta glaucescens	X 54	strophades	VIII 24
nodosa	» 94	Erythræa gypsicola	V 89
meifolia	» 51	EUPHORBIACEÆ	» 51
Enarthrocarpus			VII 86
strangulatus	VIII 44		XII 107
Enneapogon Persicus	V 71	Euphorbia altissima	V 52
	XIII 43	anacampseros	» 55
Ephedra foliata	VII 100	arvalis	XII 116
Epipactis veratrifolia	XIII 11	Aucheri	VII 94
Eremostachys glabra	XII 90	aulacosperma	XII 117
Eremurus Aucherianus	VII 112	cardiophylla	» 107
Persicus	» 119	Cassia	» 108
Erigeron amorphoglossum	VI 80	cheiradenia	» 112
Elbrusense	XI 1	craspedia	VII 95
Kotschy	VI 82	Cybirensis	» 89
nivale	» 82		XII 109
Persicum	» 81	var. β acutifolia	» 109

Euphorbia Damascena	D.	XII	p. 113	Fagonia parviflora	Diagn.	VIII	p. 124
dumosa	»	110		Sinaïca	I	61	
erioclada	VII	88		subinermis	I	62	
eriphora	V	81		Thebaïca	VIII	121	
erubescens	VII	90		Farsetia multicaulis	»	31	
erythradenia	»	92		ovalis	»	32	
erythron	XII	114		umbellata	VI	13	
Galilæa	»	116		Ferula sancta	X	39	
Græca	V	83		Sinaïca	»	40	
hebecarpa	VII	90		Ferulago Cassia	»	40	
Hierosolymitana	XII	110		cinerea	VI	60	
Ispahanica	VII	91		frigida	X	39	
Kotschyana				geniculata	»	36	
var. thyrsoides	XII	111		nodosa	»	37	
macroclada	V	84		pauciradiata	»	37	
Marschalliana	VII	91		Syriaca	»	38	
megalantha	»	95		Festuca Cylleica	XIII	58	
microsciadia	»	89		sclerophylla	»	59	
microsphæra	»	87		Ficus Johannis	VII	96	
monticola	»	93		Persica	»	97	
notadenia	XII	111		FRANKENIACEÆ	VI	25	
osyridea	VII	87		Fraxinus Persica	XI	78	
plebeia	»	93		Syriaca	»	77	
Persepolitana	»	92		rostrata	»	76	
Pestalozza	XII	114		Fritillaria acmopetala	VII	104	
polycaula	»	112		conica	»	105	
Reuteriana	»	113		gibbosa	»	107	
schizoceras	V	85		Græca	»	104	
sessiliflora	»	82		Lycia	XIII	20	
striata	VII	91		Pinardi	VII	106	
Eunomia Moricandiana	V	85		Reuteri	V	87	
subulata	VIII	42		Fumaria Anatolica	VIII	14	
Evax Anatolica	XI	2		Gussonii	»	13	
contracta	»	3		Judaïca	VII	15	
eriosphæra	»	3		megalocarpa	I	68	
Palæstina	»	2		oxyloba	VIII	14	
				Reuteri	»	13	
Fagonia acerosa	VIII	124		FUMARIACEÆ	I	68	
Aucheri	I	62			V	79	
echinella	VIII	123			VI	78	
grandiflora	»	121			VIII	11	
Kahirina	»	122					
myriacantha	»	123					

Gagea amblyopetala	Diag. VII	p. 107	Galium peplidifolium	Diag. III	p. 46
<i>Persica</i>	•	108	<i>Pestalozzæ</i>	X	65
<i>rigida</i>	•	109	<i>Philisteum</i>	•	71
Galium Aleppicum	III	50	<i>pisiferum</i>	•	67
<i>aretioides</i>	•	42	<i>serotinum</i>	•	71
<i>Aucheri</i>	•	41	<i>Syriacum</i>	III	47
<i>bracteatum</i>	•	51	<i>thymifolium</i>	VI	67
<i>Cappadocicum</i>	•	45	<i>Tmoleum</i>	III	59
<i>Cassium</i>	X	68	<i>trachyanthum</i>	•	50
<i>caudatum</i>	III	48	<i>vulcanicum</i>	X	70
<i>ceratocarpon</i>	•	55	Genista Anatolica	II	8
<i>ceratopodium</i>	•	45		IX	3
<i>citraceum</i>	VI	69	<i>Antiochia</i>	•	4
<i>consanguineum</i>	•	69	<i>Aucheri</i>	II	7
<i>Creticum</i>	X	66	<i>Cassia</i>	IX	3
<i>Decaisnei</i>	VI	69	<i>Libanotica</i>	•	3
<i>delicatulum</i>	X	65	<i>liparioides</i>	II	6
<i>demissum</i>	III	40	<i>Lydia</i>	•	8
<i>diploprium</i>	X	66		IX	4
<i>dumosum</i>	III	44	<i>Melia</i>	•	2
<i>effusum</i>	•	55	<i>Pestalozzæ</i>	•	4
<i>Judaicum</i>	X	69	Gentiana gelida		
<i>jungermannioides</i>	III	45	var. <i>prostrata</i>	XI	79
<i>Kotschyanum</i>	•	56	GENTIANEÆ	V	89
<i>Kurdicum</i>	•	57		XI	79
<i>Laconicum</i>	VI	66	GERANIACEÆ	I	58
<i>lasiocarpum</i>	III	42		VI	30
<i>leiophyllum</i>	•	56		VIII	106
<i>Lycium</i>	X	71	Geranium Atlanticum	I	59
<i>megalanthum</i>	VI	67	<i>crenophilum</i>	VIII	117
<i>melanantherum</i>	•	68	<i>glaberrimum</i>	•	116
<i>mite</i>	III	57	<i>Kotschy</i>	VI	30
<i>Monacchinii</i>	X	67	<i>lasiopus</i>	VIII	117
<i>Mungierii</i>	•	68	<i>macrostylum</i>	I	58
<i>musciforme</i>	III	44	<i>Mascatense</i>	I	59
<i>nebulosum</i>	III	49	<i>trilophum</i>	VI	30
	X	69	Gladiolus Aleppicus	XIII	13
<i>nigricans</i>	III	48	<i>atro-violaceus</i>	•	14
<i>Olympicum</i>	•	41	<i>halophilus</i>	•	14
<i>Orientale</i>	•	58	<i>Kotschyanus</i>	•	15
	X	65	<i>Persicus</i>	VII	102
<i>Pamphylicum</i>	•	69	Glinus micranthus	X	11
<i>penduliflorum</i>	III	46	Glycyrrhiza brachycarpa	II	58
<i>penicillatum</i>	X	68	<i>flavescens</i>	VI	33

Gomphocarpus Sinaicus	D. XI	p. 81	Haplophyllum vulcanicum	VIII	p. 126
GRAMINEÆ	V	68	Hedysarum atomarium	IX	111
	VII	120	Aucheri	II	87
	XIII	40	callichroum	II	89
Grantia arachnoïdea	VI	79	Cappadocicum	II	87
Aucheri	"	79	criniferum	II	88
GROSSULARIACEÆ	X	19	dumetorum	IX	111
Gymnandza Armena	IV	75	Kotschy	"	111
Gypsophila Anatolica	VIII	57	'leucocladum	"	112
aretioides	I	9	Lydium	II	88
atropurpurea	VIII	58	Pestalozzæ	IX	112
Aucheri	I	12	pogonocarpum	II	87
bellidifolia	I	11	Sipyleum	II	89
caricifolia	I	14	Syriacum	II	90
Damascena	VIII	57	Helianthemum Syriacum	VIII	49
ericalyx	I	13	ventosum	"	50
frankenioides	I	10	vesicarium	"	50
var. fasciculata	VIII	58	Helichrysum Anatolicum	IV	11
glandulosa	"	59	Aucheri	XI	28
hispida	I	11	compactum	IV	12
lepidioides	I	14	conglobatum	XI	31
Libanotica	I	12	globiferum	"	29
nebulosa	VIII	58	Kotschy	VI	92
Olympica	"	55		XI	28
pilulifera	"	56	leucocephalum	"	50
ruscifolia	I	12	niveum	"	30
serpylloides	VIII	59	psychophilum	"	28
trichopoda	I	10	Tardentii	"	29
tubulosa	I	11	Heliotropium Aleppicum	"	88
virgata	I	13	Bovei	"	87
			brevilimbe	"	89
Hagioseris Amalecītana	XI	36	circinnatum	"	87
Galilæa	"	36	dissitiflorum	"	88
Haplophyllum			grandiflorum	"	86
Arabicum	VIII	127	Kunzii	"	89
canaliculatum	"	129	undulatum		
longifolium	"	127	var. tuberculosum	"	89
myrtifolium	I	63	Heracleum anisactis	X	41
pumilum	I	62	glabrescens	"	41
	VI	52	Hesperis multicaulis	VI	10
Reuteri	V	87	renifolia	VIII	22
sulphureum	V	87	secundiflora	I	70
sylvaticum	VIII	126	violacea	V	81
			Heterochroa glandulosa	I	15

Hieracium macrotrichum	D. IV	p. 29	Iphiaea horrida	Diagn. VI	p. 80
Olympicum	»	30	scabra	»	80
pannosum	»	32	Inula Anatolica	XI	6
Persicum	XI	60	cordata	IV	3
Reuterianum	IV	51	multicaulis	»	3
Sartorianum	VII	45		XI	6
Taygeteum	»	45	Iris stylosa var. angustifolia	XIII	45
Hippocrepis cornigera	I	102	suaveolens	»	45
Salzmanni	I	104	IRIDEÆ	VII	102
Hippomarathrum				XIII	45
crassilobum	X	56	Isatis Iconia	VIII	48
Holosteum tenerrimum	I	53	Kotschyana	»	48
Hordeum fragile	VII	428	raphanifolia	VI	49
lthaburense	XIII	70	Isopyrum cæspitosum	VIII	7
violaceum	»	70			
Hussonia uncata	VII	47	Jordania minuartioides	»	94
Hyoscyamus bipinnatisectus	»	36	spergulifolia	»	94
HYPERICACEÆ	I	56	Johrenia dichotoma	X	33
	VI	27	fungosa	»	33
	VIII	109	juncea	»	33
Hypericopsis Persica	VI	26	scoparia	VI	61
Hypericum Assyriacum	VIII	416	JUNCACEÆ	VII	101
atomarium	»	414	Juncus Kotschyi	»	102
Bithynicum	»	412	Persicus	»	101
Cassium	»	411	Jurinea Anatolica	IV	22
Heldreichii	»	411	Cadmea	»	22
helianthemoïdes	»	416	carduiformis	VI	144
hirtellum	»	416	erythrolepis	X	98
Kotschyianum	I	56	frigida	VI	112
leprosum	I	58	stæhelinae	»	111
Lydium	I	57			
microcalycinum	VIII	415	Kentrophyllum Anatolicum	VI	115
neurocalycinum	»	414	aureum	X	99
papillare	»	410	Creticum	»	99
Pestalozzæ	»	413	Syriacum	»	98
Rumeliacum	»	413	Knautia bidens	II	408
Spruneri	»	412	Kochia monticola	VII	82
stenobotrys	»	415	Kœleria obtusiflora	»	121
Thymphrestum	I	57	Sinaica	XIII	53
trichocaulon	VIII	410	Kœlpinia sessilis	XI	34
uniflorum	»	409		Emend.	
Iberis odorata	I	75	Koniga Arabica	VIII	26
pectinata	I	75	Kundmannia Syriaca	X	31

LABIATÆ	Diagn. V	p. 3	Leontodon Græcum	Diagn. XI	p. 39
	VII	43	Kotschyi	"	40
	XII	47	Libanoticum	"	39
Lactuca brassicæfolia	XI	49	oxylepis	"	41
intricata	IV	27	Leonurus Persicus	V	27
Persica	VII	9	Lepturus Persicus	XIII	71
polyclada	"	10	Lesquereuxia Syriaca	XII	44
scarioloides	XI	49	Leucocyclus formosus	XI	14
Lagochilus Aucheri	V	38	Leuzea sclerophylla	X	97
Lamium Armenum	VII	55	Ligularia Persica	VI	93
erythrotrichum	V	26	LILIACEÆ	V	57
	XII	87		VII	104
filicaule	"	86		XIII	19
Kotschyanum	"	86	Linaria Aucheri	VII	44
microphyllum	V	23	Cælesyriaca	XII	41
nivale	VII	54	Iconia	"	42
Robertsonii	"	54	Kurdica	IV	73
truncatum	XII	86	lineolata	XII	42
Lampsana adenophora	IV	23	longipes	"	40
Cassia	XI	53	microcalyx	IV	72
Pisidica	"	53	var. acutiloba	XII	40
ramosissima	"	54	modesta	"	43
Lappa amplissima	VI	108	monochroma	"	41
tenella	"	109	rytidosperma	IV	73
Laserpitium petrophilum	X	46	LINEÆ	I	53
Lathyrus blepharicarpos	IX	126		IV	27
Cassius	"	128		V	86
chrysanthus	VI	46		VIII	104
Hierosolymitanus	IX	127	Linum album	VI	27
hispidulus	VI	46	Anatolicum	I	56
Lycius	IX	128		Emend.	
pseudo aphaca	II	105	aretioïdes	I	53
neurolobus	IX	123	Cariense	V	86
stenolobus	"	124	carnosulum	VIII	103
stenophyllum	"	126	flavum		
Lavandula Cariensis	V	3	var. Pamphylicum	"	106
LEGUMINOSÆ	II	6	leucanthum	I	53
	V	88	Olympicum	I	56
	VI	52	Persicum	VI	27
	IX	2	Tmoleum	VIII	103
Lepidium crassifolium			virgultorum	"	103
var. ramosissimum	VIII	44	Lisæa Syriaca	X	48
erinaceum	VI	17	Lithospermum cyanochroum	VII	33
Leontodon divaricatum	XI	42		XI	113
Plant. Orient. nov.					40

Lithospermum Kotschyi	D. IV	p. 49	Mattia brachyantha	Diagn. XI	p. 127
Lolium lepturoides	XIII	67	Matthiola aspera	VIII	16
Persicum	"	66	Damascena	"	16
Lotus Aleppicus	IX	33	flavida	VI	9
Aucherii	" II	38	ovatifolia	"	9
	IX	38	sinuata		
Carmeli	"	34	var. bracteata	VIII	13
Castellanus	"	34	Medicago Galilæa	IX	10
divaricatus	II	37	hybrida	"	12
halophilus	II	37	laciniata		
lamprocarpus	IX	33	var. brachyacantha	"	10
Libanoticus	"	32	lunata	"	12
sulphureus	II	35	papillosa	II	24
thermalis	II	35	rotata	II	24
tingitanus	II	36	Melica breviflora	VII	124
unifultus	II	36	Cretica	XIII	54
Lupinus Forskahlei	IX	10	eligulata	"	56
Græcus	II	15	Hohenackeri	"	54
leucospermus	IX	8	inæquiglumis	VII	124
Palæstinus	"	9	micrantha	XIII	53
			pannosa	"	55
			Persica	VII	124
Malabaila involucrata	X	42		XIII	55
Kotschyi	"	42	rectiflora	"	56
sekakul	"	42	trachyantha	VII	125
Malcomia bicolor	VI	10	vestita	"	125
Græca	I	71	Melilotus Armena	IX	11
Malva oxyloba	VIII	109	Meliocarpus microcarpus	X	53
MALVACEÆ	VI	28	peduncularis	"	52
	VIII	106	Melissa teucrioides	VII	49
Marrubium brachyodon	VII	58		XII	67
crassidens	V	38	Merendera Attica	V	67
Friwaldskyanum	XII	74	Persica	XIII	37
Hermonis	"	74	Mericarpæa vaillantioïdes	III	52
Kotschyi	V	52	Michauxia thyrsoidea	XI	61
Libanoticum	XII	73	Micromeria hispida	XII	48
lutescens	V	34	Libanotica	"	50
micranthum	XII	73	myrtifolia	V	19
polyodon	"	78	nummularifolia	XII	49
rotundifolium	V	35	Persica	VII	48
Matricaria oreades	VI	87	Sphaciotica	XII	48
	XI	21	staminea	V	19
trichophylla	VI	88		XII	51
	XI	21	xylorrhiza	"	49

Milium trichopodum Diag. XIII p. 45		Nepeta depauperata Diagn. VII p. 51	
Millina Arabica	XI 58	erodiifolia	V 24
hispidula			XII 67
var. tenuifolia	XI 58	Dænensis	VII 53
Persica	VII 3	glomerulosa	V 21
	XI 58	Ispahanica	• 23
Mönchia cœrulea	VIII 104	Isaurica	XII 63
Moltkia Anatolica	XI 114	Kotschyi	VII 50
aurea	IV 49	leucostegia	XII 62
Monsonia hispida	VIII 120	oxyodonta	VII 51
Moricandia dumosa	• 23	macrosiphon	• 51
Sinaica	• 26	marrubioïdes	XII 67
Morettia canescens	• 17	Persica	• 66
Philæana	• 17	Pisidica	• 68
Moriera umbellata	VI 16	satureioïdes	V 24
Munbya densiflora	XI 116	Schiraziana	VII 52
cephalotes	• 116	scorodonia	XII 65
conglobata	• 116	Tmolea	V 22
cyanochroa	• 108	viscida	• 20
perennis	• 115	Nephelochloa Orientalis	• 73
Muscari longipes	XIII 37	Nerium Kotschyi	VII 21
Myopordon Aucheri	VI 108	Nigella bicolor	VIII 8
Persicum	• 107	elata	I 66
Myosotis Abyssinica	XI 123	stellaris	VII 7
Cadmæa	• 122	Nonnea auriculata	XI 95
Cretica	• 121	Euphratica	• 97
hispida		macrosperma	• 97
var. grandiflora	• 123	melanocarpa	• 96
Idæa	• 121	Persica	VII 32
Olympica	IV 50		XI 97
		Philistæa	• 96
		Reuteriana	• 98
Nardurus Orientalis	VII 127		
Nasturtium aureum	VIII 17	Odontites Aucheri	IV 73
Hispanicum	• 18	ixodes	VII 45
macrocarpum	• 18	OLEACEÆ	XI 77
Niloticum	• 19	Omphalodes Cariensis	IV 41
Nepeta Andrica	XII 64		XI 130
Cadmea	V 21	Luciliæ	IV 41
camphorata	VII 49	Pavoniana	XI 128
cephalotes	V 20	Persica	VII 50
curviflora	• 22		XI 129
Cilicia	XII 64	Onobrychis æquidentata	IX 109
concolor	• 65		

Onobrychis argyrea	Diagn.	IX p. 107	Onosma Kotschyi	Diagn.	VII p. 34
Aucheri	II	94	mite	XI	111
aurantiaca	IX	103	oreodoxum	XI	103
	"	108	pachypodium	"	104
Cadmea	II	96	pallidum	"	112
ebenoides	II	97	Rascheyanum	"	110
expansa	IX	103	scaberrimum	"	113
Gärtneriana	"	107	sericeum	"	101
galegifolia	II	91	Spruneri	"	109
heliocarpa	II	95	stellulatum	"	112
hypargyrea	II	91	stenosiphon	VII	55
lanata	II	92	strigosissimum	XI	102
lasioslacha	II	96	Taygetum	"	101
lunata	II	95	trachyanthum	VII	34
megataphros	II	97	trachytrichum	XI	103
melanotricha	VI	43	velutinum	"	105
nitida	II	92	xanthotrichum	"	109
oxyptera	VI	44	Opopanax Persicum	X	36
oxydonta	II	98	ORCHIDEÆ	V	56
pannosa	IX	105		XIII	10
Pisidica	"	107	Orchis Anatolica	V	56
psoraleæfolia	II	93	sepulchralis	XIII	10
scrobiculata	II	95	Origanum Libanoticum	V	14
Ononis adenotricha	II	14	scabrum	VII	48
Onopordon Alexandrinum	X	93	Orlaya anisopoda	X	46
anisacanthum	"	93	Ormosolenia Pisidica	"	34
Argolicum	"	91	Ornithogalum Aucheri	V	63
bracteatum	"	91	nivale	V	68
carduiforme	"	92	platyphyllum	"	64
floccosum	"	92	Orobis nervosus	VI	45
Græcum	VI	106	Orientalis	II	106
Onosma Aleppicum	XI	107	Persicus	II	107
brachyanthum	VII	34	trachycarpus	VI	45
brachysolen	XI	104	Otostegia Aucheri	V	40
bulbotrichum	"	108	Kotschyi	VII	59
Cassium	"	102	microphylla	V	39
cœrulescens	"	110	Oxytropis Aucheri	II	41
dasytrichum	VII	33	chrysocarpa	VI	34
dichroanthum	XI	107	Kotschyana	IX	36
flavidum	"	100	Persica	II	40
Græcum	"	106	Pancratium tortifolium	XIII	18
halophilum	"	103	PAPAVERACEÆ	VI	7
Helveticum	"	111		VIII	10
Isauricum	"	101			

<i>Papaver tenuifolium</i> Diag. VIII p. 40		<i>Peucedanum</i>	
<i>umbonatum</i> „ 41		<i>pastinacæfolium</i> Diag. X p. 35	
<i>Pappophorum Aucheri</i> XIII 43		<i>Phaca ovigera</i> VI 55	
<i>Paracaryum angustifolium</i> XI 131		<i>Zerdana</i> „ 54	
<i>Aucheri</i> „ 131		<i>Phæopappus carthamoides</i> „ 125	
<i>azureum</i> „ 131		<i>cheirolophus</i> X 108	
<i>Cariense</i> „ 130		<i>leuzeoides</i> VI 124	
<i>corymbiforme</i> „ 131		<i>macrocephalus</i> „ 124	
<i>cristatum</i> „ 131		<i>spectabilis</i> „ 124	
<i>glastifolium</i> „ 131		<i>Szowitsii</i> „ 125	
<i>hirsutum</i> „ 130		<i>Phagnalon affine</i> „ 74	
<i>lamprocarpum</i> „ 131		<i>Græcum</i> XI 6	
<i>leptophyllum</i> „ 131		<i>Persicum</i> VI 74	
<i>longiflorum</i> IX 132		<i>Phleum gibbum</i> V 69	
<i>micranthum</i> XI 129		<i>Græcum</i> XIII 42	
<i>mysotoïdes</i> „ 130		<i>Phlomis anisodonta</i> V 37	
<i>Persicum</i> „ 129		<i>Armeniaca</i>	
<i>rugulosum</i> „ 129		<i>var. brachyodon</i> XII 88	
<i>undulatum</i> „ 129		<i>Aucheri</i> V 36	
<i>Parlatoria rostrata</i> VIII 22		<i>chrysophylla</i> XII 89	
<i>Parietaria multicaulis</i> XII 106		<i>cymifera</i> VII 60	
<i>Paronychia chionæa</i> III 9		XII 90	
<i>desertorum</i> „ 11		<i>lanceolata</i> V 36	
<i>flavescens</i> X 14		<i>Persica</i> „ 37	
<i>Kochiana</i> „ 13		<i>Syriaca</i> XII 89	
<i>Kurdica</i> III 10		<i>Phyteuma asperum</i> XI 72, 77	
<i>macrosepala</i> „ 11		<i>Cappadocicum</i> „ 75, 77	
PARONYCHIEÆ „ 9		<i>cichoriforme</i> IV 37	
X 11		XI 77	
<i>Passerina Persica</i> VII 85		<i>gracile</i> „ 74, 77	
<i>Pedicularis acmodonta</i> IV 84		<i>Kotschyi</i> „ 71, 77	
<i>Cadmea</i> „ 82		<i>linifolium</i> „ 73, 77	
<i>elephas</i> „ 81		<i>Lycium</i> „ 76, 77	
<i>Olympica</i> „ 82		<i>Pestalozzæ</i> „ 74, 77	
<i>pycnantha</i> XII 43		<i>Sibthorpianum</i> IV 36	
<i>Sibthorpii</i> IV 83		XI 77	
<i>Pennisetum Tiberiadis</i> XIII 45		<i>stylidioides</i> „ 73, 77	
<i>Pentanema Aucheri</i> VI 73		<i>Picris campylocarpa</i> XI 37	
<i>multicaule</i> VI 73		<i>cyanocarpa</i> „ 37	
<i>Petrocallis fenestrata</i> VIII 27		<i>Olympica</i> IV 26	
<i>Peucedanum cupulare</i> VI 63		<i>Pimpinella apiifolia</i> X 25	
<i>Kotschyi</i> „ 62		<i>Reuteriana</i> „ 26	
<i>microcoleum</i> „ 62		<i>triradiata</i> „ 27	
<i>ovinum</i> „ 61		<i>Pistacia Palæstina</i> IX 1	

Plant. Orient. nov.

11

Piptatherum molinioides D. VII p. 121		Polygonum Kotschyannum D. VII p. 84	
Platycheete Aucheri XI 5		Libani XII 9	
glaucescens " 5		molliaforme VII 84	
glutinosa " 5		radicosum " 84	
mucronifolia " 5		serpyllaceum " 84	
PLANTAGINEÆ XII 94		thymifolium " 84	
Plantago Arabica " 94		tubulosum " 83	
PLUMBAGINEÆ VII 68		PORTULACEÆ X 11	
XII 92		Potentilla adenophylla III 5	
Poa Attica XIII 57		argyroloma X 6	
Pamphylica " 58		Cappadocica III 6	
psychrophila " 57		Cilicia III 7	
Pocockia Arabica IX 12		Ellwindensis VI 51	
Aucheri " 12		Kurdica III 4	
Cachemirica " 12		Libanotica " 4	
Cretica II 16		Meyeri " 7	
elliptica IX 12		nuda VI 49	
glomerata " 12		poetarum III 5	
Græca II 16		polyschista X 6	
Kotschyi IX 12		poteriifolia VI 50	
lunata " 12		radicosa " 49	
platycarpus " 12		xylorrhiza X 5	
radiata " 12		Poterium compactum " 7	
Ruthenica " 12		Prangos asperula " 54	
Podocytisus Caramanicus " 7		pauciradiata " 55	
Podonosma Sytiaca XI 114		Pestalozzæ " 55	
Podospermum Cariense IV 24		Primula capitellata VII 64	
eriospermum VII 5		PRIMULACEÆ IV 37	
phæopappum " 5		VII 64	
villosum " 7		XI 79	
Pogonostigma Arabicum II 39		Psammoseris Arabica " 52	
Nubicum II 40		senecioides " 52	
Polycarpon Arabicum X 13		Pterocephalus Arabicus X 78	
Polygala Arabica I 9		bellidifolius II 109	
irregularis I 8		Caramanicus X 77	
papilionacea I 8		Coulteri " 77	
pruinosa I 8		Cyprius II 110	
Emend. VI 83		Persicus VI 72	
POLYGALACEÆ I 8		Pinardi V 88	
POLYGONACEÆ V 45		pyrethrifolius II 109	
VII 83		strictus II 110	
XII 99		Pterochæte Aucheri VI 77	
Polygonum histortoides V 46		XI 5	
dumosum VII 83		glaucescens VI 78	

Pterochaete glaucescens Diag. XI p. 5			Ranunculus		
glutinosa	VI	77	macrorrhynchus	D. VI pag. 5	
	XI	5	Orientalis	VIII	2
mucronifolia	VI	78	Palæstinus	"	4
	XI	5	Peloponnesiacus	I	63
Pteroneurum Græcum			Reuterianus	I	63
var. lasiocarpa	VIII	20	Sprunerianus	I	64
Pteropyrum gracile	XII	102	trigonocarpus	VIII	2
Ptosimopappus bracteatus	X	104	RESEDACEÆ	I	4
Pulicaria elata	XI	6		VI	22
gnaphalodes	VI	76		VIII	54
Pyrethrum Cadmeum	IV	10	Reseda alopecurus	"	53
Cassium	XI	23	Arabica	I	6
Dudermanum	"	26	Armena	I	5
filipendulinum	"	24	Aucherii	I	5
flavovirens	"	23	bracteata	VI	22
Kotschyi	VI	88	eremophila	VIII	54
Persicum	"	89	stenostachya	I	5
Syriacum	XI	24	tomentosa	I	4
Szowitzii	"	25	REAUMURIACEÆ	III	13
Pyrus glabra	VI	53		X	10
Syriaca	X	1	Reaumuria Palæstina	"	10
			RHAMNEÆ	II	5
				IX	1
Quercus Boissieri	XII	119	Rhamnus cornifolia	II	3
petiolaris	"	120		IX	1
pseudocerris	"	118	kurdica	II	3
			punctata	II	4
			Persica	II	4
Raphanus Aucheri	VIII	45	Rhizocephalus Orientalis	V	69
pugioniformis	"	46		XIII	43
RANUNCULACEÆ	I	63	Rhus Aucheri	II	5
	VI	3	Ribes melananthum	X	19
	VIII	3	Ricotia carnosula	VIII	30
Ranunculus amblyolobus	"	3	Cretica	"	29
bulbilliferus	"	3	sinuata	"	30
brachylobus	"	6	Rindera Græca	VII	30
Cadmicus	I	63		Emend.	
crynophilus	VIII	6	Robertia tenuifolia	XI	35
cuneatus	"	2	Rochelia peduncularis	VII	35
cupreus	"	3	Rœmeria rhœadiflora	VI	7
edulis	"	4	Romulea crocea	XIII	18
Kotschyi	VI	5	Rosa anserinæfolia	VI	51
Isthmicus	"	4	Kotschyana	X	3

<i>Rosa Libanotica</i>	Diagn. X	p. 4	<i>Salvia calycina</i>	Diagn. XII	p. 62
<i>Phœnicia</i>	"	4	<i>cedronella</i>	V	5
ROSACEÆ	III	3	<i>chionantha</i>	"	8
	VI	49	<i>dracocephaloïdes</i>	"	4
	X	4	<i>eremophila</i>	"	42
RUBIACEÆ	III	24	<i>frigida</i>	"	40
	VI	63	<i>Hierosolymitana</i>	XII	64
	X	57	<i>hypochionæa</i>	V	8
<i>Rubia Aucheri</i>	III	54	<i>Judaïca</i>	XII	64
<i>brachypoda</i>	X	57	<i>Kotschyi</i>	VII	46
<i>brevicaulis</i>	III	53	<i>macilenta</i>	V	43
<i>florida</i>	VI	74	<i>macrostiphon</i>	"	44
<i>Kotschyi</i>	"	70	<i>Peloponnesiaca</i>	VII	47
<i>pauciflora</i>	III	54	<i>Persepolitana</i>	XII	60
<i>trachyantha</i>	VI	70	<i>Pinardi</i>	"	59
<i>Rumia Kotschyi</i>	"	59	<i>Pisidica</i>	"	57
<i>Rumex Creticus</i>	XII	402	<i>polyadenia</i>	V	7
<i>Elbursensis</i>	"	400	<i>polychlonos</i>	VII	47
<i>Olympicus</i>	V	45	<i>potentillæfolia</i>	XII	58
<i>peregrinus</i>	"	46	<i>Rascheyana</i>	"	58
	XII	400	<i>Rassami</i>	VII	47
<i>Raulini</i>	"	400	<i>Reuteriana</i>	V	40
<i>subtrilobus</i>	V	46	<i>rubifolia</i>	XII	56
<i>Tmoleus</i>	XII	404	<i>santolinæfolia</i>	V	13
<i>Ruta fumariæfolia</i>	VIII	423	<i>Shiellii</i>	VII	45
RUTACEÆ	I	62		XII	62
	V	86	<i>Smyrnæa</i>	V	5
	VI	32	<i>spiræifolia</i>	"	5
	VIII	423	<i>Tmolea</i>	"	9
			<i>xanthocheila</i>	XII	59
SALICINÆÆ	VII	98	SANTALACEÆ	V	47
	XII	117		VII	86
<i>Salix acmophylla</i>	VII	98		XII	104
	XII	117	<i>Saponaria Barradensis</i>	VIII	75
<i>Daviesii</i>	VII	98	<i>fasciculata</i>	"	75
<i>dracunculifolia</i>	"	99	<i>filicaulis</i>	"	74
<i>Elbrusensis</i>	XII	117	<i>Kotschyi</i>	I	46
<i>Medemii</i>	VII	100	<i>Mesogitana</i>	I	46
<i>Persica</i>	"	99	<i>mollis</i>	VIII	72
<i>zygostemon</i>	XII	118	<i>nodiflora</i>	I	45
			<i>ocellata</i>	VIII	73
<i>Salvia Benthamiana</i>	XII	57	<i>Pamphylica</i>	"	74
<i>Cadmica</i>	V	6	<i>Persica</i>	I	48
			<i>pulvinaris</i>	VIII	74

<i>Saponaria pumilio</i>	Diagn. I	48	<i>Scleropoa pumila</i>	Diagn. XIII p.	61
	VIII	74	Memphitica	"	62
tridentata	I	47	<i>Scilla Bithynica</i>	VII	144
thymifolia	I	47	Messeniacia	"	140
	VIII	74	nivalis	V	63
Syriaca	"	73	<i>Scorzonera argyrea</i>	IV	26
<i>Sartoria hedysaroides</i>	IX	110	calyculata	XI	42
<i>Savignia Ægyptiaca</i>			Cariensis	IV	24
var. oblonga	VIII	34	cinerea	XI	44
<i>Saxifraga chrysosplenifolia</i>	III	20	elata	IV	25
corymbosa	"	47	intricata	VII	9
cymbalaria	"	24	Ispahanica	"	7
	"	25	Libanotica	XI	43
hederacea	"	24	limnophila	VII	7
Olympica	"	49	Mackmeliana	XI	44
scotophila	"	23	multiscapa	"	42
Sibthorpii	"	22	paniculata	VII	8
Spruneri	"	48	picridioides	"	6
Taygetea	X	49	radicosa	XI	43
SAXIFRAGACEÆ	III	47	stenocephala	VII	6
<i>Scabiosa Aleppica</i>	X	84	subaphylla	"	8
Anatolica	"	82	<i>Sporobolus Arabicus</i>	XIII	47
Aucherii	II	144	<i>Sporophularia Benthiana</i>	XII	39
	X	82	catariæfolia	"	36
brachycarpa	II	143	crassicaulis	"	37
breviscapa	VI	73	crenophila	VII	44
calocephala	X	80	cryptophila	XII	31
cosmoides	II	143	depauperata	IV	68
eremophila	X	79		XII	37
hispidula	II	142	farinosa	VII	40
Hymettia	II	144		XII	40
leptopoda	X	78	filicifolia	IV	70
Palæstina	"	80	frigida	VII	42
Persica	"	84	lepidota	IV	74
Reuteriana	II	142	Libanotica	XII	36
Taygetea	VI	73	Hierochuntina	"	35
tenuis	II	144	macrophylla	"	32
<i>Scaligeria Cretica</i>	X	52	marginata	IV	72
<i>Scandix Pisidica</i>	"	49	Mesopotamica	XII	34
<i>Schimpera Arabica</i>			myriophylla	"	39
var. lasiocarpa	VIII	48	oligantha	"	33
Persica	VI	48	Olympica	IV	69
<i>Sclerocephalus Arabicus</i>	III	52	Pinardi	"	71
<i>Scleropoa Philistæa</i>	XIII	64	Pisidica	XII	33

Plant. Orient. nov.

12

<i>Scrophularia polybotrys</i>	D. XII	p. 52	<i>Sestinia calycina</i>	Diagn. V	p. 44
pruinosa	»	38		XII	67
rubricaulis	»	34	ligustroides	III	53
scariosa	IV	67	<i>Sideritis condensata</i>	XII	74
Smyrnæa	»	66	Cassia	Errata.	
subaphylla	VII	41	erythrantha	»	70
Taygetea	IV	68	hololeuca	»	69
Tmolea	»	66	Lycia	»	70
xanthoglossa	XII	38	Pisidica	»	72
SCROPHULARINEÆ	IV	51	Sipylea	V	52
	VII	37	stricta	XII	72
	XII	5	Taurica		
<i>Scutellaria glechomoides</i>	»	67	var. procumbens	»	74
multicaulis	VII	64	theezans	VII	58
rupestris	»	60	<i>Silene albescent</i>	I	28
<i>Secale Anatolicum</i>	V	76	ammophila	VIII	82
<i>Sedum Assyriacum</i>	VI	35	ampullata	I	26
Bithynicum	X	46	Armena	I	29
callichroum	VI	56	Aucheriana	I	27
confertiflorum	III	43		VIII	87
Creticum	X	46	atocioïdes	V	85
Kotschyannum	VI	56	brevicaulis	I	34
Laconicum	»	53	capitellata	I	25
Lydium	III	47	chætodonta	I	39
nanum	VI	57	Cappadocica	VIII	86
Olympicum	III	46	Caramanica	»	90
Orientale	X	47	Cariensis	I	40
Palæstinum	»	48	Cassia	VIII	78
tristriatum	»	16	commelinæfolia	I	35
radicosum	»	45	delicatula	I	44
<i>Senecio Heldreichii</i>	VI	95	echinosperma	VIII	78
hypochionæus	IV	44	eriocalycina	I	28
Kotschyannus	VI	95	exsudans	VIII	76
lacerus	XI	32	gonocalyx	I	38
oligolepis	VI	94	goniocala	I	34
Olympicus	IV	45	Græca	I	36
Persicus	VI	94	grisea	VIII	88
Taygeteus	»	95	Heldreichii	»	80
Tmoleus	IV	45	Hussoni	»	76
vulcanicus	XI	31	Kotschy	I	40
<i>Serratula latifolia</i>	X	96	lasiopetala	VIII	85
<i>Seseli corymbosum</i>	»	29	lasiostyla	»	79
radicosum	»	30	Lazica	I	35
stylare	VI	60	leucophylla	I	29
			leysseroides	I	44

Silene Libanotica	Diagn. VIII p. 89	Solenanthus amplifolius	D. XI, p. 126
Lycia	» 90	cerinthoides	» 127
Lydia	I 37	petiolaris	» 128
macroclada	VIII 84	SOLANÆ	VII 36
macrodonta	I 57		XI 135
	VIII 82	Solanum Sinaicum	» 135
Makmeliana	» 89	Smyrniopsis Syriaca	X 51
melanophylla	I 24	Smyrnium cordifolium	VI 64
microphylla	I 53	Stachys acerosa	VII 57
Montbretiana	I 26	aleurites	XII 79
nodulosa	I 34	Argolica	» 83
var. Schiraziana	VIII 91	Bithynica	V 28
Olympica	I 24	bombycina	XII 79
oreades	VIII 92	burgsdorffioïdes	» 85
Palæstina	» 80	Cassia	» 76
papillosa	I 39		et Errata.
	VIII 82	chrysantha	VII 56
Pamphylica	» 81	ciliaris	XII 78
Parnassica	» 91	citrina	» 83
peduncularis	I 30	diversifolia	» 80
Pentelica	VIII 75	Garana	» 76
Persica	I 27	Græca	» 77
Pestalozzæ	VIII 87	hydrophila	» 81
physalodes	» 83	Kurdica	V 51
pinetorum	» 75	Kotschyi	» 32
pruinosa	I 23	macrocheilos	» 30
	VIII 85	macroserma	XII 84
pseudo-behen	I 36	Messenica	» 81
pungens	I 52	neurocalycina	» 85
radicosa	VI 24	obtusicrena	VII 57
rhynchocarpa	I 33	Persepolitana	» 56
	et Errata.	Pinardi	V 29
salsa	VIII 77	Pisidica	XII 75
Schimperia	I 31	pumila	» 84
Sinaica	I 25	Scyronica	V 31
spergulifolia	VIII 85		XII 83
squamigera	I 38	Spruneri	» 82
subulata	I 33	Tmolea	V 29
swertiæfolia	I 32	viticina	XII 77
tunicoides	I 34	Statice globulifera	» 93
variegata	VIII 83	Iconia	» 92
viscariaefolia	I 30	leptostachya	VII 68
Sison exaltatum	X 21	Stipa Damascena	XIII 45
Sobolewsia stylosa	VIII 41	Swertia Aucheri	V 90

Swertia longifolia	Diagn.	V	p. 90	Thesium brachyphyllum	D. V	p. 48
Symphytum Anatolicum	IV	43		Billardieri	„	48
	XI	93		compressum	XII	104
brachycalyx	IV	43		Græcum	V	47
Palæstinum	XI	94		Kotschyanum	VII	86
				THYMELEÆ	„	85
					XII	403
Tamarix deserti	X	9		Thymus Cappadocicus	V	47
Hampeana	„	9		Kotschyanus	„	16
Meyeri	„	9		Sipyleus	„	16
Tapeinanthus Persicus	XII	68		Syriacus	XII	47
Tanacetum dumosum	VI	89		teucroides	V	15
flabellifolium	XI	26		Tordylium brachytænium	X	45
heterophyllum	VI	90		Pestalozzæ	„	45
pinnatum	„	90		Torilis triradiata	„	48
Taraxacum psychrophilum	XI	48		Trachelium tubulosum	XI	61
Taverniera Ægyptiaca	IX	113		Tragopogon acanthocarpum	„	45
glabra	II	90		caricifolium	VII	4
	Emend.			Cœlesyriacum	XI	47
incana	II	90		Kotschy	„	45
	Emend.			latifolium	IV	23
Telephium Orientale	X	11		Palæstinum	XI	46
sphærospermum	„	12		Persicum	VII	4
Tephrosia Persica	II	40		Olympicum	XI	46
TEREBINTHACEÆ	II	5		nervulosum	„	47
	IX	1		Tragus brevicaulis	XIII	45
Terminalia cicutricosa	VI	54		Tribulus macropterus	I	61
Teucrium Cyprium	V	43		Sinaicum	VIII	120
leucocladum	„	44		Trifolium Anatolicum	II	31
Mascatense	„	44		aurantiacum	II	33
nivale	XII	91		Bithynicum	IX	21
Persicum	V	42		Cassium	„	25
Pestalozzæ	XII	90		caudatum	„	22
Sinaicum	„	91		dichroanthum	„	20
Smyrneum	V	42		eriosphærum	„	25
Taylorii	VII	61		erubescens	„	31
Thlaspi bulbosum	I	74		filicaule	„	24
elegans	V	82		Galilæum	„	26
microstylum	VIII	38		glanduliferum	II	30
Kotschyanum	„	39		globosum	II	28
ochroleucum	„	39			IX	25
stenopterum	„	40		leiocalycinum	II	31
Taygeteum	„	40		Mesogitanum	II	34
Theresia Libanotica	XIII	20		modestum	IX	27

Trifolium moriferum Diagn. IX p. 28		Trigonella plagioneura Diag. IX p. 46	
nervosulum	» 25	platycarpus	» 42
Palæstinum	» 24	polycarpa	» 48
Pamphylicum	» 20	Ruthenica	» 42
Parnassi	II 30	rytidocarpa	» 42
plebeium	IX 23	Sibthorpii	» 44
pilulare	II 29	sinuata	» 48
Preslianum	II 25	Spruneriana	II 47
Oliverianum	II 29		IX 15
	IX 25	Smyrnæa	II 49
Ottonis	II 28	stragulata	IX 47
radicosum	IX 27	velutina	II 48
Roussæanum	II 26	Trisetum glumaceum	XIII 49
rytidosemium	IX 29	lineare	» 49
sclerorhizum	» 28	macrochætum	» 48
scutatum	II 27	Noëanum	» 48
setiferum	II 32	Triticum Bœoticum	» 69
Smyrnæum	II 25	Tulipa Cretica	» 49
speciosum	II 33	montana	
	IX 34	var. chrysantha	» 49
stenophyllum	» 50	undulatifolia	V 57
Tenoreanum	II 26	Tunica Arabica	VIII 62
xerocephalum	II 32	graminea	» 60
Trigonella aurantiaca	II 22	hispidula	» 62
Aucheri	II 20	Olympica	» 61
	IX 42	Syriaca	» 63
Caschemirica	» 42	Sibthorpii	» 64
capitata	II 47	Thessala	» 63
Cariensis	II 24		
Cassia	IX 43	UMBELLIFERÆ	VI 58
Cœlesyriaca	» 49		X 20
crassipes	II 23	Umbilicus chrysanthus	» 45
elliptica	II 20	Gaditanus	VI 58
	IX 42	lineatus	X 45
	Emend.	oxypetalus	III 45
filipes	IX 46	Persicus	III 14
glomerata	» 42	Sprunerianus	VI 57
Hlerosolymitana	» 45	tropæolifolius	III 14
lilacina	» 47	URTICÆ	VII 96
lunata	II 49		XII 406
	IX 42		
macrorrhyncha	II 24	Vaillantia aprica	X 72
ovalis	IX 12	aristata	VI 65
Persica	II 22		

Plant. Orient. nov.

<i>Valeriana hispidula</i> Diagn.	III	p. 56	<i>Verbascum maerocarpum</i> D.	XII	p. 6
<i>oligantha</i>	X	72	<i>mallophorum</i>	VII	59
VALERIANEÆ	III	56	<i>Mesopotamicum</i>	XII	24
	X	72	<i>myriocarpum</i>	•	21
<i>Valerianella</i> Aucheri	III	58	<i>napifolium</i>	IV	60
<i>dactylophylla</i>	X	73	<i>Olympicum</i>	•	54
<i>diodon</i>	III	57	<i>orgyale</i>	XII	13
<i>diplusodon</i>	X	74	<i>Pestalozzæ</i>	•	23
<i>Kotschy</i>	III	60	<i>Pinardi</i>	IV	62
<i>Persica</i>	•	58	<i>Pisidicum</i>	XII	16
<i>obtusiloba</i>	•	59	<i>Prusianum</i>	VII	57
<i>remota</i>	X	75	<i>ptychophyllum</i>	XII	8
<i>Soyeri</i>	•	74	<i>pumilum</i>	•	20
<i>tuberculata</i>	III	59	<i>pychnostachyum</i>	•	11
<i>Velezia fasciculata</i>	VIII	92	<i>Rascheyanum</i>	•	18
<i>Verbascum adenophorum</i>	IV	64	<i>ringens</i>	•	15
<i>alyssifolium</i>	•	58	<i>rubricaulæ</i>	•	23
<i>Antiochium</i>	XII	9	<i>salviæfolium</i>	IV	55
<i>asperulum</i>	IV	57	<i>Sartorii</i>	VII	58
<i>astrophyllum</i>	XII	13	<i>scaposum</i>	XII	26
<i>Beryteum</i>	•	28	<i>Schimperianum</i>	•	11
<i>Bithynicum</i>	IV	63	<i>splendidum</i>	IV	53
<i>bombyciferum</i>	•	52	<i>Smyrnæum</i>	•	61
<i>Cæsareum</i>	XII	7	<i>stachydifolium</i>	XII	25
<i>campestre</i>	•	5	<i>stenocarpum</i>	•	18
<i>cedreti</i>	•	19	<i>stenophyllum</i>	•	17
<i>cerinum</i>	•	21	<i>taraxacifolium</i>	IV	59
<i>cheiranthifolium</i>	IV	56	<i>Tiberiadis</i>	XII	26
<i>chrysorrhacos</i>	•	58	<i>Tripolitanum</i>	•	9
<i>crenatifolium</i>	•	51	<i>vulcanicum</i>	•	6
<i>Daënense</i>	VII	38	<i>Veronica</i> Aucheri	IV	80
<i>Damascenum</i>	XII	19	<i>cæspitosa</i>	•	79
<i>detersile</i>	•	15	<i>campylopoda</i>	•	80
<i>denudatum</i>	•	25	<i>Cariensis</i>	•	75
<i>elegans</i>	•	12		XII	47
<i>epixanthinum</i>	VII	59	<i>Elbruzensis</i>	•	46
<i>Galilæum</i>	XII	8	<i>erinoides</i>	IV	78
<i>glomeratum</i>	IV	52	<i>leiocarpa</i>	XII	45
<i>Kotschy</i>	•	56	<i>macropoda</i>	IV	79
<i>insulare</i>	XII	14	<i>micropoda</i>	•	76
<i>Isauricum</i>	•	22	<i>montioides</i>	VII	45
<i>leptocladum</i>	•	10	<i>oxycarpa</i>	•	44
<i>leuconeurum</i>	•	27	<i>pæderotæ</i>	IV	78
<i>Lydium</i>	IV	62	<i>perpusilla</i>	VII	45

Veronica Reuteriana	Diag. XII p. 46	Viola papillaris	Diagn. VIII p. 52
<i>rubrifolia</i>	» 46	<i>poetica</i>	VI 24
<i>viscosa</i>	» 47	<i>Thessala</i>	VIII 54
<i>Thymphræstea</i>	IV 77	VIOLACEÆ	I 7
Vicia Armena	II 102		VI 20
<i>Assyriaca</i>	IX 123		VIII 51
<i>Cassia</i>	» 119	Vincetoxicum Anatolicum	IV 39
<i>ciceroidea</i>	VI 47	<i>funebre</i>	XI 79
<i>Cilicia</i>	IX 122	<i>Pisidicum</i>	» 79
<i>Cretica</i>	» 116	<i>nivale</i>	VII 20
<i>cuspidata</i>	II 105	<i>speciosum</i>	IV 39
<i>Durandi</i>	IX 116	<i>Tmoleum</i>	» 58
<i>galeata</i>	II 103	Vulpia patens	XIII 62
	IX 124	Warthemia Arabica	VI 74
<i>gregaria</i>	» 121	Wulfenia Orientalis	IV 75
<i>Kotschyana</i>	VI 47		
<i>microphylla</i>	IX 117	Xanthium Anatolicum	XI 32
<i>Palæstina</i>	» 116	Xeranthemum radiatum	IV 18
<i>Persepolitana</i>	VI 48		VI 101
<i>Persica</i>	II 105	<i>squarrosus</i>	» 101
<i>Pinardi</i>	IX 120		
<i>pinetorum</i>	II 104	Zataria multiflora	V 18
<i>sativa var. albiflora</i>	IX 123	Zizyphora cleonioides	» 14
<i>Sibthorpii</i>	» 122	Zizyphus Aucheri	II 5
<i>Spruneri</i>	» 119	Zollikoferia Arabica	VII 12
<i>venulosa</i>	» 123	<i>mucronata</i>	» 12
Viola calycina	VIII 53	<i>tenuiloba</i>	XI 50
<i>cinerea</i>	I 7	Zozimia dichotoma	VI 63
<i>Cretica</i>	VIII 51	<i>radians</i>	X 45
<i>delphinantha</i>	I 7	ZYGOPHYLLÆ	I 61
<i>Heldreichiana</i>	VIII 53		VIII 120
<i>Libanotica</i>	» 50	Zygophyllum dumosum	VIII 125
<i>pachyrrhiza</i>	VI 24		

INDEX SPECIERUM

AD PLANTAS AUCHERIANAS ORIENTALES NOVAS

IN ANNALIBUS SCIENTIARUM NATURALIUM PARIISIENSII

SER. 2 VOL. XVI, XVII, ET SER. 3 VOL. I ET II, DESCRIPTAS.

Adonis Aleppica	Ser. 2 XVI p.350	Arabis Aucheri	Ser. 2 XVII p.32
Æthionema Armenum		bryoides	» 55
	Ser. 2 XVII 191	cordata	» 51
fimbriatum	» 193	drabiformis	» 55
stenopterum	» 192	hirsuta var. rosea	» 52
Alyssopsis deflexa	» 58	Montbretiana	» 53
Alyssum aizoides	» 153	nuda	» 54
alpestre	» 151	scapigera	» 54
Atlanticum	» 152	Scopoliana	» 56
Aucheri	» 156	viscosa	» 52
campestre	» 155	Aubrietia deltoidea	
confertum	» 155	var. siliquis hispidis	» 89
hirsutum	» 156		
Horebicum	» 156		
marginatum	» 157	Barbarea integrifolia	» 57
meniocoides	» 319	Boreava Orientalis	» 383
montanum	» 151	Brassica Aucheri	» 88
peltarioides	» 158	deflexa	» 87
Persicum	» 152	Harra	» 86
tetrastemon	» 153	Schimperi	» 86
var. Cappadocica	» 153	Sinaica	» 85
Wierzbickii	» 155	Willdenowii	» 88
Wulfenianum	» 151	Tigridis	» 87
xanthocarpum	» 154	Brossardia papyracea	» 184
Anchonium Tournefortii	» 386	Bupleurum Aleppicum	
Anthriscus Anatolica	Ser. 3 II 59		Ser. 3 I 148
lamprocarpa	» 59	apiculatum	» 147
tenerrima	» 60	Aucheri	» 148
Aquilegia Olympica	Ser. 2 XVI 361	Cappadocicum	» 146
Plant Orient. nov.			14

Bupleurum glumaceum			Cochlearia Aucheri Ser. 2 XVII p. 168	
	Ser. 3 Ip.	147	<i>camelinæ</i>	» 172
<i>Kurdicum</i>	»	146	<i>campylocarpa</i>	» 171
<i>leucocladum</i>	»	144	<i>drabæcarpa</i>	» 169
<i>Olympicum</i>	»	149	<i>glaucophylla</i>	» 170
<i>Persicum</i>	»	150	<i>planisiliqua</i>	» 169
<i>Schimperi</i>	»	151	<i>violacea</i>	» 171
<i>trichopodium</i>	»	145	Colladonia Syriaca Ser. 5 II	86
Butinia glaucescens	Ser. 3 II	61	Coluteocarpus	
<i>Libanotica</i>	»	62	<i>reticulatus</i>	Ser. 2 XVII 162
<i>macrocarpa</i>	»	62	Condolocarpus Apulus Ser. 3 I	349
<i>nodosa</i>	»	61	Conringia clavata Ser. 2 XVII	84
<i>stylosa</i>	»	63	Crambe Aucheri	» 388
			<i>Hispanica</i>	» 389
			<i>Persica</i>	» 389
			<i>quadricostata</i>	» 288
Cachrys eriantha	Ser. 3 II	74	Crenularia orbiculata	» 181
<i>papillaris</i>	»	75		
<i>prangoides</i>	»	76		
Camelina hispida	Ser. 2 XVII	176	Daucus heterocarpus Ser. 3 II	50
Campyloptera Syriaca	»	194	<i>Persicus</i>	» 50
Cardamine oxycarpa	»	156	Delphinium Aconiti Ser. 2 XVI	369
Carum Armenum	Ser. 3 I	137	<i>anthoroideum</i>	» 369
<i>elegans</i>	»	138	<i>Aucheri</i>	» 362
<i>daucoïdes</i>	»	139	<i>Cappadocicum</i>	» 367
<i>divaricatum</i>	»	140	<i>linarioides</i>	» 368
<i>incrassatum</i>	»	139	<i>Hellesponticum</i>	» 366
<i>microcarpum</i>	»	137	<i>penicillatum</i>	» 369
<i>Persicum</i>	»	158	<i>Persicum</i>	» 362
Chærophyllum			<i>Phrygium</i>	» 363
<i>Byzantinum</i>	Ser. 3 II	65	<i>olopetalum</i>	» 364
<i>crinitum</i>	»	65	<i>rugulosum</i>	» 361
<i>macropodium</i>	»	64	<i>tomentosum</i>	» 365
<i>temuloïdes</i>	»	64	<i>trigonelloïdes</i>	» 368
Cheiranthus			<i>tuberosum</i>	» 370
<i>crassicaulis</i>	Ser. 2 XVII	45	Diceratium canescens Ser. 2 XVII	62
Chorispora compressa	»	385	<i>floccosum</i>	» 61
<i>Persica</i>	»	384	Dicyclophora Persica Ser. 3 II	91
<i>Syriaca</i>	»	384	Didymophysa	
Clypeola echinata	»	174	<i>Aucheri</i>	Ser. 2 XVII 179
<i>glabra</i>	»	173	Diplotænia	
<i>lappacea</i>	»	174	<i>cachrydifolia</i>	Ser. 3 I 309
<i>dichotoma</i>	»	175	Draba acaulis Ser. 2 XVII	164
Cnidium conifolium Ser. 3 I		299	<i>Armena</i>	» 167
<i>Orientale</i>	»	299		

<i>Draba elegans</i>	Ser. 2 XVII p. 166	<i>Ferula Anatolica</i>	Ser. 3 Ip. 317
linearis	" 167	erubescens	" 316
Natolica	" 163	<i>Ferulago asparagifolia</i>	" 321
Olympica var. major	" 163	Aucheri	" 323
Persica	" 164	geniculata	" 324
Persica var.	" 165	humilis	" 322
rosularis	" 165	lineariloba	" 319
<i>Dorema ammoniacum</i>	Ser. 3 I 529	lophoptera	" 323
Aucheri	" 329	longistylis	" 321
glabrum	" 329	oxyptera	" 320
<i>Ducrosia anethifolia</i>	" 342	stellata	" 323
flabellifolia	" 342	trachycarpa	" 319
<i>Durizza Abyssinica</i>	Ser. 3 II 84	trifida	" 318
Græca	" 80	<i>Fortuynia Aucheri</i>	Ser. 2 XVII 178
<i>Echinophora</i>		<i>Glastaria deflexa</i>	" 204
flabellifolia	" 92	<i>Glaucium calycinum</i>	Ser. 2 XVI 375
radians	" 92	Cappadocicum	" 376
<i>Elwendia caroides</i>	Ser. 3 I 140	contortuplicatum	" 376
<i>Erucaria lineariloba</i>	Ser. 2 XVII 390	pumilum	" 374
<i>Erysimum aciphyllum</i>	" 180	<i>Graëllsia</i>	
Aucheri	" 78	saxifragæfolia	Ser. 2 XVII 173
Carium	" 77	<i>Grammosciadium</i>	
crassipes	" 79	Aucheri	Ser. 3 II 67
macrostigma	" 81	daucoïdes	" 68
Persicum	" 79	macrodon	" 67
purpureum	" 82	pterocarpum	" 68
thyrsoidæum	" 79	scabridum	" 66
versicolor	" 80	Szowitsii	" 67
<i>Eryngium Barrelieri</i>	Ser. 3 I 125	<i>Hasselquistia lanata</i>	Ser. 3 I 347
Bovei	" 124	Syriaca	" 346
Bithynicum	" 123	<i>Heldreichia</i>	
cœruleum	" 122	bupleuvrifolia	Ser. 2 XVII 186
thoræfolium	" 122	Kotschyi	" 186
thyrsoidæum	" 121	longifolia	" 187
pusillum	" 125	rotundifolia	" 185
<i>Enomia cordata</i>	Ser. 2 XVII 190	<i>Helleborus vesicarius</i>	Ser. 2 XVI 337
oppositifolia	" 191	<i>Hippomarathrum</i>	
iberidea	" 191	amplifolium	Ser. 3 II 74
<i>Farsetia linearis</i>	Ser. 2 XVII 150	Bocconi var. longiloba	" 74
macrocarpa	" 89		
pendula	" 89		
suffruticosa	" 150		

Hippomarathrum		Johrenia Græca	Ser. 3 Ip. 305
crispum var. longiloba et		Meyeri	» 307
crassiloba	Ser. 3 IIp. 73	platycarpa	» 308
cristatum	» 75		
pterochlænum	» 74	Laserpitium carota	Ser. 3 II 46
Hladnikia cicutaria	» 71	Leontice	
Heracleum apiifolium	Ser. 3 I 332	leontopetalum	Ser. 2 XVI 372
humile	» 333	Lepidium Aucheri	Ser. 2 XVII 493
lasiopetalum	» 332	latifolium	
platytænium	» 334	var. glabrescens	» 496
Hesperis Armena	Ser. 2 XVII 65	Persicum	» 496
Aucheri	» 66	Leptaleum pygmæum	» 72
breviscapa	» 67	Lereschia Thomasii	Ser. 3 I 426
campicarpa	» 66	Ligusticum saxifragum	» 300
leucoclada	» 69	Lisæa grandiflora	Ser. 5 II 54
matronalis		papyracea	» 55
var. runcinata	» 64	Syriaca	» 55
Persica	» 64	Lophosciadium	
Persica var.	» 65	meifolium	Ser. 3 I 327
podocarpa	» 65	silaifolium	» 326
pulmonarioides	» 68		
quadrangula	» 67	Malabaila Abyssinica	» 339
scabrida	» 64	Aucheri	» 338
tristis	» 65	brachytænia	» 338
Hymenophysa fenestrata	» 497	graveolens	» 335
		involucrata	» 337
Iberidella cæspitosa	» 490	lasiocarpa	» 337
ovalifolia	» 489	platyptera	» 336
sagittata	» 488	pimpinellifolia	» 335
trinervia	» 488	rectistyla	» 334
Iberis Garrexiana	» 480	Malcomia Egyptiaca	Ser. 2 XVII 72
Taurica	» 480	binervis	» 71
Isatis apiculata	» 499	crenulata	» 71
Aucheri	» 202	Meyeri	» 71
campylocarpa	» 203	pulchella	» 70
Candolleana	» 499	runcinata	» 70
cochlearis	» 202	strigosa	» 70
cordigera	» 198	Matthiola acaulis	» 50
corymbosa	» 200	albicaulis	» 46
glauca	» 204	angulosa	» 50
microcarpa	» 204	Arabica	» 49
undulata	» 200	bicornis	
Johrenia Candollei	Ser. 3 I 306	var. forcipifera	» 54
dichotoma	» 304	Eubæa	» 48

Matthiola livida	Ser. 2 XVII p.50	Peucedanum petiolare	Ser. 3 Ip. 312
montana	" 47	Orientale	" 309
odoratissima	"	Schlechtendalii	" 314
var. ovalifolia	" 49	stenocarpum	" 314
pumilio	" 51	Pimpinella Arabica	" 130
Microsciadium		barbata	" 129
tenuifolium	Ser. 3 I 142	Cretica	" 130
Morettia asperima	Ser. 2 XVII 60	crinita	" 131
parviflora	" 60	corymbosa	" 131
Moriera spinosa	" 182	eriocarpa	" 128
virgata	" 183	glaucescens	" 130
Muretia aurea	Ser. 3 I 143	Kotschyana	" 132
Tanaicensis	" 143	Olivieri	" 132
		puberula	" 129
Nasturtium		Polylophium	
ellipticum	Ser 2 XVII 59	Orientale	Ser. 3 II 48
flexicaule	" 58	Prangos anisoptera	" 86
sagittatum	" 58	Aucheri	" 83
Nigella aristata	Ser. 2 XVI 359	cheilanthifolia	" 79
deserti	" 359	cinerea	" 80
oxypetala	" 357	corymbosa	" 81
Persica	" 358	lophoptera	" 82
sativa var. hispidula	" 360	macrocarpa	" 71
		meliocarpoides	" 81
Opopanax Orientale	Ser. 3 I 330	microcarpa	" 83
Orlaya intermedia	Ser. 3 II 49	pumila	" 77
Ormosciadium Aucheri	" 93	odontoptera	" 78
		ovatifolia	" 79
		Szowitzii	" 78
Papaver Caucasicum	Ser. 2 XVI 375	Ptilotrichum	
Decaisnei	" 372	cyclocarpum	Ser. 2 XVII 159
gracile	" 372	emarginatum	" 160
Libanoticum	" 375	Pycnocycla	
Persicum	" 373	Aucheriana	Ser. 3 II 88
Parlatoria cakiloidea	Ser. 2 XVII 72	nodiflora	" 88
clavata	" 73	spinosa	" 87
Pastinaca latifolia		Ranunculus	
var. elliptica	Ser. 3 I 330	argyræus	Ser. 2 XVI 352
Peltaria Aucheri	Ser. 2 XVII 175	Aucheri	" 351
Peucedanum Aucheri	Ser. 3 I 315	Cassius	" 354
cephalotes	" 314	demissus	" 354
graminifolium	" 314	dissectus	
membranaceum	" 314	var. glabrescens	" 353
macrocoleum	" 310		

Ranunculus dissectus			Smyrniopsis Aucheri	Ser. 3 II p. 72
var. <i>velutina</i>	Ser. 2 XVI p. 553		Stenotænia nudicaulis	Ser. 3 I 540
<i>eriocarpus</i>	"	351	<i>tordylioides</i>	" 339
<i>lanuginosus</i>			Sterigma	
var. <i>pumila</i>	"	355	<i>brachypetalum</i>	Ser. 2 XVII 386
<i>lomatocarpus</i>	"	356	<i>contortuplicatum</i>	" 387
<i>myriophyllus</i>	"	354	<i>longistylum</i>	" 387
<i>procumbens</i>	"	353	Strophades lanceolata	" 83
<i>rhynchocarpus</i>	"	353	<i>linearis</i>	" 85
<i>trilobus</i> var.	"	356	Synelcosciadium	
Rhabdosciadium			<i>Carmeli</i>	Ser. 3 I 346
<i>Aucheri</i>	Ser. 3 II 69			
Rømeria Orientalis	Ser. 2 XVI 374			
Reutera flabellifolia	Ser. 3 I 133		Tetrapterygium	
<i>flava</i>	" 133		<i>glastifolium</i>	Ser. 2 XVII 204
<i>cervariæfolia</i>	" 154		Thecocarpus meifolius	Ser. 3 II 94
<i>deverroïdes</i>	" 156		Thalictrum Orientale	Ser. 2 XVI 349
<i>pastinacæfolia</i>	" 154		Thlaspi Natolicum	Ser. 2 XVII 180
<i>tragioides</i>	" 155		Trigonosciadium	
Rumia depressa	" 126		<i>tuberosum</i>	Ser. 3 I 345
			Tommasinia Kotschy	" 302
			<i>Szowitsii</i>	" 302
Scaligeria			Tordylium Cappadociæum	" 349
<i>Tournefortii</i>	Ser. 3 II 70		<i>Hasselquistiæ</i>	" 548
Scandix Aucheri	" 58		<i>macropetalum</i>	" 548
<i>grandiflora</i>			<i>officinale</i>	" 347
var. <i>lasiocarpa</i>	" 58		Torilis grandiflora	Ser. 3 II 56
<i>Hispanica</i>	" 57		Turgenia brachyantha	" 52
<i>pecten</i>			<i>tuberculata</i>	" 52
var. <i>tomentella</i>	" 58		Turgeniopsis fœniculacea	" 53
var. <i>scabricarpa</i>	" 57			
Seseli denudatum	Ser. 3 I 298			
<i>Olivieri</i>	" 298		Vesicaria	
Silaus virescens	" 301		<i>gnaphalodes</i>	Ser. 2 XVII 161
Sisymbrium			<i>vestita</i>	" 162
<i>aculeatum</i>	Ser. 2 XVII 75			
<i>irioides</i>	" 76		Zerdana anchonioides	" 85
<i>pumilum</i>	" 76		Zilla chamærapistrum	" 382
<i>rigidum</i>	" 75		<i>schouwioïdes</i>	" 382
<i>Schimperi</i>	" 76		Zozimia tragioides	Ser. 3 I 341
<i>scorpioides</i>	" 74			
<i>torulosum</i>				
var. <i>contortuplicatum</i>	" 74			

